

مؤلف مفید عالم کی دیگر ضروری اور عجیب و غریب تصانیف

تفسیر القرآن بالقرآن - جس میں تمام اخلاقی و روحانی مسائل کی تفسیر قرآن مجید سے تفصیل کی تشریح احاد

صحیحہ اور تورات و انجیل و جبر سے پیشگوئیوں کا اثبات و اقحاط و تواریح مستحبہ سے نکات کا بیان علوم جدیدہ حقیقہ سے کیا گیا ہے۔ تصانیف باطل اور بے بنیاد قصوں اور مسئلوں کو چھوڑ دیا گیا اور صاف طور پر ثابت کر دیا گیا ہے کہ تمام ضروریات دینی و اخلاقی پر قرآن مجید ایسے کامل طور پر حاوی ہے کہ کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور تمام عیوب و نقصانات اور باطلات بیانوں سے ایسا منزہ اور پاک ہو کہ بہت سبباً انسان اس پر حرف زنی نہیں کر سکتا اور ہر پہلو سے یہ کلام خدا بجا ز پر واقع ہے۔ کیا عجیب و غریب معانی و وسعت مضامین کے کیا عجیب و غریب فصاحت و بلاغت اور نبوت و حکمت کے اور کیا عجیب و غریب دلنشین ترکیب و حسن تفسیر قلوب اور ایصال الی اللہ کے اور اس بات کا بڑا اہتمام رکھا گیا ہے کہ ترجمہ اور تفسیر دونوں نہایت ہی سہل نفیس رہیں اور ہر ایک حل طلب مقام نہایت ہی مختصر اور متفقانہ طریق سے حل ہو جاوے فالحمد للہ کہ اسی کے فضل اور اسی کے کرم سے اور اس کے رحم سے مؤلف کو اس میں کامیابی حاصل ہوئی ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء مفتاح القرآن پڑھنے کے بعد ہر ایک معمولی سمجھ کا انسان تمام قرآن مجید کو اس کی مدد سے باسانی حل کر سکتا اور اپنے دین میں کامل ہو سکتا ہے پس تمام علماء و جوانوں اور بزرگوں کو چاہئے کہ اب قرآنی علوم سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ اس میں تمام دینی اور دنیاوی فلاحی امور

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ - قیمت بلا جلد سے قیمت مع جلد ہے، محصول لاک بدم خریدار۔

یہ تفسیر انگریزی میں بھی چھپ گئی ہے۔ قیمت ص ۱۰

حمایل التفسیر - یعنی تفسیر القرآن بالقرآن - حمایل کی صورت میں ۱۰۰ ہاں و آن مجید مع ترجمہ ہر صفحہ کے بالائی حصہ پر مسلسل چلا جاتا ہے اور تفسیر نیچے کے حصہ میں - ترجمہ اور تفسیر وہی ہیں جو تفسیر القرآن بالقرآن میں ہیں - قیمت بلا جلد سے - محصول لاک بدم خریدار۔

تذکرۃ القرآن - بابت ۱۹۱۹ء و ۱۹۲۰ء - جلد قیمت ۱۰۰ روپیہ سال - ان رسائل میں مفصلہ ذیل قرآنی مضامین کا بیان قرآن مجید سے نہایت عمدگی اور کمال کے ساتھ کیا گیا ہے جس کی خوبی کا اندازہ مطالعہ ہی سے ہو سکتا ہے۔ دلائل برہانی باری تعالیٰ - اسمائے الہی - تقدیر - ذکر و فکر - غفلت - دعا - تقویٰ - نبوت احمدی - از کتب مقدسہ - جہاد - اختلاف التفاسیر اور ان میں توفیق و تطبیق وغیرہ۔

مفتاح القرآن - اس کو معمولی اردو خواں ایک مہینے میں یاد کر کے پانچ روزہ لغتوں اور ایک لاکھ سولہ ہزار صیغوں پر ایسا حاوی ہو جاتا - اور صرف میں ایسا مشاق ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید با ترجمہ بالائی پڑھ سکتا ہے چھوٹے بھی اس کو چھ پانچ مہینے میں یاد کر کے قرآن مجید با معنی پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہو سکتے ہیں - بلا معنی پڑھنے کی برابر مدت میں ختم کر سکتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن نے قرآن مجید با معنی پڑھنے اور سمجھنے کو ایسا آسان کر دیا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں معمولی سمجھ کے طلباء باسانی از خود اس تفسیر کی مدد سے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں - قیمت صرف ۴

تَحْمِيدُهُ وَتَعْظِيمُهُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

۱۵۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُفِيدِ عِلْمِ

آنوس - یعنی خونِ محرکِ عمدہ و امعاء اور ربول ہو جی میں یا پیر کا اثر مقوی اور جواب کھڑے ہو کر ہوتا ہے۔ عاف - سوزاک و جیریاں کہیں میں نہیں ہوتے۔ خیم بھلو رخصت نصف دھام سے ایک ڈرام تک دیکھتے ہیں۔

آتشک و سوزاک - جقدر عورتوں کو آبی زیادہ اور مردوں کا باہمی ملاپ عام ہوتا جاتا ہے اس قدر زنا کاری بکثرت اور عام ہوتی جاتی ہے یہ امراض یعنی آتشک سوزاک اسی کا نتیجہ ہیں۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے ہی امراض اس نہایت پھیلے ہیں کہ آخر خیر کا کچھ اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ دس بارہ سال گئے کہ یہ امراض نہایت اور وقوع تھوڑے کسی شخص کا نہیں بنتا ہو جاتا نہایت شرمناک موقع خیال کیا جاتا تھا حتیٰ کہ بلا سخت تکلیف اور اندیشہ کہ ان امراض کا ظہور باہمی موت کی برابر ناگوار ہوتا تھا۔ اور اب وہ زمانہ ہے کہ یہ امراض ایک عام واقعات ہو گئے اور انکا اظہار کرنا ایک معمولی بات ہو گئی ان امراض کو انگریزی میں وینر بیل کہتے ہیں اس کی دراصل تین مختلف اقسام ہیں اول سفلس یعنی آتشک و دوم سافٹ شلر اسکا ہماری دیسی زبان میں کوئی علیحدہ نام نہیں ہے بلکہ غلطاً عام طور پر اسکو بھی آتشک کہتے ہیں۔ حال میں اور آتشک میں بہت بڑا تفاوت ہے جسکا مختصر بیان ہم ذیل میں کوں گئے انشاء اللہ تعالیٰ سووم گوڑیا - یعنی سوزاک

رہاوی سفلس یعنی آتشک - یہ ایک متعدی مرض ہے جو زنا کاری سے پیدا ہوتا ہے اسکا بہر لیادہ مرض کو خون اور زخم نہیں ہوتا ہے جب کسی تندرست شخص کے زخم یا کچھ جگہ پر مرض آتش کا خون یا اس کے کسی زخم کی رطوبت لگجا دو تو اس میں سہاگت کر جاتا اور ترقی پڑے کہ مرض پیدا کر دیتا ہے تھوک معنی اور دودھ معنی تو اسکا اثر نہیں ہوتا اگر خون اور تمام زخموں اور جھالوں میں بکثرت ہوتا ہے اس مرض کے چار درجہ ہیں۔

دا، درجہ سرایت۔ اسکی میعاد اداں سے ۴۶ دن تک ہو اور سطح میعاد ہون ہے۔ اس میں کئی خاص علامت پیدا ہوتی ہیں۔ ہوتی ہاں اگر تیز قسم کی پیچ کے ساتھ ٹکرائے سرایت کی ہے تو مقام سرایت پر سوزش اور ورم ہوتی ہے اگر سافٹ شینک کی پیچ کے ساتھ لائے سرایت کی ہے تو اس کے زخم کی علامات شروع ہو جاتی ہیں۔

۲۲ درجہ ابتدائی۔ اسکی میعاد ۴ ہفتے سے ۶ ہفتہ تک ہر پہلے ایک سخت اور عار مقام سرایت پر شروع ہوتا ہے جس میں کچھ درد ہوتا اور کچھ پیچ نکلتی ہے کبھی تو اسکی سطح پر سے پھلکے یا بوراوترتے ہیں اور کبھی نہیں اس سخت خشک اور بڑبڑ اور بھلے سے آٹھ دس یوم بعد قریب کے غدود بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں پہلے ایک غدود بڑھنا شروع ہوتا ہے بعد ازاں اور۔ مگر ان میں درد نہیں ہوتا بلکہ سخت گولیوں کی طرح ہے ہیں۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر سافٹ شینک کے ساتھ آتشک شروع ہوتا ہے تو پہلے سے زخم ہو جاتا اور غدود متورم ہو کر ان میں پیچ پڑ جاتی ہے زخم کی بنیاد سخت ہو جاتی ہے۔ اگر کسی اور قسم کا زخم وکرا و میں آتشک کا مادہ سرایت پذیر ہو جائے تب بھی اسکی بنیاد اور کنا سے سخت ہو جاتے ہیں۔

۳ درجہ دویم۔ درجہ ابتدائی کے بعد پانچ سات ہفتہ تک کوئی علامت نہیں ہوتی۔ اس عرصہ میں آتشک کا زہر غدود سے گذر کر خون میں پہنچتا اور بڑبڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ خون میں بکثرت ہو کر طرح طرح کے فسادات ظاہر ہونے شروع ہو جاتی ہیں جسم پر دونوں طرف ایک مطابق داغ نمایاں ہو کر پھر کھڑے بنتے پھر پھینچیاں اور چھالے پیدا ہوتے ہیں مقتدر کے کنار و کپڑے کنڈلی بن جاتے ہیں۔ آتشک کی پھینچوں اور چھالوں کی یہ ایک خصوصیت ہے کہ ان میں درد یا ٹیس یا جلن یا کھجلی کچھ نہیں ہوتی۔ حلق کا اندر سوزش ہو کر لوزتیس میں زخم ہو جاتے ہیں۔ ناک خون متورم ہو کر سخت موٹے اور کھرسے ہو جاتے ہیں۔ بال جھٹنے لگ جاتے اور آنکھوں کے پردوں میں سوزش ہو جاتی ہے جسکو آئی ٹس اور بی ٹائی ٹس کہتے ہیں ہڈیوں کے غلافوں میں سوزش ہو کر دم ہو جاتی اور اکثر درد ہو جاتا ہے اس درجہ کی میعاد ایک مہینہ سے ایک سال تک ہو۔

۴ درجہ سویم۔ اس درجہ میں جلد پھنکے اور ہڈیوں میں گہری نقصان پیدا ہوتے ہیں بعض اوقات دویم درجہ کے بعد کچھ مدت تک کوئی نقصان ظاہر نہیں ہوتا اور بعض ظاہر ابوری صحت پر رہتا ہے پھر کچھ عرصہ کے بعد درجہ سویم کے فسادات شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک قسم کی جھوٹی جھوٹی رسوئیاں پیدا ہوتی اور متورم ہو کر زخمی ہو جاتی ہیں اس طرح کچھ بے بدنا دیر پا اور بدبو دار زخم بن جاتے ہیں جن سے رقیق پیچ نکلتی رہتی ہے کبھی یہ گیلیاں ہڈی میں شروع ہو کر ناسا اور زخم بنادیتی ہیں کبھی اندرونی اعضا مثلاً پیچھے ابلگر گردہ قلی اور دماغ میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ آتشک ہو نیو کی بعد دوبارہ نہیں ہوتا۔ تیسرے درجہ میں کچھ مرض متحد نہیں رہتا مگر بعض کیس ایسی بیان کی گئی ہیں کہ دس یا رہ برس کے بعد بھی یہ مرض ایک سے دوسرے کو لگ گیا۔ طریق سرایت دا، اگر کوئی زخمی یا کھجلی ہونی یا کچھ سطح پر مریض کے زخم کی رطوبت لگ جانا۔

۲، اگر ایک کچھ یا پانی پر دوسرے شخص کے منہ یا زبان سے زخم کی رطوبت لگ جائے یا کچھ یا پانی سے دوسرے شخص کے منہ میں وہ رطوبتی رطوبت پہنچ جائے ۳، آتشک والی کچھ کا دانت لگ کر دودھ پلانیا والی عورت میں سرایت کر سکتا ہے۔ آتشک والی ماں یا باپ کی کچھ کا جاملے موروثی آتشک دو طرح سے ہوتا ہے ایک تو اس طرح کہ ذرا جھکے وقت

دا، درجہ سرایت۔ اسکی میعاد ادا کرنے سے ۴۶ دن تک سیر اور سطح پر ۲۴ دن ہے۔ جس وجہ میں کہ نخی خاص علامت پیدا ہوتی ہیں یا اگر تیز قسم کی بیکے ساتھ کلکٹنے سرایت کی ہے تو مقام سرایت پر نش اور دم ہوتی ہے اگر سافٹ شینک کی بیکے ساتھ انے سرایت کی ہے تو اسکے نخی کی علامات شروع ہو جاتی ہیں۔

۲۰) درجہ ابتدائی - اسکی میعاد ہفتہ سے ۶ ہفتہ تک ہر پہلے ایک سخت اور انتقام سرایت پر شروع ہوتا ہے جس میں کچھ درد ہوتا اور کچھ پیپ نکلتی ہے کبھی تو اسکی سطح پر سچھلکے یا بوراوترے اور کبھی نہیں اس سخت خشک اور بورد اور بھاسے آٹھ دس یوم بعد قریب کے غدود بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں ۱۰ ایک غدود بڑھنا شروع ہوتا ہے بعد از ۲ اور ۳ مگر انہیں درد نہیں ہوتا بلکہ سخت گولیوں کی طرح رہتے ہیں -

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اسٹشینر کے ساتھ آتشک شرفِ ہلاکت تو پہلے سے زخم ہو جاتا اور غرور و متورم ہو کر ان میں پیپ پڑ جاتی ہے زخم کی بنیاد سخت ہو جاتی ہے۔ اگر کسی اور قسم کا زخم راوی میں آتشک کا مادہ سرایت پذیر ہو جائے تب بھی اسکی بنیاد اور کرنا سے سخت ہو جاتی ہیں۔

(۳) درجہ دوم - درجہ ابتدائی کے بعد پانچ سات ہفتہ تک کوئی علامت پہلا نہ ہوتی۔ اس عرصہ میں آتش کانبر خدود سے گذر کر خون میں پھیلتا اور بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ خون میں بکثرت ہو کر طرح طرح کے فسادات ظاہر ہونے شروع ہو جاتی ہیں جسم پر دونوں طرف ایک طباقی داغ نمایاں ہو کر پھر کھڑکتے پھر پھنسیاں اچالے پیدا ہوتے ہیں مفعد کے کنار و نیہ کنڈ لیا بجاتے ہیں۔ آتش کی پھنسیوں اور چھالوں کی یہ ایک خصوصیت ہے کہ ان دریاٹھیں یا جلن یا کھجلی کچھ نہیں ہوتی حلق کو اندر سوزش ہو کر لوزتیں میں زخم ہو جاتے ہیں۔ ناخن متورم ہو کر کٹ موٹے اور کھر سے ہو جاتے ہیں۔ بال جھڑنے لگتے اور آنکھوں کے پردوں میں سوزش ہو جاتی ہے جسکو انی رائیٹس اور انائیٹس کہتے ہیں ٹریوں کے غلافوں میں سوزش ہو کر دم ہو جاتی اور اکثر دردمو جاتا ہے اس درجہ کی میعاد ایک مہینہ ایک سال تک ہو۔

(۶۷) درجہ سویم۔ اس درجہ میں جلد عضاے اور ٹیگیوں میں گہری نقصا پیدا ہوتے ہیں بعض اوقات دویم درجہ کو بعد کچھ مدت تک کوئی نقصان ظاہر نہیں ہوتا اور مرض ظاہر ابوری صحت پر رہتا ہے پھر کچھ عرصہ کے بعد درجہ سویم کے فاسخ شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک قسم کی جھوٹی جھوٹی رسولیاں پیدا ہوتی اور تورمز زخمی ہو جاتی ہیں اسطرحیگرہے بدناما دیر پا او بدبو دار زخم بن جاتے ہیں جن سے رقیق پیپ نکلتی رہتی ہے کبھی یہ گیارہ ٹی میں شروع ہو کر ناسواور زخم بنا دیتی ہیں کبھی اندرونی اعضا مثلاً پیچھے اگلے گردے قلی اور دماغ میں پیدا ہو جاتی ہیں ایک دفعہ آشک ہونیکو بعد دوبارہ نہیں ہوتا تیسرے درجہ میں کچھ مرض متحدی نہیں رہتا مگر بعض کیس ایسویان بیاں کہو گئے ہیں کہ دس بارہ برس کے بعد بھی یہ مرض آتا ہے دوسرے کو لگ گیا۔ طریق سرایت (۱) زنا کی وقت زخمی یا کھجی یا کبھی سطح پر زخم کے زخم کی رطوبت لگ جانا۔

۲۴) اگر ایک چھ یا بیالیس پر دوسرے شخص کے منہ یا زبان سے نہ ختم کی رطوبت اُچھائی چھ یا بیالیس سے دوسرے شخص کے منہ میں وہ بہت سی رطوبت پھینچ جائے (۳) آتشک والہ کی کدوانت لگ کر دودھ پلانیوالی عورت میں سرایت کر سکتا ہے۔ آتشک والوں یا باپ سے بچہ کو جانتا ہے موروں آتشک دو طرح ہوتا ہے ایک تو اس طرح کہ قراحل کے وقت

ماں یا باپ کو آتشک ہو دوں اس طرح کہ قرار حل کے بعد ماں کو آتشک ہو جائے۔

آتشک کو ابتدائی خشک سخت اور بے درد اور بھار کو مار ڈھسکر کہنے میں جو پتیل کے رنگ کا ہوتا ہے عموماً تو یہ اعضا مخصوصہ ظاہر ہوتا ہے کبھی لبوں یا رخسارہ پر یا زبان پر ہو جاتا ہے الغرض جہاں مرض کی زہریلی رطوبت کے سرایت کی ہو اسی جگہ ہو جاتا ہے اس طرح جسم کے ہر ایک حصہ پر ہو سکتا ہے آتشک کا زہر جب سرایت کر جائے تو پہلا اور دوسرا درجہ کسی طرح نہیں رک سکتی تیسری درجہ کی علامات بہت کم مر لیں میں ظاہر ہوتی ہیں علاج سے صرف اس قدر فائدہ ہو کہ اس کا زہر اسانی کے ساتھ خارج ہوتا رہتا ہے اور تکالیف کم ہوتی ہیں پہلے اور دوسرے درجہ میں پارا اور تیسرے درجہ میں پوٹاسیم آئیوڈائیڈ مخصوص اور پیٹ ہیں۔

آتشک موروثی یا سپرائشی آتشک۔ یہ عموماً پیدائش کے بعد دو ہفتہ سے آٹھ ہفتہ تک ظاہر ہوتا ہے جس قدر جلدی ظاہر ہو اس قدر زیادہ ہلکے ہوتا ہے۔ آتشک والا بچہ عموماً ضعیف الخلق اور چھوٹا ہوتا ہے جلد ہر حال میں ہونی رنگ بھیکھا گوشت نرم اور دھیلیلا اور چترہ مرصفا نہ پہنچا جسم پر پتیل نما دلغ نمایاں ہوتے ہیں پھر کھنڈ پھر پھینسیاں پھر جھالہ وغیرہ دوہ کے دانت چھیدی کمزور اور دلو سے ہوتے ہیں جو جلدی گر جاتے ہیں ناک کا اندر سوزش ہو کر غلیظ رطوبت نکلتی رہتی ہے سانس کھینچا ہوا اور آواز موٹی ہوتی ہے۔ ناک کا اندر زخم ہو کر بڑی خراب ہو جاتی ہے اور آخر کار ناک ٹیٹھ جاتی ہے۔ مستقل دانت بھی چھیدی بد وضع اور کمزور اور سامنے کو دانت دندانہ دار ہوتے ہیں سبب رخان فوطوں اور سیون پر کثرت سے سخت پھنسیاں نکلتی ہیں۔ یہ وٹ اکثر پیٹے بستے اور منہ میں اکثر جھالے پڑ جاتے ہیں چونکہ آتشک میں ہر قسم امراض جلد اور اعضا کے متعلق پیدا ہو جاتے ہیں ایسے علاج کے وقت خاص خاص امراض کو آتشک سے تشخیص کرنا ضروری ہوتا ہے آتشک کی شناخت مفصلہ ذیل امور سے بخوبی ہو سکتی ہے۔

(۱) زنا سے تین چار ہفتہ بعد بارڈشنگ کا پیدا ہونا۔ (۲) بارڈشنگ سے آٹھ دس یوم بعد قریب قریب سخت گلیٹیاں ہو جانا۔ (۳) سخت گلیٹیاں بکھڑے طور سے پانچ ہفتہ بعد جلد پر دلغیاں کھنڈ یا پھنسیاں یا جھالہ ظاہر ہونا خلق میں سوزش ہو کر لوزتین میں زخم ہو جانا ٹہیلوں میں رات کو درد رہنا جلدی داغوں اور پھنسیوں کا دونوں طرف تطابق اور کثرت کے نمودار ہونا۔ مگر انہیں طبع اور درد اور کھجلی بہت ہی خفیف ہونا بلکہ اکثر کچھ نہ ہونا (۴) ایک سال کے بعد آتشک کی گلیٹیاں ہو کر جلد کو گوشت ہڈی اور اعضا میں گہرا غلیظ اور دیر پا زخموں اور ناسوروں کا ہو جانا (۵) ان تمام علامات کا پارہ۔ اور پوٹاشیم آئیوڈائیڈ سے بہت جلد علاج پذیر ہو جانا (۶) مختلف اعضا میں طرح طرح کے خسادات مسلسل طور پر پیدا ہوتے رہنا بعض اوقات جب سافٹ شینکر ساتھ ہو تو زخم کو دیکھا آتشک کا خیال نہیں کیا جاتا ایسی حالت میں سبب کناروں اور بنیاد کو خوب غور سے دیکھنا چاہیے اگر انہیں سختی اور اوہار ساتھ ہے تو آتشک کا اشتباہ کرنا چاہیے جس کا پورا نصفہ آئندہ کی علامات ہو سکتا ہے اور زیادہ تفصیل کے لیے دیکھو بیان سافٹ شینکر کا۔

(دوم) سافٹ شینکر۔ اس مرض کی ابتدا میر ہمیشہ ایک چھوٹی پھنسی عضو خاں پر نمودار ہو کر اس کا چھالہ بن جاتا اور بعد میں یہ چھالہ پھوٹ کر زخم بجا جاتا ہے۔ اس زخم کا مواد سخت متعدد ہوتا ہے جس جگہ یہ مواد لگجائی اس جگہ اکثر کے اسی قسم کا زخم

بنادیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ زخم شرمیں ایک ہو کر پھیلنا رہتا اور قعدہ و وسعت میں ترقی کرتا جاتا ہے لیکن اسکا مادہ خون خراب نہیں کرتا ہر دو طرف چڈوں میں اس کی جھلنیں نمودار ہو کر یک جاتی اور آخر کا پھینک زخمی ہو جاتی ہیں۔

سوم سوزاک لینے کو ٹوڑیا۔ یہ درہل مجری پیشاب کی ایک تعدی سوزش ہے بد صحبت و دو تین روز بعد مجری پیشاب میں جلن اور سوزش معلوم ہونی شروع ہو جاتی اور پساری کو دبانے سے زردی یا سبزی مال رقیق پیچا جھون لگتی اور نالی کا منہ کھلا اور سرخ رہتا ہے عین روز سے آٹھ روز تک یہ حال ہو کر سخت سوزش کی علامات شروع ہو جاتی ہیں۔

عصو تناسل سو جگر سرخ ہو جاتا ہے۔ اور اگر وقت نہایت سخت جلن اور تکلیف معلوم ہوتی اور تمام عضو ایسا دردناک ہو جاتا ہے کہ کپڑا لگنے کی برداشت بھی نہیں رہتی اور ہر وقت زردی یا سبزی مال رقیق پین پیچا جھون لگتی رہتی ہے بعض اوقات پیپ کو ساتھ خون بھی خارج ہوتا ہے یہ سخت حال عموماً دس روز میں روز تک ہوتا اور بعد ازاں تمام نکالیں تب ہی تخفیف ہوتی جاتی ہے اگر باقاعدہ علاج ہوتا ہے تو دو ہفتہ میں تمام درد جلن اور اخراج پیرنے ہو جاتے ہیں ورنہ کچھ عرصہ بعد درد جلن تو موقوف ہو جاتا ہے لیکن اخراج مواد برابر مہینوں یا برسوں جاری رہتا ہے جب تک مواد جاری ہے اس وقت تک یہ مادہ تعدی رہتا ہے۔ جب یہ مرض اس طرح سے پڑنا پڑ جائے تو اسکو گھٹا بولتے ہیں۔ گھٹا کہ برابر جاری ہے یہ اندیشہ ہے کہ مجری پیشاب میں زاید ریشہ نگر اسکی تنگی یا حبس کا باعث ہو جائے تو اسکو اکثر کچھ پوتے ہیں۔ یہ مرض نہایت مشکل سے علاج پذیر ہوتا ہے اور اسکا اور پریشن جراحی کے اوق معلوم سے ہے۔ آخر کار اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نالی پیشاب تنگ ہو جاتی ہمیشہ پیشاب کو نہیں سخت تکلیف ہوتی پیشاب بار بار قطرہ قطرہ ہو کر خارج ہونے لگتا اور تمام زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ اور یہ مرض بھی پھر ایسا چھپٹتا ہے کہ بہت ہی کم خوش نصیب لوگ اس سے نجات پاسکتے ہیں۔

آب اس مختصر بیان علامات کے بعد ہم ذیل میں امراض کا کسی علاج علیحدہ علیحدہ بیان کرتے ہیں۔
اول آتشک یعنی سفلس کا علاج۔

اس مرض کو علاج کا لب لباب صرف اس قدر ہے کہ درجہ اول و دوم میں پانچ اور درجہ سوم میں پانچ سو ڈاکٹر استعمال کیا جائے۔ اگر پہلے درجہ میں ہی رہے کہ استعمال شروع کر دیا جاوے تو مار ڈشینکر کے کناروں کی سختی کم ہونی شروع ہو جاتی اور صحت نما زخم نگر اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چڈوں میں اولیٰ بہت چھوٹے نمودار ہوتے اور اگر استعمال کی پیشہ تہید ہو کر پہلے کم ہونے شروع ہو جائیں گے درجہ کی تکالیف اول تو کم جاتی ورنہ بہت خفیف ظاہر ہوتی ہیں اگر دوسرے درجہ میں پارہ کا استعمال کر لیا جاوے تو تمام شور۔ آبلہ چھپ۔ داغ وغیرہ بہت جلد کم یا کالعدم ہوتا ہے۔

میں سوزش گلو۔ چشم و زبان وغیرہ کو آرام ہو جاتا ہے۔ سوم درجہ میں پارہ کا چنداں فائدہ ظاہر نہیں ہوتا بلکہ بیمار کی صحت خراب ہو جاتی اور عام ضعف طاری ہونے کی وجہ سے اسکا استعمال ضررناک ہوتا ہے۔ اس درجہ میں پوٹاسیم آیوڈائیڈ اپنا کمال دکھاتا ہے۔ اگر شروع سے ہی اسکا استعمال کر لیا گیا ہے تو کم سے کم پانچ چھ مہینہ برابر اسکو دیتے رہنا چاہیے خواہ علامات درجہ دوم ظاہر ہوں

یاد ہوں اسکا استعمال بند کرنا مناسب نہیں۔ یہ سخت غلطی ہے کہ مریض آتشک پندرہ میں روز استعمال کے بعد حبیبیت کچھ ظاہر آنا دیکھتے ہیں صہل حال مریض کی طرف ہی بالکل لاپرواہ ہو کر زیادہ دوا کا استعمال کرکے دیتے ہیں جبکی وجہ سے انکو طرح طرح کے امراض و جہر سم میں مبتلا ہونا پڑتا ہے اور اکثر اس غفلت کی وجہ سے نہایت خطرناک اور عبرت انگیز حالت کو پہنچ جاتے ہیں ہم نے خود ایسے مریضان کو بہر چند صاف صاف طور پر یہ فہمائش کی کہ دوائی ترک کر نہیں صدمہ امراض کا اندیشہ ہو لیکن بہت کم اشخاص کو اس نصیحت کا پابند پایا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خواہ ظاہر انکالط ایک دو ہفتہ یا ایک دو مہینہ میں رفع ہو جائیں لیکن دراصل اسکا زہر ایک سال سے کم میں کلیتہاً خون و صاف خانہ نہیں ہو سکتا جب دوا کا استعمال پیش از وقت بند کیا جائیگا تو ضرور باقی ماندہ زہر اپنا زور کرکے طرح طرح کے امراض پیدا کرے گا۔ ہاں اگر انشائی استعمال پارہ میں خاص زہر پارہ کی علامات مثل قدم کشہ کثرت لعاب و سرد زبان و دم گلو وغیرہ پیدا ہوں تو فوراً چند روز کو واسطے کم کرنا یا بند کر دینا مناسب ہو گا۔ بعد میں جب تک کٹاؤ رفع ہو جائیں تو قلیل مقدار میں پھر اسکا استعمال شروع کر دینا چاہیے۔ کثرت سیلان لعاب و ورم لثہ و ورم زبان و گلو جو زیادتی پارہ سے پیدا ہوا اسکا علاج یہ ہے کہ فوراً ایک ٹنگلی سہل دیکر چنگری یا کلوریٹ آف پوٹاش کے غرغره کر ایسے سفیدی جبکہ کثرت کھلائیں اگر ضرورت ہو تو داخلی طور پر پنکچر اوپیم یا فیون ہی دیکھتے ہیں۔

مفصلہ ذیل حالتوں میں اسکا استعمال جائز نہیں ہے مرض سل خنازیر۔ ورم گردہ سخت ضعف اور لامرغری کسی پر لئے مرض کی وجہ سے ہو گئی ہو۔

بعض اشخاص کو یہ قلیل مقدار میں بھی موافق نہیں پڑتا بلکہ سخت ضرر پیدا کرتا ہے جس میں اس کا استعمال جائز نہیں ہو استعمال پارہ کے چار طریق ہیں۔

۱۔ اول کھلانا خالص پارہ اگر کھلایا جائے تو کچھ اثر نہیں کرتا بلکہ بوجہ ثقیل الوزن ہوئے صاف خارج ہو جاتا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ آٹھ چھٹانک تک پارہ خالص پلا دیا گیا اور وہ بلا کسی قسم کی تاثیر پیدا کرنے کو صاف خارج ہو گیا مگر ہم احتیاطاً یہ آجگہ ظاہر کر دیتے ہیں کہ کوئی صاحب کلی یقین کو ساتھ اسکا تجربہ نہ کر بیٹھیں کیونکہ اس تجربہ یا اندیشہ ہو کہ پارہ صدمہ میں کسی شے کے ساتھ ملکر قابل مضہم ہو جاوے اور زہر کی علامات پیدا کرے۔ اس کو صرف اس قدر نتیجہ یقینی برآمد ہوتا ہو کہ خالص پارہ کا کھلانا مفید نہیں ہے۔ اسکو مفصلہ ذیل صورتوں میں کھلا سکتے ہیں۔

۱۔ بلیمون۔ ۲۔ مگرین خوراک میں دو دفعہ روزانہ۔

اسکے بنانے کی ترکیب یہ ہے۔ خالص پارہ ایک تولہ گلقد ڈیڑھ تولہ سیدہ ملٹی نصف تولہ۔ ان ہر سہ اشیا کو ملا کر سفد رکھ کر کریں کہ پارہ کو ذرات بالکل نظر نہ آسکیں پھر دو دو گرین کی گولی بنا کر دو گولی روزانہ استعمال کریں۔

۲۔ گرے یا وڈر۔ ۳۔ خوراک ۲ گرین دو دفعہ روزانہ۔

اسکے بنانے کی ترکیب یہ ہے کہ ایک حصہ پارہ اور دو حصہ کھر یا مٹی لیکر خوب باریک کھل کریں۔ یہاں تک کہ پارہ کا کوئی ذرہ نظر نہ آئے۔

۳۔ کیٹول۔ خوراک ۱۲ گرین دو دفعہ روزانہ۔

۴۔ لاپکوار ہانڈا جراثی پر کلورائنڈ خوراک۔ نصف ڈرام دو دفعہ روزانہ۔

۵۔ ڈوٹو وائٹ سائیوشن خوراک ۱۰ پونڈ سے ۳۰ پونڈ تک۔

چونکہ ڈوٹو وائٹ سائیوشن میں سکھیا اور ایڈوٹین بھی ہوتے ہیں اسلئے یہ دوا درجہ دوم کے آخری حصہ اور درجہ سوم میں نہایت مفید ہے۔

۶۔ ساسوکلک ہزار ہا دوسری نسخجات جنہیں خالص پارہ یا شگرف۔ یا رسکیو۔ یا دارچینا جو پارہ کی مختلف صورتیں ہیں شامل کی جاتی ہیں۔ انہیں سب بہت نسخجات نہایت سریع الاثر اور اعلیٰ درجہ کے مجرب ثابت کیے جاتے ہیں مگر سب سے جو اپر غور کیا تو اخیر نتیجہ سوائے اسکے اور کچھ نہیں نکلا کہ ان نسخجات کا خلاصہ یا روح سو آچارہ کا اور کچھ نہیں ہے۔ انکو ملحوظ رکھنا اور سہل الوصول ہو کر کیٹول اور گرے پاؤڈر پر کوئی ترجیح نہیں دیا جاسکتی اسلئے ہم انکا ایک پرورج کرنا سراسر فضول اور بے فائدہ طوالت خیال کرتے ہیں۔ کیٹول اور گرے پاؤڈر سے ہی بعض مریضوں کو ہفتوں میں اور بعض کو مہینوں میں کامل آرام ہو جاتا ہے لیکن جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں انکا استعمال کم سے کم پانچ چھ مہینہ اگر شروع سے علاج کیا گیا ہو جاری رکھنا ضروری ہے ورنہ ایک سال تک۔

دوم۔ دھونی دینا جبکہ جلدی امراض مثل ثور بہق۔ آبلہ زخم۔ داغ وغیرہ بکثرت ہوں تو پاؤڈر کی دھونی کھلانا کی نسبت جلدی فائدہ کرتی ہے۔ اسکا آسان طریق یہ ہے کہ مریض کو ایک کرسی پر پرہنہ بٹھا کر ایک کبیل گردن تک لیٹ دینا کہ چہرہ کھلا ہے۔ اور ایک انصنی یا کوئی دہات کی پلیٹ آگ میں سرخ کر کے کرسی کو بچھ رکھیں اور اسپر رسکیور ۲ گرین ڈالیں۔ اس دہات کی گرمی سے رسکیو دھواں ہو کر تمام بدن میں سرایت کر گیا۔ اسطر سے ایک دفعہ روزانہ دھونی دینی چاہیے۔ دھونی دینے کی اور بہی بہت سی لمبی اور پور وین ڈاکیب ہیں اگرچہ انہیں کوئی خاص ترجیح معلوم نہیں ہوتی اسلئے ہم انکو خوف طوالت درج نہیں کرتے۔

سوم۔ جلدی پیکاری کرنا ترکیب پیکاری (۱) گرؤڈو سینٹینٹ ۲۴ گرین نوشادرا آگن پانی مقطر ۲ ڈرام ان سب کو ملا کر اس میں سے ۱۰ پونڈ بذر پیکاری عضلات کو اندر پہنچاویں۔ دوسرے دن پیکاری کو بعد فی ہفتہ ایک دفعہ پیکاری کرنا کافی ہو ذب (۲) گرؤڈو سینٹینٹ ۸ گرین پانی مقطر ایک ونس میں حل کریں اور اس میں سے ۲ پونڈ بذر پیکاری عضلات کو اندر پہنچاویں۔

چھٹا سرم مالشات۔ چونکہ مالشات میں یہ اندازہ کیا جانا ناممکن ہو کہ کس قدر پارہ جذب ہوتا ہے اسلئے ہم اس ترکیب کی طرف اپنا نظرن کو توجہ دلانا پسند نہیں کرتے۔

ثور دھن و گلو کے لیے نائٹریٹ آف مرکری کا مقامی استعمال نہایت مفید ہے۔ کٹڑی ٹو ماس جو متعہ کے قریب ہوں کیٹول ۲۰ گرین۔ آگسائیڈ آف زنک ۲۰ گرین سپل انٹینٹ ایکل ونس میں ملا کر لگانا نہایت مفید ہے۔ ہنگامہ کو زہر پڑھوان میں ایڈوٹو وائٹ ۲۰۔ ایڈوٹول کیٹول اور پوٹاشیم ایڈوٹو وائٹ بطور مرہم استعمال کرنا مفید

ثابت ہوتے ہیں اگر اشیاء استعمال پارہ میں اسہال شروع ہو جائیں تو دُور زس پاؤں یا کچھ اور کم ملا دینا چاہیے۔ مریض کی عام صحت و طاقت کی طرف بھی خاص توجہ رکھنی ضروری ہے جس سے عمدہ یہ اصول معلوم ہوتا ہو کہ وقتاً فوقتاً مریض کو وزن کرتے رہیں اگر استعمال پارہ سے وزن جسم میں کمی ثابت ہو تو مصلح غذا و مناسب مقویات لاروغن ماسی ہو اسکا و نفعیہ کرنا چاہیے اور اگر ضرورت معلوم ہو تو چند روز کے لیے پارہ کا استعمال بند کر سکتے ہیں مسوڑیوں کی طرف بھی ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے اگر کسی قسم کی ورم یا سیلان ظاہر ہو تو فوراً پارہ کی خوراک بند کریں اور پچھلکری (ڈاگرن فی اولس) یا کلوریٹ آف پوٹاش (ڈاگرن فی اولس) کے غرغہ کریں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ قلیل مقدار میں پارہ کا استعمال آٹھ نو مہینہ برابر جاری رکھنا صفا خون اور تکمیل علاج کے لیے نہایت ضروری ہے لیکن اگر ورم لثہ سیلان لعاب دہن۔ ورم زبان وغیرہ کی علامت ظاہر ہوں یا وزن جسم میں کمی واقع ہو تو مناسب تدریجاً و نفعیہ کرنا چاہیے چند روز کے لیے پارہ کا استعمال کم یا بالکل سدود کر سکتے ہیں مناسب ورزش۔ مصلح غذا تبدیل آہ و ہوا۔ خوش باشی وغیرہ سے عام صحت و طاقت کو ترقی دینا اور شراب۔ کثرت تاکو۔ اچار یا دیر نشیوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے جو جماع سے مریض کو سخت ممانعت کر دینی چاہیے۔ اگر مریض مجرب ہے تو شروع مرض سے کم سے کم دو سال تک ناشادی کی اجازت دینا ہرگز مناسب نہیں بعض ڈاکٹروں کا یہ قول ہے کہ ابتدائیں مارڈشنگ کوٹنا ٹریٹ آف مکرری یا نائٹرک ایسڈ یا زنگ کلکٹورلڈ سے جلا دینا یا سرج کرم لوہے کے ساتھ داغ دینا مرض آتشک کو روک دیتا ہے مگر ہمارا اس معاملہ میں کچھ تجربہ نہیں اس واسطے اس کے لیے ہم تصدیق یا تکذیب نہیں کر سکتے ہاں اس قدر ضرور ظاہر کر سکتے ہیں کہ شینکر کے سخت ہونے سے پہلے پہلے مقام ماؤف کو جلا دینا شاید تمام زہر پلہ یا وہ کو ہلاک کر دیتا اور خون میں لٹو سے روک دیتا ہو مگر جب شینکر سخت ہو چکا اور زہر خون میں مل گیا تو اس عمل سے کوئی فائدہ متصور نہیں ہو سکتا تاہم اس عمل کے آزمانے میں کسی قسم کے ضرر کا احتمال نہیں بلکہ فائدہ کا خیال ہے۔

سوم درجہ آتشک میں پارہ چنداں مفید نہیں ہے بلکہ مریض کی عام صحت و طاقت زایل ہونکی وجہ سے اسکی برداشت نہیں ہو سکتی اور نقصان کا احتمال ہوتا ہے اس درجہ میں پوٹاسیم آیوڈائیڈ خاص فائدہ کرنا ہے اسکی خوراک کو بارہا دینا ڈاکٹروں میں بہت اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ بخوری مقدار یعنی چار پانچ گرین روزانہ کافی ہے بعض کی رائے میں ایکلونس روزانہ تک دینا چاہیے ہمارا ان ہر دو حدوں سے اتفاق نہیں شروع سے ہی اگرین سے ۲۰ گرین تک کی خوراک میں مہینہ دفعہ روزانہ دینا چاہیے۔ جس قدر نقصانات درجہ سوم کثرت ہوں اسی قدر اسکی زیادہ برداشت ہوتی ہے اور اسی قدر زیادہ مقدار میں اسکو بلاتال دیکتے ہیں اس کے استعمال سے آتشک کی گھٹلیاں یعنی گٹا۔ استخوانی انہارا اور گہرے بد نما زخم بہت جلدی رو بصحت ہو جاتی ہیں۔ دماغی گٹا کو دباؤ کی وجہ سے اگر امراض ہونے لگیں۔ ہڈیاں۔ شینخ۔ رخشہ۔ نابینائی۔ بہرہ۔ فاج۔ لقوہ وغیرہ پیدا ہو گئی ہوں تو دو تین ڈرام روزانہ پوٹاسیم آیوڈائیڈ

کے ساتھ پارہ ملا دینا مفید اور ضروری ہوتا ہے۔ ڈونو انس سالیوٹن اس وجہ کے لیے نہایت مفید ہے۔
مفصلہ ذیل نسخہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔

لاکٹو آرمائڈ رائڈ جرائی پکٹور رائڈ نصف ڈرام پوٹاشیم آیوڈائیڈ اگرین ایفیوژن چرائٹا ایکل ونس ایسی میں خوراک
روزانہ اس نسخہ میں یہ خوبی ہو کہ پارہ پوٹاشیم آیوڈائیڈ کا انداز حسب ضرورت کم و بیش کر سکتے ہیں لیکن ڈونو انس
سالیوٹن میں یہ کمی بیشی ناممکن ہے۔

درجہ سوم کو زخموں۔ رسولیوں۔ سوزش مخمرین۔ سوزش گلو۔ وغیرہ میں پوٹاشیم آیوڈائیڈ پارہ آیوڈو فائٹم اور آیوڈوول کا
مقامی استعمال بطور مرہم یا یوٹن یا دھونی نہایت مفید ثابت ہوتا ہو۔

پیدائشی آتشک میں بھی پارہ خاص دوا ہی حسب قدر آتشک کو زیادہ نقصان پہون مسقد پارہ کی برداشت زیادہ
ہوتی ہے بچوں کو علی العموم بھی نسبتاً پارہ کھلا سکتے ہیں چھ مہینہ کے بچے کو ۱/۲ گرین ہر گھنٹہ گرین کی خوراک میں گری یا یوڈ
تین دفعہ روزانہ کھلا دینا کچھ نقصان نہیں کرتا حسب قدر پارہ کھلا نہیں خوف و زبردلی ظاہر کجای اسقدر آتشک کے
فسادات زیادہ زور کرتے ہیں۔ بچہ کو پارہ کھلانے کا ایک یہ بھی آسان طریق ہو کہ لکری کو پارہ کھلایا جا کر اسکا دودھ
پلایا جائے یا کچھ کی ماں کو پارہ تھوڑی مقدار میں برابر چھ سات مہینہ تک استعمال کرایا جائے۔ گدھی کا دودھ ایسی بچوں کو
زیادہ موافق ہوتا ہے۔ مرض آتشک میں مفصلہ ذیل ادویہ بھی مفید بیان کی گئی ہیں۔

۱ مرکبات پارہ کاربونیٹ آف مرگرنی۔ فارمنے مائیڈ آف مرگرنی۔ ریڈ آیوڈائیڈ آف مرگرنی۔ سیلی سیلیٹ آف
مرگرنی ٹینٹ آف مرگرنی شگرف۔ وارچکنا۔ رسیکپور۔ گرین مرگرنی۔

۲ مرکبات آیوڈین۔ مائیڈری اوڈک ایڈ۔ ارسٹال۔ فری آیوڈائیڈ سوڈیم آیوڈائیڈ۔ امونیم آیوڈائیڈ
آیوڈو فائٹم۔ آیوڈوول۔ سوزو آیوڈوول آف مرگرنی۔

۳ صفت قرآک ویکہ۔ سم الفار۔ آرمی اینٹ سوڈی کلو رائڈ عشبہ۔ بربریس اکوئی فوہیم۔ بونڈو برڈاک۔
کیر و باکسٹیر امارا گلا۔ گنڈیورینگلو۔ کونایم۔ کوہی ٹی لین۔ ایبرمی وین جیو پرنڈری۔ جوگولانس ٹائیگ
کولانسٹ۔ لائیو اپٹاسی منقی۔ بیٹی سپرم کاندوئی فوہیم۔ میزیرین۔ آئیون۔ پے پے این۔ فاسفورس۔ فائی ٹولا
ٹپاسی بانی کروکاس۔ پے پے ٹلا۔ کوئین۔ رسا دسین۔ ساسا فرس۔ سوڈی ہائی پوسلفاس۔ شلیچیا۔ زینٹھاکسی کم۔
ٹرائی فوہیم۔ کپا وٹڈ۔ اس فہرست کی نسبت ہماری سلسلے کا خلاصہ صرف اسقدر ہو کہ یہ تمام مرکبات پارہ درجہ اول
و دوم میں مفید ہیں۔ مگر ان عام مرکبات پر کوئی ترجیح نہیں معلوم ہوتی جو ہم علم بیان میں درج کر چکے ہیں۔ مرکبات
آیوڈین سوم درجہ آتشک میں مفید ہیں۔

باقی متفرق ادویہ اپنی تاثیرات میں بمقابلہ پارہ و آیوڈین کچھ وقت اعتبار نہیں کھتی۔ ان خاص فوائد کو اگر مرکبات
پارہ و آیوڈین کے ساتھ انکو مشاغل کر سکتے ہیں۔ زیادہ تفصیل کے لیے ان ادویہ کا اپنے اپنے
مقام پر بیان دیکھو۔

دوم۔ سافٹ نیکر کا علاج۔ اسکا علاج بیان کرنے سے پیشتر ہم دوبارہ اس بات کو یاد دلانے میں کہ زیر مرض محض مقامی ہر خون میں اس کو کچھ فساد نہیں ہوتا۔ اور کوئی دو اکھلائی یا پلائی سے اسکو خاص فائدہ نہیں پہنچا سکتی بلکہ کتب طب ڈاکٹری میں اسکو آتشک و علیحدہ نہیں کیا گیا ایسے طبہا میں یہ سخت غلطی دیکھنے میں آتی ہو کہ وہ سافٹ نیکر کو بھی آتشک تصور کر کے ایسے مطابق علاج کرتا شروع کر دیتے اور بے فائدہ مریض کو جسم پر ادویہ کا بار ڈالتے ہیں۔ اس فحش غلطی کی طرف تمام معالجین کو خاص توجہ کرنی چاہیے چونکہ سافٹ نیکر محض ایک مقامی مرض ہو ایسے اسکا علاج بھی دراصل مقامی ہو یا بغرض تقویت عضلات و قوی کوئی اندرونی دوا بھی ضرورتاً مستحکم نہیں جیسا کہ آتشک میں تمام خون خراب ہو کر جا بجا شور آور آبلہ چھپنے لگے نمودار ہوا آتشک کی رسولیاں بن کر پھٹ جاتی اور انکو بد نما اور فاسد زخم ہو جاتی ہیں بڑیاں گلن لگ جاتی اور ذہن۔ گلو چشم وغیرہ میں سوزش ہو جاتی ہے سافٹ نیکر میں اس قسم کی کوئی شکایت پیدا نہیں ہوتی برعکس اسکو آتشک کا شروع میں کوئی زخم حشفہ پر نہیں ہوتا بلکہ محض بے درد خشک پھنسی کی طور پر ایک ابھار نمودار ہوتا ہے اور سافٹ نیکر میں ایک سخت زہریلہ اور متعدی زخم حشفہ پیدا ہوتا ہے اور اگر اسکا علاج اچھی طرح سے نہ کیا جائے تو پھیلتا جاتا اور حشفہ اور عضلات کو گلانا شروع کر دیتا ہے۔ سافٹ نیکر کے علاج میں سب مقدم یہ امر ہے کہ زخم کو کامل طور پر صاف رکھا جائے سب بہتر لوشن اسکے دھوؤں کے لئے بلیک اش ہو جو ایک سو چھیالیس حصہ لایم واٹر میں ایک حصہ گلیوکل ملانے سے بنتا ہے زخم کو خوب صاف کر نیے بعد خالص آیوڈو فارم یا آیوڈو توہم پھیر کر دیں کر دینا چاہیے آیوڈو فارم کی عفونت سخت نفرت انگیز ہوتی ہے جو ٹینک ایکٹ یا ایوڈو کے پینٹس آئل ملانے سے رفع کجا سکتی ہے۔ اگر چند روزہ استعمال آیوڈو فارم کے بعد زخم دوبارہ نہ ہو بلکہ اسکی سطح بد نما زردی یا لیل سے تو خراب الگور کو نائٹرک ایسڈ یا نائٹرک ایسڈ کی مرمری یا زنگ کلورائیڈ کے ساتھ جلا دینا چاہیے اس سے فاسد اگلو جل کر اتر جائیگا اور نیچے سے سرخ صحت نامی سطح نکلیں گی بعد میں اسی طرح آیوڈول یا آیوڈو فارم و ٹینک ایسڈ کے ساتھ اسکو دس گتے رہنا چاہیے اگر ختنہ نہ ہوئی ہو تو حشفہ اور جلد کے درمیان اور مستور میں ہر دو بل اندام نہانی کو درمیان لٹ بلیک اش میں کیا ہو مشیر رکھنا چاہیے تاکہ زہریلہ دھواں نہ پھیلے جگہ لگ اور زخم سپرادرک اگر حشفہ اور جلد میں زخم کی وجہ سے سخت درد ہو تو لید لوشن یا سپرٹ لوشن میں ترکی ہوئی گدڑی برابر رکھنا اسکو دھو کر کرنا چاہیے۔ اگر فانی موشس ہو جو دھو تو ختنہ کر دیں یا ایک سید بانگاف دیں۔ دین تاکہ زخم اچھی طرح دھو یا جاکر دوا بخوبی لگ سکے لیکن بانگاف میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ سافٹ نیکر کا زہریلہ مادہ سرایت کر کے تمام حصہ زخم کو اپنی قسم کا بنالو ایسے ختنہ یا بانگاف کو بعد زخم کی کامل طور پر صاف رکھو اور آیوڈو فارم یا آیوڈول سے مراد اپنی سپیکٹ کے میں کوئی کمی نہ کرنی چاہیے بعض اوقات خلاف حشفہ کو نیچے مواجہ رہ کر سخت درد کرتا اور حشفہ اور جلد کو گل کر دے بنا نا شروع کر دیتا ہے ایسی حالت میں فوراً بانگاف دیکر اخراج مواد کو لینے رہتہ کہ وہیں جو حصہ مردہ پر گیا ہو اسکو کپڑے کی گدی کے ساتھ رگڑ کر صاف کریں اور بعد میں معمولی طور پر آیوڈو فارم سوڈیہ رکھتے رہیں اور اگر کچھ مردہ اسراحت لگی ہو تو بندریہ انٹی سڈیک پولیس اس کے علیحدہ کر نیکی کوشش کریں داخلی طور پر مرکبات پارہ دیو سے زخم جلدی رو صحت

ہو جاتا ہے۔ رسکپور کی وصولی بھی ایسے زخموں کے لیے نہایت مفید ثابت ہوئی ہے۔

چونکہ سافٹ شینکر کا نام بھی دیسی زبان میں آتشک ہی اور یہ چند مہنتوں میں ہی مناسب علاج سے صحت پذیر ہو جاتا ہے۔ ایسے غلط العالم پر ہی نہیں بلکہ حکما اور نیٹوڈاکٹر ان کی زبان سے بھی اکثر اس قسم کی روایات سننے میں آتی ہیں فلان شخص کو ایسا سخت آتشک تھا کہ عضو تناسل گلنا شروع ہو گیا تھا اور وہ فلانے علاج سے ایک یا دو ہفتہ میں کامل طور پر اچھا ہو گیا اور ایسا اچھا ہوا کہ بعد میں کوئی بقیہ اسکا نظر نہ آیا یہ سخت غلطی ہے۔ اس زخوام الناس کو اس دھوکہ میں ڈال رکھا ہے کہ آتشک ایک دو ہفتہ میں علاج پذیر ہو سکتا ہے۔ ایسا گرز نہیں ہو سکتا ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ اصل آتشک کا اثر ایک سال تک میں خون سے صاف نہیں ہو سکتا۔ ہاں موجودہ کالیف کو بھٹک آرام مل سکتا ہے لیکن اگر بارہ کا استعمال ترک کر دیا جائے تو پھر وہ زہر زور کر کے طرح طرح کے فادات پیدا کرتا اور مریض کو دفعتاً ہلک اور جھڑکا حالت میں پہنچا دیتا ہے۔

سوم علاج سوزاک یعنی گوڑیا۔ اسکا علاج مختلف درجوں میں علیحدہ علیحدہ بیان کیا جاتا ہے۔

اول درجہ ابتدائی جس میں خفیف جلن اور خارش محسوس ہوتی رہتی ہے اور حشفہ کے دبائے سر رقیق سپ خارج ہوتی ہے اسکی معادہ بد صحبت و تین روز اور حداً آٹھ روز تک ہے۔ اس زمانہ میں سادہ بخاراش عدرات و اعلیٰ طور پر نیچے چاہئیں اور نہایت کم طاقت اینٹی سیکلک لوشن تیار کر کے مجری مٹیاب میں انکی پیکاری ایک ایک یا دو دو گھنٹہ بعد متواتر کرنی چاہیے یہ یاد ہے کہ ہر دفعہ کچھ ہی وقت اس لوشن کی بوتل کو گرم پانی میں سکھ کر گرم کر لینا چاہیے۔ نمکین مہلات مثلاً سیگنٹیا سلفاس ۴ ڈرام سے ایک ولس تک یا سوڈا ٹارٹریٹ ۲ ڈرام سے ۶ ڈرام تک ۴ چھٹانک پانی میں ملا کر تیسرے یا چوتھے روز دیتے رہیں تاکہ اسہال ہو کر امعاء صاف ہیں۔ غذائیں لطیف سرلیج الہضم اور ٹھنڈی دیتے ہیں۔ دودھ چاول کھیر فیرنی آتش جو کچھ چھڑی وغیرہ گرم غذاؤں مثلاً سرخ مرچ۔ آچار چٹنی گوشت جھلی پوینہ سے پرہیز کر لیں۔

تینجیات اور ارجو درجہ اول میں دیکھے ہیں اول شورہ قلمی، اگرین آب کافور ایک ولس ایسی تین خوراک و زرا دوم سائیر کرایڈ، اگرین پٹاسنی کاربوناٹ ۲۰ گرین ان ہر دو ادویہ کو کھل کر کے آپس میں ملا لیں اور چار اونٹ پانی میں ملا کر گوش کھانے کی حالت میں پلاویں۔ اس طرح تین دفعہ روزانہ پلانا چاہیے۔ تیسویں۔ ریشم کی کے سرے، اگرین قلمی شورہ ۵ گرین سہاگہ ۵ گرین ان ہر دو ادویہ کو باریک پیسکر ایک سفوف تیار کریں ایسی تین سفوف روزانہ پانی کے ساتھ کھلانے چاہئیں۔

تینجیات چھکار یہی جو درجہ ابتدائی میں استعمال کر سکتے ہیں (۱) دارچینا ایک گرین عرق کلاب ۲ پائینڈ۔ (۲) پریگنٹ آف پٹاش ایک گرین پانی خالص ایک پائینڈ (۳) کونین سلفاس، اگرین ایڈ سلفیوڈ کڈ الی لیوٹ ۲۵ بوند عرق کلاب ایک پائینڈ (۴) پیکسکری ۵ گرین پانی ایک پائینڈ۔

انکے علاوہ اور صد ہا تینجیات اور درو پیکاری تجویز کئے گئے ہیں مگر اسبجک پر ہم ان چند بخون پر جو ہماری سلسلے میں نہایت

سہل الوصول اور قابل اعتبار میں کفایت کرتے ہیں اور اخیر میں ایک مختصر فہرست ونسجات کی بھی دیگر انشاء اللہ تھا۔ اگر ان ہدایات کی جو درجہ ابتدائی کے لیے بیان کی گئی ہو سے طور پر پابندی کی جائے تو سادہ مدرات استعمال کی جائیں اور بار بار خوب دھتک مجری پیشاب کو بذریعہ پچکاری یا دیگر کموشنوں سے دہرایا جائے تو اکثر ان دردناک مصائب سے جو درجہ دوم میں پیدا ہوتی ہیں اور نیز ان ہولناک تکالیف سے جو درجہ سوم کے بعد باقی رہ جاتی ہیں بجات کلی بلجاتی ہے۔ اگر کلی بجات نہ ملے تو کم سے کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ وہ تمام جاندارانہ تکالیف جو درجہ دوم میں نہشت کرنی پڑتی ہیں دور رہتی ہیں۔

دوم درجہ شدت مرض جبکہ میعاد دس روز سے عیس روز تک ہو۔ یہ زمانہ مریض سوزاک کے لیے ناقابل برداشت دکھ اور درد کا ہوتا ہے اسی زمانہ میں اہل جنم کی طرح اسکو اپنے کسی پر نہامت حاصل ہوتی ہے اور بالخصوص اسکی سوچتی ہے مگر سوچنے اور ٹرنے کا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ عضو تناسل سوج کر سرخ آکارہ بن جاتا ہے ہر وقت اس میں ہوش رہا جیس اور دسوز جلن بہتی اور پیپ زردی یا سبزی مائل یا خون آمیز ہر وقت بکثرت خارج ہوتی رہتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمام عضو گلکریب کی تحصیل بن جائیگا پیشاب کا آنا تو ایک ایسی آفت ہو کہ الامان۔ آگ میں جل جانے سے کم اسکی جلن معلوم نہیں ہوتی بعض اوقات پیشاب کی دبا مجری بول کو آگ کی طرح جلاتی ہوئی۔ اور کبھی ارہ کی طرح چیرتی ہوئی نکلتی ہے۔ مریض چاہتا ہے کہ پیشاب بند کئے ہے مگر تاکے۔ آخر اسکو ضرور آگ میں جلنا اور آہ سے چرنا پڑتا ہے۔ طریقہ کہ اکثر اوقات کے وقت اس مرض میں عضو خود بخود ہتاد ہو جاتا ہے جو پہلی ناقابل برداشت مصیبت کو اور دو چند کر دیتا ہے یہ ہتادگی ایسی معلوم ہوتی ہے کہ کوئی عضو تناسل کو فائدہ ٹھوک کر چیر رہا ہو۔ مریض بیچارہ مصیبت کا مارا بستر سے اٹھ بیٹھتا اور ہر چند تداویر کرتا ہے کہ یہ ہتادگی رفع ہو مگر وہ کیوں رفع ہو۔ بعض اوقات خود کشی کے ارادہ تک پہنچ جاتی ہے۔

اس ہتادگی انگریزی میں کارڈی کہتے ہیں اس زمانہ میں پچکاری کا نام لینا اٹھلانے سے کم آفت نہیں ہو۔ روغن صند یا کباب یا کوپائیوا وغیرہ ادویہ سوزاک پلانا جو اکثر رسمی حکیم و ڈاکٹر علی ایہم تجویز کرتے ہیں مریض کو دھکتی آگ میں ڈال دینے کی برابر ہو۔ ہم اس بات کو بڑے افسوس کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں کہ باوجودیکہ یہ مرض بہت عام ہو اور اپنا تجربہ ہو ایک ہوش معالج کا کافی رہنا ہو سکتا ہے تاہم ایسی لوگ جو لکیر کے فقیر ہیں جو سوائی نسخہ بانی کو اور کچھ نہ کرتے ہیں اور نہ کرنا چاہتے ہیں اور جبکہ تمام علم و عمل کا حد و انتہا صرف اس قدر ہے کہ ایک نسخہ محرب کر پائید ہو رہے وہ کبھی اپنے علم و تجربہ سے کچھ سبق نہیں لےتے اور بلکہ اظہار و کوائف موجودہ نسخہ تجویز کرتے رہتے ہیں ہم ان ہتہاری محاکجوں پر بھی افسوس کرتے ہیں جو چند نسجات کو بطور مجرب تہر کر کو عام خلق اللہ کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔

در اصل کوئی دوائی اور کوئی نسخہ کسی مرض کے لیے مجرب نہیں کہلا سکتا مجرب ہی دوا اور نسخہ ہی جو حالت موجودہ کے مطابق وقت پر تجویز کیا جائے۔

اس درجہ شدت سوزش و درد میں سادہ بے خلاش مدرات جو درجہ اول میں بیان کی گئی ہیں دیکھتے آئے یہ فائدہ ہو کہ پیشاب رقیق ہو کر جلن کم کرتا ہے۔ اور دوسرے مجری بول کی بھی بار بار بخوبی صفائی ہوتی ہے پچکاریوں کا اس درجہ میں اگر

جلن و درد شدت ہیں ہرگز نام لینا نہ چاہیے۔ ہاں اگر بوجہ علاج یا قدرتی طور پر درد سوزش و درد شدت نہیں اور بعض کو چکاری کی برداشت ہو سکتی ہے تو وہی کم طاقت کو لوشن استعمال کرنے چاہئیں جو درجہ ابتدائی کے علاج میں مذکور ہوئے۔ اگر چکاری کی مطلق برداشت نہ ہو سکی تو مفصلہ ذیل تدابیر سے سوزش کو کم کر سکتے ہیں۔

اول گرم پانی یا بارباعضو تناسل پر بہانا اور گرم اینٹی سپٹک لوشن ایک پیالہ میں ڈالکر عضو تناسل کو اُس میں کھنکا بعد میں ملل یا لنٹ کی گدی جو گرم اینٹی سپٹک لوشن مثلاً ڈارچکناہ گرین گرم پانی ۱۶ اونس یا یورکالیڈ ۶ ڈرام گرم پانی ۱۶ اونس یا پریٹینکٹ آف پوٹاش ۵ اگرین گرم پانی ۱۶ اونس میں بھگو کر عضو پر لپٹا اور بعد ازاں گٹا پرچہ یا برگ کیلہ یا موم جامہ سے ڈھانپ دینا تاکہ وہ گدی برابر تر اور گرم رہے۔

دوم۔ بعض اوقات سرد پانی عضو پر بہانا نہایت تسکین بخشتا ہے۔

تسوم۔ اکثر آٹ بیلڈ ڈونا ۲ ڈرام گلیسرین ۶ ڈرام ایڈ کاربالک ۲۰ بوندان ہر سہ ادویہ کو ملا کر گرم کر کے تین چار دفعہ روزانہ عضو پر ملا کر کرنا اور آٹس پر پرنٹ لپیٹ کر گلوٹ باندھ لینا یا گونوریا بیک لگانا۔

چھادم۔ داخلی طور پر ٹیکچر ایچ ایم ایونڈر ٹیکچر یا یوسائٹس ۲۰ بوند سپرٹ کلورافارم نصف ڈرام آب کا فور ایک اونس ایسی تین چار خوراک روزانہ پلانا یا افیون کم گرین کا فور ۶ اگرین اجوائن ۳۰ گرین ان ہر سہ ادویہ کو ملا کر آٹھ پڑیوں میں تقسیم کر کے تین پڑیہ روزانہ کھلانا۔

اگر کارڈیجینی استوائی عضو تناسل کی تخفیف رہے تو داخلی طور پر پاپاٹیم ہر ہالڈ ۴ گرین آب کا فور ایک اونس میں ملا کر دینا یا تین خوراک روزانہ پلانیں۔ یا افیون ایک گرین اور کا فور ۴ گرین ملا کر ایسی تین چار خوراک روزانہ دیں مگر اس سے آرام حاصل نہ ہو تو ایک گرین کو کے این ایک ڈرام پانی میں حل کر کے مجری پیشاب میں چکاری کریں یا مفصلہ ذیل ادویہ کی تہی مجری بول میں رکھیں۔

اکسٹراکٹ بیلڈ ڈونا ۴ گرین مارینا ۴ گرین کا فور ایک ڈرام آبل خیمبر و ماٹم ۴ ڈرام ۴ گرین ان چھ روزانہ ادویہ کو ملا کر ۱۶ عدد بقیوں میں تقسیم کریں۔

جب شدت سوزش و درد کم ہو جائے تو اس حالت کا علاج بعینہ صبر سوم کے مطابق ہے۔

سوم۔ حالت صرمنہ کا علاج۔ اسکی کوئی میعاد معین نہیں بعض اوقات ہفتوں اور بعض اوقات مہینوں یہ حالت قائم رہتی ہے ہمیں درد اور جلن کی شدت تو نہیں رہتی لیکن اخراج پیپ یا تخفیف عصر البول یا ہر دو برابر جاری ہوتے ہیں ایسے زمانہ میں خاص ادویہ سوزاک مثلاً کوپائو اور روغن صندل۔ کبات عینی وغیرہ مفید ثابت ہوتی ہیں۔ داخلی طور پر ان ادویہ کو جس طرح مناسب ہو استعمال کرنا میں اور ساتھ ہی اینٹی سپٹک لوشنوں کی چکاری کرتے رہیں انہیں سو کوپائو اسب سے اعلیٰ درجہ پر مفید ہے مگر اسکی بد بو اور ہیک اکثر مریضان کے لئے ناقابل برداشت ہوتی ہے اس سے دوم درجہ پر روغن صندل اور سوم درجہ پر کباب چینی جو ان سب میں ایک یہ بڑی دقت ہو کہ معده کو خراب کرنے اور اکثر اوقات تشنج و درد معده کا باعث ہو جاتے ہیں۔ ان امور کا

لے سوا اور پتھرا دو بیہ بطور پکڑی استعمال کی جاتی ہیں۔ ذیل میں انکی مختصر فہرست مع اندازہ فی پائٹ فی مچ کی جاتی
ایڈ بورک ڈیرہ ڈرام ایڈ کاربالک ۳ ۱/۲ ڈرام ایڈ سلفیوس ایک اونس ایڈ ٹینک ڈیرہ ڈرام پھلکی ڈیرہ
ڈرام کلورل ہائڈریٹ ایک ڈرام کرپولین ایک وٹس ہائیکو اراگٹ ۲ اونس ہلبائی ایسی ٹاس ایک ڈرام ٹاسی
کلوراس ۲ ڈرام سوڈی سیلی سلاس ڈیرہ ڈرام زنک کلورائیڈ گرین زنک سیلی سیٹ ہم گرین زنک سوزہ آئو
ڈول ۳ ڈرام زنک سلفو کاربولیٹ ہم گرین۔

یہ تمام پکڑیاں اگر درجہ اول و دوم میں استعمال کرنی ہوں تو انکی طاقت کم از کم چارم کر لینی چاہیے جو مقدار اوپر
فی پائٹ سبک بیان کیا گیا ہے اس سے جو تھانی حصہ دوائی ملانی چاہیے۔

مجری پیشاب کے اندر پہنچانے کا ایک طریق یہ بھی ہے کہ ادویہ مطلوبہ کو آئیل تھیو بروماس ملا کر اور س انچ کے قطر
لمبی بتی بنا کر نالی کے اندر پہنچادی جائے۔ آئیل تھیو بروماس حرارت جسمی پر پھلکر رقیق ہو جاتا اور حل کر دے دو اکاثر
تمام سطح اندرونی پر پھیلا دیتا ہے مثلاً آئو ڈو فارم ۲۰ گرین آئیل تھیو بروماس ہم گرین ان ہر دو کو ملا کر اسکی
بتی بنا کر مجری بول کے اندر رکھیں۔

اس قدر تفصیل کے بعد ہم چند ضروری موریط جو تمام علاج سوزاک کی بنیاد میں اپنے ناظرین کو توجہ دلائیں۔
اول یہ کہ مرض سوزاک ایک طرح سے علاج پذیر ہے اور ایک طرح سے نہیں یعنی اگر استقلال کو ساتھ کافی
مدت تک برابر باقاعدہ علاج کرایا جائے تو مرض کی شدت ہونے نہیں پاتی اور تین چار ہفتہ میں کلی آرام حاصل
ہو جاتا ہے۔ برعکس اس کے اگر بے اعتباری اور بے صبری کے طریق سے ادویہ بدلتے رہیں ایک معالج کو دوسری معالج کی
طرف بھاگتے پھریں تو چنداں کامیابی حاصل نہیں ہوتی بلکہ اکثر مرض کو فسادات بڑھ جاتے ہیں اور ہفتوں کی بجائے
مہینوں میں مرض رو صحت ہوتا ہے۔

دوہم یہ کہ جو نسخہ عام بیان میں درج کیے ہیں وہ سب کے قابل اعتبار ہیں طبیب کو ایک نسخہ پر استقلال قائم
رہنا تلوں کی نسبت بدرجہا بہتر ہے۔

تیسرا یہ کہ پکڑیاں بار بار کامل طور پر کرنی چاہئیں پکڑکاری کرنے کے بعد حشفہ کو چار پانچ مرتبہ باکروشن
کو اندر بند رکھنا چاہیے تاکہ دوا کا اثر بخوبی ہو سکے۔

چھٹا یہ کہ کثرت تبا کو شراب سرخ مچ ترشی اور تمام ثقیل غذاؤں سے پرہیز رکھنا چاہیے۔

آخذہ ایکسٹریکٹ کا بیان دیکھو۔

آرٹ کی بیماریاں یعنی خانہ چشم کے امراض۔

اول پراپٹوس ایکس آفتھیما س یعنی ذلیک کا اپنی جگہ سے باہر کو اٹھانا اسکا علاج مطابق سببا کرنا چاہیے
خانہ چشم کے اندر دبیہ یا رسولی یا اینورس مایا نیوس یا ورم عضلات یا ورم سٹخوان ہو کر ذلیک باہر کی طرف اٹھ آیا کرتا ہے پس
ان امراض کا جیسا کہ ذیل میں درج ہے علاج کرنا چاہیے تاکہ دباؤ دور ہو کر ذلیک اپنی درست وضع پر قائم ہو جائے بعض اوقات

خود دیکھو بوجہ رسولی یا اجتماع رطوبت متورم ہو کر باہر کی طرف نکلا ہوا معلوم ہو اگر تاہے جب اسوجہ سے پراپٹوسس ہو تو ان امراض کا علاج کرنا چاہیئے دیکھو بیان گلا کو ماوڈیلہ کے امراض کا۔

دوم آپس یعنی ذیلہ کے قریب یا اسکے نیچے بھڑا ہوا جانا اُبھانے کے مقام پر تنگ گانف دیکر پ کامل طور پر نکال دیں اور بعد میں پوڈیس لگاتے رہیں۔ اگر ناسو باقی ہے تو مر داٹکڑہ ہڈی کا خیال کے اسکی تلاش کریں اور اگر ممکن ہو سکے تو اسکو خارج کر دیں اگر کوئی ٹکڑہ دار ہڈی کا دستیاب ہو سکے تو سٹی ہونٹ اور وہی مثلانک کلورائڈ گرین فی وٹر بانی میں حل کر کے پچکاری کریں۔

سوم فریچر آئی پوٹنر آئی آرٹ۔ یعنی خانہ چشم کی کسی حصہ میں ضرب آکر ہڈی کا ٹوٹ جانا چونکہ باغ اسکے قریب ہو ایسے ورتکاری کا ہرگز ارادہ نہ کرنا چاہیئے مریض کو ہر قسم کی حرکت و فعل سے منع کریں اور ٹھٹھ پانی کی گدی آٹکھ پر برابر رکھیں سہلات سے انٹریوں کو صاف کریں اگر سرخی اور ورم زیادہ ہو تو جو نکلیں لگاویں ہر قسم کی محرک یعنی گرم ادویہ سرخ مرچ گرم مصالح وغیرہ سے پرہیز کریں۔

چہارم فارین بوڈی ان دی آرٹ۔ یعنی غیر جنس شے کا خانہ چشم کے اندر گھسن جانا۔ اگر ممکن ہو سکے تو مناسب ایرو اسکوٹکا لک بعد میں سوزش وغیرہ کا علاج معمولی ہول پر کرتے رہیں۔

پنجم کرانک پیری آئی آئی آرٹ۔ یعنی خانہ چشم کے غشاء اعظم میں پرانی سوزش ہو جانا اگر مریض میں آٹک موجود ہوں تو پوٹاسیم آیوڈائیڈ اور مرکبات پارہ سے علاج کرنا چاہیئے فصلہ ذیل نسخہ ایسی حالت میں مفید ہو گا۔
 آیوڈر ارجرائی پر کلورائیڈ ایک گرین پٹاسی آیوڈائیڈ ۶ اگرین ٹینک کلورائیڈ ۱۲ انس مقطر بانی آٹھ انس! سمیں سے ایک انس تین دفعہ روزانہ پلاویں۔

رفع درد کیے مارینا اور آرٹھریٹس کی جلدی پچکاری کرنا اور اکثر الٹ بلاڈونا ایک حصہ پلیو آئینٹ میں کرکسپیٹ لگانا مفید ہوگا اگر تحقیقات ایسا معلوم ہو کہ کوئی گٹا خانہ چشم کے اندر جھوٹ گیا ہے تو پلکائی تنگ گانف دیکر اس گٹا کو سرخ کر دینا چاہیئے تاکہ تمام رطوبت وغیرہ خارج ہوتی رہے اور اگر کوئی ٹکڑہ ہڈی کا علیحدہ ہو کر تکلیف دیتا ہو تو اسکو حتی الامکان نکال دینا چاہیئے۔

ششم اکیوٹ پیری آئی آئی آرٹ۔ یعنی خانہ چشم کے غشاء اعظم میں سوزش واقع ہو جانا اسکے علاج کے وہ اصول ہیں جو اوپر بیان ہوئے۔

ہفتم ٹروکس اینڈ کیریز آئی آرٹیل پوٹنر۔ یعنی خانہ چشم کی بڈیو کامر دار پڑ جانا۔ علاج عام اصول کے مطابق کرنا چاہیئے ٹروکس کیریز کا بیان دیکھو۔

ہشتم اینورزم آئی آرٹ۔ یعنی خانہ چشم کی کسی شریان کا پھول جانا اسکا علاج تین طریقوں سے کیا جاتا ہے۔
 اول۔ ماون جانب کی کیرائڈ آرٹری پر دباؤ پہنچانا۔
 دوم۔ اینورزم کی شریانوں کو لکچر کر دینا۔

سوم۔ وائف جانب کی کیرائڈ آرٹری کو لکچر کر دینا۔

ہم چونکہ فی آرٹھٹ - اسکی دستکاری کے تین طریق ہیں -
آپال نیوس کے ابھرے ہوئے حصہ کو لگیچ کر دینا -

دوقہ یا ایک نوک دار کاٹری سے ابھرے ہوئے حصہ کو جلا دینا -

سوم - اگر نیوس بہت بڑھ کر اس سے سخت ٹکلیف ہو تو کھیتا خارج کر نیکی تدبیر کرنا -

ہم اکیس انفیلیک گائیٹر - یعنی گریوڈرینز گریوڈرینز کا بیان دیکھو -

یازہ ہم - آرٹھٹیل ٹیو مرس - یعنی خانہ چشم کی رسولیاں - اگر سپیل یعنی بے ایذا رسولی ہو تو اسے نکلانے کی
کوشش کرنی چاہیے حتیٰ الوسع آنکھ کو ضرر سے بچانا چاہیے - اگر سیلگنٹ یعنی ایذا رساں رسولی ہو تو اسکا محض کلیہ
طور پر قطع کر دینا ہرگز کافی نہیں ہوتا بلکہ ساتھ ہی تمام ارد گرد کی ساختوں اور شربانوں وغیرہ کو ایکچوئل کاٹری
سے آزادانہ جلا دینا چاہیے بعینہ کافی مقدار اینٹی سیٹیک لنٹ کو کسی اسٹریٹجٹ اور اینٹی سیٹیک لوشن میں لگا کر
خانہ چشم کے اندر بھر دینا چاہیے رفع درد کے لیے مارفیا کی جلدی پچکاری کر سکتے ہیں -

دوا زہم - ڈیٹیلنٹ آف دی فرسٹل سائینسیر - یعنی عظم الجھتہ کے جو فوں کا پھول جانا - اسکا علاج
صرف اسقدر ہے کہ جبر طرف کو زیادہ آسان اور مناسب ہو خواہ خارج کی طرف یا ناک کے اندر اس جبر میں شکاف
دینا چاہیے تاکہ تمام رطوبت وغیرہ خارج ہوتی ہے باقی خاص علامات کا علاج عام صول پر کرتے رہیں -

آر بیوٹین Arbutin یہ ایک سفید دانہ دانہ جو ہر جہے جو آرٹھٹا سافا ٹیلاس یودی ارسے

حاصل ہوتا ہے ایک عمدہ درد دوا ہے - نشانہ اور مجری پیشاب کی جھلی پر اسکا مقوی اور سجا ذاب اثر ہوتا ہے - پرانی
سوزش بخانہ و جریان میں مفید ہے - خصوصاً کھگرین سے مرگن تک -

آرٹھرائٹس Arthritis درم مفصل - جوڑوں کے امراض کا بیان دیکھو -

آرٹھروچوک Artechoke مائی نار سکولی مس - آرٹھروچوکس اسکے پھول مقوی اور درد میں تیز اثر بخیش

میں - خمر شکچ آرٹھروچوک ایک اوس تک تین دفعہ روزانہ -

آرٹھریٹل سیریشن Artificial Respiration - تنفس مصنوعی جب کہ کسی جرم بند ہو جائے

تو مختلف تدابیر سے سانس لینے کو تنفس مصنوعی کہتے ہیں - کلوروفارم سنگھاتے سنگھاتے بعض اوقات تنفس بند ہو جاتا ہے -

ایسے موقع پر فوراً زبان اور ناک اسفل کو باہر کی طرف کھینچ کر مصنوعی طور پر دم دینے سے جان بچ جاتی ہے یا پانی میں غرق ہونے کی بجائے

ایسا بان کشتن ثابت ہوا ہے کہ ظاہر ایک گھنٹہ تک کوئی حرکت تنفس معلوم نہیں ہوتی مگر اس عمل کو باسقتلال برابر جاری

رکھنے سے دم قائم اور جان تازہ ہو گئی - طفلانہ اور بچہ کے جس اہم میں بھی اس سے تنفس شروع ہو کر افارزیت قائم ہو جائے

پس اس میں جان بخش عمل کی تشبیح صاف طور پر جانا ہر علاج وغیرہ علاج کے لیے نہایت ضروری ہے عرق کلوروفارم

لے لینا اور پیدائش تک کی وقت جب کہ یہ ایسا اتفاق واقع ہو جائے تو اسکی واقفیت اور عدم واقفیت پر تمام زندگی منحصر

ہو جاتی ہے پس اس سے کامل طور پر واقفیت پیدا کرنا ہر ایک علاج اور غیر علاج کو لیے نہایت ضروری ہے مصنوعی تنفس کو

طور پر سمجھانے کے لیے ہم اس جگہ قدرتی تنفس کی مختصر کیفیت بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ داخل ہونے والے تنفس یعنی سانس لینے کی علت غائی یہ ہے کہ ہوا خون کی باریک گول کر قریب پہنچ جائے تاکہ خون کو سرخ ذرات ہوا میں سے آکسیجن جذب کر سکیں اور خون کی کاربانک ایسڈ گیس ہوا میں مائل خارج ہو جائے مچھلیوں میں تنفس اس طرح سے ہوتا ہے کہ منہ کے اندر پانی داخل ہو کر گردن کے راستہ سے نکلتا ہوا انگلیوں کی سطح پر سے گذرتا ہے چونکہ ان انگلیوں میں خون کی باریک گیس بکثرت ہوتی ہوتی ہیں اس لیے خون کے ذرات پانی میں سے تمام آکسیجن جذب کر لیتے ہیں اور خون کی فاسد ہوا میں مثلاً کاربانک ایسڈ پانی میں مائل خارج ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ نے بھی اکثر مشاہدہ کیا ہو گا کہ مچھلیوں کی گردن میں ہر دو جانب رازیا سوراخ ہوتے ہیں اور ان میں سے کچھ انگلیاں ہی نظر آتا کرتی ہیں جن کو گل پھڑے کہتے ہیں ان انگلیوں میں خون کی رگیں بکثرت ہوتی ہیں۔ اور ان کا مطلب یہی ہے کہ پانی منہ کے درست داخل ہو کر گردن سے خارج ہوتا ہوا اپنی آکسیجن ہوا خون کو دیکھا اور خون میں سے کاربانک ایسڈ لیکر باہر نکلیا۔ تمام حیوانات کو تنفس کا لب لباب صرف اس قدر ہے کہ آکسیجن گیس خواہ ہوا کو ذریعہ یا پانی کے ذریعہ خون کی باریک گول کر قریب پہنچ جائے یعنی یہی حال انسان کے تنفس کا ہے ہوا انک یا منہ کے رستہ زرخہ میں سے گذرتی ہوئی پھیپھڑوں کو مسامات یعنی ایر ویسی کلرین پہنچ جاتی ہے جیسا کہ تصویر نمبر ایک میں دکھایا گیا ہے اندر کی طرف سانس لیتے وقت سینہ کشادہ ہو جاتا اور باریک ہوائی نالیاں و ہوائی تھیلیاں کشادہ ہو کر پھیپھڑوں کو مل جاتی ہیں تب ہوا پھیپھڑوں میں داخل ہو کر تمام ہوائی تھیلیوں میں پہنچ جاتی ہے اور اس جگہ خون کو ساتھ بنا دلا کئی ہو یعنی اپنا آکسیجن دیکر خون سے کاربانک ایسڈ وغیرہ ہوا میں لیتی ہے۔

باہر کی طرف سانس لینے کے وقت سینہ اور پھیپھڑے سکڑ کر باہر کی جانب ہوا کو نکال دیتے ہیں پس جب سینہ اور پھیپھڑے کی کشادگی میں کسی وجہ سے ہرج و مرج واقع ہو کر دم بند ہو جاوے سینہ اور پھیپھڑے خود بخود پھول سکیں تو مصنوعی طور پر ان کو مختلف طریق سے پھلکا کر ہوا اندر پہنچانے اور بچہ دباؤ سے سیکڑ کر باہر نکالنے یعنی اندرونی و بیرونی سانس دینے میں جیسا کہ ہم ابھی ذیل میں بیان کرتے ہیں اول فوراً مریض کی ناک یا نحر تک تھیر یا بڑی ٹنگی گذار کر جھوٹی دھونکنی کے ذریعہ یا اپنے منہ سے فی منٹ دس بارہ یا پندرہ سولہ دفعہ ہوا پھونکیں اور ہر دفعہ پھونکنے کے بعد سینہ پر دباؤ دیکر اندر کی ہوا نکالتے رہیں یہ عمل اگر چہ بیک وقت میں آسان معلوم ہوتا ہے لیکن دراصل نہایت مشکل ہے بعض اوقات بجائے پھیپھڑے کے معدے کے اندر ہوا پہنچتی

ہوتی ہے۔
دوم سٹوٹر صبا کا طریق فوراً مریض کو نشت اس طرح سوٹاؤ کہ سینہ اور سر قدر اوچا رہے تب مریض بازو کو پہنی اور پیکر ہر کے اوپر کی طرف خوب کھینچو اس کے سینہ کشادہ ہو کر ہوا اندر داخل ہوگی پھر دو سیکنڈ کے وقفہ سے بازوؤں کو جھاتی اور پیٹ پر لیجا کر خوب باؤ ایسا کرنا شروع کرو کہ سینہ دیکر ہوا خارج ہو جائیگی اسی طرح سے زور دانا متعلق کے ساتھ پندرہ دفعہ فی منٹ باری باری اندرونی اور بیرونی سانس دیتے رہو جب نفس خود بخود واکشا شروع ہو جاوے تو اس عمل کو بند کر کے اور ضروری تدابیر کو وجیہ کہ مضمون کو آخر میں ہم نے بیان کیا ہے۔
سوم مارشل ہال صاحب کا طریقہ اس میں مریض کو پہلے ہائیں پیلو پرٹا کر اوٹا کرتے ہیں۔ ایسا کرنے

جھاتی اور پیٹ پر دباؤ پڑ کر انگلی ہوا خارج ہو جاتی ہے پھر کرڈ پائیکرپٹ کرتے ہیں تاکہ سٹیڈ ٹریڈ اپنی قدرتی لچک سے کشادہ ہو کر ہوائ اندر داخل ہو جائے اسی طرح بارہ دفعہ فی منٹ آٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں۔

چھاسرہ ہو وارڈ صاحب کا طریقہ۔ اس میں مریض کو اوندھا کر اسکے بازو یا کلاں پیشانی کو نیچر رکھ دیتے ہیں تاکہ منحنی میں کراسا نہ لگے پھر ایک ویزکپ کے کی گدی بنا کر معدہ کے نیچے رکھ دیتے ہیں تاکہ سر بہ نسبت صغیر کے نیچا ہو جاویں تب پشت بھونکاؤ دیکر تمام باقی سینہ شکم سے باہر نکال دیتے ہیں بعد ازاں چٹ لٹا کر سینہ کے نیچے وہی گدی رکھ دیتے

تصویر استخبر و خبر و شش

نوٹ متعلقہ تصویر نمبر

(۱۱) مخمور پھنس چکیں۔ اسکی سوزش کو لیرجائی ٹیس کہتے ہیں۔


۱۲۱) لفظ یحییٰ شریکاً اسکی سونش کو شریکائی شریک کہتے ہیں

(۳) برائے۔

(۴۴) براکیلی ٹیوب پیسے بموائی ٹالیاں۔۔

(۵) اس کے لیے جو کہ ہوا کی تالیس ویر اور دے

کراہکا، اُسے اور کچھ کھا، ہوتا کہ کراہکا کچھ کھتے ہیں۔

[illegible]

کلید تصویر نمبر

(۱) حجرہ چہ اناک یا نہ گنبد کہ حجرہ میں داخل ہوتی اور اسی کے نزدیک

(۲) زخمرہ۔ اس کہانی میں حکم و نافرمانی کا جو طعن ہے اس کا نشانہ ہے۔

حصہ ۱۰۰: اس کے بعد ان کے کتبہ و رسوم و شاخ و

پیشتر یہ کہ دراصل یہ لوگ سب سے پہلے

[illegible]

وہاں پر اس نے یہ پتھر کے پناہ لے کر اس طرح مدد فرمائی ہو جاتا،

جیسا کہ پچھلے پتھر کی تصویر میں دکھایا گیا ہے آخر کار اسی

تہا میں لے آؤں گا یہاں ایک ہو کر چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں ختم ہوتی

میں یہ تھیلیاں زمین سے وہی نظر آسکتی ہیں تمام پیچھے انہیں

باریک تھیلوں اور مٹوائی نالیوں کا ہوا، ان تھیلوں کو روک دیتے ہیں۔

۴۵) ہر ایک کی باریک شناخت کو برائے خود بخوبی میوانی نالیاں کہتے ہیں۔

(۵) سو ان سوالیہ ناموں سے گذر کر اربوبہ کلتر میں پہنچتے رہے۔

[illegible]

ایہ زبانی سرکاری دیوانیہ ہے۔

عروسی محل کے جال ہو گئے ہیں۔

پس جب ہوا ان بھیلیوں میں چھپی ہے تو فوراً

ہوا کا اسپرچن خون میں بجاتا اور خون کی

فاسدہ اے یعنی کاربانک ایسڈ وغیرہ۔

ہوا میں لمباتی ہے۔

زبان تقنین کے لئے دیکھو بیان تنفس کا۔

تصویر ۲ زغره چسپ کے بدن وغیرہ

کلید تصور نمبر ۲

۱۰۱۔ اس کی جڑوں نامخوں کے لئے کھوپڑی کر دوں وہ یہ ہر ایک

شاخیں پہنچتی ہیں (۱۱) پیمانہ


تو اچھے چکر میں پھرتی ہو ہر ایک کی بات

نہیں میں جاں کس طرح اسکی بات چھیڑ سکتا

القلب مني اود امنا القلب

فہمے بھن میں مل ہو تا اور دہن

یعنی دنیوی میل خورہ پلہاری رشتہ



اس خون میں مکران سرفراز کو تازہ اور شاد بنا دیتا ہے۔ صبا ہی اُن نئی گول گت کو کجا اب خون کی گت سرخ شفاف ہو جاتی ہے۔ سب سے تمام خون صاف ہو کر مایا بن جاتا ہے۔

رفتہ کے اردو شہر آج (۱۸) دن کا واسطہ ہے اور یہ شہر اور مانتھ کا قاصد کے لیکر دامن اذن القل مع منبتہ اور روز کا اذن القل مع منبتہ ہے

[illegible]

۱۔ اربعہ جوارات یعنی رائے وزیر، نیکل (۱)، بایاں بطن القلب یعنی فیفٹ و میٹرکل (۲) بایاں ابن القلب یعنی لیفٹ ایرکیل۔

۱۱۔ تمام ساختوں کو صاف طور پر دکھانے کی غرض سے ہم ایک سنگ تراشیدہ اسٹیل ورک کرتے ہیں تاکہ ناظرین کے لئے سہل اور دلچسپی کا باعث

یہ دیکھ کر تصور بنیں۔ زیادہ شرح اور تفصیل کے لئے دیکھ بیان و دران خون کا۔

جندبہ کی کلمہ کی تائید کے لئے لکھی گئی ہے۔

کے زیریں حصہ پر رکھتا ہے کہ لگوٹھے زینفائیڈ کانٹری کچھ دھوئی پر میں تب تمام کا بوجھ دونوں تصیلین پر ڈال کر سینہ کو دو تین سکنڈ خوب باتا اور پھر اچانک اٹھا لیتا ہے اس طرح سے سینہ پہلے سکڑ کر ہو ا کو نکال دیتا اور بعد ازاں خود بخود اپنی پچھلی کٹاؤ ہو کر خارجی ہو جاتا ہے۔ اس طرح دس دفعہ فی منٹ کو صابن مصنوعی طور پر دم دیتے ہیں حتیٰ کہ خود بخود دم آنا شروع ہو جاوے۔

اگر غرق ہونے سے جس دم ہوا ہے تو سب سے مقدم یہ امر ہے کہ مریض کو اوندھا لٹا کر فوراً تمام پانی شکم اور سینہ میں ہو وادہ صاحب کے طریق پر نکال دیں اور بعد ازاں دہن و زبان کو کچھ وغیرہ صاف کر کے کسی طریق سے مصنوعی دم دینا شروع کریں۔ ساتھ ہی ساتھ دوسرے شخصوں کی ٹانگیں اندھا تھوں پر مالش کریں گرم پانی کی بوتلوں سے سینک میں یا جلدی سے تمام بدن پر گرم پانی بہا کر کمبل لپیٹ دیں غرض کہ جس طرح میسر آسکے تمام بدن کو گرمی پہنچا دیں اگر ممکن ہو تو فریک عصبت بجلی لگائیں۔ ایتھر کی جلدی پچکاری کرنا تحریک و ران کر لیے مفید ہے۔ طفل نورائندہ کے جس دم میں بچہ کو پہلے چھ سات سینکڈ تک لٹا کر ناک منہ اور زبان کو خوب صاف کرنا چاہیے تاکہ سر کی طرف خون زیادہ رجوع کرے اور ٹیکہ اور سینہ کی آکائش صاف ہو جائے بعد ازاں جس طریق سے چاہیں مصنوعی طور پر دم دیکے تب جس جلد کو رافارم میں مصنوعی تنفس کیا ایتھر یا ٹیڈیوٹھیرین کی جلدی لگا کر ناک اور منہ اسکا کھانا مفید ہے۔ یعنی مصنوعی دودھ۔ اسکا بیان بچوں کی غذا میں دیکھو۔

Artificial Milk آرٹیفیشل ملک

Articocalus آرٹیکولس

Artemisia Frigida آرٹیمیزیا فریجیدا

ع سیریا سالوایا۔ یہ کوئین کی طرح لیبر یا بخار اشتیاقہ صدا عرق النساء وجع الصلب حج الفال سکالین فیور اور ڈیفیریا میں نہایت مفید ہے۔ مزید پرال کوئین کو نقصانات مثلاً دوسرے دوران سر بہرہ بن بخوابی۔ بے چینی وغیرہ نہیں کرتا آخر سفوف درخت ایک رام سودو ورام تک فلوئیکٹا رام ایک ورام سے دو ورام تک فلوئیکٹا ایک کلاس کرم لیونیڈ میں ملا کر دیکتے ہیں۔

Artemisia Absinthium آرٹیمیزیا اابسینتھیم

Argentum آرجینٹم۔ چاندی بطور ورق لقرہ خالص کھلائی جاتی ہے۔

Argenti Oxidum آرجینٹی آکسائیڈ

آرجینٹی اولیٹ۔ یہ محض خارجاً بطور مالش کے مستعمل ہوتا ہے۔

Argenti et Potassii Nitras آرجینٹی ایٹ پٹاسی نائٹراس

Argenti Phosphas آرجینٹی فاسفاس

Argenti Nitras آرجینٹی نائٹراس

پتھرین سے مل کر گرین تک۔

آرجینٹی اولیٹ خارجی استعمال میں پرالز غول اور زاید انگور کی اہلح کر لیے مفید ہے۔

آرجینٹی نائٹراس کو سلوٹائٹریٹ اگر خالص کسی مقام پر لگایا جاوے تو اسکا کھلا کر سیاہ کر دیتا اور گہری ساختوں میں درو اور

سوزش پیدا کر کے آخر کار سوختہ حصہ کو بطور سیلف اپنا رہ دیتا ہے۔ بعد میں زخم بہت جلدی اچھا ہو جاتا ہے اسکو پانی میں حل کر کر کسی جگہ پر لٹا دیا جائے تو خون اور رطوبتوں کی البیومن کو الگ کر دیتا ہر ایک ذرات کے پروٹو پلازمہ اچھا دیتا تمام خون کی رگوں کو سکھاتا اور خون کو زخم پر دیتا ہے اس طرح سے یہ ایک نہایت عمدہ آئینہ فوجی ہے۔ ^{بھونٹتی ہوئی} سلونو زخم پر بہت جلدی لٹا دیا جائے تو اسی جگہ اسکا اثر محدود دیتا ہے اسلئے عام طور پر زخم پر جانوروں کے ذنبوں زہ پلے زخموں جھوٹی رسیوں ٹوپس وغیرہ کے جانا نہیں خاص طور ناثر بہت ہی استعمال کیا جاتا ہے اور سخت اور ضعیف زخموں اور بیدار سوز وغیرہ کی صحت کر لئے اسکا اثر سن لٹا دیا جاتا ہے جو تک کا خون بند کر کے میں خاص طور ناثر بہت مناسب ہے۔ ^{دوبارہ}

جب سلونو ایئر بہت پانی میں حل کر کے منہ اور گلوں میں لٹا دیا جائے تو فوراً البیومن کو الگ کر دیتا ہر پلازمہ اور خون کو اچھا دیتا اور عروق الدم کو سکھاتا ہے گویا ناسہ ^{بھونٹتی ہوئی} اور فوجی فوجی کپڑا پر لٹا دیا جائے اس طرح سے اسے آگوتن فی اینس کا حل منہ اور گلوں کے چھالوں ایکوت فیرینا ^{بھونٹتی ہوئی} اور ^{بھونٹتی ہوئی} اسلئے اس میں صاف ہے معدہ میں ہونچ کر مائیکرو کلوک ایئر اور ^{بھونٹتی ہوئی} اسلئے اس کا ساتھ ملنے اسکی بہت ایسی متغیر ہوجاتی ہے کہ کھانا خاص جاذب اور دفع سوزش اثر کا عدم ہو جاتا ہے اسلئے معدہ کو زخموں میں اسکا فائدہ ہر وقت ہے۔ لیکن دودھ اور امعاء زخموں میں اسکا جھنڈ کرنا زیادہ مفید ہے تمام ساختوں میں ہونچ کر بطور خاص ذرات کو بچھ جاتا اور سطحوں مثلاً جلد اور سوڑوں کو سیاہ فام کر دیتا ہے اعصاب پر اسکا اثر ٹانگے کا ہوتا ہے اسلئے مری غشہ کو ریا لو کو موٹا ایسی میں مفید ہے۔ اندرونی استعمال کے لئے آگ ایڈ آف سلونو اور فاسفیٹ آف سلونو بہتر ہیں۔ آرسینیٹ فاسفاس و خراش معدہ اور جلد کی بدرنگی بھی نہیں ہونے پاتی آرسینیٹ آف ٹاسنی ٹریٹرس کا اثر خاص آرسینیٹ ناثر اس کو ضعیف ہوتا ہے اسوہ سطح پر ہامٹی گینگوا کا شک بھی ہے۔ امراتن شجر میں اسکا استعمال مفید ہے۔ ورق نقدہ جی داخلی استعمال میں نہایت عمدہ مقوی اعصاب میں

آرسناتی آیوڈائیڈم - Arsenii Iodidum ^خ ہر گزین۔
 لائیو آرسینیٹ ہائیڈرو آئیوڈائیڈم - ^خ ۱۰ سے ۳۰ قطرہ تک۔

آرسنایٹ آف برومین Arsenite of Bromine ^خ ایک سو تین پانچ قطرہ تک
 آرسنایٹ آف کاپر Arsenite of Copper ^خ ایک سو تین پانچ قطرہ تک
 آرسنک اولیٹ Arsenic Oleate ^خ پانچ قطرہ فی اونس سنگین میں مل کر اچھا
 آرسنک ایڈ - Arsenic Acid ^خ سنگین الفاسر ^خ ایک سو تین پانچ قطرہ تک
 لائیو آرسینیٹ کیلکس ^خ ۲ سے ۸ ہونڈ تک
 لائیو آرسینیٹ سالی ہائیڈرو کلو ریکس ^خ ۲ سے ۸ ہونڈ تک
 آرسنک برومائیڈ Arsenic Bromide ^خ گینس سالیڈ ^خ ایک سو تین پانچ قطرہ تک
 آرسنایٹ آف آئرن - Arseniate of Iron ^خ ایک سو تین پانچ قطرہ تک
 آرسنایٹ آف سوڈیم - Arseniate of Sodium ^خ ایک سو تین پانچ قطرہ تک
 لائیو آرسوڈی آرسینیٹس ^خ ۵ ہونڈ سے ۱۰ ہونڈ تک۔

مناجی استعمال میں آرسنک سنگیہ آری ٹینٹ۔ کاسٹیک۔ اور انٹی سینک۔ ایسے نصد ساختوں مثلاً لوہے۔ الی تمسلیوں کا
 کاٹنی لومکا رنگ۔ سائنٹیک۔ روفینٹ۔ آکس۔ سوکائی۔ سس وغیرہ کو اصلاح پر لانے کے لیے مختلف طاقتوں میں
 استعمال کیا جاتا ہے چونکہ کچی سطحوں میں یہ جذب ہو جاتا ہے اسلئے اسکا خارجی استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے۔ دانستہ کریز
 و مردانہ ہو کر بھرنے میں دو حصہ آرسنک ایسڈ میں ایک حصہ سلفیٹ آف مارفین اور کافی مقدار کر کے زوٹ ملا کر بھرنا درود
 کو موقوف اور فاسد حصہ کو صاف کرنا ہے طبی مقدار میں پلانے سے معدہ میں ہینچک پارہ اور چاندی کی طرح اسکی کیفیت
 متغیر نہیں ہوتی اسلئے خراش کر کے دوران خون اعصاب اور غدود کو تحریک دیکر گرمی اور اشتہا پیدا کرتا اور اخراج
 عروق باضفہ کو زیادہ کرتا ہے اسوجہ سے پرانی بدھضی میں جو ضعف معدہ سے ہوا سین مفید ہے اگر زیادہ مقدار میں کھلا
 جائے تو کثرت خراش سے قے غثقان اور دیگر علامات سوزش معدہ پیدا کرتا ہے۔ اسکا بھی سوزش پیدا ہو کر کھال
 ہو جاتی ہیں خون میں جذب ہو کر خارج ہوتے وقت بھی معدہ میں فصلہ بالا طریق سے تقویت دیتا ہے خون میں ہینچک کوئی
 خاص تغیرات پیدا نہیں کرتا لیکن قلت و رقت خون میں رانیما جو دیگر امراض مثلاً لیریا۔ ٹیو بریکلو۔ سس۔ سکرا فیولا۔
 گائٹ۔ ہیپوٹرم اور کھال اور پیشین مزمنہ کے باعث سے ہوا ویزیر کی شش انیمیا میں مفید ہے خون کو خارج
 ہو کر تمام ساختوں اور اعضا میں ہینچک پارہ اثر پیدا کرتا ہے کہ گیسڈیشن کو اور پیداوارنا۔ ٹیو جسن مادہ کو زیادہ کر دیتا اور س
 کے ذریعہ کو چربی میں بدل دیتا ہے لیکن انیمیا میں کثرت ملکر کوئی مستقل مرکب نہیں بنا تا بلکہ جلدی خارج ہو جاتا ہے
 تمام اعضا کو نقصان دینا کو تقویت دینا کو یا کبھل ٹانگ اور آئریڈیو ایسے نفوس اور وجہ مفاصل میں مفید ہوتا ہے
 یہ موصوفیا اور سل میں سوزش کی پیداواروں کو جلدی زایل کر کے تحلیل کر دیتا اور لیڈیل بیماریوں مثلاً بخارات۔ تشقیق
 صدمہ۔ بیاض۔ عرق المنا وغیرہ ویزیر سے فیور میں مفید ہے اعصابی مرکوزوں کو خاص کر جو نخاع کو متعلق ہیں تقویت
 دیتا اور انکی حر اور فیلیکس راہی کے پلیمے کو کم کر دیتا ہے۔ اسلئے کوریا۔ صرع۔ رعشہ۔ ورم اور اعصابی دروں میں مفید
 ہے۔ سنگیہ براہ پیشاب جلد جگر اور امعا خارج ہوتا ہوا اپنے خاص اثر ظاہر کرتا ہے یعنی ان اعضا میں خراش پیدا کر کے
 اخراج و حومات زیادہ کرتا اور انکی افعال کو تقویت دیتا ہے اسلئے اکثر جلدی امراض مثلاً سوکائی۔ س۔ کراک۔ گزیما
 ایلی۔ ہیپوٹرم اور نفوس و صفراوی ننگریوں میں مفید ہے۔ آرسنٹ آف آئرن کل کو پینہ کور و کتا ہر صرٹا یا ریا کتا
 گزما اور سل میں ہی مفید ثابت ہوا ہر معدہ پر دینا بہتر ہے کیونکہ ایسی حالت میں اس معدہ کی جھلی پر خراش کم ہوگی سوزش
 و درد معدہ نفخ۔ سرخی۔ شہم۔ خشکی۔ گلیو اور قوی تاثیریں اسکو احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ بچوں کو بور ہوں کی نسبت زیادہ
 برداشت ہوتی ہے فولاد کو ساتھ ملکر یہ نہایت عمدہ مقوی ہو جاتا ہے کیونکہ سنگیہ افعال نشود نا کثر کرتا اور فولاد
 مادہ پرورش خاص کر کیچن زیادہ پہنچاتا ہے۔ ایک حصہ لایکھوارا۔ راسنی کیس تین حصہ مقطرانی میں ملکر دیکے ورنج بڑھ قطرہ
 لکی چھپکری کرنی گوا۔ ٹیو اور سار کوما میں مفید ثابت ہوئی ہے۔

بروما۔ آف آرسنک مگما میں نہایت مفید ہے سنگیہ اور برومانس علیحدہ دینے سے جو نقصانات اور دقتیں واقع
 ہوتی ہیں وہ نہیں پہنچاتی بلکہ باضفہ اور عام طاقت ترقی پہنچاتی ہیں اور دیگر برومانڈز کی طرح اسکی مقدار

بروز زیادہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔

آرسنائٹ آف کاپر موسم گرنا کو اسی طرح اور بیضہ میں جو انول و بچوں کے لئے مفید ثابت ہوا ہے۔

آرکائیٹس *Orophitis* درم بیضہ۔ فوطوں کے امراض کا بیان دیکھو۔

آرکٹاسٹافیلوس گلاکا۔ *Arctostaphylos Glauca* میں بیضہ کا بیان دیکھو۔

آرکٹاسٹافیلوس یووی ارسائی *Arctostaphylos Uvae Ursi* بیضہ کا بیان دیکھو۔

اسکے پتے اپنی تاثیرات میں پائرا اور بکوکے مشابہ ہیں لیکن ان میں نیل اور لیلک لہڑیادہ موسمی وجہ سے اس میں بیضہ زیادہ ہوتی ہو کر دھوا اور مجری پیشاب کے پرانے زکام میں بطور اسٹرنجینٹ۔ ڈوس انٹیکٹ سیٹی مولیٹا۔ زیادہ بکوکے استعمال کیے جاتے ہیں۔ خیم الفیووزن یووی ارسائی سے ۲ اونس تک۔

آرموریشیا رڈکس *Armoracia Radix* ہارٹس کیڈنٹس کیڈنٹ رائی کیڈنٹ بطور

کا ڈسٹریٹ اور محرک معدہ استعمال کیا جاتا ہے اسکے کیونڈ سپرٹ نہایت عمدہ محرک ریح اور خوش فایقہ ہے۔ خیم سپرٹ رائی مولیٹا کو ایک ڈرام سے ۲ ڈرام تک۔ ایروٹیک سپرٹ ۱ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔ اس کے گنتہ۔

آرٹنی کا۔ خارجی استعمال میں مقامی سوزش پیدا کر کے سرخی اگر نما اور بعض اوقات ماسرہ پیدا کرتا ہے اسلئے ہکا استعمال بطور کانٹرا آریٹسٹ اور لوکل سیٹی مولیٹا احتیاط سے کرنا چاہیے۔

کھلانے سے لطیف خوشبودار و غنوں کی طرح محرک و مقوی معدہ اور جنرل سیٹی نوٹ تاثیرات پیدا کرتا ہے۔ زیادہ مقدار میں قزومت اور سخت شورش ہو جاتا ہے گردوں اور صلبہ سے خارج ہوتے ہوئے مراد و مرق اثر پیدا کرتا ہے۔ خیم ٹیکر ایک ڈرام سے ۲ ڈرام تک۔

آروغ۔ ڈکار۔ آرکیشن کا بیان دیکھو۔

آرمی ایٹ سوڈی کلورائیڈم۔ *Auri et Sodii Chloridum* یہ ایک نہایت عمدہ

مقوی اعصاب صفی خون ہے۔ آتک (درد و دوم و سوم) اختناق الرحم۔ احتباس الطث قلت الطث سوزش رحم مالنخو لیا اور ہائی پوکائیٹریا میں مفید ہے۔ آتک میں جبکہ پارہ اور پوٹاسیم آکسائیڈ سے کامل آرام نہ ہو تو یہ نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ خیم ۱۰ گریں سے ۱۰۰ گریں تک۔

آستھما۔ *Asthema* آستھما دم کھڑا دم و ضیق النفس۔ یہ بیان طرہ سے ہو سکتا ہے اول ہوائی

کے تشنج استرخا و دوم حشر میں تشنج یا دم کے باعث روک ہو جانے سے سوم قلبی امراض سے چھادڑ امراض خون مثل نفرس پیچیم ڈایا ڈام پر دباؤ یا کھینچ ہونے سے۔

ان میں سے ہر ایک اسما جو ہوائی نالیوں کی تشنج سے پیدا ہوتا ہے بہت عام ہے۔

علامات۔ دورہ سے پیشتر سفید رقیق پیشاب کثرت سے خارج ہوتا خفیف کھانسی۔ ردکش ظاہر ہوتی اکثر

قبض ہو کر نفع اور گرانی ہو جاتی ہے۔ ان علامات سے مرخص پہچان لیتا ہے کہ اپنے ورثہ شروع ہوئیہ الہیہ عموماً دو تین بجے رات کو دور ہوتا ہے سینہ پر کھینچ اور دباؤ محسوس ہو کر دم بند ہونا معلوم ہونا اور سخت دلکشی ہو جاتا ہے تب مرخص اپنے کپڑوں کو ڈھیل کرنا بستر سے اٹھ بیٹھنا اور کسی چیز کو ہاتھوں سے کپڑ کر سانس لینے کو واسطے زور کرنا اور تمام طاقت سانس لینے میں ختم کرتا ہے جس سے بدن پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے سانس کیساتھ کشت اکوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ وریدوں میں خون جمع ہو کر چہرہ اور بدن نیلا اور پھیکا پڑتا ہے کچھ دیر کے بعد یہ دور دفعتاً یا تدریجاً ختم ہو جاتا ہے مگر بعد میں کھانسی کو ساتھ کسی قدر بلغم خارج ہوتا رہتا ہے بلغم عموماً چھوٹے چھوٹے شفاف گولیوں کی صورت میں خارج ہوتا مگر کبھی کبھار مقدار اور تہہ ہوتا ہے اسکے اندر مضبوط لکھائے ہوئے بلغم کے ریشہ ہوتے ہیں خوردبین میں دیکھنے سے ہشت پہلو غلیظ نظر آتی ہیں بار بار کو دوران سے سینہ قدری بڑھ جاتا حرکت انبساطی خفیف یا معدوم ہوتی تھوکنے کی آواز صاف سموع ہوتی تنفس کی آواز بند نہالیوں کے مقابلہ پر ضعیف پڑ جاتی اور خشک آوازیں سنائی دیتی ہیں۔

اسباب یہ مرض موروثی اور مردوں میں عورتوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اکثر نرسال کی عمر سے شروع ہوتا ہے تین سال سے پچاس سال کی عمر تک بڑھتا رہتا ہے مفصلہ ذیل وجوہات سے اسکے دورہ کی تحریک ہو جاتی ہے۔
 ۱۔ گرد و غبار اپنی ٹھاک پاپولن وغیرہ خراش کنندہ اشیاء کے دھانس چڑھانا۔
 ۲۔ اکثر برا کھانسی اور اینجیما کراسخہ یہ مرض ہو جاتا ہے۔
 ۳۔ قلبی امراض جن سے پیچھے پھروں کا اندر اجتماع خون ہو جاوے۔

۴۔ نفع و قبض۔

۵۔ انتقال حس اعصابی مثلاً امراض لحم سدرہ مہارہ۔ دفعتاً گرم ہو جانا ٹھنڈی ہوا لگنا۔ لوزیتین کا بڑھنا۔ تاجخوہ اور حلق کے امراض۔ ناک کی رسولیاں نزلہ و زکام کسی ٹرنزیٹیو ٹیڈی کا بڑھنا۔

۶۔ جذبہ و باغی اشتقاق الرحم۔

۷۔ برائیکس غدد و کا بڑھنا۔

۸۔ واکس عصب پر خراش رہنا۔

کیفیت۔ اسکی اصل حقیقت کی نسبت مختلف ہے میں جو ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

۱۔ ہوائی نالیوں کا تشنج ۲۔ ڈایا فلام کا تشنج ہو کر سخت ہو جانا ۳۔ ہوائی جلیب کا اجتماع خون اور ورم ۴۔ ریشہ و انجم کی گولیوں کی نالیوں کا تشنج ۵۔ ناک کا اندر ہڈی کا پیچھا یا سہسولیاں پیکھا ہو جانا ۶۔ دیگر بلغم میں شریٹوں کا کس قسم کا نبات بھی پایا گیا ہے جو دمہ یا فلام کا تشنج سے ہوتا ہے اس میں درد اور دلکشی وقفہ وقفہ کرتا رہتا ہے۔ انتہا دورہ کو کھانسی نہیں رہتی نہ باغی خارج ہوتا ہے نہ کوئی خشک یا تر آوازیں پیچھے وں سے سموع ہوتی سخت ریہانسی میں بھی یہی حالت ہو جاتی ہے جو خراش کنندہ گرد و غبار کی دھانس چڑھنے سے دمہ ہو جائے اسکو ہی آسکا کہتے ہیں اس میں نہ کھانسی اور ضعف و تقاہت کی زیادہ شدت ہوتی ہے گرد دلکشی کو دورہ خفیف ہوتے ہیں۔

امراض متشابہ۔ ایسی بیماریاں جن میں امراض قلب، اعصابی و کبھی گردن امراض کی علامات کا مقابلہ کرنے سے تشخیص آسانی ہو سکتی ہے۔

لبخاظ علاج یہ دو قسم کا ہوتا ہے خشک اور مرطوب خشک دہ میں محض ہوائی ایو و سائٹو عضلات متشنج کا تشخیص ہو کر دم لینا مشکل ہو جاتا ہے مرطوب دہ میں علاوہ تشخیص کے ہوائی نالیوں میں لمبم جمع ہو کر دکشی اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے خشک دہ کی نوبت بچا۔ گھنٹہ میں رفع ہو کر عموماً کئی آرام حاصل ہو جاتا ہے لیکن مرطوب دہ میں شکایت دکشی بہت دیر تک باقی رہی ہو پس تمام لبخاظ علاج دمہ کا صرف ہمدرد ہو کہ فوراً رفع تشخیص اور اخراج بلغم کی کوشش کی جائے خشک دمہ کو لینے مارینا اور اٹروپین کی جلدی پھپکاری کرنا سب سے اعلیٰ درجہ پر ہو اس سے چند منٹ میں ہی تمام دکشی رفع ہو کر مریض کو کئی آرام حاصل ہو جاتا ہے اور یہ آواز دینا (یا) اثر ہو کیوں کہ مرطوب دہ کی حالت میں اسکا استعمال اندیشہ ناک ہو نیز اگر کوئی مرض گردہ موجود ہو تب ہی ہرگز نیشا استعمال نہ کرنا چاہیے۔ بیشمار دفع تشخیص اور دینا مثلاً کھولنا فارم (۲۰ بوند سے ایک ڈرام تک)، الٹائیٹھ (۲ بوند سے ۵ بوند تک) امونیا کاربونا س (۵ بوند سے ۱۵ بوند تک) پائیری ڈین (۲۰ بوند) نتھال۔ اتھیل نائیٹرائٹ۔ آئی سوڈی نائیٹرائٹ وغیرہ کا سنگھانا۔ بہت شہرت پانچک ہے اسمیں کوئی حکام نہیں کہ یہ تمام ادویہ نہایت سریع الاثر و رفع تشخیص ہیں اور نوبت دمہ کو فوراً خفیف یا بالکل رفع کر دیتی ہیں لیکن انکا اثر عارضی ہوتا ہے بلخاظ سرعت و قیام تاثیر یہ تمام ادویہ مانعاً و اٹروپین کی جلدی پھپکاری کے مقابلہ میں بہت کم وقت کھتی ہیں لیکن جبکہ دمہ مرطوب ہو یا کوئی مرض گردہ موجود ہو تو بجا و مارینا کی ان ادویہ کو استعمال نہ کرنا بہت قسم کی دھونیاں دہ میں مفید ثابت ہوتی ہیں مثلاً قلمی شورہ۔ دہتورہ تاکو۔ لوبی لیا۔ برگ ہائوسائیس۔ برگ بیلا ڈونا۔ برگ چیری لال۔ پچا۔ گرنڈی لیا۔ سوفراجوائن۔ ایو کو لپٹس کے پتہ وغیرہ کی دہونی دینا قلمی شورہ کی دہونی اسطرح دیتے ہیں کہ ایک مقدار پانی میں زیادہ و زیادہ شورہ حل کر کے اسمیں جاذب تر کر کے خشک کر لیتے اور وقت ضرورت پر اس کا غلہ کو جلا کر اسکا دہواں سوگھتی ہیں۔ اسکا دہواں اسقدر مریض لکڑہ میں کرنا چاہیے کہ تندرست لوگوں کو دکشی محسوس ہو و لگے کم مقدار میں ہونی کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا باقی ادویہ معمولی طور پر جلا کر انکی دہونی لیتے یا چرٹ باحتہ کے ریجی و انکا دہواں گائیز و رفع تشخیص ادویہ میں ہوتا ہے کوئی دوا ایسی نہیں جو دہ میں آزمائی نہ گئی ہو اور جو تھوڑی بہت مفید ثابت نہ ہوئی ہو۔ انکی مختصر فہرست ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔

پوٹاسیم آیوڈائیڈ برومائیڈ۔ بیلا ڈونا۔ ہینک۔ کافور۔ شک سینبل۔ مدعفران۔ کلو سل ہائیڈریٹ۔ اینٹی پائرین۔ میٹھری۔ دہتورہ۔ افیون۔ قہوہ۔ چائے کیفین۔ سائیٹرائٹ۔ کیفین۔ ٹیکچر لوبی لیا۔ لوبی لین۔ داگرین سے ۴ گرین تک (کیو برکو بھنگ۔ کونائیم۔ ہائوسین۔ سرپ آف ہائیڈریڈک ایسڈ ۲۰ سے ۳۰ بوند تک) کچھلہ۔ سٹرکینا۔ سم الفاد۔ ایتھر۔ اجوائن۔ ایل ٹرائی برومائیڈ۔ انی مونس۔ انہو لیم لیمبی لی آئی۔ ایو مارینا۔ ہوائی اوینا۔ مدار سیرینی۔ آکسی لاس۔ اتھیل برومائیڈ۔ ایو فار بیا پولی فرامیٹھی لال۔ نائیٹرو گلیسرین۔ بیسی ڈیا اری تھرائینا۔

ان میں جو جن ادویہ پر خط کھینچے گئے ہیں وہ زیادہ قابل اعتبار ہیں۔ ان تمام ادویہ کے استعمال میں یہ امر قابل غور ہے کہ انکو زیادہ مقدار میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے متواتر دینا چاہیے اور چونکہ کھلا فٹے سے اثر دینا نہیں ہوتا ہے اسلئے

ہمیشہ یہ بہت ہے کہ پہلے کوئی بہن الرسول دوم سنگھا کر یا دھونی دیگر شدت نوبت کو خفیف کر دیں اور داخل طور پر کسی کتاب
دافع تشنج اور دیگر استعمال کرتے رہیں۔

نیک نیت علاج چنداں شکل نہیں لیکن مرطوب دم اکثر وقت طلب و حیران کنندہ ہو جاتا ہے مرطوب دم کے
بیماری میں بہت بہترین طریق علاج حسب ذیل ہے۔

شروع نوبت میں فوراً امونیا کاربوناٹ یا اینٹی مونیم ہارٹس ٹم یا پی کاک یا بیج مدار (۲ گریں) یا پاوریا فائو
سے ۲ گرائن کہ عدد صاف ہو جاوے اور ساتھ ہی ہوائی نالیوں میں ہی بلغم خارج ہو جائے۔ تو کے ساتھ تمام ہوائی نالیوں
اور عضلات تنفس پر دافع تشنج انٹرمیڈیٹ کی دوا کا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ مرطوب دم میں تو نہایت مفید ثابت ہوتی ہے
اگرچہ قلیل المقدار اور رقیق سے تو مارنیا اور اٹروپین کی جلدی پیکاری کر سکتے ہیں۔ نہ کہ کورافارم یا ایل ٹیراٹ
با امونیا یا پائیریدین وغیرہ سنگھا کر یا اجوائن قلبی شورہ دہتورہ دھاکو وغیرہ کی دھونی دیگر شدت نوبت کو کم کریں اور
بعد ازاں دافع تشنج و مخرج بلغم اور یہ تو اترتوٹے ٹوٹے سے کھلاؤ نہیں۔ ایڈوائز آف پوٹاسیم آرسنک سٹرنٹینا
سوڈی ہنزاس ایسی حالت میں نہایت مفید ہیں۔ (نصف گرائن) پوٹاسیم آئیوڈائیڈ اگرین لائیوڈ آرسنک ہونو
والیم ای کاک ۲۰ ہونو پچھ پلو سائیس ۲۰ ہونو سٹرنٹ کورافارم ۲۰ ہونو کواکیمفریک ولس ایسی ایک خوراک دفعہ روزانہ
۳، اجوائن ۴ ہونو کافور ایک تو لیمینگ ۲ ہونو ان سب کو باریک پیکر دھتی کی خوراک میں تین دفعہ روزانہ ہتھال کریر
و آگس عصیکے رستہ پر بجلی لگانا ہر دفعہ کے دم میں نہایت مفید ثابت ہوا ہے۔

بعض اوقات ناک و رطلق کی رسولیوں۔ ورم لوزیات اور خنا نیر سے بھی دکشی ہو جاتی ہے جو جب بچوں جو انوں بیت
مرض ظاہر ہو تو بہ تمام وکمال ناک و رگلو کا ضرور ملاحظہ کرنا چاہیے۔ اور اگر اس قسم کا کوئی سبب معلوم ہو تو فوراً اسکا
دفعیہ کریں بعض ڈاکٹروں کا یہ قول ہے کہ ہر حال میں پانچ فیصدی کوکسین لوشن بنا کر دو ریک ناک و اندر لگانا
بطور فورہ پہنچانا دکشی کو فائدہ کرتا ہے۔

یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مریض ان دم کو غلیظ و خالی ہوا یا دھواں ہوتی ہے چنانچہ گھان شہروں مصطلوں و دھونو و
سکازوں میں ہنا کھیلے صاف میدانوں کی نسبت مریض ان دم کو زیادہ مفید پرتلے ہے چونکہ نوبت دم کی اتنا اکثر قبض
نفع اور خارش معدہ سے ہوا کرتی ہے اسلئے یہ مناسب ہے کہ ایسے مریض کو اندیشہ مرض کے ایام میں تمام قلیل اور نفاخ
غذا اول شام مولی چنا۔ اٹیوچ۔ اور اربی بگن ہسن سیم مٹرو وغیرہ کی کثرت نہ بہرہ رکھائیں۔ ہر قسم کے خام میوہ
بھی منع کریں قلیل المقدار اور کثیر غذا اٹیا کھلائیں شام کے کھانے کا وقت ایسا مقرر کریں کہ سوز کے وقت سے پہلے
ہضم مدہ ختم ہو چکے حیوانی غذا میں پازر شلغم کا جرگو بھی۔ پیٹی پالک سیب۔ ناشپاتی جقدر سک اجازت دیں
اگر قبض نفع نقل معیذ علامات بد بعضی پیدا ہوں تو فوراً انکا دفعیہ کریں۔

آسٹریلیا کی آسٹریلیا ویزا ایڈوارڈ پولی فرانہ رویندی نہایت عمدہ دافع تشنج مخرج بلغم اور سکون و جامع ہے
مرض متین خاص کر جب سخت دکشی بار بار نوبت سے ہوتی ہو خاص کر مفید ہے نیز اگر ایک یا کئی گھنٹے میں ہونے لگے


اگونا پیکوئیس۔ لیٹر نیل سپریم۔ اور دکشی امفی سیام میں نافع ہو زیادہ مقدار میں جینے سے ناک کا ٹکڑا ہر ہوتا ہے
خم سفوف ۸ گرین۔ فلوئڈ اکثرکٹ ۴ سے ۲۰ ہونے تک خشک اکثرکٹ اسے اگرین نکٹ پھر ۱۰ سی ۲۰ ہونے تک۔
آسٹریلین بلیوگم۔ یہ ایو کے پٹس گلا بیولس کا دوسرا نام ہے اسکا بیان دیکھو۔

آسٹریلین ریکیم ٹری۔ یہ ایو کے پٹس راسرہا کا دوسرا نام ہے اسکا بیان دیکھو۔
آسٹریلین فیور بارک۔ یہ اسٹونیا کنٹر اکثرکٹ کا دوسرا نام ہے اسکا بیان دیکھو۔
آسٹریلین فیور ٹری۔ اس کے دوسرے نام ایو کے پٹس گلا بیولس اور آسٹریلین بلیوگم ہیں اسکا بیان دیکھو۔
آسٹی آئی ٹس۔ Osteitis پیری آسٹی آئی ٹس کا بیان دیکھو۔

اسمی ڈرووسنس Osmidrosis پسینہ کرا مرض کا بیان دیکھو۔
اکرکرا۔ ٹانگ یعنی مقوی اعصاب ہی برائیل کیس ممبرین پر اسکا اثر الٹریٹیا اور ٹانگ ہوتا ہے۔ نشوونما۔
رعشہ عرق النساء اور عام کمزوری میں مفید ہے بھلو ہونوں اور چیزوں مثلاً کافور بورک ایڈر کتھہ ٹینک الیہ
متم بہتھہ وغیرہ کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا درو کمزوری دندان میں مفید ہے۔
آلو دیکھو غذا کا بیان۔

آلو بجا را۔ پلین سہل صفرا۔ مزلی مفرح یعنی ریفریکٹریٹ بنافع غٹیان صفراوی خارش بدن دفع نشوونما
آنکھ کے امراض کا بیان شروع کرنے سے پیشتر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسکی مختلف تشریح بیان کر دیا
پس واضح ہو کہ آنکھ کے

تصویر نمبر ۳



تین کوٹ اور تین ہی شفاف
رطوبات ہیں سب بیرونی
پردہ دبیز مضبوط اور
چکدار ہے۔ آنکھ کی اندرونی
ساختہ کی اسی کی حفاظت
ہے اس کے دو حصہ ہیں۔

سامنے کا تو مہیا کارینا
نام شیشی کی طرح
شفاف ہے اور باقی
حصہ سفید یا نیلگون ہوتا
ہے اسکا نام سکلہ راکس ہے
عربی میں اسکو پردہ مکتیہ کہتے ہیں۔

الرحمن

کارینا علوہ مضبوط اور پکدار ہونے کے شیخہ کی طرح صاف ہو کر اس میں روشنی صاف طور پر گذر سکتی ہو کارینا اور سکلے رائلک کے مقام اتصال پر ایک باریک نالی ہو جو کارینا کو زورادائرہ بناتی ہے اسکو کنال آف سلیم کہتے ہیں۔ دوسرا کوٹ کورائڈ اور آئرس یعنی پردہ شکیبہ و عنیبہ سے ملکر بنا ہے۔ یہ کوٹ مختلف ملکوں کے باشندوں میں مختلف رنگتوں کا ہوتا ہے اسی کو رنگ پرانگھ کی رنگت منحصر ہے۔ کورائڈ اور آئرس مقام اتصال پر ایک جھلہ خمی۔ رباطی اور عصبی ریشوں سے بنا ہوا ہے۔ اسکو سلیری باڈی کہتے ہیں کارینا اگر دو حسیا جھلہ نظر آتا ہے وہ درحقیقت ہی سلیری باڈی ہے۔

کورائڈ کی اندرونی سطح پر سلیری باڈی کے قریب بہت سی جھریاں پڑتی ہیں انکو سلیری پروپینٹر کہتے ہیں۔ آئرس اور کارینا کا اتصال ایک متخلل ساخت کے ذریعہ ہوتا ہے جسکو گنگیم کیٹی نے ٹم آئری ڈس کہتے ہیں اور اسکو اندر جو مسامات ہیں انکا نام سپینز آف فائناٹا ہے یہ مسامات کنال آف سلیم میں کھلتے ہیں۔

آئرس کوٹ پردہ عنکبوت یعنی ریڈیٹا سے بنا ہوا ہے۔ یہ پردہ نہایت باریک نازک اور عصبی ریشوں کی بافت سے بنا ہوا ہے جو عصب و باغ سے آٹکھ میں آتا ہے یعنی آٹکھ کے پردہ درحقیقت اسی کا پھیلاؤ ہے اسی پر بصارت کا دار و مدار ہے۔ یہ پردہ کورائڈ کی اندرونی سطح پر سلیری باڈی تک پھیلا ہوا ہے اور دنداندار کنارہ میں ختم ہوتا ہے جسکا نام آؤر اسیر ٹیٹا ہے۔

آٹکھ کی تین رطوبتیں حسب ذیل ہیں۔

اول۔ اکو اس ہیومر یعنی رطوبت بیضیہ جو قرنہ کے پیچھے آلی جمیر میں بنتی ہے۔ یہ رطوبت سفیدی بیضہ کو مٹانے کے لیے نکلتی رہتی ہے۔

دوم لینئر یعنی رطوبت جلیدیہ۔ اسکو آٹکھ کا موتی بھی کہتے ہیں۔

سوم۔ وٹریس ہیومر یعنی رطوبت زجاجیہ۔

یہ تمام رطوبتیں شفاف ہیں کر روشنی صاف ان میں سے گذر کر ریڈیٹا تک پہنچ جاتی ہے۔ وٹریس ہیومر کے گرد ایک باریک شفاف جھلی ہے جسکو ہائے لائڈ ممبرن کہتے ہیں۔ یہ جھلی آؤر اسیر سے بالکل قریب پہنچ کر لینئر کے خلاف بر بالگتی ہے جسکی وجہ سے لینئر ایک جگہ قائم رہتا ہے۔

یہ تمام اصل ذیلیہ کی تشریح کا بیان ہوا۔ لیکن ایک نہایت باریک میوکس جھلی آٹکھ کے اس حصہ میں جگہ جگہ درمیان آتلی ہے چھائی ہوئی ہے۔ اسکو گنجائٹو یعنی پردہ صلیبہ کہتے ہیں۔ یہ جھلی اسی قسم کی ہے جیسا کہ منہ حلق۔ نکل اور اندرونی اعضا کے جو فوں میں چھائی ہوئی ہے اسکی یہ خاصیت ہے کہ ہر وقت ایک لعاب میوکس نام خارج کر کے سطح کو تر رکھتی ہو۔ ذیلیہ سے چھلی ملکوں کی اندرونی سطح پر لٹ جاتی ہے معمولی حشری چشم یا آشوب چشم دراصل اسی جھلی کی

کلید تصویر نمبر ۴

(۱) کارینا یعنی طبقہ قرنیہ (۲) سکلر انک یعنی طبقہ ملتحمہ (۳) کورائڈ یعنی طبقہ شکیبہ (۴) ریشی یعنی طبقہ عنکبوتیہ (۵) آٹکھ (۶) وٹریس ہیومر (۷) کنال آف شلنگ (۸) لینئر یعنی رطوبت جلیدیہ (۹) آئی رس یعنی طبقہ عنیبہ (۱۰) اکو اس ہیومر یعنی رطوبت بیضیہ (۱۱) پوٹنی جمیر (۱۲) کنال آف سلیم (۱۳) سپینز آف فائناٹا (۱۴) کنال آف پی (۱۵) سلیری باڈی

سوزش ہوتی ہے۔

یہ تمام تشریح ایک بکرے کی آنکھ پر آسانی سمجھنے کی ہے اس لیے ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں التماس کرتے ہیں کہ وہ حضور اس تشریح سے واقفیت پیدا کریں۔ بلا تشریح کے امراض چشم کا سمجھنا ناممکن ہے۔ آنکھ کی تشریح سیکھ لینا ممکن ہے۔ گھٹنوں ہی کا کام ہے۔ امراض کما بیان ہم فصل ذیل خصوصیات اور علیحدہ علیحدہ موقوفہ ہو کر کریں گے۔

(۱) کجنگٹائیوں کے امراض (۲) کارینا اور سکلر ایکٹ کے امراض (۳) ہائیرس اور ڈیلا میں یہ کہ امراض (۴) کیسٹائیڈ (۵) ریٹیائیڈ کو ریلڈ اور آپٹک نرو کے امراض (۶) بصارت کو نقص دہ عضلات چشم کے امراض (۷) آنکھ کی اندامات (۸) لیکریل ایسے سے تش کے امراض (۹) ہیکوٹ کے امراض (۱۰) آرہٹ کے امراض۔

پس ناظرین کو ہر مرض کی بابت انکو علیحدہ علیحدہ بابوں میں نکال کر دیکھ لینا چاہیے۔

آنکھ پر ضربات لگنا۔ یا کسی اور طرح سے سدیمہ پہننا۔

اول۔ قذی یعنی کسی غیر جنس شے کا آنکھ میں پہننا۔ اسکا علاج کئی طور پر ہے۔ اگر کوئی بابر دہ نہ ہو تو نکرریگ یا کوئی وغیرہ کا آنکھ کر اندر پر جلا لیں لیکن ذیل کے اندر داخل ہو تو یہ ضرور اجنبی اعلیٰ یا جفن اسفل کی جڑ کے قریب پیچھا رہا کرتا ہے اور ہر طرف پر دیکھتے کہیں نظر نہیں آتا اور جب تک یہ ذرہ بالوں کے اندر سے اسوقت تک سخت خراش و شخجہ مٹا رہتا ہے۔ مریض کو آنکھ کھول کر دیکھنا دشوار ہوتا ہے اس لیے پانی کثرت جاری رہتا ہے۔ پس ایسی حالت میں پاک کو جڑ تک لٹکا کر ملا خطر کرنا درجہ تک یہ ذرہ نظر آئے اسکو فوراً نکال دیں۔ بعض اوقات یہ ذرہ قرینہ میں گھس کر وہیں جا رہتا ہے۔ اسکا علاج یہ ہے کہ مریض کی آنکھ کو پیلے کو کین سے سجھیں کریں اور بعد ازاں منجھو سے پکڑ کر آنکھ پر دوسرے ذرہ کو نکال دیں۔ سو بے کرا۔ ۲۔ متقاضی قریب لازم سے بھی آسانی نکل آتا کرتے ہیں۔ اگر کوئی غیر جنس شے قرینہ کو جھید کر ڈیلے کے اندر داخل ہو جاوے تو اس ذرہ کے متورم ہونے اور گھلنے پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے اس سے اگر خراش اور سوزش برابر ہے تو قرینہ میں تنگ فیکر جسطرح سے ممکن ہو ایسی غیر جنس شے کا نکال دینا ہی بہتر ہے کیونکہ جب ایک ذرہ ظنا سے دھس جاتا ہوگا تو دوسری آنکھ کو بھی ضرر پہنچے گا اندیشہ ہے اس لیے ہر حال غیر جنس شے کا آنکھ کے اندر سے نکال دینا ہی ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ غیر جنس شے بہت باریک ہو کر ڈیلے کے اندر گھس کر گرفت میں نہیں آتی اور نہ اور کسی طرح سے باہر نکل سکتی ہے مگر خراش برابر کر رہی ہو تو باہر لا چاری دوسری آنکھ کی حفاظت کی غرض سے اس مضر ذرہ کو نکال دینا چاہیے لیکن اگر مریض چشم بے اہل اسکی صحیح آنکھ میں ہی غیر جنس شے داخل ہوئی ہو تو حتی الوسع اس آنکھ کو پانی کی کوشش کرنی چاہیے یعنی وقتیکہ خطرناک سوزش پیدا نہ ہو عمل جراحتی کا ارادہ مناسب نہیں۔

دوق۔ آنکھ کر اندر آن بچھا چونہ پڑ جانا۔ یہ آنکھ کے لیے نہایت ضررناک حادثہ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی ان کو چھونے کا آنکھ میں بڑا سخت جھلن اور سوزش پیدا کر دیتا ہے جس حصہ قرینہ پر پڑے اسی حصہ کو جلا کر مردار بنا دیتا اور تمام آنکھ کو سرخ اور متورم کر دیتا ہے پس جب ایسا مریض قریب ہو تو فوراً آنکھ کو پانی سے کال طور پر صاف کریں۔ اور اگر علیحدہ میں سرکہ میسر آئے تو تھوڑا سا سرکہ بھی پانی میں بجا کر ایک ڈرام فی اونس کے مالیل اور بعد میں ٹھنڈے

بانی کی گدی اٹھ کر برابر رکھیں اور مریض کی تکلیف کم کر نیچے پڑے قدرے افیون وغیرہ پیلاؤ و ناجھی کھلاویں۔ اگر مریض دیر اور بعد پیش ہو رہے تو فوراً کونکین کے ساتھ اسکی آنکھ کو جس کے ایک ایک ذرہ چھونے کا کالبدیں اور بعد از ان حضورِ سامیہ علیہ السلام کی آنکھ میں چکاویں۔

ساقیہ کا گرم پانی یا آگ یا کسی تیز گرم شے سے چلجانا تو اس کا علاج سب سے بہتر یہ ہے کہ چونکہ پانی اور روغن زیتون ہموں
 ملا کر سوختہ جگر برابر لگاتے ہیں اس واسطے کہ کیا بکری کی گدی جھگڑا آٹھ پوڑا برابر رکھیں اور نفع دے دے کہ ایسے انیوں کھلاں
 چھڑا دے آٹھ کا کسی تیز آب مثلاً سفید کرک یا سڈ یا نائٹرک یا سڈ وغیرہ سے چلجانا اور مریض کی آٹھ پر ٹھنڈا پانی بکثرت
 بہاویں اور اگر سوڈا اجلدی سی میسر آ جاو تو پانچ گزین فی اونس کو حساب ہی پانی میں حل کر کے آٹھ کو خوب اندر سے
 کمال طور پر دہو دیں اور بعد میں میٹھا تیل آٹھ میں ڈالیں۔

پنچھ سو سترہ انگلی میں بڑ جانا۔ اسکا علاج بھی قریب قریب اسی طرح ہے جیسا کہ نمبر میں بیان ہوا۔
 ششم۔ ہندو کی ٹوپ کے ٹکڑے آنکھ میں جا لگنا۔ اسکا علاج بعینہ اسی طرح ہے جیسا کہ نمبر یعنی قدی میں بیان ہوا۔
 ہفتم۔ بارود آنکھ میں بڑ جانا یہ تین طریق سے آنکھ کو نقصان پہنچا سکتی ہو اور اسی کیطابق اسکا علاج بھی تین
 مختلف طریق سے کیا جاتا ہے۔ (۱) یہ کہ اسے شعلہ سے آنکھ جلجلاؤ۔ اسکا علاج بعینہ اسی طرح ہے جیسا کہ نمبر میں بیان ہوا۔
 (۲) یہ کہ محض بارود کا اڑتے وقت آنکھ کو صدمہ پہنچو تو اسکا علاج اسقدر ہے کہ آنکھ کو آرام دیں اور ٹھنڈی دانی کی
 گدی براں آنکھ پر رکھیں (۳) یہ کہ آنکھ کی سطح پر بارود کو ذرات بھیج جائیں اسکا علاج یہ ہے کہ آنکھ کو کوئین کے ساتھ
 کر کے ہر چار طرف ذیلیہ پراڈیز لٹکوں کی اندرونی سطح پر بغیر نظر کر کے اور جس جگہ بارود کو ذرات نظر آویں محو ہونگی
 لپٹے کو ساتھ لٹکے یا سوزن یا چاقو کی نوک کو ساتھ لٹکے جاکر محال ہیں اور دیگر مانی تمام سطح پر ذیلیہ پراڈیز سے چھپا کر آنکھ
 علیحدہ شدہ ذرات سے صاف کر دیں اور بعد میں آنکھ کے اندر قدیمے پختہ تیل اسکا کوئی باندھ دیں۔

ہشتادہ۔ قرنہ کا پھٹ جانے اور بعض خورائش ہو تو آنکھ کو کوئٹین کے ساتھ بے حس کے بغور ملاحظہ کریں اگر اکثر زخم کے اندر سے باہر نکل آیا ہو تو اسکو اندر اسکی اصلی جگہ پر کریں اگر ایسا آسانی ہونا ممکن ہو تو خارج شدہ حصہ کو قطع کر کے زخم کے کناروں کو بالمقابل ملا کر اور آنکھ کو بورک روشن سے دھو کر ڈریس کریں تیسرے روز پھر آنکھ کو دھو کر اسی طرح سے ڈریس کریں۔

آئولہ - مفرح - تابض - محرج - بلغم مقوی قلب - معده و باہ - و دماغ - رافقے و آب ہن - شنگی و حاشی - خن - بوہر و زرقا
و نافع اسہال مزین ہے۔

آوا آوا۔ ویکھو بان کا وا کا وا۔

آواز - دیکھو وائرس کے امراض۔

آن بال - ڈی - چشم - آنکھ - کابیان و کچھو۔

اینٹریس اور وٹریس کے امراض۔ وٹریس اور اینٹریس کے امراض کا بیان دیکھو۔

ایریکس ویری کولار Iris versicolor
 ایری دین Iridin
 ایری سین Irisin
 کرتی تصویر میقدار میں اثر ہے تو محرک صغیر در عین محک و رمقی ہو کر معاک قاتل اور دانی اسکی سوا اسکی
 سے چھینکلی آتی میں یاد مقدار میں تیز سہل اور متقی ہے نفع عرق جافہ وغد و پسینہ و جگر و گردہ و عروق و ماسا ساریقا
 کو تحریک و تقویت بخشتی ہے۔ امراض تشک۔ سکرافیلا۔ استقار و ج مفاصل۔ غلیان صغیر و صغیر و صغیر و صغیر
 بخارات گرم ہماضعف جگر و طحال و گردہ میں نہایت مفید ہے۔
 خوراک سفوف اگرین بطور سہل ہے۔ اگرین ایک معنی غلیان کسٹراکٹ ۱۰ ہوا ہوتا ہے۔ خشک کسٹراکٹ
 ۲۰۰ گریں تک۔ ایری دین و ایری سین ۱۰ سے ۱۰۰ گریں تک معنی خون ہوا و ایک سو پانچ گریں تک
 کی خوراک میں تیز سہل معنی اور در ہے۔
 آیوڈائیڈ آیل Iodized - یہ پڑا نہیں جاتا محض خارجی بطور اللش مستعمل ہے۔ خارجی استعمال
 آیوڈائیڈ آف سبتھ Iodide of Bismuth - رین تک - میں آیوڈین
 آیوڈائیڈ آف بریم Iodide of Barium - نہایت تیز
 آیوڈائیڈ آف پوٹاشیم Iodide of Potassium - ۵۰ گریں تک - ازیٹ
 آیوڈائیڈ آف تھامول Iodide of Thymol - ایری سین
 آیوڈائیڈ آف سوڈیم Iodide of Sodium - ۳۰ گریں تک - ایری سین
 آیوڈائیڈ آف لیٹیم Iodide of Lithium - ۵۰ گریں تک - ایری سین
 آیوڈائیڈ آف مرکری Iodide of Mercury - بطور لیش
 آیوڈائیڈ آف فیرائی Iodidum Ferri - آیوڈائیڈ آف ایرن - ایری سین
 آیوڈائیڈ آف کیلیم Iodate of Calcium - ایری سین
 آیوڈک ہائیڈراجرائی Iodic Hydrargyri - ایری سین
 آیوڈم یعنی آیوڈین Iodina - ایری سین
 آیوڈم ٹرائی کلورائیڈ Iodine Trichloride - ایری سین
 استعمال کی گئی اور نہایت مفید ثابت ہوئی ہے۔ دل۔ واد۔ خارش وغد و کابہجنا چھوٹی سٹ اور سولیاں
 ورم۔ وج مفاصل پیری اسکی آئیٹس میں ہاندر و فی انفلیمیشن مثلاً برانکائیٹس سٹرومونیا۔ پیوٹریلیجائیٹس -
 پیرے ہیپائیٹس۔ فیرمائیٹس وغیرہ میں بطور کاؤنٹرائیٹ اور جابوب فائدہ کرتی ہے۔ ہمزون پانی میں
 چکر آوڈین کی پچاسی کرنا سٹ گائیٹسٹرا اور ہائیڈروسیل میں نہایت مفید ثابت ہوا ہے۔

چونکہ یہ خارجی خراجوں اور دہشت سخت ہوتی ہے اسلئے اسکی بچاؤ کرنی سے پہلے کوکبین ہارن فی اولٹس کے حساب سے حسب ضرورت اندر پہنچا دینی چاہیے۔ پوٹاسیم آیوڈائیڈ جلد پر لگانے سے جذب نہیں ہوتا اسلئے اسنے سے آیوڈین۔ تاکہ زرخرہ اور ہوائی نالیوں میں سوزش پیدا کر کے چھینکیں لاتی اور اخراج بھگم کرتی ہے۔ اکثر اس سے ابرو میں درد بھی ہو جاتا ہے۔ کر کے زوٹ۔ ایوڈ کے پیش آئل سکورافارم اتھیر وغیرہ کے ساتھ اسکی بھانپ۔ دوسرے۔ براکائی ٹس سے کنکرن آئی سی لنگ اور نیو مینا میں نہایت مفید ثابت ہوئی ہے۔ درد دنداں میں ٹیکچر آیوڈین لگانا فائدہ کرتا وجہ الاذین میں جب قطرہ ٹیکچر آیوڈین اور سکورافارم کے کینگ گلاس میں ڈالکر کان کے اندر اسکی بھانپ پیچانی نہایت فائدہ دیتی ہے۔ بعدہ اور ماہر آیوڈین اور سکور سالٹ یعنی پوٹاسیم وسوڈیم آیوڈائیڈ وغیرہ خراش کر کے غلیان درد نفع مروڑ۔ اور شہاں پیدا کرتے ہیں اسلئے ہمیشہ انکو کھانے کے بعد استعمال کرنا چاہیے۔ خون سے گذر کر تمام ساختوں میں پہنچتی اور اپنے خاص اثر ظاہر کرتی ہے۔

ترجمہ سے رسول

(۱) آتشک کو درجہ سوم میں آیوڈین اور اسکور سالٹ مخصوص ہیں تمام لنگا اور نوڈل کے استعمال سے بہت جلدی تحلیل ہو کر غائب ہو جاتے ہیں۔

(۲) سکریفیو لائٹس جبکہ غدود بڑھ گئے ہوں اسکا خارجی اور داخلی استعمال نہایت مفید ثابت ہوا ہے۔
(۳) خاص خاص زہر جو ساختوں کے ساتھ ملکر مستقل کیمیائی مرکب بنالیتے اور دیر پانقصاصات کا سلسلہ قائم کرتے ہیں انکو علیحدہ کر کے اخراج کی طرف زور دیتی ہے مثلاً سک اور بارہ کو پرانے زہر دلیپیہزم اور ہائیڈرا جرم ہیں انکو جسم سے خارج کر کے صحت بخشتی ہے۔

(۴) پرانی اقلیمیشتر میں خواہ وہ اعضا میں ہو یا جھلیوں اور ساختوں میں یا مفصل میں عروق جاذبہ کو تحریک دیکر اور فاسد اجزاء کو جلد زائل کر کے ورم کو آرام دیتی ہے۔

(۵) دہ (دما) میں خواہ کسی وجہ سے ہو اسکا روزانہ استعمال یقینی علاج ہے۔ لیکن آیوڈینم کی علامات شروع ہو جاویں۔ تو آیوڈین بند کر کے پائیر پٹین کا استعمال کرنا چاہیے۔

آہر کار گردوں جلد جگر پستان اور براکائی کے راستہ خارج ہوتی ہے۔ پوٹاسیم آیوڈائیڈ کچھ تو آیوڈین میں بدل کر اور کچھ غائص حالت میں خارج ہوتا ہے۔

اسکا مدثر نہایت خفیفہ و ملہ ہے لیکن آیوڈین اور پوٹاسیم آیوڈائیڈ کے خاص فائدوں کی غرض سے مختلف امراض گردہ مثلاً میں اسکو استعمال کر سکتے ہیں براکائی سے خارج ہونے والے مقامی خراش سے زیادہ ہو کس خارج کرتی اور غلیظ ہو کس کو تپلا اور زلزلے کی رویت پر سطح سے گویا کہ نہایت عمدہ مخرج بھگم اور کراکٹ لگائیش میں مفید ہو۔ زیادہ مقدار میں بہت سوزش و خراش کرتی ہے کہ سخت کھانسی۔ درد اور دیکشی کی علامات شروع ہو کر نوموینا کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ جلد سے خارج ہونے سے خراش کرتا اور اخراج بھگم یا ابل یا کھنڈ یا سرخ دانوں کے نمودار کرتی ہے جیسے مختلف پرانے امراض جلدی میں مفید ہے۔ پستان پر لگائی جاتی ہے تاکہ ترابہ یعنی اخراج شیر کو کم کر دیتی ہے۔

ایوڈو ایڈ آف ایل - خارجی استعمال کے لیے ایک عمدہ صحت پر جلدی جذب ہو جاتا لیکن کچھ ایوڈین کی طرح جلد کو داغدار نہیں کرتا۔
ایوڈو ایڈ آف بے تھینہ اپنی تاثیرات میں ایوڈو فارم کو مشابہ ہے۔ حصہ بانی میں ایک حصہ ملا کر پیکاری کرنا سوزاک میں نہایت مفید ثابت ہوا،
ایوڈو ایڈ آف بیویم سخت نہریہ، ڈرنس میں خارجی زخموں اور آگیا پر لگائی جاتی ہے۔

ایوڈو ایڈ آف پوٹاسیم اسمیں تمام تاثیرات ایوڈین کی موجود ہیں لیکن اسکی طرح مقامی خراش نہیں کرتا اور نیز جلد میں جذب بھی نہیں ہو سکتا عام بیان دیکھو۔

ایوڈو ایڈ آف بخائی مال - یہ اسٹمال کا دوسرا نام ہے اسکا بیان دیکھو۔

ایوڈو ایڈ آف سوڈیم اسکا تمام حال بعینہ پوٹاسیم ایوڈو ایڈ کا حال ہے۔

ایوڈو ایڈ آف لیٹیم گاؤٹ یعنی نفرس اور آٹک کو درجہ سوم میں نہایت مفید ہے۔

ایوڈو ایڈ آف مرکری - ہائیڈر جرم کا بیان دیکھو۔

ایوڈیٹ آف کیلیم - ایک عمدہ ڈس انیکٹ اور اینٹی سپٹک ہے۔

ایوڈین ٹرائی کلورائیڈ - اینٹی سپٹک اور ڈس انیکٹ ہے۔ ایک فیصدی کی پیکاری سوزاک میں مفید ہے۔

ایوڈو پیرال Iodo-Pyrral

ایوڈو سلفیٹ آف سٹوئین Iodosulphate of Cinchonine

اینٹی سیپال کا بیان دیکھو۔

ایوڈو فارم - Iodoform پگہلے سے مرگن تک آئیوڈو فارم اینٹی سپٹک

ایوڈو فارم بی ٹومی نیٹ Iodoform Bituminate ڈس انیکٹ اور ایک

ایوڈو فارم کلورڈین Iodoform Collodion قوی ڈی اوڈورینٹ ہے

مقامی استعمال میں کوئی خراش پیدا نہیں کرتی بلکہ کیفہر جائے مائف کو بے حس کر دیتی ہے فاسد زخموں مثلاً اسٹیک

سکرافیولا اور آوزینیا میں مفید ثابت ہوتی ہے بعض اوقات زخموں سے جب ہو کر غشیانہ بخار بنے چینی ہڈیاں وغنودگی

اور غشی پیدا کرتی ہے ایک حصہ ایوڈو فارم و حصہ ویسلیں ہیں ملا کر آکھ کے مختلف امراض مثلاً فلکے نولر انفیلیا اسٹریڈ

کارینا اور گرنیولر انفیلیا میں استعمال کرنا مفید ہے۔

ایوڈو فارم کلورڈین ایک حصہ ایوڈو فارم ۱۰ حصہ کلورڈین میں حل کیا ہوا پشانی پر لپ کرنا دروشقیقہ اوراری سی ٹپس

میں مفید ہے شروع حل میں کرے روٹ اور ڈیکسٹین کو ساتھ گولی بنا کر دینا اور نیز بطور اینڈریشن استعمال کرنا مفید ہو ہے

حل کی حالت میں کسی قسم کا نقصان ظاہر نہیں ہوتا بلکہ سل کے نفت الدم کو بھی فائدہ کرتا ہے۔ دمہ پر اکائی ٹپس برانکو نیومینا اور

سکرافیولا آتک قروح المعدہ و امعاء و کرم احما میں مفید ہے۔ اسکا مقامی استعمال بطور مرہم یا کلورڈین یا سفوف ایوڈو فارم

بیٹومی نیٹ ہر قسم کے زخم اپنی ڈیٹس مائٹس اسکا ٹپس اورینا اور پرانے دل سرطان کا ریکل اور چیک پر بے نظیر تاثیرات

لکھتا ہے۔ دم خوردہ جلد پر اسکو استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اساتھیں زیادہ خراش کا اندیشہ ہے اسکی بلور رفع کرنے کے لیے

ایسی ایک خوراک چار چار گھنٹہ بعد۔

غذا سادہ لطیف اور سریع الهضم ہونی چاہیے شراب نہ یادہ مصالحہ اور تندی سے پیو جائے۔
دودھ چاول ڈل روٹی اور دودھ کچھڑی ذال روٹی نیمیرت بھیندا اور پکا استعمال کر سکتے ہیں۔

دوم۔ تاہم اسقاط کو لیے مناسب تدابیر اگر جریان خون بکثرت ہو فم رحم کافی طور پر کشادہ ہو گیا ہو اور مدد نہ بھی بار بار اٹھائے
تو ایسی حالت میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جریان خون میں کمی ہو جائے اور تمام متعلقات جن میں اجنبی جلیان اور ذلول
کامل طور پر رحم سے خارج ہو جائیں پس لڑل رگوئیں ایک ڈرام کلورل ہائیڈریٹ ۴ گرین یا پی مسقطر ایک ولش ٹین ٹین یا
چار چار گھنٹہ بعد پلانا چاہیے اس سے درد میں تخفیف اور جریان خون کا اندازہ ہو جائیگا اور پیدائش جنین محلہ کے متعلقات
کے جلدی ہوگی لیکن اگر جریان زیادتی پر ہے اور ہلاکت مریدہ کا اس سے اندیشہ ہو تو فوراً صاف روٹی کو کاٹنا خاص سرکہ تر
بھگو کر وجانا یعنی گردن رحم میں خوب دبا کر بھر دینا چاہیے اور اخیر میں اندام بنانی کے قریب خشک مٹی بھرنی چاہیے
یہ یاد رہے کہ تمام روٹی کے کالوں کے ساتھ دھاگہ بند مامونہ لگانے میں دقت نہ پڑے۔ اور جب گردن رحم روٹی کو ساتھ
بوجھتی تن جلے تو بیسند تریج یا لنگوٹ کو طور پر دباؤ قائم رکھنے کے واسطے کچھ باندھ دینا چاہیے اسکے ساتھ آرگٹ کی
ایک خوراک بھی پلانی ضروری ہوگی۔ ایسا کرنے سے بارہ گھنٹہ کا اندر فم رحم کھل جائیگا اور جریان خون میں بہت کمی ہو جائیگی
اور اودوم یعنی فم رحم کے قریب آہنگ تباہ کرکے الگشت یا کوریٹ یا مونیو کے ساتھ پکڑ کر کال لینا چاہیے۔ اگر پہلی دفعہ
میں ایسا نہ ہو تو دوبارہ بھری طرح کوشش کرنی چاہیے۔ اگر دوبارہ کہے ہی فم رحم نہ کھلے اور جریان خون کم ہو اور کسی قسم
کی اور علامات مند نہ بھی پیدا نہ ہوئیں۔۔۔۔۔ تو مریدہ کو ایک خوراک لگٹ پلا کر قدرتی حرکات پر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ رحم خود بخود
زور و جین کو پیدا کر لے لیکن اگر ایسا نہ ہو یعنی نہ تو جریان خون میں کمی ہوئی ہو اور نہ فم رحم کھلا ہو تو فوراً فم رحم کو سپنج ٹینٹ
ہائیڈروسٹیک ڈائی لیٹر سے کھو لکر دوا لگایاں رحم کے اندر داخل کیا ویاں اور ایک ہاتھ شکم پر سے رحم کو دبا تاکہ
یا وسیلہ فارسیس سے رحم کا سامنا بپکڑ کر رحم کی پیچھے کو کھینچ لیا جائے تاکہ انگلیاں رحم کے اندر کافی طور پر پہنچ
جائیں اس طرح جنین اور تمام اس کے متعلقات کا لکر رحم کو شیر گرم کار با لک لوشن یا یورک لوشن سے دھو دینا چاہیے تاکہ
خون بھی بند ہو جاوے اور رحم ہوائی نہ ہوں کا اثر سے بچ جاوے لیکن اگر خون اس طرح سے بند نہ ہو تو فوراً کچھ روٹی
کی ڈلیاں رحم کے اندر بھجوا کر ایک یا زیادہ انگلیوں کے ساتھ جیسا کہ ممکن مناسب ہو ہر جہاں طرف بھرنی چاہیے اور
آرگٹ ایک ڈرام ٹیکچر اور پیچہ اپنڈا اور اکوا ایک ولش ملا کر پلانا چاہیے۔

اسقاط کے بعد کم از کم ہفتہ عشرہ مریدہ کو مقوی اور سریع الهضم غذا کھلانا تمام تر دوا ت اور محنت سے آزاد رکھنا ضروری
اگر اسقاط کے بعد جو مریدہ کی حفاظت اور دوا ت مناسب طور پر نہیں کی جاتی تو بہت امراض مثل اورام رحم و نشین
و سلیس نشین اور وشنر یعنی رحم کا اپنی جگہ سے غریبہ گرنا یا نام کھانا پیدا ہو جاتا ہے جو تمام عروال جان
پرستہ ہیں اور آئندہ متوالا اسقاط کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی دستکاریوں میں پسے اور
اسٹنٹ کرنا بخون اور تمام متعلقات کا اسٹیک ہونا نہایت مضر ہے۔

جب فم رحم کو مصنوعی طور پر کشادہ کرنا ہو تو کھلوار فارم سنگھا کر کشادہ کرنا چاہیے۔

بعض حالتوں میں ماں یا بچہ یا دونوں کی جانبی کرواسطے قبل از وقت مقررہ مصنوعی طور پر پیداکرنا لازمی اور ضروری امر ہو جاتا ہے اسکی تدابیر اور طریقہ مختصر طور پر ذیل میں بیان کی جاتے ہیں۔

(۱) غلاف جنین کو کیتھیر یا ساونڈ کے ساتھ پھاڑ دینا۔ یہ طریقہ پانچ چھ مہینہ تک نہایت عمدہ ہے بعد ازاں اس میں کئی قسم کے اندیشہ میں آتی ہے کیونکہ تمام پانی جھلیوں کو پھٹنے سے خارج ہو جاتا ہے اسلئے فم رحم جسکو جھلیاں آہستہ آہستہ فنانہ کے طور پر خارج ہو کر کھولا کرتی ہیں نہیں کھلتا۔ اور تمام دباؤ رحم کا بلا واسطہ پانی کے صاف پچھ پر پڑتا ہے اور جنین مردہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر جنین کا زندہ کالنا مقصود ہو تو یہ طریقہ کسی اور تدابیر مثلاً نمبر ۲ کے ساتھ کرنا چاہیے۔

(۲) مصنوعی طور پر فم رحم کو سینچ ٹیٹ یا بارینز رنگ کی کھول دینا۔ اس میں یہ بہت لگتی ہے لیکن اگر اس کے ساتھ اور طریقہ خال کر لیا جاوے تو نہایت مفید ہے۔

(۳) سردی گرم پانی (۱۰ اور ۱۲ درجات) سے تین چار دفعہ روزانہ دیکھنا یعنی گردن رحم میں پچکاری کرنا اس سے رحم کو تحریک ہو کر قریباً تین روز میں پیدائش شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں صدمہ نہ پچھلاکت کا اندیشہ ہے۔

(۴) جھلیوں اور دیوار رحم کے درمیان کیتھیر پھنچا کر طار واڑکی پچکاری کرنا اس میں بھی صدمہ نہ پچھلاکت کا اندیشہ ہے۔

(۵) اگرٹ کھلانا یہ طریقہ سخت اندیشہ ناک ہے۔ اس طرح کہی نہیں کرنا چاہیے۔

(۶) پیٹ پر مالش کرنے اور بجلی لگانے سے رحم کو حرکت دینی یہ طریقہ قابل اعتبار نہیں ہے۔

(۷) بے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ رحم اور جھلیوں کو درمیان ایک صاف گم ایلاشک کیتھیر قریباً چھ سات انچ پھنچا کر وہیں چوڑو دیا جاوے۔ اس سے دو تین گھنٹہ کے اندر رحم کو تحریک ہو کر پیدائش شروع ہو جاتی ہے۔ اور بلا کسی اور تدبیر کے جنین پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات مصنوعی طور پر فم رحم کو کھولنے اور جھلیوں کو کھاڑنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان تمام طریقوں میں انیشی سیپٹک امبر کی کامل طور پر پابندی کرنی نہایت ضروری ہے خاص کر برہمیازی یعنی حمل اول والی عورتوں میں۔

ابر پریکے ٹورس Abrus Precatorius - یعنی رتی لالہ کی گھنگلی یا راتک

اگر اسکو کھلایا جائے تو عمدہ اور امعا میں سخت سوزش پیدا کرتی ہے۔ اگر جلد کے اندر پچکاری سے پہنچا دی جاوے تو آجکے سخت ورم اور سوزش ہو کر پیپ پڑ جاتی ہے اور اسکا زہر خون میں سرایت کر کے تمام جسم میں علامات زہر کی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سخت سوزش عمدہ و امعا پر پیش خون آمیزہ سے وہاں ہوا ہوتے ہیں اور گردہ میں سوزش ہو کر مٹیاب سرخ رنگ بار بار اور تکلیف خلج ہوتے ہیں اسلئے سچ سے رتی میں ایک البومی شس زہر ہوتا ہے جو شکر کنیا کی نسبت سو گنا زیادہ تیر ہے۔ اسکا انفیوژن اور لڈر یعنی مردہ ہو نہیں جسب ذیل استعمال کیا جاتا ہے۔ شیش ریتیاں باوریک پیکر سارو پندرہ ادنس سرد پانی میں جو جس گھنڈ رکھ جھوڑیں اور پھر ساٹھ پندرہ ادنس گرم پانی اس میں ملاویں جب یہ پانی ٹھنڈا ہو جاوے تو اسکو فلٹر کر کے کھجور میں اس میں پانی کے ساتھ چھ پندرہ روزانہ کھلوں کو اٹھا لیا کر دینا چاہیے۔

تا وقتیکہ کافی سوزش شروع ہو جاوے اور دو سے کم روز سوزش ہو کر پلکیں بھول جائیگی اور آنکھوں میں پانی جاری ہو جائیگا تین روز کے بعد پلکوں میں پپڑ جائیگی جو پانچ روز سے پندرہ روز..... تک رہ کر بند ہونی شروع ہوتی ہے اور گریٹولین شرفی سے مسخ واد اور ٹیکس رفع ہو جاتے ہیں۔

ابرین Abrasion یعنی سطح جلد کا چھل جانا۔ سحج جلدی اس میں اکثر درندہ ہوتا ہے اور جب چھلنے کے ساتھ زیریں ساختیں بھی کچی لگی ہوں تو ایسا زخم بہت عرصہ میں اچھا ہوتا ہے اسکا علاج صرف ایچد رہے کہ اگر زخم میل اور ریک ہو صاف ہو تو اسپرٹورک ایسڈ اور میگنیشیا کارب یا نشاستہ ہوزن لیکر یا بلدی با ریک پسی ہوئی یا کولیہ کی لکھ چھڑک دیا وے اور اگر زخم کی سطح پر ریک لگا ہوا ہو یا رطوبت خارج ہو کر چھلکی ہو تو اسکو نہایت آہستگی اور نرمی کے ساتھ صاف کر کے ویسا ہی عمل کرنا چاہیے اور بعد برورنے دول کے اسپٹک رولی زخم پر رکھ کر بیٹا بندہ دینی چاہیے اگر ورم ہو گیا ہو تو کاربالک یا کریمیل یا یوکر پوٹیس نہایت مفید رہیگی یا کھانیکا رنگ نیگرم پانی میں حل کر کے ایک گڈی لٹ یا مل کی آس میں جھگو کر زخم پر رکھ دی جاوے اور بعد ازاں قد سے رولی رکھ کر بیٹا بندہ دی جاوے ہماری سلسلے میں سب عمدہ علاج ابرین کا یہ ہے کہ کاشک لوشن ۲۰ یا ۴۰ گرین نے اولس کا تمام علی ہوئی جگہ پر لگا دیا جاوے جب یہ لوشن خشک ہو کر سیاہ کھر ٹھنجاوے تو قد سے نرم رولی رکھ کر بیٹا بندہ دی جاوے تاکہ رگڑ سے یہ کھر نہ محفوظ رہے۔

ابریشم - خوراک ایک ماشر سے تین ماشر تک مفرح مقوی دماغ و خلع اور مقوی دل و جگر ہے خواش دماغ و معدہ میں سنگین تختا ہے۔ حکماء قدیم اسکو بطور مقوی باہ و مغلط منی استعمال کرتے ہیں۔

ابستی نفس Abstinance - دیکھو بیان فائدہ کشی کا۔
ابسنٹیئم Absinthium اسکو اگر نیری میں ورم وڈ اور ہندی میں ناگ نہ اندہ ہتی ہیں۔

ایک نہایت عمدہ مقوی دماغ مفرح مقوی معدہ مفرح پسینہ آور مخرج کرم امعاء انٹی سپٹک اور قدرتی مٹشی ہے۔ قوت حافظہ و ذہن کو ترقی دیتا ہے کینیلابارک کسیر یا جراثیم کشین باؤنڈ کسکریلا سیرنیٹا۔ اور پست لیموں و سنگترہ کی طرح خوشبودار تلخ قویات معدہ میں سے ہے کمزوری دماغ و خجاج میں جو اکثر طلباء اور دیگر بٹھے رہنے والے اشخاص کو لاحق ہو جاتی ہے مفید ہے تیرامراض صرع خفقان حیات موسمی یرقان استقاء اعتناق رحم عسر البول رعشہ اور ضعف جگر و معدہ میں نافع ہے چونکہ اس سے قوت و تفریح بہت جلد حاصل ہوتی ہے اس سبب ایسے مریضوں میں جو کسی طبیب پر یقین نہیں رکھتے یا جو کم عرض یا خلیا اعتناق الرحم حاض ہو اسکا بیڑا فائدہ ہوتا ہے کہ انکو مٹھا اور مفرح طبع بنکر ایک طبیب کے علاج کی طرف قائم رکھ سکے اور ایسی حالت میں دیگر ادویہ زیادہ مقوی اور مفید کا استعمال آسان ہوتا ہے بطور قوت پیشانی یعنی تکیہ کے کچا استعمال نہایت مفید پڑتا ہے اور اگر سر میں جھگو کر کسی ضرب یا مسکو دینی سپرن پر بانڈا جاوے تو ورم اور درد کو جلد آرام دیتی ہے اسکا فیوزن ایک پائٹ لیکر ان کرم امعاء کو بطور عمدہ استعمال کرتے ہیں۔
خم سفوف بزرگ دواخان اگرین سے۔ مگرین ملک افیوزن ایکل ولس واولس تاک نظویر اکشراک ۵ سی ۲۰ یونٹیک سالڈ اکشراک ایکسٹراکٹین تک چکر تہ ۲۰ ولام تک مریض ایک ہی پانچ قطرہ کلس۔

البتیس Abscess ایسے ورم ہو کر چھوٹا اسکو دل یا دبلہ یا پھوڑا کہلاتے ہیں۔ کبھی تو پھوڑا شدت اور تیزی کے ساتھ پھیلنا اور سخت دردناک ہوتا ہے بیرونی سطح سرخ گرم اور سوجی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسکو اکیوٹ البتیس کہتے ہیں کبھی بابت آہستگی کے ساتھ دونوں میں پکنا ہے اسیں ظاہری سرخی گرمی ورم اور درد خفیف ہوتے ہیں ایسے اسکو پرانا یا ٹنڈا پھوڑا کہتے ہیں ایسے پھیٹے اندر ہی اندر دو تک پھیل جاتا کرتے ہیں۔ انگریزی میں اسکو کرانک البتیس کہتے ہیں کبھی پھوڑے کو اندر پھیل کر ٹٹے سے ہوا میں بھرجاتی ہیں۔ اندر وہ کچی اندرونی اعضا مثلاً ہوائی نالیوں یا پیچھڑوں یا مری معدہ و امعاء وغیرہ سے ہوا آجاتی ہے اگے ٹھوکنے کے آواز کی طرح ہول کر شاہ ہوتی ہو انکو امینی سے لٹ کہتے ہیں۔ جب پھوڑا محدود ہو تب اسکو لوکل البتیس کہتے ہیں اور جب پھیلنا جائے تب ڈیفوز البتیس کہلاتا ہے۔ البتیس کی خاص تشخیصی علامات حسب ذیل ہیں۔ سرخی گرمی ورم۔ درد پکنے کو اندر جب پیللا ہو جائے تو پپ کی لمبوس ہو سکتی ہے۔ جب پھوڑا بہت تیز اور بڑا ہو یا نازک اعضا میں ہو تب بخا بھی ہو یا کراتا ہو۔ اعضا کے یکساں مثلاً جگر دل اور دماغ کے پھوڑوں میں متواتر لرزے ہی ہوا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ان اعضا کا ابتلا کی خاص خاص علامات ساتھ ہو جاتی ہیں جنکا بیان موقع بہ موقعہ آگیا۔

اسکی ابتدا ہمیشہ خفیف یا شدید ورم سے اسطرح ہوتی ہے کہ پہلوؤں حصہ میں خون بکثرت آکر عروق شعریہ بھرتے ہیں بعد ازاں خون کی رگوں میں سیانی اور ذرات جھنکے سوچیں ہو جاتی ہے۔ بہانک کہ ذرات اور ساختوں پر دباؤ پہنچاؤنگی پر ورم میں خلل آجاتا ہے۔ پھر وہ گلنے شروع ہو کر ترقی سیال بن جاتے ہیں اسطرح پپ پڑتی شروع ہو جاتی ہے۔ اقسام۔

۱۔ اکیوٹ البتیس یعنی ایسا پھوڑا جو شدت ورم کی وجہ سے بہت جلدی اور تیزی کے ساتھ پیدا ہو۔ یہ ہمیشہ دردناک ہوتا ہے باہر سے سرخ چمکیلا اور داغ ہوا نظر آتا ہے۔ دبانے سے درد کٹا اور دماغوں کو تیز گرم معلوم ہوتا ہے۔

۲۔ کرانک البتیس یعنی ایسا پھوڑا جو خفیف ورم کی وجہ سے آہستہ آہستہ بہت مدت میں بے اسکو پرانا پھوڑا اور ٹنڈا پھوڑا ہی کہتے ہیں۔ اسیں ظاہر سرخی چمک اور تیزی کچھ نہیں ہوتی۔ درد کچھ نہیں ہوتا یا تھوڑا گرم معلوم نہیں ہوتا۔

۳۔ پھیلنے والا البتیس۔ اس سے مراد ایسا پھوڑا ہے جو تیزی اور سرعت کے ساتھ جلد کے نیچے پھیلنا چلا جائے اسیں گرمی تیزی چمک اور درد بہت زیادہ ہوتا ہے مگر ادبجائے محدود نہیں رہتا۔

۴۔ ٹپے ننگی البتیس یعنی ہوا دار پھوڑا یہ دو طرح بنتا ہے ایک تو اسطرح کہ انٹری یا پیچھڑے کے قریب ہوا داران اعضا سے ہوا اسکو اندر آجائے دویم اسطرح کہ پپ اسکو اندر لگے ہو یا میں بخا میں۔ علامت ان فیمل ہیں۔

۵۔ اولیاد میں سوزش ورم۔ درد سرخی گرمی کا ہونا۔ تیز پھوڑوں کے ساتھ اکثر بخا بھی ہو جاتا ہے مگر سولیوں میں

بہت ہوتا ہے۔

۶۔ پھوڑے کے ایک طرف یا تھوڑے کھنکھن درد دوسری طرف ایک یا دو انگلیوں سے چوٹ لگا دین یا جلدی کے ساتھ دباؤ میں زوب کا سیلاب اندر سے ہوا کو لگا لگا اسکو خاک چھوٹتے ہیں کہتے ہیں بعض ورم یا سخت سوز

میں فلک چوایش نہیں ہوتی۔

س اگر ان طریقوں سے اطمینان نہ ہو سکے تو کھادار سونے یا ٹیڑھ کار داخل کر کے اطمینان کر سکتے ہیں۔

علاج۔ جبکہ شروع میں ورم خفیف ہو اور پیپ بنی شروع نہیں ہوئی اس وقت پولیسوں اور فوٹیفیشن یا کاسٹک پیٹ یا ایوڈین پیٹ یا ہائیڈروک ایکشن آئی کار بالک ایڈسالیوشن (دہ حصہ پانی میں ایک حصہ) یا کوکل سڈیوز مثلاً سیلا ڈووناکلیسین یا بلشرنگ یا جوئنگ یا کوکل کا وٹھاری منٹ یا خون نکالنا وغیرہ سے ورم رفع ہو کر البیس رک جاتا ہے۔ لیکن جب پیپ پڑ جاوے تو اسکے علان کے کھلے خواہ البیس سبک پر موصفہ ذیل اصول پر (۱) ایک نہ زیادہ پیپ بننے نہ پاوے (۲) یہ کہ تمام پیپ جو بن چکی ہے وہ خارج کی جاوے (۳) یہ کہ جو کوئی یعنی جو پیپ نظر نہ آئے رہتا ہے وہ بند ہو جائے ان اصولوں کی تعمیل کے واسطے حسب ذیل خارجی اور داخلی تدابیر ہیں۔

اول داخلی تدابیر عمدہ غذاؤں اور دیگر تدابیر حفظ صحت سے بیمار کی طاقت اور صحت کو ترقی دینا اگر کوئی مرض مثلاً آتشک یا بدھمی سہا انچیش جلدی نقص البیومی نور ہیا ذیابیطس قلت یا رقت خون یعنی اینیسیا یا مائیڈریا موجود ہوں یا سکرافوس زراج ہو تو انکا علان ج کرنا عام کمزوری اور رقت و قلت خون کا علاج مقویات فولاد و حریکہ سے کرنا کیلیم سلفائیڈ اور کیلیم ہائیڈرو فاسفاس کا داخلی استعمال پیپ بننے کو روکتا ہے۔

دوم خارجی تدابیر یہ بموجب کیفیت اور مقام البیس کے نہایت مختلف ہیں خلاصہ طلب ان تمام کا یہ کہ کچیر کیا ٹپ کر کے یا کاسٹک سے کھوکھو لکریپ کو خارج کر دیا جاوے اور بعد میں اگر ضرورت ہو تو ڈینج ٹیٹ کا بالک لٹ زخم کو اندر پہنچائی جاوے تاکہ جو کھوکھو کھلا ہے اور تمام پیپ کی تدریج صفائی ہو جاوے اور ہمیشہ اس جف کو اینٹی سپٹک و ششوں و صاف کر دیا جاوے تاکہ موائد اندر بند ہو کر پھر زیادہ خرابی نہ کرے البیوجیب مقامات اور کیفیات مختلفہ البیس کا علاج مختصر طور پر ذیل میں کیا جاتا ہے۔

آکریٹ اسپس۔ آرام۔ متلع حرکت مقامات ورم پر سکن۔ ادویہ کا کانا جب پیپ معلوم ہو تو فی الحال کافی دیگر انگلو خارج کرنا چاہیے اور مابعد کا علان حسب تفصیل بالا کرنا چاہیے۔ یہ سب سبب یا کار بالک لٹ داخل کر کے ساتھ چند روز پولیس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے تاکہ تمام خراب شدہ اجزاء جلدی سے ٹپ کیے جاسکیں اور ورم رفع ہو جاوے۔

ڈیفیو زیم پھیلتے والا اسپس ایسی اسپسوں میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی نہریلہ مادہ موجود ہوتا ہے جو سخت خراش کرتا ہے ایسے اسپس میں بہت جلد کافی شکاف دیدیئے جائیں تاکہ پیپ یا خون نکال کر جلد آرام ہو جاوے ورنہ تمام جلد اور گوشت وغیرہ مزار ہو کر بڑے بڑے زخم ہو جاتے ہیں جو بہت عرصہ میں اچھو ہوتی ہیں بعض اوقات ایسے البیس جھٹک ہو گئے ہیں۔

کریٹک اسپس۔ اسکا علاج ایسی طرح ہے جیسے کہ تفصیل میں ہے مابین کی شکاف نہ کرنا چاہیے۔

کریٹک اسپس

بعد میں ڈریسٹینج ٹیوب یا کاربالک لٹ داخل کیا جاوے اور اینٹی سیپٹک اری ٹسٹ فائڈہ کر لیتے مفصلہ ذیل
 ادویہ کی پیکاری کیجاوے مثلاً (۱) ٹیکچر آئیوڈین ہوزن پانی میں ملا کر (۲) آئیوڈو فارم ایک ڈرام ایو کیو ٹیس آیل
 ۳۰ پونڈ وین ششاش یا روغن کچھ (۱۲) اونس (۳) کانڈینر فلور (۱۵) ڈم (۴) نک کلورائیڈ (۵) گرن ۲۰ اچکن ایک گرن پانی

۱۲ اونس

اعضائے ریسہ اور دیگر نازک مقامات کے ابیس مثلاً شکم اور سینہ کی دیوار میں یا شکم و سینہ کے اندر پیری ٹونیم یا لیپر کے
 جوف میں باغی احتیاس گرہ سکیم رسم یا جگر کے قرب میں رجز گرہ شش پستان و مرغ محال پستیکریاس
 کی ساخت میں میڈیا سٹائل نم میں فیکس کے چھ گروں میں یا غدود نہیں۔ ایسے ابیسوں کو کھولنے میں
 زیادہ سو زیادہ ہوا کا پکا کرنا چاہیے اسی پر دار و دار صحت و موت کا مقنوبہ ہے۔

آبیسوں کا علاج اب اور نئے طریقہ پر شروع ہوا ہے ان علاقوں کی پورٹوں کو معلوم ہونا بہرہ کثا یہ عنقریب طر
 عام ہو کر پانہ طریقہ تکلف پولٹس اور وزانہ ڈریس کو نافذ کر دیں۔ انکی مختصر کیفیت اس طرح ہے کہ شروع ورم میں چار فصدی
 طاق کا کاربالک لوشن بذریعہ ہائیڈروک سرخ کے اندر پینچایا جاتا ہے چھوٹے ابیس اکثر بلا پیر پڑنے کے
 اچھے ہو جاتے ہیں اگر پیر پڑ گئی ہو تو بذریعہ اسپرٹ کے پہلے تمام پیر نکال لی جاتی ہے اور بعد ازاں کم طاق کی مرکز
 لوشن ۵۰۰۰ حصہ میں ایک حصہ یا یو رک لوشن سے خوب تمام غار کو پیکاریوں کو ساتھ دھو دیا جاتا ہے
 جب جوف ابیس کا ل طور پر صاف ہو جاوے اسپرٹ کی سوئی نکال کر اینٹی سیپٹک گاڑی گدی تمام ابیس کیجا
 پر رکھ کر پٹی باندھی جاتی ہے چار سو دس روڈنگ یہ گدی اور پٹی بلالی نہیں جاتی۔ اس عرصہ میں جوف ابیس کی
 دیواریں کامل طور پر اقبال پا جاتے ہیں اور کوئی نشان ابیس کا باقی نہیں رہتا۔ اس طریقہ کی کامیابی اس بات
 پر منحصر ہے کہ پہلے غار کا ل طور پر صاف اور اینٹی سیپٹک ہو جاوے اور بعد میں کوئی سیپٹک جرم سطح ابیس
 تک پہنچا یا کہ بعض فرید حیاط کا طور پر آئیوڈو فارم آیشن یا ٹیکچر آئیوڈین ہوزن پانی میں ملا ہو جوف کو اندر پینچائے میں۔
ابلیوشن Ablution یعنی غسل طہیث خسانی کو مفید افعال میں سے غسل بدن بھی ایک نہایت ضروری
 اور مفید فعل ہے بشرطیکہ کسی طور پر محض پانی کا بدن پر بہا لینا کافی نہ سمجھا جاوے غسل کی طرح سے جسم کو تقویت و صحت اور روح
 کو فروغ و تازگی بخشتا ہے۔

اول سطح جرم جسم کی تمام سطحی گرد و بیل صاف ہو کر ساتھ جلدی کھلتا ہے یہاں درتہ مضائقہ رطوبت ہوا میں بخوبی خارج ہو سکتی ہے
 دوم سطح جرم کا اختلاف حرارت جسم و پانی و دوران خون میں حرکت ہوتی ہوا و خون کی رگوں و اعصاب کو حرارت سطح صلی
 حالت پر قائم رکھنے کے واسطے ایسی قوت خرج کرنی پڑتی ہے جو منکھ ہمیشہ کے غسل سے تشریفوں و اعصابوں کو تغیر تبدیل و متا
 برداشت کو کشی و درزش ہوتی رہتی ہے۔ ان کا بال الوجودوں کو نہایت غلیظا و بیزیر سمجھنا چاہیے جو غسل سے سستی کوڑے رہتے
 ہیں اس سستی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ بہت سی جلدی امراض مثلاً خارش۔ دلدہ و غیرہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہی نہیں
 بلکہ جلد کے ہمیشہ سیلا جیلا رہنے سے اندرونی امراض متعلق گرہ و امراض پیش پیدا ہو جاتے ہیں غسل کی ضرورت اور

فائدہ کو سمجھ کر بائبان ادیان مختلفہ قدیم سے اسکو مذہبی رسومات کے شامل کرتے رہے چنانچہ قدیم یونانیوں و ہنوں ہندوؤں یہودیوں اور عیسائیوں کی مذہبی رسومات کا غسل ایک حصہ رہا ہے دین اسلام میں بھی طہارت بدنی عبادت الہی کا ایک جزو سمجھی جاتی ہے یورپ کے حالیہ خیالات ہر ایک تمدنی و اخلاقی امر کو مذہب سے انگ سمجھتے ہیں مگر چونکہ انسان کے ہر فعل کا اثر اس کے مذہب یعنی تعلق الی اللہ پر ضرور ہوتا ہے رفع الی اللہ بلا عدل و احسان بالخلق ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا اسی بنا پر تمام ادیان دین کی اخلاقی و تمدنی حالت پر ہمیشہ نظر رہی ہے اسی وجہ سے صفائی جسمانی جو ایک نہایت ضروری اور مفید طبی و تمدنی فعل ہے تمام مذاہب کا ایک جزو رہی ہے اگرچہ عبودیت و عبادت الہی ایک امر دیگر ہے چنانچہ قرآن مجید فرماتا ہے لَنْ تَنَالُوا اللَّهَ بِحَرْمِ الْفَوَاحِشِ مَا ذُكِّرَ بِكُمْ

لَا تَنَالُوا اللَّهَ بِحَرْمِ الْفَوَاحِشِ مَا ذُكِّرَ بِكُمْ ^{یہاں اگرچہ نہیں پہنچا کہ حال صلیح کی روح جو تھوڑی ہے وہ نہایت طرف کی پہنچتی ہے} لَنْ تَنَالُوا اللَّهَ بِحَرْمِ الْفَوَاحِشِ مَا ذُكِّرَ بِكُمْ ^{مگر وہ ناپاک صاحب فرمانے میں سے بچا اور وہ ناپاک جو بچنے پڑا تھوڑے بچا اور ہی جائے جسدے من بیا سونے} حضرت مسیح فرماتے ہیں (متی باب ۲۲-۲۵) لے ریاکار فقہو اور قرسیہ یوم پر افسوس کہ تم پیالہ اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے پر دے لوٹ اور برائی سے بھرے ہیں (آیت ۲۴) لے ریاکار فقہو اور قرسیہ یوم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کے مانند جو باہر سے بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں پر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہڈیوں کی ناپاکی سے بھری ہیں

اب ہم اچھے غسل کے قسام اور انکے علیحدہ علیحدہ خواص بیان کرتے ہیں

(الف) غرض بائبان اس میں تمام جسم کو درجہ بدرجہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بچا کر حشرات پہنچائی جاتی ہے بہانہ کہ آخر کار غد و دردن میں سیل سپینہ بجالا فرماؤ فکر تمام نالیوں کو صاف کر دیتا ہے اور تمام پرانی میل کھیل کو بھی ساتھ نکال لاتا ہے ساتھ ہی ساتھ تمام جسم کے سنے اور رگڑنے سے میل اور بھی زیادہ تر باہر نکلتی ہے جو اس وقت صاف کیجاتی اور دھوئی جاتی ہے تب جلد فعل کی طرح صاف اور نرم ہو جاتی ہے۔ تب پھر اس پسینہ آور کمرہ سے غسل کنندہ کو ایک خوشگوار کمرہ میں لیجاتے ہیں جہاں پردہ کچھ عرصہ آرام کرتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ از سر نو جوان ہو گیا یا ادھی عمر میں سے کچھ عمر کم ہو کر کم سنی کی تازگی اور ہمت حاصل ہو گئی ہے اس طرح عام کرنا تقریباً رجب مفاصل جلدی امراض ضعف جگر اور ام کہنہ اور امراض گردہ میں نہایت مفید ہے اسکے مقابل میں اور تمام غسل بمعنی معلوم ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اگرچہ بدن کو خوب میل کر پانی صابون اور تولیوں کے ساتھ صاف کیا جاتا ہے لیکن جلد کی باہر ایک نالیوں کی طرح میل سے اٹی رہتی ہیں اس میں برخلاف اسکے گرم ہوا تنفس کے ساتھ اندر پتھر پسینہ کے دریا رواں کر دیتی ہے جو تمام میل کھیل کو نالیوں کے اندر سے باہر نکال لاتے ہیں اور ساتھ ہی سطح جسم گرم ہو کر جلد کی شہ بانیں اور درمیں خوب پھیلتی ہیں جس سے دوران خون ترقی پا کر اسکی صفائی جلد میں خوب ہوتی ہے جو لوگوں میں بات کافر کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ صابون کے ساتھ نہا کر تولیوں سے بدن صاف اور خشک کر دیتے ہیں۔

یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ انکا صابون اور تولیہ میل کو نالیوں کے اندر سے باہر نہیں لاسکتے بلکہ برعکس ٹکڑش بائٹھ کے اور میل کو دبا دبا کر نالیوں میں بھرتی ہیں

(ب) مغزی طریق غسل یعنی بائٹھ یہ کئی طرح پر ہے اول سادہ بائٹھ یعنی خالص پانی یا بھانپ یا ہوا کو ساتھ دوم مرکب بائٹھ یعنی ایسے پانی یا ہوا یا بخارات کے ساتھ جس میں قدرتی یا مصنوعی طور پر شال کی گئی ہوں اول سادہ بائٹھ اسکی تین اقسام ہیں

(۱) سادہ وارٹھ بائٹھ اسکی ترکیب یہ ہے کہ ۲۵ یا ۳۰ گیلن پانی ایک بڑے ٹب میں ڈالکر اور اس میں ٹھیکر ہٹلا یا جادئے اس کے بلحاظ حرارت پانی کے چند اقسام ہیں اول سرد بائٹھ جس میں پانی کی حرارت ۵۵ درجہ سے ۷۰ درجہ تک ہوتی ہے دوم ٹیڈ بائٹھ جس میں پانی کی حرارت ۸۵ سے ۹۵ درجہ تک ہوتی ہے سوم شیر گرم یعنی دارم تبہ جس میں پانی کی حرارت ۱۰۱ اور ۱۰۴ کے درمیان ہوتی ہے چھارم گرم یعنی ہٹ بائٹھ جس میں پانی کی حرارت ۱۰۴ درجہ سے ۱۱۴ درجہ تک ہوتی ہے سرد بائٹھ جوانوں کے لئے گرم بائٹھ کمزوروں اور بوڑھوں کے لئے ٹیڈ بائٹھ ہر عمر اور ہر حال کے لئے موزوں اور مفید ہیں سرد بائٹھ کل جسم کے واسطے مقوی اور بہت سی عصبانی امراض مثل خفقانی لرحم اور کوریامیں نافع اور بخاروں میں حرارت کو کم کر نیوالا ہے شیر گرم بائٹھ مسکن اور جلع و خراش عصبانی دردوں اور وجع مفاصل لحم الصبیان اور شجنوں میں نافع ہے اس سے سینہ خوب آتا ہے اور بہت سے جلدی امراض میں نہایت مفید پڑتا ہے اگر قلب کمزور ہو یا کوئی غونی مرض مثلاً نکسیر یا بواسیر یا نفث الدم یا بول لدم موجود ہیں یا جسم بہت لاغر ہو کر جلد تپتی اور جربی زائل ہو گئی ہے تو ایسی حالتوں میں سرد بائٹھ ہرگز نہ کرنا چاہئے بلکہ ٹیڈ بائٹھ سے بھی احتراز لازم ہے نیم گرم بائٹھ بھی ایسی حالتوں میں نہایت احتیاط کے ساتھ کرنا چاہئے تمام غسلوں اور بائٹھ کے واسطے نہایت مناسب وقت وہ ہے جبکہ معدہ خالی نہ ہو اور کھانکے بعد ایک یا دو گھنٹہ گزر چکے ہوں اور کسی قسم کا ٹکان بھی موجود نہ ہو ہر غسل کے بعد پانی کا محض تولیہ کے ساتھ پونچھ ڈالنا کافی ہوگا بلکہ خوب لٹل کر جلد کو صاف کر دینا چاہئے ماش سے صفائی بھی بخوبی ہو جاتی ہے اور تمام جلدی ساخت کو صحت کی طرف حرکت ہوتی ہے سرد بائٹھ اور دارم بائٹھ ۵ منٹ سے ۱۲ منٹ تک کرنا چاہئے ٹیڈ بائٹھ ۸ سے ۱۲ منٹ تک اور گرم بائٹھ ۵ منٹ سے کم

(۲) سادہ سپر بائٹھ اس میں خاص خاص ترکیبوں کے ساتھ تمام جسم پر پانی کی بھانپ پہنچائی جاتی ہے جس سے سینہ خوب آتا ہے اور میل کھیل کال طور پر صاف ہو جاتی ہے عصبانی اور عضلاتی دردوں اور جوڑوں کی درم اور جیسں لبول میں نہایت مفید ہے

(۳) سادہ جوانی بائٹھ اسکی ترکیب اس طرح ہے کہ چند کمروں یا صندوقوں میں ہوا مختلف درجوں پر گرم کی جاتی ہے اور مریض کو یکے بعد دیگرے ان میں بند کر کے ہوا کی حرارت دیا جاتی ہے اس میں سپر بائٹھ سے بھی زیادہ پسینہ آتا ہے اور عصبانی درد مثلاً عرق النساء اور درم دفع ہو جاتے ہیں یہ رائٹس ڈیزیز پر پانی ورم منزلا اور

ترکام اور سر ہی جسم میں مفید ہے۔

دوم۔ مرکب ہاتھ جبکی سادہ ہاتھ کی طرح تین قسم میں

(۱) مرکب ہاتھ یعنی ۲۵ یا ۳۰ گیلن پانی میں کوئی دو مصنوعی طور پر ملا کر ہاتھ لیا جاوے یا کسی سمندر یا چشمہ کا پانی جس میں اکثر نمک حل شدہ ہوتی ہیں اسی مقدار میں لیکر اس میں ہاتھ کر لیا جاوے
۱۔ مرکب ہاتھ جو سمندر کے پانی سے کیا جاوے اوسط مقدار حل شدہ نمک کے سمندر کے پانی میں قریباً تین فیصدی ہوتی ہے جو ان آدمیوں کے واسطے سمندر کے پانی میں ہاتھ کرنا نفیوت بخشتا ہے اور امراض سکرافیولا اور سکروی میں نافع ہے۔

۲۔ ملے لائن ہاتھ ۲۵ یا ۳۰ گیلن پانی میں ۱۶ آونس سوڈا بائی کارب یا ۲ آونس پٹاسی کاربوناٹس حل کر کے ہاتھ کریں امراض جلدی میں مفید ہے۔

۳۔ کروڑو سلیمٹ ہاتھ تین ڈرام دارچینا ایک ڈرام ٹائڈروکلورک یسڈ ۲۰ گیلن پانی میں حل کر کے ہاتھ کریں جلدی امراض در دوم درجہ آتشک میں مفید ہے۔

۴۔ سلفوریٹ آف پوٹاشیم ہاتھ پانچ چہ آونس سلفوریٹ آف پوٹاشیم تین گیلن پانی میں حل کر کے ہاتھ کریں خارجی دیگر امراض جلدی میں مفید ہے۔

۵۔ ٹائڈرو ہائیڈروکلورک یسڈ ہاتھ ایک آونس ٹائڈرو ہائیڈروکلورک یسڈنی گیلن پانی میں حل کر کے کسی چوبی یا گلی برتن میں ہاتھ کیا جاوے امراض جگر میں بہت مفید ثابت ہوا ہے اس میں بڑی دقت ہے کہ کپڑے داغی ہو جائیں
۶۔ پوٹاش کا ہاتھ یعنی برین کا ہاتھ اسکی ترکیب یہ ہے کہ چار پونڈ پوٹاشی آسٹے کا بورہ ایک گیلن پانی میں جوش دے کر اسکا پانی چھان لیا اور یہ پانی پچیس یا تیس گیلن پانی میں ملا کر اسکا ہاتھ کیا جاوے جلدی خراش میں نہایت مفید اور مقوی ہے

۷۔ مسٹرڈ ہاتھ رائی ایک یا دو ٹھی ۲۵ یا تیس گیلن گرم پانی میں ملا کر اس کا ہاتھ لیا جاوے۔ نہایت مفید وکل سٹیمولنٹ اور کانفوٹری ٹنٹ ہے

۸۔ پائس ہاتھ یعنی صنوبر کا ہاتھ اسکی ترکیب یہ ہے کہ صنوبر کے پتے یا انکاسٹ ایک پونڈ پچیس یا تیس گیلن پانی میں حل کر کے ہاتھ کیا جاوے تمام جسم کے واسطے مقوی اور مفرح ہے امراض وجع مفاصل احتقان رحم اور نفوس میں مفید ہے۔

تمام مرکب سائل ہاتھوں میں یہ امر قابل یادداشت ہے کہ ان تمام میں پانی کی حرارت ولرم ہاتھ کے قریب ہونی چاہئے اور انکی دواؤں کا پورا پورا اثر ہونے کے واسطے یہ ضروری ہے کہ پیے سے جلد خوب صاف کیجائے اور مسامات کھولے جاویں اور توت جاذب کی تحریک باش سے کیجاوے

(۲) مرکب سپر ہاتھ اسکی ترکیب اس طرح ہے کہ کسی شے مثلاً فراباسم کو پانی میں جوش دیکر اسکی بھانپ

خاص خاص انتظام سے کل بدن یا کسی خاص حصہ بدن پر پہنچائی جاوے
(۳) مرکب ہوائی ہاتھ مثلاً سلفیورس ایسڈ ہاتھ نمک پوریل سوپر ہاتھ۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ مریض کو کرسی
پر بٹھا کر تمام بدن اور کرسی کے گرد اگر دایک کھل لپیٹ دیں لیکن مریض کا سر اور منہ کھلا رہے کرسی کے
نیچے گندہک یا پارہ کے انخراٹ اڑاے جاویں گندہک کے واسطے آگ کا ہونا ضروری ہے اور پارہ اس
طرح سے اڑایا جاتا ہے کہ ایک کا پر ہاتھ جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور ایک ٹمپلک پلیٹ جس پر ۶۰ سے ۱۸۰
گرین تک گرے یا رڈاکسائیڈ آف مرکری رکھا جاوے کرسی کے نیچے رکھ دیں اس ترکیب سے مریض کو پانی
اور پارہ دونوں کے انخراٹ پہنچتے ہیں۔ کیلول سوپر ہاتھ کی ترکیب یہ ہے کہ کرسی کے نیچے ایک سرخ گرم
ایسٹ یا کوئی ٹمپلک پلیٹ رکھ کر اس پر ۲۰ سے ۳۰ گرین تک کیلول ڈال دیں اس طرح سے کیلول کے انخراٹ
اگر تمام بدن پر اثر کرینگے

(ج) مشرقی طریق غسل یعنی نہانا اس کے خواص اور فوائد قریب قریب وہی ہیں جو مغربی طریق غسل میں
بیان کئے گئے ہیں فرق محض سفد رہی کہ چونکہ ہمیں آب پانی جسم پر ڈالا جاتا ہے اور بعد میں ہوا کے جھونکے برداشت
کرتے پڑتے ہیں اس لئے لاغر ضعیف و مریض شخص کو اس کی برداشت نہیں ہو سکتی بلکہ سخت نقصان کا احتمال
ہوتا ہے برعکس اسکے صحیح اور قوی شخص کے لئے مغربی طریق کی نسبت زیادہ مقوی و صحت بخش ہے
کیونکہ ہمیں تمام جسم متواتر تغیرات آب و ہوا برداشت کرنے کی زیادہ ورزش ہوتی ہے کمزور آدمیوں کو اس
غسل میں ہوا کا ہمیشہ احتیاط کرنا چاہئے مریض کو اور بھی زیادہ احتیاط لازم ہے

ہاتھ کی آسانی کے واسطے بہت سے قسم کے احتراعات کئے گئے ہیں جن سے کل جسم یا کسی حصہ جسم کو ہاتھ دنیا
آسان ہوتا ہو اور جو کمزور مریض سانی ساتھ لیجا سکتے ہیں مثلاً سلپر ہاتھ۔ ہیپ ہاتھ لیگ ہاتھ فٹ ہاتھ شیخ ہاتھ۔
شور ہاتھ پورٹیل ہاتھ اسپرٹن یا ڈوشن ہاتھ۔ ہاتھ کرنے کی اور بھی ترکیبیں ہیں مثلاً وٹ شیٹ کمپرس ہاتھ ٹینگ
انہیں سے ہم چند کی قدرے تشریح ذیل میں کرتے ہیں اول وٹ شیٹ یعنی ایک چادر ٹھنڈے پانی میں
تر کر کے اور نچوڑ کر جلدی سے تمام جسم پر سوائے منہ کے لپیٹ دیا جائے ازان بعد کھل لپیٹ کر مریض کو بستر پر
ٹٹا دیا جائے تا وقتیکہ پسینہ خوب خارج ہو۔ وجہ مفصل در امراض جلدی اور امراض گردہ میں نہایت مفید ہے
دوم کمپرس ہاتھ اس کی یہ ترکیب ہے کہ دس سے بیس گز رنگ لہیجہ اور چہرہ ساٹا پتھر چوڑی پٹی سر دیا نہیں
جگو کر اور نچوڑ کر پیٹ اور چھاتی کے گرد بانہی جاوے اور اس پر گٹا پرچ ٹشو لپیٹ دیا جاوے مریض ٹکم اور پسینہ
میں مفید ہی ٹینگ سے صرف یہ مراد ہے کہ پہلے وٹ شیٹ لپیٹ کر اس پر ایک دکھل لپیٹ دینے جاتے ہیں

اپسٹیم سالٹ **Epsom Salt** یہ میگنیشیا سلفاس کا دوسرا نام ہے اس کا بیان دیکھو

اپنیا **Apnoea** خون میں زیادہ آکسیجن پہنچنے کی وجہ سے تنفس کا بند ہو جانا بعض حنفی لفظ اپنیا کو
ایسٹنٹیا کی جگہ استعمال کرتے ہیں دیکھو میان ایسٹنٹیا

اپوپلیکسی Apoplexy

کسی دماغی نقصان کی وجہ سے دفعتاً بیہوش اور بے حس و حرکت ہو جانا یہ تین طرح سے ہو سکتا ہے اول اس طرح پر کہ دماغ کے اندر کوئی شریان یا ورید پھٹ کر خون بھرت جاری ہو جائے یا برعکس اسکے کوئی شریان بند ہو کر دماغ میں خون پھونچنا بند ہو جائے دوم اس طرح کہ دماغ کسی سخت صدمہ کی وجہ سے دماغی فعال بند ہو جاوےں سوکھ اس طرح پر کہ پیشاب بند ہو کر اور سبز خون میں جمع ہو جاوےں یا اور کوئی زہر مثلاً شراب - افیون وغیرہ سے دماغ فاسد ہو جاوےں علاج کے وقت اپوپلیکسی کو غشی سے تیز کرنا پھر یہ بچاؤ کا کس طرح بیہوشی ہونی ہے ضروری ہوتا ہے کہ چونکہ مختلف صورتوں میں علاج ایک دوسرے کے مخالف ہے

غشی کی پہچان ہے کہ امیں نبض کمزور رقیق اور ناقابل احساس ہو جاتی ہے۔ چہرہ پھیکا اور سانس بے قاعدہ ہو جاتا ہے ریفلیکس طاقتیں قائم رہتی اور سفنگلر سچست رہتی ہیں مگر اپوپلیکسی میں نبض اور تنفس میں چنداں ضعف ظاہر نہیں ہوتا نہ چہرہ زیادہ پھیکا پڑتا ہے ریفلیکس طاقتیں زائل ہو جاتی اور سفنگلر ڈیپلے پڑ جاتے ہیں غشی کی حالت جلدی رفع ہو جاتی ہے۔ مگر اپوپلیکسی دیر تک رہتی ہے

اب رہی یہ پہچان کہ اپوپلیکسی کس سبب سے ہوتی پس یاد رکھنا چاہئے کہ جو اپوپلیکسی سبب اول یعنی خون کے خارج ہونے یا کسی شریان کے بند ہونے سے ہوتی ہے وہ دفعتاً ہوتی ہے جو محض صدمہ سے ہو وہ بھی دفعتاً ہوتی ہے انہیں پہچان یہ ہے کہ پہلی صورت میں دونوں آنکھوں کی پتلیاں غیر مساوی ہو جاتی ہیں اور دوسری صورت میں ایک مطابق رہتی ہیں جو اپوپلیکسی کسی زہر کی وجہ سے ہو وہ رفتہ رفتہ پیدا ہوتی ہے ساتھ ہی خاص زہر کی علامات بھی دریافت کرنے سے معلوم ہو گا کہ سر پر چوٹ نہیں لگی نہ کوئی اور صدمہ ہو چکا ہے نہ کسی قسم کا کوئی مرض پہلے سے موجود تھا جب کوئی مرض یا قسم کا چارے پیش ہو جو بیہوشی اور بے حس و حرکت ہے تو میں چاہئے کہ اس کے عزیزوں سے سوال کریں کہ کتنی دیر سے بیہوش ہے دفعتاً ایسی حالت ہوئی یا رفتہ رفتہ پہلے سے مرض رہتا ہے یا نہیں سر پر چوٹ لگ کر بیہوش ہوا یا خود بخود یا کوئی اور یہ کھانی؟

ساتھ ہی فوراً چہرہ اور نبض کو غور سے دیکھیں۔ پس اگر نبض رقیق اور ناقابل احساس ہے اور چہرہ پھیکا تنفس بے قاعدہ ہے تو سمجھنا چاہئے کہ غشی ہے تو فوراً چہرہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دیں پکھا کریں امونیا سنگھاویں جو دم اسگود نہ ہونے دیں کھلی ہوا میں ٹائے رکھیں سر کو اونچا نہ کریں بلکہ باقی جسم کی نسبت نیچا رہنے دیں اگر یہ معلوم ہو کہ تنفس خامی چل رہی ہے۔ چہرہ بھی پھیکا نہیں ہے تو خیال کریں کہ دماغی نقصان ہے پس اگر چوٹ لگنے کے بعد دفعتاً بیہوشی طاری ہوئی ہے پتلیاں کم و بیش ہیں مرض کم سن یا جوان ہے کبھی کبھی گھبراہٹ آتی ہے یا خون تھوکتا ہے تو خیال کرنا چاہئے کہ دماغ کے اندر ضرب کے بعد جریان خون واقع ہوا ہے اور اگر پتلیاں برابر ہیں پہلے سے خون کا کوئی مرض نہیں تو غالباً خالی صدمہ ہے ان دونوں صورتوں میں مرض کو آرام سے ٹائے رکھیں سر کو تھکیوں سے اونچا کر دیں برف یا ٹھنڈا پانی سر پر برابر لگائے دیں جریان خون

کی حالت میں جابل لوم مثلاً ارگٹ نم کدو ہیزی لین گلیک ایسڈ ایسی ٹیٹ آف لڈ وغیرہ کھلاویں اور اگر محض صدمہ ہے تو کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے اگر معیضوم ہو کہ پیپے سے دل یا گردہ کا مرض موجود ہے یا گہرے زخم یا بھوڑے موجود ہیں تو شریان کے رکے کا خیال کیا جاسکتا ہے

علاج اول درجہ اپو پلکسی جبکہ ہوش جزاً یا کلتیاً جاتی رہی ہو اس درجہ میں یہ کوشش کرنی چاہئے کہ زیادہ خون خارج ہونا بند ہو جاوے پس یہ تاکید ہونی چاہئے کہ بیمار کو ہرگز حرکت نہ دیا جاوے اور کئی قسم کا شور و غل سکے قریب نہ ہو اگر ممکن ہو جس جگہ بیمار گرا ہے اسی جگہ اسکے معالجہ کی کوشش کی جائے سر اور گردن اونچا کر دینا چاہئے لیکن یہ احتیاط رہے کہ نیچے کا جہز اسید پر نہ جل سکے کیونکہ اس میں زبان کے فیرکس بند ہو کر دم خراٹوں کے ساتھ آنے لگتا ہے کسی قسم کا تنگ کپڑا گردن اور سینہ پر نہ رہے اگر بیہوشی سخت اور فالج تمام جسم کا ہو تو کوئی امینڈسٹ نہیں رہتی اگر مریض جوان اور قوی ہو اور نبض پُر تیز اور سخت ہو تو فوراً قصہ سی خون نکالنا چاہئے لیکن اگر سن رسیدہ یا ضعیف ہے یا علامات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیہوشی کوئی شریان بند ہو کر دماغ کے نرم ہو جانے سے ہوئی ہے تو ہرگز قصہ نہ کرنی چاہئے دیگر تداویر دماغ کا خون کم کرنے کی یہ ہیں کہ کسی تحلیل المقدار اور قوی الاثر مہل مثلاً اگرین کیلول یا دو تین قطرہ روغن جمال گوٹہ یا پانچ قطرہ گلیسرین میں ملا کر منڈی پر رائی کا پلستر لگانا یا پاؤں گرم پانی میں رکھنے گرم پانی اور صابون کا روغن تارین ملا کر حقن کرنا سر پر آیس بیگ اور پاؤں پر گرم پانی کی بوتلیں لگانا بیہوشی کی حالت میں ایک دو روز غذا کی کچھ پرواہ نہ کرنی چاہئے کیونکہ ایسی حالت میں خوراک کے بخورہ میں اترنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور اگر غذایت کے پہنچانے کی ضرورت ہی سمجھی جاوے تو ناک کر رہستہ سے معدہ تک سائٹ کیتھٹر پہنچا کر بذریعہ پیکاری کے دودھ اور مٹھنی وغیرہ پہنچا سکتے ہیں

دوم اگر دماغ میں مقام ماؤف پر سوزش ہو کر بخار ہو جاوے تو داخلی طور پر ٹنگر کونائٹ پلانا سر پر ف لگانا مہل دینا اور ہر قسم کے سٹیمولنٹ حرکت اور گھبراہٹ سے بچانا مفید ہونگے بوڑھوں اور ناتوانوں میں اکونائٹ سے ہر ہیز لازم ہے قابضات خون مثلاً ایسیٹ آف لڈ گلیک ایسڈ ارگٹ ہیزی لین۔ افیون وغیرہ کے استعمال میں نہایت احتیاط چاہئے کیونکہ اگر حقرا مپوسن یا ایمبولزم ہو کر اپا پلکسی ہوئی ہو تو اور زیادہ نقصان ہوگا جب کہ اپو پلکسی امبولزم یا حقرا مپوسن کی وجہ سے ہوئی ہو تو محض یہی کافی ہے کہ مریض کو آرام کلی دیا جاوے ایسی حالت میں قصہ لینے سے نقصان ہوتا ہے کیونکہ خون کم ہو کر اور انجاء خون کا اندیشہ ہوتا ہے ریتز مہل بھی نہیں دینے چاہئیں محرک قلبا دویہ مثلاً دجی ٹاسل مونیوا۔ حقرا الکھال کا استعمال مفید ہوگا سفلیک ارٹرائٹس میں پٹاسی یوڈائیڈ سے چالیس گرین کی خوراک میں مفید ہوگا

معمومہ جب مریض ہوش میں آنے لگے تو نہایت احتیاط چاہئے تاکہ دوبارہ خون دماغ میں نہ نکل پڑے یا ورم دماغ کی علامات نہ پیدا ہو جاویں کلی آرام دینا حرکت اور کلام سے پرہیز کرنا سر پر البھم لطیف غذا لکھانا سر پر برف لگانا گردن کی پشت پر ٹیڑھا لٹرا یا لٹرا لگانا سہلات پٹاسی یوڈائیڈ داخلی طور پر دینا تاکہ خون جذب ہو جائے

چهارم یہی بلجیا اور سختی عضلات کا جو اکثر اپوپلیکسی کے بعد رہ جاتی ہے علاج کرنا یہ اکثر لاعلاج ہوتے ہیں انکا علاج یہ کہ شروع میں تمام مغلوج حصہ کی مالش کرنا دو تین ہفتہ بعد جبکہ مسکڑ کرنا کٹیلینی گم ہو گئی ہو چلی لگانا خذلے لطیفہ و رمقوی کا دینا غذائے حیوانی شراب چائے اور کافی سے پرہیز کرنا اور یکے کے ساتھ سہلات دینا

پنجم حفظاً تقدم کے طور پر ضروری ہوگا کہ ایک دفعہ صحت یابی کے بعد آئندہ کو ہمیشہ قہرسم کی بے اعتدالی مثلاً شراب چائے اور کافی کے استعمال میں احتیاط ہے کوئی ورزش تکان کی حد تک نہ کیجاوے اگر غلبہ یا شریانون یا خون کے متعلق کوئی مرض موجود ہو یا آنشک ہو اسکا علاج کیا جاوے

اپوسانی پنجم کینا بیغم Apocyanum cannabinum اسکا فعل طبی طاس شرف و نقص اور درجہ اولیٰ

اپوسانی نین Apocyanin

سرمشاہدہ رمقوی قلب معرق مخرج بلغم

در قدمے مفرح اور درونی مسیج یعنی قاتل کرم ہے زیادہ مقدار میں نہایت تیز سہل اور مرقی ہے استسقامی کلیہ میں کمی درم کے ساتھ البیون اور کاسٹ کو بھی پیشاب کم کر دیتا ہے استسقامی قلبی مائڈر و خورکس بلجیوسی وجہ مفاصل ضعف معدہ ضعف گردہ اور کرم امعا میں نافع ہے خوراک سفوفیخ اپوسانی پنجم ۵ سے ۲۰ گرین تک خشک اکسٹراکٹ اسونہ گرین تک تر اکسٹراکٹ ۵ سے ۲۰ بوند تک ٹکچر ۵ سے ۲۰ بوند تک ڈاکا کٹن پل آؤنس سے ایک آؤنس تک

اپوسانی نین پلہ گرین سے نصف گرین تک کی خوراک میں مدد مخرج بلغم پلہ گرین سے ۲۰ گرین تک کی خوراک میں تیز سہل اور مرقی ہے

ایولس Epulis جبڑے کی رسونی ٹیومرس کا بیان دیجو

اپو مارفینی ہائیڈروکلورائیڈم Apomorphinae Hydrochloridum

تمام قے آور دواؤں میں نہایت سریع الاثر تیز اور اعتباری ہے تارکاک (یعنی خدرات) زہروں میں نہایت مفید مرقی ہے اگر جبڑے کھل نہ سکتے ہو تو جلد میں پلہ گرین سے پلہ گرین تک پچکاری کرنے سے چارمنٹ کے اندہ خوب قے ہو کر معدہ بکلی صاف ہو جاتا ہے اگرچہ مارفیا یا گوڈایا سے اسکو حاصل کرتے ہیں لیکن یہ قے آور مقدار میں کسی قسم کا لٹہ نہیں کرتا یہ یاد رہے کہ چونکہ اسکا فعل نخاع کے ذریعہ ظہور پذیر ہوتا ہے اسلئے سخت بیہوشی کی حالت میں قے نہیں ہوتی کلورفارم کی بیہوشی بھی اسکے فعل کو روکتی ہے انفٹائل کنوئنٹنر یعنی ام الصبیاں میں جلدی پچکاری سے قے ہو کر تشیج رک جاتا ہے نزلہ و زکام و سرفہ کہنہ و دمہ کرپ و کیپلری برنڈکائیس میں ہلکا مفید مخرج بلغم مسکن سوزش اور ایلمیٹو ہے صرع کو ریا اور ہلکی کے دردناک تشیجوں کو آرام دیتا ہے زہر گرینک ایسڈ شراب ۱۰ فون اور کاربالک ایسڈ میں نہایت مفید ثابت ہوا ہر خود الک بطور مخرج بلغم پلہ گرین سے پلہ گرین تک بطور قے آور پلہ گرین سے پلہ گرین تک جلدی پچکاری پلہ گرین سے پلہ گرین تک سرپٹ پلہ گرین جسکی طاقت پلہ گرین فی آؤنس ہے پلہ ڈرام سے ایک ڈرام تک انجیکشن اپو مارفینی ہائیڈروکلورائیڈم ملاحظہ ہونی چاہیے

ایک گرین ۳۱ ہونڈ سے ۱۰ ہونڈ تک

اپنی بلوای ٹیکس Epiploitis یعنی اپنی پٹوں باگرٹا و منٹم کی سوزش دیکھو بیان پیری ٹوٹاٹیس

اپنی ڈوڈی مائی ٹیکس Epididymitis غمی دم اپنی ڈیڈی مس دیکھو فوطوں کے امراض کا بیان

اپنی ڈرس Epidermis دیکھو جلد کے امراض کا بیان

اپنی ڈیک Epidemic دبا امراض متعدی

اپیرینٹس Aperients وہ دوائیں جو امعاء کے لحمی اور عصبی ریشوں کو تحریک دیکر بطور حقیف مسہلات کے

عمل کریں انکی تفصیل حسبِ ہر

بلاڈونا کیسٹرائٹل سناؤ کی گندک شیرخشت انجیر الی آلو بخارا امتاس صابون مشہد گلیسرین ریشہ ہوت

روضن بادام ایونی من روضن انیسون رہینس نفرنگولا کیسکرا سیگرڈ امگینشیا سلفاس میگینشیا

کاربوناس فانی سوس ٹیکما ارگٹ نہرہ گاو تخم دہتورہ ایوسائٹس ٹرکیسی کم اپنی کے کوانا وایولا ٹرائی کلوا لویچ

ٹورپر فوٹے ٹم ہائیڈرو سین کچلہ

ان کو ہمیشہ خراج ریاح دواؤں کے ساتھ دینا چاہئے تاکہ کچ و تاب امعاء میں کم ہو بر خلاف نکلین مسہلات

کے اوں میں پانی کم خارج ہوتا ہے اور اجائیں بجائے رقیق اور سائل ہونے کے طین ہوتی ہے اسبوجہ

سے پورٹل کنجینچن اور ڈرائیسی میں اسکا استعمال چنداں فائدہ نہیں کرتا

اپنی سپی ٹیس Epispadias یہ عضو تناسل کا ایکسپیرائٹش نقص ہر جسمین مسہری پیشاب بالائی جانب

سے نکلا رہتا ہے اس کی تفصیل ہم عضو تناسل کے امراض میں کریں گے انشا اللہ تعالیٰ دیکھو عضو تناسل

کے امراض کا بیان

اپنی سٹی آف دی کارنیا Opacity of the cornea بھولا بیاض چشم جالہ

دیکھو کارنیا کے امراض

اپنی ٹیکس Epistaxis یعنی رفاف یا نکسیر بعض اوقات نکسیر دائمی کنجینچن کا قدرتی علاج

ہوتی ہے اس نے اگر آنکھیں سرخ سر میں درد گرانی کانوں میں گنجاں یا دیگر علامات سوزش دماغ کی موجود

ہوں تو ایسی حالت میں نکسیر کے روکنے میں احتیاط لازم ہے یعنی اگر خون بکثرت خارج ہو چکا ہے تب اس

کے بند کرنے کی تدبیر کرنی چاہئیں ورنہ نہیں

نکسیر کے بند کرنے کی تدبیر حسبِ ہر

اول خارجی تدبیر مریض چت لیٹ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو سیدھا اونچا اوٹھا دے

سر اور شانہ باقی جسم کی نسبت قدرے اونچے ہوں اور جس نچھنے سے

خون جاری ہے اس پر دباؤ دیا جاوے اس طرح کرنے سے اکثر خون بند

ہو جاتا ہے اگر ایسا کرنے سے خون بند نہ ہو تو ناک کو اندر حاسب الدم ادویات میں رمل یا لنٹ بھگو کر ٹھوس دینا چاہیے مثلاً ہیزیلین ٹیچر ہی میلس ٹیکچر شیل ٹرنڈین یا بھٹکری گیلک لید کے اسٹرائنگ سالیویشن میں لمبوں کو عرق کی پچکاری نہایت قوی الاثر ثابت ہوئی ہے اسکے سولے پاؤں اور ٹانگوں کو گرم پانی میں رکھنا پنڈلیوں یا جگر پر لمبے لگانا۔ ریفلیکس طور پر اپنا اثر کر کے بعض اوقات فوراً خون بند کر دیتا ہے۔ اگر جلد ہی میں بھٹکری اور عرق لمبوں بھی دستیاب نہ ہو سکے تو نمک پانی میں حل کر کے بجائے انکی استعمال کر سکتے ہیں۔ خالص پانی میں ترکی ہوئی گئی بھی اکثر اوقات کمسر کو بند کر دیتی ہے۔

دوم۔ داخلی تدابیر ٹیکچر یا لنڈرائس ٹیکیر لٹک لید انک ہیزیلین ٹیکچر ہی میلس ٹیکچر شیل پلانا اکثر منفید ہوتا ہے ہیزیلین کا چند روزہ استعمال آئندہ کے واسطے روک کر تلب ہے۔

جب ان تدابیر سے خون بند نہ ہو سکے اور زیادہ اخراج خون سے غشی کا اندیشہ ہو تو دوسرے ریٹریز کو لپک کر ناظرہ ہو گا۔ انکی ترکیب اس طرح ہے کہ بیلاکس ساونڈیا سانٹ کیتھر کے سر کے ساتھ ایک دوہرا کیا ہو مضبوط دھاگہ باندھ کر ناک میں ہو گلو تک لیجاویں اور دواں سے ہو چنے کے ساتھ دھاگو کھینچ کر منہ سے باہر نکال لیا جاوے تو تب دھاگہ کا سبب ایک ہاتھ سے پکڑ کر ساونڈیا کیتھر کو ناک سے باہر کھینچ لیا جاوے اور دوسرے سر پر دھاگو کو لیا جاوے گا کہ ایک سر منہ سے نکلا ہو لے اور دوسرا ناک میں سے پس جو دھاگو منہ میں سے نکلا ہو لے اس پر کافی مقدار لنٹ باندھ کر ناک والا سر اکھینچنے سے لنٹ دوسرے ریٹریز یا ریز میں پہنچ جائیگا۔ یہ یاد رہے کہ منہ والا دھاگو اس قدر لمبا ہو چلائے کہ لنٹ کو دوسرے ریٹریز میں پہنچنے کے بعد بھی منہ سے باہر نکلائے تاکہ نکالنے کو وقت اسکو کھینچ کر لپک واپس منہ میں کو نکال لیا جاوے۔ یہ اوپر لکھن درون ناک اور اکثر بے سود ثابت ہوتا ہے انھیں حالتوں میں اسکی ضرورت پڑتی ہے جبکہ شیر ریٹریز سے خون نکلتا ہو۔ اور سامنے کی طرف کافی لنٹ دباؤ پہنچانے کے واسطے اس مقام تک نہ پہنچ سکتا ہو۔ ورنہ اکثر حالتوں میں مفصلہ بالاتر تدابیر کافی ہوتی ہیں۔

اپنی فور۔ Epiphora۔ اس دھماگو سے پانی جاری رہنا لیکر میل اعضا کے امراض کا بیان دیکھو۔ اپنی کے کوانا Ipecacuanha اگر جلد پر اسکا سفوف لگایا جاوے تو خراش کرتا ہے اور بعض اوقات جھوٹے ٹھونٹے ابل بھی اٹھا دیتا ہے اسکی نسوا سے تمام ناک کی چھلی میں خراش ہو کر جھنکیں خوب آتی اور رطوبت خارج ہوتی ہے اگر اسکا دھواں یا اسپرے حلق کے اندر پہنچایا جاوے تو فیکس اور لیکر کس ممبرین پر خراش کر کے رطوبت خارج کرتا اور کھانسی پیدا کرتا ہے بعض اشخاص میں اسکی نسوا اور دھواں سے مرض دیر یعنی استہما شروع ہو جاتا ہے خشک کھانسی میں نسوا یا اسپرے یا دھواں مفید ہوتی ہے جب اپنی کی ایک پاؤڈر چھٹائی گرین کی مقدار میں کھلایا جاتا ہے تو معدہ کے دوران خون کو ترقی دیتا اور غددوں کو تحریک دیکر عروق باطن زیادہ پیدا کرتا ہے اسلئے قلیل مقدار میں بدھن ہی مزہ میں نہایت مفید ہے اور جو تھکے مضمی اعضا بامعدہ سے ہوا اسکو آرام دیتا ہے۔ دوسرے پاؤڈر کی صورت میں معدہ کے زخموں میں نہایت مفید ہے۔ ۵۔ ۱ سے ۲ گرین کی مقدار میں تیز اور سریع الاثر ہے اور بے۔

اول تو اس مقدار میں معدہ میں سخت خلش اور حرکت پیدا کرتا ہے اور ساتھ ہی دماغی مرکزے کو تحریک دیتا ہے انٹریوں میں ہنچکھٹھوری مقدار میں دوران خون اور افعال غدود کو تیز کرتا ہے اور زیادہ میں اسی شدت پر نیکن بچپش میں ۳۰ گرین سے ۹۰ گرین تک کی خوراک میں بھی سوزش کو رفع کرتا۔ جموں کو اندام میں تائید کرتا اور اخراج خون اور میو کس کو بند کرتا ہے۔ دیکھو بیان بچپش یعنی ڈیسنٹری کا۔

معدہ اور انٹریوں سے اپنے کے کو انا خون میں جذب ہو کر دماغی مرکزے پر اپنا اثر کرتا ہے پس اگر اسکا سفوف ۵۰ گرین ہی ۳۰ گرین یا وائٹیم ای کا ۳۰ ڈرام سے ۶ ڈرام کی مقدار میں یہ جاتی ہے تو ۳۰ منٹ کے اندر خوب ہو کر معدہ اور اعضا کو تفس صاف ہو جاتے ہیں تب طبیعت قدرے معمولی ہو جاتی ہے مگر کہیں نا توانی اور قبلیاتی نار نارائیک سے کم اور رنگ سلفا آس زیادہ ہوتی ہے اور یہ کافعل بھی نار نارائیک کی نسبت دیر میں ہونے پر اسی کی تو نہیں حالتوں میں سفید ہر جبکہ قے کی بہت جلدی ہوا اور دوسری قے آور و واول سے زیادہ نا توانی کا اندیشہ ہو۔ ماریا اور دوسرے زود اثر زہروں میں کادینا چند ان سفید ہوگا۔ اس کی قے کر دے ہو پنگ کف اور برا کائی ش میں سفید ہو کیونکہ خراب رطوبات اور جھلی کو خارج کر دیتی ہے جلد میں ہنچکھٹھوری کے کو انا پسینہ لانا ہے اور اس بنا پر ڈوورس پاؤڈر زلہ سور تھروٹ اور خفیف وجہ مائل میں دیا جاتا ہے۔

آخر کا سائٹین جو اپنی کوکوتا کا ایک جوہر ہے بروکائی نگرہ معدہ اعضاء کو جگہ کیالیو کو رہتے خارج ہوتا ہوا ان مقامات کو دوران خون اور افعال غدود کو تیز کرتا ہے ایک طرح سے بڑھائی میں طویرت یا وہ پیدا کر کے کھانسی کو ساتھ اسکو خارج کر دیتا ہے گویا کہ وہ طرح سے خارج ہوتا ہے اس بنا پر اکیوٹ اور کاک ہلکا ٹیسٹس سل اور خشک کھانسیوں کا استعمال کیا جاتا ہے چونکہ یہ تحریک کے بعد سڈیو اثر کرتا ہے اسلئے کھانسی کی سوزش اور بخاریں ہی سفید ہے۔ جگر کے رہتے خارج ہوتے وقت اسکے دوران خون اور افعال غدود کو تیز کرتا ہے اسی طرح سے گویا خارج صفر اچھی ہے۔ خوراک الیٹیم ای کا ۵۰ ہونڈ سے ۴۰ ہونڈ تک پلو اپنی ایک کو ۵۰ گرین سے ۵۰ گرین تک پل اپنی کے کوانی کم ملی ہے۔ اگرین تک وائٹیم ای کا ۵۰ سے ۴۰ ہونڈ تک (بطور مخرج بلغم) اور ۳ سے ۶ ڈرام تک (بطور قے اور) پلو اپنی کا ۵۰ سے ۳۰ گرین تک۔ (بطور ایکٹوٹ) اور ۵ سے ۳۰ گرین تک (بطور ایکٹوٹ)

اپلی لیسٹک انیٹے Epileptic Insanity جنون الصرع۔ اسکا علاج عام اپلی لیسٹک اصولوں پر جو آئندہ بیان کئے گئے ہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئین ۳ سے ۶ گرین سکس کو نانی ۳ ڈرام سے ایک اوٹس تک بار بار دینا قفائے گردن کے زیریں حصہ پر کاؤٹر اریٹھین شلائٹین یا کاشی یلے سے نپزم سے کرنا۔ سر دشور با تھ یا پاکینگ نہایت مفید ثابت ہوئے ہیں۔

اپلی لیسٹک Epilepsy یعنی مرگی۔ صرع۔ وقتاً بہوش ہو جانا اور تشنجی حرکات ظاہر ہونا اس مرض کی خاص علامات ہیں۔ مگر دو قسم کی خفیف مرگی ہے جو ان دونوں علامتوں میں مشتمل ہے ایک نام اپلی لیسٹک یعنی خفیف مرگی ہے اس میں وقتاً ایک دفعہ سکینڈ کیو اسی بہوشی ہو جاتی ہے بھل و فوات

یہی ہے کہ پتہ سر پہ ہر جگہ غار و غار کا پتہ مگر محمود نے ان علامات سے مندرجہ ظاہر نہیں ہوتی۔ دوسرے کا نام جیکسنوین اپنی بیٹی
اس میں بیہوشی نہیں ہوتی مگر جسم کو ایسا طرے تشنجی حرکات ظاہر ہوتی ہیں جو شدید مرگی کی علامت مندرجہ جلی ظاہر ہوتی ہیں
جو چند منٹوں کے ایک منٹ کے بعد کچھ ہیں۔ اس کے بعد یہ تشنجی حرکات ہیں علامات مندرجہ حسب ذیل ہیں
عام چھٹی درجہ ہے۔ دوران سر اور کھانوں میں بھار گھٹنوں کے بلکہ میں مٹھانے کے اندر اس کے اثرات سردی گرم ہوا
کا یہ لاب اعراض سر پر لپٹ جانا اور بعد میں ہوا کرتا ہے جو ہر قسم میں رہتا ہے نہ جانے تو رک سکتا ہے۔

خاص دورہ کی علامات میں درجوں میں بیان کی جاسکتی ہیں

درجہ اول یہ کہ بعض ایک دفعہ ہار کر یا گہری آہ بھر کر دفعتاً گڑبڑا دیر پیش ہو جاتا ہے ساتھ ہی تمام عضلات کا مسلسل تشنج
ہو کر چہرہ بدو وضع تشنج اور نبض غیر معلوم ہو جاتی ہیں۔

درجہ دوم یہ ہے کہ سائل تمام معلوم ہوتا اور غیر مسلسل تشنج ہو کر طرح طرح کی حرکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ زبان خود بخود
کلکتی اور اندر چلی جاتی ہے منہ میں جھانک بھراتی جبر زور کے ساتھ بار بار جھنجھٹے اور کھٹے ہیں۔ چہرہ پر طرح طرح کی کھٹکی
اور ہاتھ پاؤں بار بار اٹھتے ہیں۔ دل دھڑکتا اور نبضیں زور کے ساتھ مگر بقاعدہ طور پر چلتی ہیں یا خانہ پیشاب کی مہر
خود بخود خارج ہو جاتے ہیں اور کبھی زبان دانوں کے بیچ میں آکر کٹ جاتی ہو۔ انگلیوں کے فیصلے زور کے ساتھ اور دھڑک رہتی ہیں
درجہ سوم یہ ہے کہ مریض ہوش میں آتا اور رخت یا نہ طور پر ادھر ادھر نظر کرتا ہے ضعف اور تکان کے ساتھ
نہند غالب ہوتی ہے تشنجی حرکات بند ہو کر تنفس صحیح ہو جاتا ہے لیکن دل ابھی تک صرکتا ہے۔ درجہ اول جیسے
بیہوشی اور تشنج مسلسل غالب رہتی ہیں۔ ۳۰ یا ۴۰ سکینڈ تک رہتا ہے۔ درجہ دوم جیسے بیہوشی اور تشنج غیر مسلسل
غالب رہتی ہیں قریباً پنج منٹ رہتا ہے کبھی تشنجی حرکات کی وجہ سے دماغ کو صدمہ پہنچا اور پیکسی اور منجماتی تشنج بھی
ہو جاتے ہیں۔ امراض متشابہ اختناق الرحم ام الصبایان زچہ کے تشنج غشی زہر شراب اور یہاں تشنجی علامات۔

اختناق الرحم میں کلی بیہوشی نہیں ہوتی اور تشنجی حرکات بقاعدہ طور پر کبھی مسلسل اور کبھی غیر مسلسل ہوتی رہتی ہیں
طرح طرح کے توہمات اور خیالی نکالیف پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ امین کو دہانے سے اختناق الرحم کا دورہ اکثر
بند ہو جاتا ہے۔ ام الصبایان اور زچہ کے تشنج میں خاص اسباب موجود ہوتے ہیں غشی میں تشنج ساتھ
نہیں ہوتا نبض نہایت رقیق ضعیف اور ناقابل احساس ہو جاتی ہے مگر خفیف مرگی میں نبض ایسی رقیق
اور ضعیف نہیں ہوتی۔

زہر شراب اور یوریمیا کی تشخیص مریض کے حالات معلوم کرنے سے آسانی ہو سکتی ہے۔

علاج را، دورہ کی حالتیں علاج صرف اس قدر ہے کہ مریض کو اندیشہ کی جگہ مثلاً قرب آگ یا پانی یا بلندی
پر سے اٹھا کر نرم فرش پر لٹا دیا جاوے تاکہ تشنجی حرکات کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اگر سینہ و گردن پر
تنگ لباس ہو وہ کھول دینا چاہیے اگر مصنوعی دانت لگائے گئے ہوں ان کو نکال دینا چاہیے اور چونکہ
حالت دورہ میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ زبان دانوں میں آکر کٹ جاوے اسلئے یہ ضروری ہے کہ جبڑوں کو درمیان

بوتل کا گک یا کپڑے کی گدی چسپادی جاوی کیونکہ اسکو دبائے سے کوئی نقصان و انتوں کو نہیں پہنچتا اور
دانتوں سے کچھ کٹ بھی نہیں سکتا جس سے حلق میں پھنسنے کا اندیشہ ہو۔ سر کی مقدار اونچا کر دینا چاہیے کہ اند آڑی
کا دبانا دورہ کی تخفیف کیلئے مفید سمجھا جاتا تھا اگر اب یہ طریق متروک ہو چکا ہے بجائے اسکے ہوندنا سٹرائٹ ایل یا
ایکٹ رام کلورافام کا سنگھانا اور چوتھائی گرین مارفیا کی جلدی پچکاری کرنا نہایت مفید ثابت ہوا ہے اسے اکثر
دورہ جلد ختم ہو جاتا ہے اور تنجی حرکات بہت خفیف ہو جاتی ہیں۔ اور تداویر یہ ہیں مختلف جگہوں پر رائی کا پلستر لگا
نیم گروٹ ہاتھ دینا اور باقی بدن پر سرد پانی کے چھینٹے لگانا۔ سر پر برف لگانا سی مولٹ انی شادینا۔

(۲) ابتدائی علامات دورہ کو وقت میں پچاسی برومانڈ ۳۰ گرین کھلانا ایل ناسٹرائٹ ۵ ہوند سنگھانا۔ مارفیا اور
اٹرومین یا نائٹرو گلیسرین کی جلدی پچکاری کرنا مفید ہے جس مقام آد معلوم ہو جسکے فوراً پلستر یا کٹری لگا
یا اسکے اور باقی جسم کے درمیان بجلی لگانا یا اگر بار و یا ٹانگ سے شروع ہوا ہے تو مقام آرا سے اوپر کا حصہ خوب
کھینچ کر کچے وغیرہ سے باندھ دینا یا اگر بازوؤں یا ٹانگ یا بھٹیوں میں پھنچ معلوم ہوتی ہو تو اونکو خوب زور سے سیدھا
کھینچنا اکثر دورہ کو روک دیتا ہے۔ مریض کو ہمیشہ نصیحت ضرور کرنی چاہیے کہ نائٹریٹ آف ایل کر
کسیپول ہمیشہ وقت ضرورت کیلئے اپنی جیب میں رکھے۔

(۳) ایام وقفہ میں اس مرض کا علاج مطابق اسباب مرض و حالت مریض کرنا چاہیے اگر کسی قسم کی خراش مثلاً
کرم معا، فاموسس، سراج دندان قبض، یوزش معدہ یا معا وغیرہ موجود ہوں انکا دفیہ کرنا ہر قسم کوشش اور
جنبہ شراب نوشی کثرت کافی و چائے وغذائے حیوانی اور ہر قسم کے سٹی مولٹ سی پر مبنی کرنا خفیف کھلی ہوا میں
وزرش کرانا۔ زیادہ سونا لطیف سادی غذائیں کھانا مطالعہ و ریاضت میں اعتدال بعد اعداد متعلقہ تھوٹ تھوٹ
اگر مریض کو قبض دائمی رہتا ہو تو اسکا علاج تبدیلی غذا اووں و دو اکی نسبت زیادہ مناسب اگر انیک ہو تو اوس کا
علی مقویات فولاد سے کرنا مرگی کے مریضان کے واسطے نباتی غذائیں درد و دھ زیادہ موافق ہوتی ہیں کبھی کبھی مچھلی
یا ہیضہ کا استعمال کر سکتے ہیں مریضان مرگی کو شادی کی ہرگز اجازت نہ دینی چاہیے مرگی کو علاج میں پانچ سات
فیصدی سے زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی لیکن تعداد و زمانہ دورہ میں بہت تخفیف ہو جاتی ہے۔
الکلیان برومانڈر کی برابر کوئی دو امرگی میں مفید ثابت نہیں ہوئی۔ انکا فائدہ مرگی میں دو طرح پر بیان
کیا جاتا ہے اول سطح کہ سر ہل کارنگس کو موٹا ریلز پر اسکا اثر سڈیو یعنی مسکن ہوتا ہے اور دوسرے کھانج
کے سیریری اینو پیر مسکن اثر پہنچا کر فیلیکس اتری ٹیلٹی کو کم کر دیتے ہیں بعض مریضان کو اگر کچھ مدت تک استعمال
کرنے سے دائمی آرام ہو جاتا ہے۔ لیکن اکثر میں صرف دوروں کی تعداد اور مقدار میں کمی ہو جاتی ہے۔ اور
اسکا استعمال ترک کرنے سے پھر وہی حال ہو جاتا ہے۔ ہاٹ مال میں پی مال کی نسبت اور دورہ شینہ
میں دن کو دوروں کی نسبت زیادہ مفید ہوتے ہیں بعض مریضان میں کچھ مدت کو استعمال کو بعد میں کچھ
نہیں کرتے۔ سوڈیم پروائیڈ پوٹاشیم برومانڈ کی نسبت نظام خون کو لیکے اتری ٹنٹ اور مضغ ہے۔ اور

انہوں نے برومائڈ زیادہ مقدار میں معدہ پر اثر کر کے ان تینوں کا مجموعی استعمال علیحدہ علیحدہ کی نسبت زیادہ
 مفید ثابت ہوا ہے مثلاً ایملی برومائڈ، گرین سوڈی برومائڈ، گرین پٹاسی برومائڈ، ۳ گرین سوڈی برومائڈ
 ایسی تین یا چار خوراک روزانہ یا زیادہ حسب ضرورت برومائڈز کا استعمال میں یہ احتیاط نہایت ضروری
 ہیں کہ پہلے تھوڑی مقدار میں شروع کر کے انکو آہستہ آہستہ بڑا یا جائے۔ بچوں کو قرینا جو لڑکوں کی برابر برومائڈز
 کھلا سکتے ہیں لیکن عورتوں کو مردوں کی مقدار میں نہ چاہئیں۔ ڈچا اسٹڈین صاحب کی یہ رائے ہے
 کہ برومائڈز کی مقدار پہلے پانچ ڈرام روزانہ تک پہنچانی چاہیے تا وقتیکہ دورہ بالکل رگ جاوے یہ یا دورہ
 کہ جب ہم میں اس قدر مقدار برومائڈز کی پہنچ جاتی ہو کہ زیادہ اس سے جسم پر گزرتو نہیں کر سکتا تو اس وقت اسکی
 خوراک کم کر دینی چاہیے ورنہ برومزم کی علامات شروع ہو کر ملکات تک کو بت پہنچ سکتی ہے۔ دیکھو بیان برومائڈز
 کا دورہ بند ہو جانے کے بعد بھی برومائڈز کا استعمال دو تین سال جاری رکھنا چاہیے اسکا استعمال بند کرنے
 کے لیے بہتر طریق یہ ہے کہ ایک سال کے بعد مہینہ میں چھ روز پندرہ مہینہ کو بعد مہینہ میں پانچ روز تھا تو
 کے بعد چار روز اور پھر مہینہ کو بعد تین روز اسکا استعمال کیا جاوے اور باقی ایام میں وقفہ ہے
 بعض حالتوں مثلاً شیور ہیکو کسٹس۔ ڈفاری میٹرا آف دی اسکل۔ آتشکٹ وغیرہ میں برومائڈز کا کچھ فائدہ نہیں
 ہوتا۔ اگر آتشکٹ موجود ہو تو برومائڈز کو ساتھ آلوڈائڈز ملا دینی چاہئے۔ برومزم کی روک کے لیے برومائڈز
 کے ساتھ سوڈی سیلیسیلاس یا آرسنک ملا سکتے ہیں جب مریگی کا سبب سینسٹروائش یا انکمال ہو تو برومائڈز
 سے دیر میں فائدہ حاصل ہوتا ہے مفصلہ بالابرومائڈز کو علاوہ اوپر بھی جو خاص خاص حالتوں میں مفید
 ثابت ہوئے ہیں مثلاً لیتیم برومائڈ ۵ سے ۱۵ گرین، اسٹریسیم برومائڈ ۱ سے ۳ گرین، کیلیم برومائڈ ۵ سے ۱۵
 ۳ گرین، گولڈ برومائڈ ۱۵ سے ۳۰ گرین، برومائڈ آف زنک ۲ سے ۱۰ گرین، مونو برومیٹ آف کیمفر ۵ سے ۱۵
 ۱۵ گرین، جبکہ شہوت غالب ہو۔ فیرم برومائڈ کا سرپ ۲ سے ۳ ہونڈ، انیک حالت میں اور برومائڈز کو ساتھ
 استعمال کرنا چاہیے۔ برومائڈز آف کونائیں ۱۵ سے ۲۰ گرین تک بعض مریضوں میں برومائڈز نامی
 ہو کر بجائے فائدہ کے ضرر کرتے ہیں ایسی حالتوں میں مفصلہ ذیل ادویہ میں سے حسب موقعہ نہال کرنی چاہئے
 بوراکس یعنی بہاگہ، اگرین سے شروع کر کے ۱۰ گرین روزانہ تک۔ اس سے اکثر معدہ خواب ہو کر غثیاں
 منہ میں آبلہ ہو جاتے ہیں سوڈا کرسٹس اور اگر کیا بھی ہو جاتا ہے۔ بوراک ایسڈ ۵ سے ۲۰ گرین تک۔
 بیلا ڈونا اور اٹروپین بھی خاص کر بیٹی مال اور دوران شبینہ میں نہایت مفید ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ
 زنک ۱۵ گرین، ساٹریٹ آف زنک ۲۵ سے ۳۰ گرین، لیکٹ آف زنک ۵ سے ۱۰ گرین خوراک میں مفید
 ہیں۔ دچی ٹالیں کمزوری قلب کی حالت میں نہایت مفید ثابت ہوا ہے۔ اسکو برومائڈز کے ساتھ دیا جاسکتا ہے
 کلورل کا اثر برومائڈز کی طرح ہوتا ہے لیکن کمزوری قلب میں اسکا استعمال نکرنا چاہیے کیسٹن ٹریکا۔
 سوڈیم ٹائیٹریٹ ٹائیٹروکلیسرین۔ انٹی بائیٹریٹ اور فینٹین بھی خاص خاص حالتوں میں مفید ثابت

اور کیفین سے سر کے درد کو آرام نہوا سکے تھیں چالیس قطرہ سنگھانے سے آرام ہو گیا ہے۔ اچانا پیکٹورس اور ہو پنگ کف میں اسکو داخلی یا خارجی استعمال مفید ہے۔ دوسرے تشیع کو بھی اسکا سنگھانا یا کھانا یا دیرہ کرنا ہے۔ خود اک اور طریقہ استعمال ایک ہم ڈرام تک سنگھانے کے لئے لیبر کیسز میں تنہا یا کھوار فارم یا ایتھر کے ساتھ۔ اعصابی امراض میں ۲۰ سے ۴۰ قطرہ تک سنگھانا داخلی طور پر یا بوندرسی بوندرنگانی میں حل کر کے پلا سکتے ہیں۔

اتھل نائٹریس Ethyl Nitras دوسری نائٹریس اس طرح دافع تشیع اور آرٹیریل ٹینشن کو کم کرنے والا اسلے دوسرے اور اچانا پیکٹورس میں مفید ہے ۲۰ سے ۴۰ قطرہ تک پانی میں ملا کر پلا سکتے ہیں۔
اتھل نائٹ آف سوڈا لائیکوار Ethylate of Soda Liquor خارج طور پر استعمال کا شکل و جہاد بہرہ بنوس مول یعنی تل واسکو لگر و تھس لوپس در داد میل کا خارجی طور پر لگانا نہایت مفید ہے جبکہ بنوس یا واسکو لگر و تھ پر لگا یا جاوے تو اسلے کھڑک کو آپ اترنے دینا چاہیے ورنہ سپٹی سیمیا کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور اسلے لگانے کے بعد مقام ماؤف پر پانی بگر نہیں لگانا چاہیے۔

اتھل یوری تھین Ethyl Urethane اسکو پوری تھین اور کا بڑیٹ آف اتھل بھی کہتے ہیں۔ ممکن دماغ و نخاع منوم اور دافع تشیع ہے خوش ذائقہ اور بے ضرر ہے برخلاف کلورل ہائڈریٹ کے معدہ پر کسی قسم کا خراش نہیں کرتی۔ چند منٹ ہی میں اپنا اثر کر کے عین صحت کے مطابق خوشگوار ایند لاتی ہے اگرچہ اسکا اثر تھوڑی ہی دیر رہتا ہے لیکن بعد میں قدرتی نیند قائم ہتی ہے بیداری کو بعد کسی قسم کا غشیان۔ نفع معدہ فیض۔ اعضا شکنی۔ کسٹی وغیرہ اور خواب آور و اوائل کے بعد معلوم ہوا کرتی ہے نہیں ہونی اگر سخت کلیف کا باعث بنجوالی ہو اوہیل کا چنداں اثر نہیں ہوتا کیونکہ بھائیون سلٹوٹیل کلورل ہائڈریٹ برومانڈز وغیرہ کی نسبت سریع الی تو ہو لیکن انکی برابر قوی الاثر نہیں۔ امراض قلب نیومونیا یا رنگ اینورزم می لچیا ڈیلیریم ٹرمینس کیوٹ مانا یا اچونا وجع مفاصل کہہ وغیرہ کی بنجوالی میں جبکہ بھائیون اور کلورل وغیرہ کا دینا مضر ہو اسکا استعمال مفید ہو گا نہ ہر شر کیا۔ پکروٹاکسین اور ریبار سین کے لئے فاذر ہے۔ خمر، پگہ گرین ٹنگانی میں حل کر کے اور اگر ضرورت ہو تو دوبارہ سہ بارہ بھی اسکو کھلا سکتے ہیں۔

اتھلی ٹوسس Athetosis اس مرض میں ہاتھ پاؤں ہر وقت خود بخود آہستہ آہستہ ہر طور پر حرکت کرتے رہتے ہیں اور جب طے سے رکھے جاویں اس وضع پر قائم نہیں رہ سکتی۔ اسکا علاج مقویات اور سکناٹ سے کیا جاتا ہے۔ سم الفار بروایڈ آف پوٹاسیم بھنگ سینٹ نفع میں کیلو و نلے زینن نہایت فائدہ کرتا ہے مثبت سرائیج یا ریجنٹ پیکس پر اور منفی سر اعضا ملات ماؤف پر رکھنا چاہیے شروع میں جب کہ یہ مرض خفیف ہو آرام ہو سکتا ہے ورنہ نہیں۔

اتھلی ڈین ہائی کلورائیڈ Ethidene Bichloride اسکو اتھیدن بھی کہتے ہیں۔

کا فور اور کلیسرین میں ملنے سے جلد کے اندر سرایت کر کے اپنا اثر پیدا کرتے ہیں۔ جیسے دم یا زخم پر بہت جلدی جذب ہو چکا
ہیں اور ان کا مقامی اثر یہ ہوتا ہے کہ عصاب کس سوزن کا حس کم ہو۔ درد کو آرام ہو جاتا ہے عروق خون پہلے سکر جاتے اور
پھر جلدی سے کھل جاتے ہیں۔ اعصاب پسینہ و پستان و عضلات وغیرہ کی قوت و تیزی بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے
اکیلیپ مختلف قسم کے دردوں تشنج عضلات۔ وجع مفصل فقرس۔ ذبل۔ اری سیپس دہنی ماسٹر اور مہ پستان
و جلدی خارش وغیرہ میں مفید ہوتا ہے۔ پستان پر لپ کر کے سے اخراج شیر کم ہو جاتا ہے۔

اکٹر اٹ میلا ڈونا اور کلیسرین ہوزن ملکر لپ کرنا ان کا لیف میں نہایت نافع ہے۔ ذبل اور سوزن کو دنا یا اثر میں معدہ
اور قے کو تسکین بخشتے ہیں۔ اثر دہن خون میں جذب ہو کر خون کو ذرات پر کچھ اثر نہیں کرتی۔ بلکہ خون سے خارج
ہو کر تمام جسم کی ساختوں پر اثر کرتی ہے جس کی تفصیل یہ ہے جو گلو شک ہو کر کسی شے کا لگنا شکل دہن اناس ہے۔ اکیلیپ
پھیل جاتی اور مینائی دھندلی ہو جاتی ہر خفیف اہمال نبض سست چہرہ اور آنکھیں سرخ اور رخسار نرور ہو جاتی ہیں
زیادہ مقدار میں کھلنے سے یہ علامات زیادہ شدید ہو جاتی ہیں مگر نبض تیز ہو جاتی سخت لڑائی اور تشنجی حرکات اور
خفقان ہو جاتے ہیں زخموں یا جابجی ورم پر زیادہ میلا ڈونا لگانے سے بھی یہ علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اعصاب
اسکا اثر ذیل ہوتا ہے۔

کنو الیو شتر قلیل مقدار میں دینے سے دماغ پر اسکا اثر اشد نہیں ہوتا کہ بہک شروع ہو جائے بلکہ محض دماغی
افعال سست تمام کام کا بلی غنودگی اور کمی محسوس ہوتے ہیں۔

نخلع پر اسکا اثر صرف اشد ہوتا ہے کہ ریفلیکس اریٹیشن پہلے زیادہ اور بعد میں کم ہو جاتی ہے۔
بڈ لاکو مرکز تنفس کو تحریک ہو کر دم خوب گہرا اور جلدی جلدی آنے لگتا ہے۔ زیادہ مقدار میں اسکا فاعل ہو جاتا ہے
مرکز قلب کو تحریک ہوتی اور حرکات قلب سست ہو جاتی ہیں۔ ویو موٹار مرکز پہلے تیز اور پھر سست ہو جاتا ہے اور نیچے
پہلے تو تمام شرائین سکر جاتی اور بعد میں پھیل جاتی ہیں۔

موٹار نرور یعنی اعصاب حرکت کی حس کم اور زہر کی مقدار میں دینے سے بالکل زائل ہو جاتا ہے۔ وائٹری سلیز کچھ اثر
نہیں ہوتا۔ نرسری نرور یعنی اعصاب حس کی قوت کم ہو کر دردیں تخفیف ہو جاتی ہے۔

نرسری دماغی عصب کے سرے جو تلی کے ریشوں میں ختم ہوتے ہیں مغلوب ہو کر تلی پھیل جاتی اور نظر دھندل ہو جاتی ہے
کارڈ ایوٹائی کے سرے جو سیمیکریٹری غدود میں ختم ہوتے ہیں مغلوب ہو کر اخراج لعاب بہن بند ہو جاتا اور دہن
اور گلو شک ہو جاتے ہیں اعصاب پسینہ کے سرے مغلوب ہو کر پسینہ بند ہو جاتا مگر جلد بوجہ زیادتی خون کو سرخ ہو جاتی
ہے اور بعض وقت سرخ بخارات بھی نمودار ہو جاتے ہیں حرارت جسم پہلے زیادہ اور بعد میں کم ہو جاتی ہو لیکٹیل
اعصاب کے سرے مغلوب ہو جاتے ہیں اور پستان و اخراج شیر بند ہو جاتا ہے۔

واکس عصب کے سرے جو قلب کی دیوار میں ختم ہوتے ہیں پہلے تیز اور بعد میں سست یا مغلوب ہو جاتے ہیں ای وجہ
پوری خوراک کے بعد نبض تیز ہو جاتی ہے اور یہ تیزی واکس پر پھیل لگانے سے کم نہیں ہوتی۔ زہر دہن مقدار میں دینے سے

کارڈیک گٹھلیا اور نیز لکھی ریشہ مفلوج ہو کر حرکت قلب بند ہو جاتی ہے۔
واگس کر سرے جو ہوائی نالیوں میں ختم ہوتے ہیں مفلوج ہو کر نالیاں کشادہ اور تنفس میں آسانی ہو جاتی ہے
واگس کے حسی ریشہ بھی سست ہو کر نالیوں کی خراش اور تکلیف کم ہو جاتی ہے سطح سی پیلا ڈونا دکشی اور
کھانسی میں مفید ہے۔

اعصاب پلیٹنگنگ کو ریشہ جو امحاکی دیوار میں ختم ہوتا ہے سست ہو کر امحاکی پری سٹائٹ حرکت زیادہ ہو جاتی ہے
چونکہ طبی مقدار میں فیٹ سے تنفس اور دوران خون میں تیزی ہوتی ہے اس لیے تمام جسم کی پرورش کو ترقی ہو کر حرارت
غریزی زیادہ ہو جاتی ہے اور تمام فضلات خاصہ کر مٹیایک کے متعلق زیادہ خارج ہوتے ہیں۔

خاص استعمال چونکہ اٹرومین اور بیلا ڈونا کا اثر دماغ پر سٹیٹو ہوتا ہے اس واسطے کہ بخارات کو بحران بیہوشی
شراب و دباؤ خویا میں استعمال کرتے ہیں تشنج و تکالیف صرع، درد سر اور رعشہ میں مفید ہے۔ اٹرومین ٹوشن
پتلی پھیلا نے کے لیے عام طور پر بغرض ملاحظہ یا مرض آئی رائٹس میں آنکھ میں ڈالتے ہیں جبکہ منہ سے بہت تھوک آتا
ہو مثلاً زہر پارہ، یا ایام حمل یا دماغی امراض میں اٹرومین یا بیلا ڈونا کھلانا مفید ہوتا ہے۔ روق اور سل میں پسینہ روکنی
کے لیے بھی اس کے استعمال کرتے ہیں۔ اختلاج کلیس خاص خاص حالہ میں مفید ہے کیونکہ طبی مقدار میں کھلانے سے آریٹرل پمپ
کم اور حرکات بطن القلب تیز ہو جاتی ہیں۔ اسکو مارفیا یا دجی ٹیس کو ساتھ حسب موقعہ استعمال کر سکتے ہیں۔

امراض تنفس مثلاً دکشی، سرفہ وغیرہ میں ایفون کی نسبت زیادہ مفید ہے کیونکہ اس کی خراش کم ہو جاتی ہے اور تشنج رفع ہو جاتا
اور مرکز تنفس کو تقویت ہوتی ہے برخلاف اسکے ایفون دافع و تشنج تو ہے لیکن اس سے مرکز تنفس کے مفلوج ہونے کا
اندریشہ ہوا سی وجہ سے ایفون کو امراض تنفس میں نہایت احتیاط کو ساتھ استعمال کرنا چاہیے فیض کہنہ مسائل
اکبر کشن شقاق القعد اور تشنج سفکس میں نہایت مفید ہے۔ امراض اعضا تناسل مثلاً کارڈی جریان حبس البول
سوزش مثانہ اور پرلے ٹائٹس وغیرہ میں مفید ہے۔

زہر ایفون اور ایسیرن کی فاد زہر ہے۔
چونکہ اٹرومین پیشاب کو ساتھ بہت خلج ہونی شروع ہو جاتی ہے اس لیے یوریتس مثانہ اور یوری تھر کے خراش اور درد کو
آرام دیتی ہے۔ اور یوبہ، فاسفٹس سلفٹس، اور پانی پیشاب میں زیادہ خارج ہوتی ہیں۔ گویا کہ مدد بھی ہے۔
خام اٹرومین ۱۰ گرین سے ۱۰۰ گرین تک۔

اٹرونی پروگریسو سکولر Atrophy Progressive Muscular

ویس ٹنگ پالسی اور کرڈیل میرس میرلی بس بھی کہتے ہیں۔ دیکھو بیان ویس ٹنگ پالسی کا۔

اٹوریا۔ Otorrhœa یعنی کان کا بہنا۔ دیکھو بیان اٹائٹس کا۔

ایٹکسیا لوکوموٹار Ataxia locomotor یعنی لوکوموٹا ایٹکسی دیکھو اسکا بیان۔

ایلیجیا Otalgia یعنی کان کا درد وجہ الاذن علاج مطابق سبب ہونا چاہیے۔ اگر دم کی وجہ سے درد ہو تو

علاج کرنا ضروری ہوگا۔ دیکھو بیان انائی ٹس کا۔ اگر اعصابی ہے تو مفصل ذیل نطول مفید ہونگے۔

اٹروپین مگرین۔ ماریا مگرین۔ پانی ایک اونس۔ اسکے چار پانچ قطرہ کان میں ٹپکائے جاویں۔ ٹیکھا ایم ہوزن مگرین
تیل میں ملا کر کان میں ٹپکانا۔ آبلہن تیل میں ملا ہوا نمک پانی میں حل کیا ہوا۔ کوکین و منتھال بھی مفید ہیں۔

پوست بھینہ مرغ جلا کر اسکی راکھ کان میں بروردیں اور بعد ازاں چند قطرہ پانی کراس پر پھوڑیں۔

اجوائن۔ یہ ایک نہایت عمدہ خوشبودار مقوی معدہ اور دافع تشنج دوا ہے۔ اس ایک میں رائی چرائتا۔ اور کا

کے خواص جمع ہیں یعنی رائی کی طرح محرک معدہ اور چرائتہ کی طرح بڑا نمک اور کا فور کی طرح نافع تشنج ہے۔ ریکسڈ ٹھوڑا

میں جاذبات کو ساتھ دینا مفید ہے۔ بدبو اور بد ذائقہ دواؤں کو ساتھ ملا کر انکو بو اور ذائقہ کی اصلاح کر دیتی ہے۔

مسہلات کو ساتھ ملانے سے خراش نفع اور مرور وغیرہ کو روکتی ہے مختلف اقسام کی بدبوی یعنی ڈیسیا۔ قنفج۔ اہمال

نمکان۔ تشنجی امراض معدہ اہمال بھینہ۔ درد قوی۔ لہجہ اشتقاق الرحم۔ دمہ اور دسمینوریا میں مفید ہے شراب کی خوشبو

کے وقت اگر اسکو استعمال کیا جاوے۔ تو اسکا تیز اور خوشگوار ذائقہ اور حرارت معدہ جو اسکے پینے کی بعد پیدا ہوتی ہے

شراب کو توڑ کر رفع کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے بہت سے عالی حوصلہ اور ذی فہم اشخاص شراب کی عادات سے نجات پا سکتے

ہیں۔ اس میں تھائی مال بکثرت ہوتا ہے اور اسی پر تمام تاثیرات اسکی موقوف ہیں۔ اجوائن کا ست جو بنام اجوائن کا

پھول عام طور پر بازاروں میں بکھلتا ہے۔ تھائی مال کا قریب قریب قائم مقام ہے۔ یہ اجوائن کا پھول اعلیٰ درجہ کا اپنی

سینک اور جرمی ساڈ ہے۔ خارجی طور پر لوکل سی مولٹ اور اینٹیمٹک ہے۔ فوائد اجوائن کی مفصل تشریح کو لئے بیان

لوٹک اور تھائی مال کا دیکھو۔

خرا اجوائن۔ اسے ہم گرین نمک۔ اجوائن کا پھول یعنی تھائی مال پہ سو گرین نمک۔

اِرتھ Itch خارش کے پیز کا بیان دیکھو۔

احتباس البول رٹینشن آف یورین پیشاب کا بند ہو جانا۔ یہ حالت مفصل ذیل اسباب ہو سکتی ہے۔

۱، سٹرکچر۔ یعنی مجری بول کا بند یا تنگ ہو جانا۔ پرانی سوزش یا سوزاک کو بعد عموماً مجری بول میں زائد ریشہ بنکر اسکو

تنگ کر دیتے اور کبھی کبھی تشنج ہو کر اخراج بول کو بالکل بند کر دیتے ہیں کبھی نالی میں دم ہو کر پیشاب رگ جلتا ہے۔ کبھی

مجری بول کے لحمی ریشے سکڑ کر رہتے۔ بند کر دیتے ہیں۔ اس طرح سٹرکچر کی تین اقسام ہیں۔

اول آرگینک یعنی ریشہ دار دوم پازماڈک یعنی تشنجی سوم غیر تشنجی یعنی وہ سٹرکچر جو قلع خون کی وجہ سے ہو۔

۲، پراسٹیٹ کا بڑھ جانا۔ پراسٹیٹ ایک غدود ہے جو مثانے کے موخہ پر واقع ہے۔ مجری بول اسی کے

اندز سے شروع ہوتی ہے۔ لوٹریو نہیں اسکا درمیانی حصہ اکثر بڑھ جاتا اور مجری بول کو روک لیتا ہے۔ جب یہ معمول سے

زائد بڑھ جاتا ہے تو ہمیشہ پیشاب وقت اور تنگی کے ساتھ آتا ہے۔ اسکی خفیف درم شدت رکاوٹ کا باعث ہوجاتا

۳، پتھری۔ جب مثانہ یا مجری بول میں پتھری پڑ جاتی ہے تو اکثر پیشاب کا اخراج میں مایوس رہتی ہے۔

۴، مثانہ یا مجری بول کے اندر کسی قسم کی رسولی یا پھوڑے کا ہو جانا۔

ابن میں ہم مختلف اسباب جتناس البول کی تشخیصی علامات صحیح کر لیں

۱۸، آرگینک سٹرکچر پرانی سوزش یا سوزاک کی وجہ سے پتھری جاری رہنا پیشاب کی دھار کا تندرج بٹلہا ہونا یا پیشاب کی نالی کو خسوس کرنے سے کسی مقام پر سختی یا گروہ یا چھلہ منوم ہونا۔

۱۹، سپانز ماؤک سٹرکچر یعنی تشبیہ تنگی۔ یہ دفعتاً ظاہر ہوتی اور سینکے ہوئے گرم پانی بہانے اور دفع نشیج ادویہ کھلانی سے جلدی دفع ہو جاتی ہے۔

۲۰، کھجستہ سٹرکچر پتھری بول میں درد و سوزش، رطوبت یا سیریک جاری ہونا عارضی روک۔
۲۱، پتھری۔ کبھی کبھی پیشاب کا رنگنا۔ پیشاب کا اخراج بار بار وقت اور قاطر سے ہونا بچوں میں کلینج کا کلنا۔ اگر مجری میں نکر آچھنے تو نہایت شدت کا درد ہو تو لمبے کتھیر پاس کرنے سے آسانی تشخیص ہو سکتی ہے۔

۲۲، پراسیٹ کا بڑھ جانا ضعیف عمر اور بول کو وقت بلیثہ وقت ہونا مگر اور کسی قسم کا درد یا کھنہ ہونا وقت اور ارکا رفتہ رفتہ زیادہ ہوتے جانا سوزاک یا پتھری کی کوئی علامات موجود نہ ہونا۔

۲۳، مجری بول یا مثانہ میں پھوڑا ہونا مقامی ورم اور درد و ایک یوم سے علامات کا ظاہر ہونا۔
۲۴، مجری بول یا مثانہ میں کسی قسم کی رسولی کا ہو جانا۔ بلا کسی درد یا تکلیف کو رفتہ رفتہ تقطیر البول مسلسل بول اور حبس البول کی تکالیف ظاہر ہونا۔

علاج۔ مریض کو نیز گرم پانی میں بٹھلائیں۔ اور دفع سوزش و تشنج کیلئے داخلی طور پر ٹنگرا ویم ۲۰ بوند ٹنگریلا ڈونا، ابوزہ پیرٹ کٹورافارم ۲۰ بوند ایکو انفرایک اونس تین تین گھنٹہ وقفہ سے پلائیں۔ اگر پانی دو تین اونس رانی ملا دی جائے تو اوپر بہتر ہے۔ اگر اس عمل سے پیشاب جاری نہ ہو سکے اور حبس البول کی وجہ سے مریض سخت تکلیف میں ہو تو کٹھیجینی قاسطیر سے پیشاب نکالنا چاہیے۔ پہلے نرم کتھیر سات آٹھ نمبر کا آزمانا چاہیے۔ اگر یہ کسی طرح سے مثانہ میں داخل نہ ہو سکے تو اس سے کم نمبر مثلاً ۷، ۶، ۵ یا ایک نمبر کا آزمانا چاہیے۔

اگر کوئی نرم کتھیر ہرگز داخل نہ ہو سکے تو کم الاسٹک کتھیر آزما سکتے ہیں جب اس میں بھی ناکامیابی ہو تو آخر کار سلو کتھیر آزمانا چاہیے۔ کتھیر پاس کرنے میں یہ امور قابل یادداشت ہیں کہ استعمال کرنے سے پیشتر کمال طور اندر باہر کے انگواٹی سیٹک کو کے اور گرم نوشن میں بھگو کر یا تولیہ سے رگڑ کر گرم کر لینا چاہیے۔ بعد ازاں اینٹی سپٹک آئل میں تر کر کے گزارنا چاہیے۔ اس عمل کے وقت ہرگز ہرگز کسی قسم کی جلدی گھبراہٹ اور تیزی ظاہر کرنا جائز نہیں ہو سرجن میں یہ تصور قابل حافی نہیں ہو سکتا کہ وہ کتھیر داخل کر نہیں جلدی اور زبردستی اختیار کرے۔ بلکہ نہایت ہیکر و دستقلال کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہیے۔ وقت ختم ہو کچھ پرواہ نہیں پہلے نرم کتھیر زیادہ نمبر یعنی سات آٹھ نمبر کا استعمال کرنا چاہیے جب کوئی نرم کتھیر داخل نہ ہو سکے تو کم الاسٹک اور جب یہ بھی داخل نہ ہو تو سلو کتھیر پاس کرنا ضروری ہو آخر میں جب کوئی قاسطیر پاس نہ ہو سکے اور حالت مریض نازک ہو تو مفصلہ ذیل عملیں ہیں۔

اول سپیس کا اوپر نشان کے اندر رکارو کینٹ نوادہ داخل کر کے پیشاب نکالنا۔ اس عمل کو بعد چند روز ہر کی
نکلی اندر کھنی چاہیے تاکہ پیشاب آسکر راستہ خارج ہو جائے۔ دوسرے مفعول کے اندر سر رکارو کینٹ نوادہ داخل کر کے
پیشاب نکالنا۔ سیووم عامہ میں شکاف دیکر پیشاب نکالنا۔ ان دستکاریوں کا بیان انشا اللہ تعالیٰ سر کچر
میں مفصل کریں گے۔ دیکھو یہاں سر کچر اور پرنسٹنک انلا جرنٹ کار۔

احتباس الطمث بدش حیض - امینوریہ - مفصلہ ذیل اسباب حیض بند ہو سکتا ہے

(۱) حمل دھارقت و قلت خون (۲) کثرت خون (۳) پیدائشی نقصانات (۴) دیر پا امراض جنکی وجہ سے عام ضعف اور
لاغری لاحق ہو جائے (۵) اتفاقی اسباب مثلاً سخت صدمہ - زاید ترددات و تغلطات - فاقہ کشی - تنگ لباس - پس اگر کسی
مریضہ کی طرف سے حیض نہ کجانی کی شکایت پیش ہو تو یہ لازم ہے کہ اصل سبب کے دریافت کر کے اس کے مطابق علاج شروع
کریں۔ تحض احتباس الطمث کا نام ستر مہینہ حیض آدوہ دیدینا سخت نقصانات پیدا کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر حمل کی وجہ سے احتباس طمث
ہوا ہے تو مہینہ حیض آدوہ دینے کا اسقاط کا اندیشہ ہے کیونکہ جس قدر حیض آدوہ ہے عموماً سقط بھی ہے۔ اگر کوئی بیڈیش
لوگ موجود ہو تو مہینہ حیض آدوہ سے اور خون خارج ہو کر درد اور جھنجھ زیادہ ہو جائے گی۔ اگر قوت و قلت خون یا عام ضعف
لاغری کی وجہ سے حیض بند ہو ہے تو مہینہ حیض آدوہ دیکھ فائدہ نہیں ہو سکتا پس طبیب کی یہ سخت نادانی ہے کہ بلا تشخیص کے
احتباس طمث کا علاج شروع کر دے۔ اب ذیل میں ہم اسباب مختلفہ کی شخصی علامات درج کرتے ہیں۔

اول حمل کی علامات حسب ذیل ہیں: حیض کا بند ہونا۔ حمل کے بعد حیض ہمیشہ بند رہتا ہے بعض اوقات بیا
سے بھی ایسا ہو جاتا ہے کبھی باوجود حمل ہونے کے پہلے تین مہینوں میں ایام کو دنوں میں خون آتا رہتا ہے اسلئے
یہ قطعی علامت نہیں ہے۔

(۲) پستان کا بڑھ جانا اور چچی کے گرد سیاہ چمکہ نمایاں ہونا تیسری مہینے کے بعد دلانی سے دودھ نکلنا کبھی
ایسا ہو جاتا ہے کبھی حمل کی حالت میں بھی پستان چھوٹی رہ جاتی ہیں گویا کہ قطعی علامت نہیں ہے۔

(۳) بچہ کی حرکات معلوم ہونا۔ حمل کے سواہوں ہفتہ میں بچہ پھر تا معلوم ہوتا ہے۔ پہلے پہل اتنی حرکتیں بہت
خفیف ہوتی ہیں۔ لیکن بعد میں زیادہ تیز اور قوی ہو کر صاف لائیں مانتا معلوم ہوتا ہے بعض اوقات
یہ حرکات ہفتوں اور مہینوں بند بھی رہتی ہیں۔ اور کبھی کل مدت حمل تک بالکل معلوم ہی نہیں ہوتیں۔

(۴) رحم کا کبھی کبھی سکڑنا اور سخت ہو جانا شکم پر ہاتھ رکھنے سے رحم کا سکڑنا اور سخت ہونا کبھی کبھی معلوم
ہوا کرتا ہے۔ اگر رحم کے اندر رسولی ہو تب بھی ایسا معلوم ہوا کرتا ہے۔

(۵) صبح کے وقت جی متلانا۔ آرتے ہونا۔ دایمیا چیزوں کو کھانے کو دل چاہنا۔

(۶) رحم کا نرم ہو جانا۔ اندام نہانی کی رنگت نیلی پڑ جانی۔ رحم کے اندر اوٹلی داخل کر کے اگر اوٹلی
کو دفعتاً دھکیلا جاوے تو پھر اوپر کو اوٹلی پھر اوٹلی پر آ پڑتا ہے۔ یہ ایک صاف علامت ہے کہ کوئٹہ رسولی
ہو چکا ہو اوٹلی پر نہیں گر سکتی۔

۷۷۔ ہجے کے قلب کی آوازیں سنائی دینا سچ کا دل فی منٹ ۱۲ دفعہ بھرنے کا ہے۔ اور اتمی ہی دفعہ گھڑی کی آواز کے مشابہ دوہری آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ ایک یقینی علامت ہے حمل کو چوتھے اور پانچویں مہینے میں یہ آوازیں پہلے پہل سنائی دیا کرتے ہیں جب یہ آوازیں سننی جائیں تب حمل میں کوئی شک نہیں رہتا۔ ان آوازوں کو ماں کی ناف کو نیچے پیڈوں کے مختلف حصوں پر کان لگا کر سن سکتے ہیں۔
۷۸۔ ناف کو نیچے کان لگاتے سے سائیں سائیں کی آوازیں سنائی دینا۔

۷۹۔ پیٹ کا بندرتج بڑھتے جانا۔ اور رحم پیٹ میں معلوم ہونا تیسرے مہینے کے بعد رحم پیڈوں سے ابھرتا ہوا معلوم ہو سکتا ہے۔ پانچویں مہینے میں ناف اور کالے بالوں کے درمیان ساتویں مہینے میں ناف پر اٹھویں مہینے میں ناف اور کوڑی کے درمیان اور نویں مہینے میں کوڑی پر کوئی رسولی ایسی ہوا رقتار سے نہیں بڑھتی۔ اسلئے پیٹ کا بندرتج بڑھنا بھی ایک صاف علامت ہو۔

دومہ رقت و قوت خون۔ اسمیں تمام بدن کا رنگ بھیکا پڑ جاتا ہے۔ لب ہلکیں اور ناخن سفید نظر آتے ہیں۔ آپس کثرت سے آتی طبیعت ضعیف اور سست رہتی ہے۔ کسی کام کے کرنے کو دل نہیں چاہتا سست بیٹھے یا پڑے رہنا بھلا معلوم ہوتا ہے۔ زیادہ تفصیل کے لئے بیان اینیما کا دیکھو۔

سومہ کثرت خون۔ اسمیں مریضہ کا چہرہ سرخ اور بھرا ہوا ہوتا ہے۔ بدن فربہ معلوم ہوتا۔ اور ضعیف غصہ میں ہی چہرہ سرخ ہو جاتا ہے نبض پر قوی اور موٹی ہوتی ہے۔ سر بھاری رہتا اور اکثر دل دھڑکتا رہتا۔
چھاسمہ پیدائشی نقصانات۔ جوان لڑکیوں میں اگر حیض آنا شروع نہ ہو اور پیڈوں میں درد رہتا ہو تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ پیدائشی طور پر گردن رحم یا رحم میں کسی قسم کی روک ہو ایسی صورت میں اندام نہانی اور رحم کا ملاحظہ کرنا ضروری ہے بلکہ ملاحظہ کے اصل سبب کا تشخیص ہونا اور پھر اس کا مناسب علاج کیا جانا غیر ممکن ہے۔

پنجمہ دیر یا امراض انکی تشخیص مریضہ کے حالات دریافت کر نیسی باسانی ہو سکتی ہے۔
ششمہ اتفاقی اسباب

پس ان مختلف حالتوں میں ایسا ہو یا یعنی حبس الطمث کا **علاج** بھی مختلف طور پر ہو سکتا ہے۔ اگر اسکی وجہ حمل معلوم ہو تو جریان حیض کے لئے تدابیر کرنا نہایت نامناسب اور لذیذ ناک فعل ہوگا۔ اگر وجوہات نمبر دوم سوم و چہارم میں سے کوئی وجہ ثابت ہو تو اسکا مناسب علاج کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے مریض کی علوان نشست و برخاست۔ خور و نوش اور پوش اور پوش کی طرف توجہ کر کے اسکی مناسب اصلاح کرنی چاہیے۔ زیادہ بیٹھے رہنے۔ زیادہ سونے تنگ اور شدیدہ لباس پہننے سے منع کرنا مناسب محنت اور ورزش کی نصیحت دینا خوشی و نشاط عبادات اور صحبت کی طرف توجہ دلانا اگر غذائے شہوانی کوئی نقص یا قیاعدگی معلوم ہو تو اسکو منقطع کرنا ضروری امور میں غلبت و رقت خون اور عام کمزوری کی حالت میں فولاد۔ آرنک۔ کونین اور نکس دم کا حسب موقع استعمال کر سکتے ہیں کمزوری رحم کی حالت میں آرگٹ

بورکس پر گنیت آن پوٹاش۔ ایسیال۔ جسنگ سنٹونین اور صبر مفید ہیں۔ زیادہ تفصیل کے لئے ان ادویہ کا بیان اور نیز لکے لگاک ادویہ کی تفصیل دیکھو۔ دیگر نڈیر جو اور ارضیں میں مدد ہو سکتی ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔

رحم کے مقابل ہائی پوگاٹریک یجین پر مالش کرنا گیلونیک کرٹ لمبر اور ریکیرل یجین مین کو گڈارنا۔ ولو پرجوٹیکر لگوٹا۔ فٹ ہاتھ اور سب ہاتھ دینا پستان کی مالش کرنا یا سینک دینا محرک ادویہ کے حنفہ کرنا۔ رحم کے اندر ساؤنڈ داخل کرنا۔

احتقان المده فی الصدر۔ یا پوٹھورکس سینس میں سب پڑ جانا۔ دیکھو بیان پیورسی کا۔

احتلام۔ ناکٹرل۔ ایسی شذرات کو سوز ہو کر ازال ہو جانا اسکی وجوہات مختلف ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے اسکا علاج بھی وجوہات مختلفہ کے مطابق مختلف طور پر ہے۔ پس اگر آغاز شباب میں تجربہ کہ جسے کثرت احتلام ہوتا ہو تو اسکا علاج یہی ہو سکتا ہے کہ نیک صحبت اختیار کرائیں۔ غذا ایت میں کمی کریں اور ادویہ قاطع شہوت۔ پوٹاسیم برومائیڈ وغیرہ استعمال کر لیں۔ دھنیا خشک چٹے ماش کے قریب وزانہ پانی میں پسکرا اور چچان کر صبح کے وقت پلانا کثرت احتلام کو روکتا ہے۔ کثرت طبع کی وجہ سے اعضائے تناسل کمزور ہو جاتے اور سرعت ازال و کثرت احتلام کا باعث ہوتا ہیں ایسے اشخاص کے لئے مقویات فولاد مثلاً اسٹیریل وغیرہ ایٹ کوئین سائٹراس نہایت مفید ہوتے ہیں۔ اگر مرض نشہ جوانی میں دایہ تباہی حال رکھتا اور شب و روز خیال شہوت میں غرق رہتا ہو تو اسے احتلام کا علاج بھی سوا ترغیب صحبت نیک کی غذا و ادویہ قاطع شہوت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات ضعف باہ و رقت منی سے سرعت ازال و کثرت احتلام لاحق ہو جاتے ہیں۔ ایسے اشخاص ہمیشہ ادویہ مہی نمک و مغلاظ منی کے متلاشی اور ہمیشہ نامردی و زوال شباب کو خیال ہو مغموم و شوریدہ خاطر رہتے ہیں۔ ایسے اشخاص کو لیے عمدہ ورزش لطیف غذائیں اور مقوی ادویہ مثلاً دمیانا۔ کچلہ۔ فولاد۔ اور کوئین علاج ہیں ہمیشہ ٹھنڈے پانی میں غسل کرنا کھلی ہوا میں سیر و ورزش کی نصیحت دینا۔ اور واپیات خیالات سے انکی طبیعت کو صاف کرنا ضروری ہیں۔ ایسے لوگ کتابی شکلوں۔ جعلی حکیموں اور عطاریوں کو رسالجات و شہنشات بڑھ کر ہمیشہ علاج کی فکر میں آوارہ و سرگردان پھرتے رہتے ہیں۔ دراصل کوئی قابل علاج مرض نہیں ہوتا بلکہ محض انکی خیالات و توہمات ہی مرض بن جاتے ہیں۔ ساتھ اس کے دغا باز حکیموں کو لاف و گراف و جعلی تحریرات اور اداں کی بہودہ شہنجات مرض کو اور دو بالا کر دیتے ہیں ہمارا نسخہ کیم مرصیوں کو واسطے سولے اسکے اور کچھ نہیں کہ وہ بہودہ توہمات اور بڑھتی ہوئی مرض کو ہمیشہ بات سمجھیں۔ نیک صحبت اختیار کریں کھلی ہوا میں سیر و ورزش کرتے رہیں۔ اساک بند ہیچ کے تسخات اپنی جوانی کے لئے نہر قابل خیال کریں اور صلاح غذا و عادات و عام صحت کو تقویت بخشیں۔

احراق البلادر۔ خواہ کسی تیرے مثلاً بھلاؤاں یا کسی تیزاب مثلاً کاسک و سلفیورک ایڈ وغیرہ سے احراق واقع ہوا ہو تو اس کے اصول علاج حسب ذیل ہیں۔

احراق التیزاب۔ اول یہ کہ مصلح ممکن ہو فوراً اس سے غرضت کو صاف کر کے اسکا اثر کو روک دیں۔

احراق الشمس - بجلاؤں کی تیزی کسی تیل کے ساتھ فوراً دھو ڈالو تو سے رفع ہو جاتی ہے۔ تیز آب
احراق الماء - نیم گرم پانی سے آسانی صاف ہو سکے ہیں جو وضو کے لیے پانی میں کی قدر کھار
احراق النار - اشیاء مثلاً سوڈا مالکرو دھونا زیادہ مفید ہے۔

احراق النور - دوم یہ کہ اگر آبلہ نمودار ہو گئی ہوں یا جلنے سے زخم رکھے ہوں تو او کا علاج
 کرنا چاہیے۔ جیسا کہ بھی احراق الماء و احراق النار کے علاج میں ہم انشاء اللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔
احراق الشمس - نرم پوست والے اشخاص میں بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ شدت و صوب میں پھرتے
 بعض اوقات جلد کا کوئی حصہ ہلکے سرخ یا سیاہ ہو جاتا یا آبلہ پڑ جاتا ہے۔ اس کا علاج بعینہ اسی طرح
 جیسا کہ اول و دوم درجہ احراق الماء و احراق النار کا۔ آگ یا سرخ گرم دہات یا اور کوئی سخت چیز بہت گرم
 تک جسم کو جلا سکتی ہے لیکن پانی یا روغنیاں کا اثر عموماً جلد پر ہی محدود رہتا ہے۔ علاج ہر سر احراق کا ایک ایک
 پانی یا آگ سے جلنے کے بعد فوراً جائزاً و فہر سوڈا او الکر تھوڑا پانی چکاتے اور ملتے جائیں۔ اگر سرخ غلے الغور
 کیا جائے تو سوزش و درد بہت جلد موقوف ہو جائے اور چھالہ و زخم ہونے نہیں پاتے ہیں۔ لیکن جب احراق
 کو دیر ہو کر اس عمل کا موقع جاتا ہے تو اصول علاج و تدبیر حسب ذیل ہیں۔

اصول اول - جلد کو ہوا اور عفونت انگیز گرمیوں کے فسادات سے محفوظ کرنا۔

اصول دوم - سوزش و درد کو مہول کلیہ کے مطابق مناسب ادویہ سے رفع کرنا۔

اصول سوم - آبلوں میں مناسب مقام پر سورخ کر کے پانی نکال دینا۔

ان اصول کی تعمیل کے لیے بے حد نجات و تدابیر اہم کر گئے اور اپنے اپنے موجدین کے ہاتھوں میں کمال
 بنظر اختصار ہم ذیل میں چند تدابیر و نجات جو نہایت سہل و اصول اور قابل اعتبار ہیں درج کرتے ہیں۔

اول خشک ادویہ چھڑک کر اور اس پر صاف خشک روئی رکھ کو پٹی باندھ دینا مثلاً (۱) ناستہ اول
سہاگہ تولد (۲) سوز و آوٹول ایک تولد ناستہ اول (۳) بستمہ سب ناستہ اس ایک تولد سیلا ل ایک تولد
آگ اند آف زنگہ تولد (۴) پورک ایڈم ڈرام آگ ایڈ زنگہ آف ڈرام ناستہ ایک اونٹس۔
(۵) کوئلہ کی رائے (۶) رال ہار یکہ بیسکلو اور اکیس ہار پانی میں دھو کر سوختہ جگہ پر لگانا۔ اگر غرق
گلاب میں یا کیا جائے تو اور بہتر ہے۔

خفیف جلن اور چھوٹے آبلوں کے لیے یہ تدابیر کافی ہیں۔

دوم سرخ ادویہ کا ملا یا ضماد کرنا مثلاً (۱) مریم سہاگہ (۲) مریم زورہ (۳) آب چونہ و روغن السی ہوزن
 ملا کر طلاء کرنا (۴) مریم حب (۵) مریم آوٹو فاسم (۶) چاک روغن السی اور سرکہ ہوزن ملا کر (۷) زردی
 بیضہ و روغن السی ہوزن ملا کر ان سب کا یہ فائدہ ہے کہ جلد کی سوزش کو کم کرنے اور جلد کو ہوا اور عفونت
 انگیز گرم کے اثر سے محفوظ رکھتی ہیں۔

سوسہ متفرق نہ ہو اور سوختہ جگہ پر ٹھنڈے پانی کی گدی رکھنا اور اسکو بار بار بدلتے رہنا۔ اس وجہ سے
میں فوراً کمی واقع ہو کر سنگین اور آدم کی صورت نظر آنے لگتی ہے (۲) کوئلہ کی یا لکھ پانی میں ملا کر اور صاف
پانی بنا کر بار بار سوختہ جگہ پر بہانا نہایت مفید ہے۔ (۳) ایتھر میں آیوڈو فارم حل کریں۔ اور اس حل میں
ملل یا لٹ جھکو کر جلے سوختہ پر رکھیں۔ پر ترکیب نہایت مفید اور سنگین بخشش ہو۔ ایتھر خیر ہو کر تمام
جگہ کو سرد کرنا اور آیوڈو فارم کی تہ جگر تمام سوختہ جگہ پر غلاف بنا دیتی ہے جس سے جلے ماؤف کی
حفاظت ہو جاتی بلکہ گرم عفونت خیر سرائت کرنے سے باز رہتے ہیں (۴) گوند پانی میں حل کریں اور اس میں
قدے سہاگہ یا کاربانک ایسڈ ملا کر تمام سوختہ جگہ پر لپ کریں اس سے گوند کی تہ کا غلاف بنکر ہو اور گرم
امراض سے حفاظت ہو جاتی ہے (۵) سفیدی زردی بیضہ میں سہاگہ ملا کر لپ کرنا۔

یہ تمام تدابیر جو بیان کی گئی ایسے احراق کے لئے قابل عمل ہیں جو تھوڑی جگہ میں واقع ہو۔ لیکن جب جسم
حصہ کثیر چلچلتا ہے تو تمام سہر پر یہ عمل کرنا نہایت دشوار ہوتا ہے ایسی حالت میں سب سے مقدم یہ امر ہے کہ
مریض کی ارواح کو شراب یا افیون سے قائم رکھیں تاکہ صدمہ احراق کی وجہ سے سخت ضعف اور عشی
طاری ہو کر اسکی ملاکت کا باعث نہ ہو۔ تمام سوختہ جگہ کو فوراً فالین کی گدیوں سے محفوظ کریں اور بعد
میں تھوڑا تھوڑا انکرا کاٹ کر اسکا علاج تدابیر بالکے مطابق کرتے رہیں۔ تخفیف درد و سوزش کو لینے کو کینین
بحساب آگرین فیصدی پانی میں حل کر کے لگانا نہایت سنگین بخشش ہو۔ بڑے آبلوں کا پانی سورخ کر کے
نکالتے رہنا چاہیے۔ ہر ایک نئی ڈرنگ کو وقت زخموں کو پورک لوش صاف کر لینا ضروری ہے۔ اٹالے
علاج میں وضع اعتدال کی طرف براہ خیال رکھنا چاہیے۔ چونکہ سخت احراق کے بعد عموماً جلد اور عضلات
سکڑ کر گردن۔ بازو۔ ہاتھ و ٹانگ وغیرہ کو ایک طرف کھینچ لیا کرتے ہیں۔ ایسے اثنای علاج میں الٹی وضع
ہمیشہ اس طریق پر رکھنی چاہیے کہ بعد میں جو سختی و کھینچ واقع ہو وہ چنداں بدنما تکلیف دہ نہ ہو۔

احراق النورہ اس سے مراد منہ میں جھالہ پڑ جانا ہے جو اکثر زبان خوبوں کے منہ میں چونکہ وجہ ہو جاتا
کرتے ہیں۔ اسکا علاج صرف اسقدر ہے کہ ہان کا کھانا بند کرادیں۔ سہاگہ ایک حصہ شہد دس حصہ میں ملا کر
چھالو پر مشورہ اتر لگائیں۔ لعاب سیفول سے مضبوط کر لیں۔ دغن بادام اور دغن اخروٹ ملنا یا لکھ مغزیات
کا چباننا بھی مفید ہیں۔ تیز اور شورخیزوں کے کھانے سے پرہیز لازماً ہے۔

احول بھیگا بشرے جس کا بیان دیکھو۔
اختلاج الشفہ۔ لبوں کا ہلکا سا علاج بعینہ اختلاج القلب کا علاج ہے۔

اختلاج القلب۔ سلیٹین۔ دل کا دھڑکنا۔ دھڑکنا۔ دل بہت تیزی اور شدت کی بنا پر حرکت کرتا
اور سینہ پر نظر کرنے سے اسکی حرکت دور تک میل پوری نظر آتی ہیں۔ بعض کو ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ دل اسکی حرکت کی طرح چل رہا ہے یا دھڑکنا اسکی طرح ہوتا ہے۔ دیکھیں۔

غالب ہو جاتے ہیں۔ اگر قلب کی دیوار یا کوڑیوں میں کوئی فساد موجود ہے تو حرکات بقیاعدہ اور غیر مسلسل بھی ہو جاتی ہیں۔ آن علامات سے اختلاج القلب کی پہچان نہایت آسان ہے۔ خود مریض ہی بول سکتا ہے کہ اس کا دل دھڑک رہا ہے مگر اسکی وجوہات مختلف ہوتی ہیں۔

استہباب۔ اول خراب عادات جنکی وجہ سے دل کے لحمی اور عصبی ریشے کمزور پڑ جاتے ہیں مثلاً ست میٹھے یا پڑے رہنا۔ کثرت تباکو۔ چار شراب۔ کثرت حملع۔ جلق۔ آرام طلبی۔ فاذہ کثی۔ جب قلب کی ایسی حالت ہو جائے تو خفیف اسباب مثلاً دفعتاً کھڑے ہو جانے بھاگنے۔ یا نفع مدہ یا اتفاقی حادثہ یا جوش غضب یا شہوت سودھڑکے شروع ہو جاتا ہے۔ اور غھوڑی دیر آرام سے بڑے ہنسنے یا کسی محرک و مخرج ریح ادویہ کھلانے سے جلدی رفق ہو جاتا ہے۔ مریض خود بتا دیتا ہے کہ اکثر خفیف وجوہات سے اسکو دھڑکا لگتا ہے اور مرزئی آلمہ یا سب یا عرق سو نف یا عرق کیوڑہ یا سپر سنٹ یا سپرٹ امونیا اتر و یا کولی یا دواہ الک یا مشک کا فور کھانے سے فوراً رفق ہو جاتا ہے۔

دوم۔ قلب کی دیواروں میں جرنی پڑ جانا یا اوکھا حد سے زیادہ موٹا یا چملا یا کشادہ ہو جانا یا اسکی کوڑیوں میں فساد ہو کر دوران خون میں خلل واقعہ ہو جانا۔ ایسی حالتوں کا دھڑکے عارضی نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ رہتا ہے اور مفردات و مقویات و مخزن ریح ادویہ سے جلدی رفق نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں خاصہ مرض کی تشخیص کے اسکا علاج کرنا چاہیے۔ دیکھو بیان کارڈیک ڈیزیز کا۔ ان امراض میں سینہ بین لگانے سے قلب کی معمولی آوازوں کے ساتھ اور اوقسم کی آوازیں بھی سنائی دیا کرتے ہیں۔ جکایان کارڈیک ڈیزیز میں کیا جائیگا انشاء اللہ تعالیٰ۔

سوم۔ حجاب القلب کو امراض جنکی وجہ سے دل پر دباؤ ہے اور آئنا دہ طور پر قلب حرکتیں کر سکے مثلاً پیری کارڈیم کے اندر پانی یا پیپ یا خون کا جمع ہو جانا ایسی صورت میں بھی دھڑکے مسلسل رہتا ہے اور دل کے مقام پر بوجھ اور دباؤ معلوم ہوتا ہے۔ ٹھوکنے سے قلب کے مقام پر معمول سے زیادہ جگہ ٹھوس معلوم ہوتی ہے۔ سینہ بین لگانے سے قلب کی آوازوں کے ساتھ عموماً کوئی غیر معمولی آواز نہیں سنائی دیتی۔ ان کی تشخیص کے واسطے دیکھو بیان پیری کارڈیم کے امراض کا۔

چھاد۔ اعتسابی امراض مثلاً رخشہ۔ اختناق الرحم یا خونہ رنگی ان امراض کی تشخیص ہی علامات ہو سکتی ہے۔ پتھر مختلف امراض جن میں دیکھی ساتھ ہو جیسے نیومونیا۔ سل۔ سپنے میں پانی پڑ جانا۔

نہم۔ وہ امراض جن میں دھڑکے میں خلل واقعہ ہو جیسے ریڈمٹڈ ڈیزیز۔ نیورم۔ ایکسٹنسیبل ٹنگا۔ آہرطہ کی رسولی۔

ہفتم۔ رخت و قلت خون۔

اختلاج القلب بذات خود ایک نہایت ہی سنگین حالت ہے مگر اسکی اصل وجہ کو پہچاننا مشکل ہو اگر یہ اکیلا مرض نہ ہو تو اسکی تشخیص بھی آسان ہو تا۔ اور اصل وجہ کے امراض کو مٹانے میں ایک ماضی علاج کے

طو پر واقعہ ہولے تو اصل مرض کا علاج کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی مفرحات و مقویات قلب کا استعمال مفید ضروری ہوتا ہے۔

علاج درجہ اولیٰ اگر ثقالت، نفخ یا خراش کثندہ غذا کی وجہ سے ہو تو فوراً کوئی مخمسج ریاح مسکن معہ دوا مثلاً ۱) ایل کچوٹ ۲) بوند اولیم منشی ۳) بوند شک چتر چتر ایونڈ سپرٹ کلورافارم ۲۰ بوند اکو کفر ایک انٹس ایسی ایک غزل ایک ایک گھنٹہ بعد حتیٰ کہ اختلاج موقوف ہو جاوے (۲) کلوروڈین ۵) بوند ایڈ سلفورک ۲) ڈالیوٹ ۲۰ بوند اکو انٹیمی ایک انس (۳) زعفران ایک ماشہ اور اچو این چار ماشہ اور زیرہ سفید چار ماشہ مصری ۲ تولہ۔ ان سب ادویہ کو ملا کر پریوں میں تقسیم کریں اور سہراہ عرق کیوڑہ یا بید مشک ۲ پڑیہ بوقت ضرورت استعمال کریں (۴) اگر تسلی معلوم ہو تو نمک پانی یا رانی سے تے کرائیں۔

(۲) اگر جوش غصہ، صدمہ، گھبراہٹ، تھکرات یا اندیشہ کی وجہ سے اختلاج شروع ہو گیا ہو تو مفرح اور مسکن دماغ ادویہ مثلاً ایونڈ، پوٹاسیم برومائیڈ شراب، بھنگ، انیٹر سپرٹ امونیا ایروینک، امونیا کاربائیڈل کریں (۳) ایونڈ ۲ رتی، کافور ۵ رتی، سفوف الاچی خوردہ رتی۔ ان سب کو باریک میکس مع عربی میں لگدی بنا کر کم جوب میں تقسیم کریں اور وقت ضرورت ہر ایک یا دو جوب کھلائیں۔

(۳) اگر کثرت محنت یا سہ عارضہ لاحق ہوئے تو ہر قسم کی محنت، دماغی و جسمانی سے پرہیز کرائیں اور پوٹاسیم برومائیڈ کلورل ہائیڈریٹ اور ایونڈ استعمال کرائیں۔

(۴) اگر کمزوری اعصاب یا قلب یا رقت و قلت خون موجود ہے تو بہہ دریافت کرنا چاہیے کہ کس سبب سے یہ مرض شروع ہوا ہے۔ پس اسکو معلوم کر کے اسکا دفعہ کریں اور ساتھ ہی مقویات قلب خون مثلاً سٹرکینار، ڈیجی ٹالس سٹرونیٹس سرکبات فولاد کا استعمال کرائیں۔ ایسی حالت میں فیری ایٹ امونی سائیر اس ۴ گزین ٹیکچرکس و امیکا، ایونڈ سوڈی برومائیڈ ۵ گزین سپرٹ امونیا ایروینک ۲ بوند اکو انٹیمی ایک انس ایسی دو جو راک روزانہ دیتے ہیں۔ مرئی سیب و آٹولہ، دوا الملک، خمیرہ مر و ارید عرق کیوڑہ و بید مشک، عنبر و مشک بھی مفید ادویہ ہیں۔

(۵) اگر شہوت پرستی کے متعلق خراب عادات مثل حلق، کثرت جلع ثابت ہوں تو انکی اصلاح ضروری کرنی چاہیے۔ اور مریض یا مریضہ کو سنا دینا چاہیے کہ جب تک ان عادات کی اصلاح نہ ہوگی یہ مرض ہرگز نہ جائیگا۔

(۶) اگر جسم یا حیض کے متعلق کوئی فساد ہو تو اسکی اصلاح کریں۔

(۷) کثرت چاؤ، شاکو اور کافی سے بھی اکثر یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے پس اسکو قطعی ممانعت کریں۔

(۸) قلب کے دیگر امراض میں اختلاج القلب اکثر ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا کوئی مرض موجود ہو تو اسکا علاج

کرنا چاہیے۔ دیکھو والو در دُر زبیر آن دی ہارٹ کا بیان۔

قلب کو مقام پر بلا ڈونا کا پلسٹا رانی کا پلسٹا ہارٹ آڈوین لگا ہر قسم کی احتلاج کیلئے سفید ہوتا ہے۔

اختناق الرحم ہیریا کا بیان دیکھو۔

اخروٹ - اخروٹ کے درخت کے پتے سکرانیو لاس سفید ہیں۔ اسکی چھال تیز سہل ہے اخروٹ کا بیرون پوت

قاتل کم اور صاف آتش کی ہر ہر اخروٹ متوی باہ اور قاتل کم ہے۔ بدھن اخروٹ ملین اور مخرج صفر ہے۔

اورنگ - فالج۔ دیکھو بیان ہی لمبیا کا۔

ادونیس ورنے لس Adonis vernalis

ادونی ڈین - Adonidin

ادنیٹھ - مشک۔ دیکھو بیان کارنجل کا۔

ارتقار الخصبہ - فوطوں کے امراض کا بیان دیکھو

آرٹی کا مارچوا - Artica Mortua

ییم الیم - وینٹیل - وارٹ آرک انجل۔

اسکے پھول استعمال کیے جاتے ہیں مفرق۔ جاذب رطوبات اور حاس الدم ہیں۔ نزلہ و زکام مزمنہ۔ لیو کو ریا

نفت الدم۔ اور ہر قسم کے جریان خون میں نافع ہے خم فلوئڈ اکثر کٹ سے ۲ درام تک پھر ۱ سی ڈرام تک۔

آرٹی کیریا - urticaria یعنی شری۔ دلم۔ رگ پی اچھلا۔ اسکو نیل ریش اور پر کلی میٹ

بھی کہتے ہیں۔ بے سے سبب دریافت کر کے انکا دفیہ کریں پس اگر کوئی غیر ہضم شے معجہ یا امعاس خراش

کرتی ہے تو فوراً نمک اور سلفٹ آف زنک وغیرہ سے تے کر اگر ایک پوری خوراک سلفٹ آف میگنیشیا کی

پلاویں شیر خوار بچوں میں مان کو نرم سہل دین۔ اور اگر مان سہل لینا پسند نہ کرے تو بچہ کو مفصلہ ذیل نسخہ استعمال

کرائیں۔ کلارونیت آف سوڈا ۱۰ گرین۔ گرے پاؤڈر ۲ اگرین میگنیشیا ایک ڈرام ان سب کو ملا کر اسکی جھ پوڑیہ بنائیں

اور ۱۱ مہینہ کے بچہ کو اسکی ایک پوڑیہ روزانہ صبح کے وقت کھلا سکتے ہیں۔ اکثر اسقدر علاج سی آرام ہو جاتا ہے۔

اگر کوئی دیرینہ ہضم یا گرم دوا یا غذا استعمال کی جاتی ہو اسکو بند کرادیں مثلاً آؤڈا آف پوٹاش۔ سببابیسی۔ کیا آؤڈا

ڈینٹائن پچھلی ٹسکیں گوشت وغیرہ اگر کوئی خاص سبب دریافت نہ ہو سکے تو داخلی طور پر کھاسی و وائین مثلاً

سوڈا ابائی کا سب ۲۰ گرین۔ بے سبب ناٹیراس۔ اگرین۔ سیو سیلج کم اکیٹیا۔ صاحب ضرورت انفیوزن چرائیا ایک اونس

ملا کر تین دفعہ روزانہ استعمال کرائیں۔ اسکے ساتھ الیکٹرا لائن یا تخم دینا سفید ہوگا۔ آب آٹامین اکو بجا رازرڈ کو

خارش۔ داخلی بجو کر اور پوڑیہ وچان کر واسطے تلکین کے پلانا اور بعد میں قرص کا فورا ر خای و تسکین جلد کیو

کھانا سفید ہیں۔ گرم پانی جسم پر بہانے سے مسامات کشادہ ہو کر فاسخین و تخیر کو کم کر سکتی ہیں۔ سرکہ و گلاب

یا ریشم کی یا سیوس گندم و تخم خربزہ بدن پر ملنا خراش کو تسکین دیتا ہو غذائی دال سو سوئی ہو جیون سفید ہے۔

اگر ہر مرض دیر پا ہو گیا ہو تو چند روز طویل مدتی کھادی دواؤں کو استعمال کرائیں۔ داخلی طور پر سیو سیلج دینی فیرین

درجہ

کلوروڈین، ریشہ انٹی پائیرین، پلباسے ایسی ٹاس، مارٹرینڈ انٹی منی، وغیرہ مصفیات خون، سکن و مخدرات مفید ہوتے ہیں۔ خارجی طور پر سرکہ جانی کے دو حصہ میں ملا کر یا عرق سونف و گلاب یا اکوا اسنتھی یا کوئی ڈالی لیوٹ ایڈ لگانا فوراً خارش کو بند کر دیتا ہے۔

نسخہ ۵۔ قرص کا فورہ مغزیدانہ ۵ ڈرام گلیسٹن، رب السوس، طباشیر ہر ایک تین ڈرام صحن عربی، کثیرہ۔
نشاہتہ گندم ہر ایک دو ڈرام، پنجم مغز کا ہو مقشر ایک ڈرام کا فورہ ۳۶ گرین، کوٹ تھان کر لعاب اسپنول میں قرص بنا دیں، ۲ ڈرام۔

ارگوٹیشن Eructation آروغ، ڈکار لینا چونکہ اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہاضمہ کی خرابی سے زیادہ ہوا میں پیدا ہو کر معدہ کو پھلا دیتی اور منہ کے رہتہ خارج ہوتی ہیں۔ اگر بکثرت اور بحیف وہ ہوں تو دافع سوج اور جاذب دواؤں سے اسکا اعلان کرنا چاہیئے۔ کھانسنے کے بعد ایڈ نائٹرو ہائڈروکلورک ڈالیوٹ ۵ ابوند سپرٹ کلورافام، ایڈ اکوا اسنتھی ایک اونس پلائیں، کوئلہ سیبتجہ سبائٹراس ٹیلیسٹین، ہائڈرو سائیک ایڈ ڈالیوٹ کلوروڈین اور تمام ایروٹیکس مفید ہونگو۔

ارگٹ
ارگوٹزم Ergotizm
ارگوٹین Ergotine
ارگوٹینین Ergotin

ارگٹ میں سفیدی لینک ایڈ اور کارنوٹین (جو حابس الدم جانتے ہیں) اور محرک حرکات امعاء رحم میں، اور ارگوٹینک ایڈ جو تاثیر میں قدرے الگ خلاف ہی پائے جاتے ہیں۔ زیادہ مقدار میں کھلانے سے ارگٹ معدہ اور امعاء میں خارش

کرتی ہے۔ لیکن طبی مقدار میں نہیں۔ خون پر اسکا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا، لیکن خون سے خارج ہو کر نظام یعنی شبہ، بالوں و سیدوں اور قلب پر اور نیز دماغ، نخاع و امعاء و رحم پر اپنا اثر کرتی ہے۔ شریانیں سکڑ جاتی اور حرکات قلب پہلے قلیل التعداد اور آخر کار بے قاعدہ اور کمزور ہو جاتی ہیں۔ اسطرح سے یہ نہایت عمدہ ہیوسٹینک یعنی حابس الدم ہے۔ دماغ پر اسکا کوئی خاص اثر سوائے تغیر دوران کے معلوم نہیں ہوتا۔ دیرینہ استعمال سے نخاع کے پوشیدہ رکالموں کی ساخت میں تغیر واقع ہو جاتا ہے۔ اور اگر کثیر کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں یعنی اعصاب پر چیونٹیاں رنگیتی معلوم ہوتی۔ ٹانگوں میں سخت دردناک تشنج و فوٹا ہونا، رفتار و گنگائی اور کمزور اور آخر کار حس و حرکت کا باطل ذائل ہو جانا، حرارت غریزی کم اور بعض میں گنگرین ہو جانا۔ رحم بے خون ہو جانا اور تیزی اور جلدی کے ساتھ سکڑ جاتا ہے۔ خاص کر جبکہ حاملہ ہو اور درد زہ شروع ہو گیا ہو۔ امعاء میں بھی خون کم ہو جانا اور پیری سٹالک حرکت زیادہ ہو جاتی ہے۔ دیرینہ مقدار میں کھلانے سے تنفس بند ہو کر مریض جان بحق تسلیم ہو جاتا ہے۔ خاص شمال انگلی کا لٹخون کے بند کرنے یا رحم کی حرکات کو تیز و قوی کرنے کے واسطے کیا جاتا ہے۔ مثلاً نصف الذمہ، نصف الدم، مغزیدانہ، اور الدم، نکسیر اور لم قنطیر البول جو کمزوری مثاند کی وجہ سے ہو۔

اور صحن

جربان بھنڈ دایمی پچش ہو اسیر خونی وغیرہ میں اور جبکہ پیدائش کا درجہ ختم ہو کر بچہ باہر آ جاوے اسوقت اخراج آئول نادل وغیرہ اور بندش خون کے لیے اور نیز لپسٹ پارٹم ہیورینج کرانک میٹرائس سب انوالیوشن اور لوٹر این پالیس میں پرہٹیک انلارجنٹ اور فیا سٹیس بے شک میں۔

چونکہ اسکا اثر شجاع پر بھی ہوتا ہے اسوجہ سے اسکو کلے روسس انفلیمیٹری پیرالمیجیا کو ریا جنرل پرکشی اور سرام میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اخراج پیشا پسینہ اور شیر کو کم کرتی ہے۔ جب سری برل کھینچن ہو کر اکیوٹ مائنا یا ڈی ملی ریم۔ یا سخت بخوابی اور بے حسینی یا صدمع ہو جاوے تو تب کلورل ہائیڈریٹ اور پوٹاسیم بروائیڈ کے ساتھ نہایت فایده کرتی ہے۔

بچکی اور ہونیک کف میں سب دواؤں سے اعلیٰ درجہ پر زود اثر دوا سبے ضرر ثابت ہوئی ہے شاید اسکا یہ اثر بذریعہ مسکور فائیزر و نخل و نظام الدم ہوتا ہے نیومونیا کے شروع درجہ میں مچی ٹالس کر ساتھ اسکا استعمال کرنا دلو تقویت دیکر شش میں زیادہ اجتماع خون کو بند کرتا ہے۔ ہائیڈروسیل میں بعد اخراج پانی کے ایک دو ڈرام۔ لکویڈ اسٹرکٹ آف ارگٹ کی بچکاری کرنا بچہ آو دین اور کاربالک ایسڈ کی طرح ایندہ آمد پانی کو رکتا ہے اور کسی قسم کی ورم اور تکلیف وغیرہ بھی نہیں ہوتی۔

اکیوٹ کھنکھی وائٹس میں لکویڈ اسٹرکٹ آف ارگٹ دو حصہ پانی میں ملا کر ہلکیوں کی اندر کی سطح پر چار چار گھنٹہ بعد بچکا نا نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ پرنے سوزاک میں جبکہ اور صد ہا دوائیں بے سود ثابت ہوتی ہیں ارگٹ کا لکویڈ اسٹرکٹ چار حصہ پانی میں ملا کر ایکد فخر و زانہ بچکاری کرنے سے نہایت مفید ثابت ہوتا ہے نائیر و گلیسرین اور کوئین کرزہروں کا فاد زہر۔ اور اگر ارگٹ نہ ہرٹل مقدار میں کھلائی گئی ہو تو اسکا کل یہ ہے کہ خالص تیخیر ۳۰ ہونڈ ٹکچرا ویم، ہونڈ سرپ ۵ ڈرام، ڈرام لیکر اس کسچر کا ایک ٹیل سپون فل نصف نصف گنٹہ بعد پلایا جاوے اور کوئین حصہ ۲ گنٹہ کا صاف کرے اسٹرکٹ ہر جبکہ حضوناس کچھ ہریلین کے پھول جانیسے تو تباہ کہ چھوٹے کوئین کی جلدی بچکاری مفید ہوتی ہے۔ چھوٹے کوئین اور کوئین دونوں جسم و سٹال کرمی نشون کو سیکرتے ہیں اس لئے کوئین کے ساتھ اس کا ایڈجیٹل میں استعمال کرنا بہت مفید ہر دن اوہل کے پسینہ۔ برانکویں۔ اپوپلیسی اور ٹریکیٹاس میں بھی نفع ہے۔ ارگوئی ٹین میں ایک مالکیلا ٹچہ جو ارگوئی ٹین سے حاصل کیا جاتا ہے۔

سم سفوف ارگٹ۔ اس دوا کو گرین ٹیکسٹا پیدائش کے لیے سوم درجہ میں ۳۰ سے ۶۰ گرین تک۔
فلوئڈ اسٹرکٹ۔ اس دوا کو ۱۰ سے ۲۰ سالہ اسٹرکٹ ملے گرین۔ انفیوژن سے ۱۲ اونس
اولیم ارگوئی ٹین۔ اس دوا کو ۳۰ ہونڈ ٹکچرا ویم، ہونڈ سرپ ۵ ڈرام، ڈرام لیکر اس کسچر کا ایک ٹیل سپون فل
ایکٹیو ارگوئی ٹین۔ اس دوا کو ۳۰ ہونڈ ٹکچرا ویم، ہونڈ سرپ ۵ ڈرام، ڈرام لیکر اس کسچر کا ایک ٹیل سپون فل
ارگوئی ٹین۔ اس دوا کو ۳۰ ہونڈ ٹکچرا ویم، ہونڈ سرپ ۵ ڈرام، ڈرام لیکر اس کسچر کا ایک ٹیل سپون فل
اسونی اینڈ ٹکچر آف ارگٹ۔ اس دوا کو ۳۰ ہونڈ ٹکچرا ویم، ہونڈ سرپ ۵ ڈرام، ڈرام لیکر اس کسچر کا ایک ٹیل سپون فل

ایک ڈرام تک۔ امونی اینڈ میگز آف الگ اینڈ اوپیم پہ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔ امونی اینڈ میگز آف الگ
ایڈویسین پہ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

اری سی پلس۔ Erythema جلد کے امراض کا بیان دیکھو۔

اری سی لوفیور Irritative fever اس کو مراد وہ بخار ہے جو کسی خراش و سوزش کی وجہ سے
ہو۔ مثلاً زخم یا ضرب قبض، کرم امعاء، غلبہ چش و غضب۔ بچوں میں اخراج دندان وغیرہ اسکا علاج مطابق
سبب ہونا چاہیئے۔ دیر پا صورتوں میں سبب لات اور اینٹی پاسٹریک اور اینٹی پیریاڈک دواؤں کا دینا ضروری ہوگا۔

اری سی پلس Erysipelas شہ۔ یہ ایک قسم کی متعدی جلدی سوزش ہے جس میں بخار ابتدا سے
ہوتا اور علامات ضعف نمایاں ہوتی ہیں۔ عموماً یہ مرض ضعیفوں اور بوڑھوں میں بکثرت دیکھنے میں آتا ہے۔ یونانی
حکما اسکو ماشرہ کہتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مرض چہرہ پر ایک جھوٹی چھنی سے شروع ہوتا ہے لیکن دراصل
یہ مرض جسم کے ہر ایک حصہ پر اور ہر ایک چھنی یا زخم کے ہو سکتا ہے۔ اسکی بچان یہ ہے کہ جلد متورم ہو کر گرم نہ ہو اور درگاہ
ہو جائے بخار ابتدا سے ساتھ رہتا اور درم بہرعت پھیلتی جاتی ہے۔

اسکے علاج کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ سرخ الہضم مقوی غذائیں مثلاً تخم، ماء اللحم، شوربا، پلاؤ، بیضہ نمیرفتہ، روغن ہما
لطیف مرغن، غذائیں بافراط میں سرکبات، فولاد معہ کوئین زیادہ مقدار میں پلائیں۔ اور قحطی طور پر اینٹی سپٹک
اور دافع سوزش ایسی جس صورت سے چاہیں استعمال کریں تفصیل اس خلاصہ کی حسب ذیل ہے۔

فنجیات کھلانے کے واسطے ڈائٹیکسچر فیری پیکورائڈ ۳۰ بوند کوئین سلفاس ۳۰ گرین پشاسی کلوراس ۱۰ اگرین۔
گلیسرین ایک ڈرام، اکوا اینتھی ایک اونس ایسی چار خوراک روزانہ (۲) فیری ایٹ کوئین سائیراس ۱۰ اکون
پانی ایک اونس ایسی چار خوراک روزانہ۔

غرضیکہ فولاد کوئین اور پشاسی کلوراس سے بڑھ کر کوئی دوا اس مرض کو بے نہیں ہے۔ ہاں اگر قلب کمزور ہو تو
فولاد کم مقدار میں دینا چاہیئے۔ تحریکات قلب مثلاً سپرٹ امونیا اور ویتیک برانڈی، رم، سڈی ٹالس وغیرہ ضعف
دوران کیمالت میں ضروری ہیں۔ برعکس اسکے اگر بخار زیادہ اور نبض تیز قوی اور پر ہو تو اکوٹائٹ اور ٹارٹار
ایٹیک وغیرہ سکن قلب و ضعف دوران ادویہ مفید ہوتی ہیں۔

تنبہ مقامی استعمال کے لئے داء میچر اوڈین ورم کے گرد ہر طرف تین چار دفعہ روزانہ لگانا اور اس طاق
کی کابلک ٹوشن میں کپڑے کی گتہ کی جگہ کو برابر ماؤف حصہ پر رکنا ورم کو پھیلنے سے روکنا اور تمام فاسد حصہ
کو جلدی سے روکنا کر دینا ہے (۲) کاربویٹ آف لٹوکوالسی کے تیل میں باریک میکر اور روغن تارپین ملا کر
متورم حصہ پر ملا کرنا اس کو غلاف بکراؤف حصہ کی حفاظت ہو جائے یہ معمولی اسکے روغن چھتا م
رنگہ زرد کی دکان پر بنام سفید مل سکتے ہیں (۱) کھانا کھانا بھی ہی کام دیکھتا ہے (۳) اور چھتا ایک رتی
پانی چھتا تک میں مل کر کے اسکی ٹوشن سے تمام ماؤف حصہ کو چھتا پانچ دفعہ روزانہ دھوئے رہنا اور

بعد میں صاف اینٹی سپٹک روئی رکھو ٹی ہاندہ دینا ۴۴) انحصار میں کا فور حل کر کے طلا کرنا درود و سوزش کو فوراً تسکین بخشتا اور ورم کو آرام دیتا ہے ۵) گوند پانی میں حل کر کے پانچ فیصدی ک حساب سے اس میں کاربالک ایڈ ملاویں۔ اور ورم خوردہ جگہ اور نیز صبح کنار و نہر اس کا لپ کریں ۶) ایڈ کاربالک ایک ڈرام۔ الکحل ایک ڈرام۔ آیل ٹرینیان ۲ ڈرام۔ نیچر آیل ۱۰ ڈرام۔ ایک ڈرام گلیسرین ۵ ڈرام۔ ان سب کو ملا کر دو دو گھنٹہ بعد لپ کریں ۷) کریولین ایک حصہ آیل دو فارم ۴ حصہ لینولین ۱۰ حصہ۔ ان سب کو ملا کر مقلیم کے ساتھ لپ کریں۔ ان کے علاوہ اور صد ہا ادویہ طلا و ضاد وغیرہ تجویز کی گئی ہیں جن کا مقصود ماؤف حصہ کی حفاظت کرنا ورم کو تسکین دینا اور اینٹی سپٹک اثر پہنچانا ہے۔ ان تمام کے استعمال کے وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ماؤف حصہ کو علاوہ صبح جلد پر ایک دو انچ تک انکالپ کیا جائے۔

اسانی گس Essphagus اسانی گس کہو ہیں خوراک کی نالی یعنی مری کو اس کے

امراض جب ذیل میں۔
۱) اسانی جالی ٹس مری کی نوزلہ آلتا لری اس مرض کی علامتیں کہ جلی و رعدہ در میان وسطی خط میں و یا جن معلوم ہو تو اور قسم کی شکو کا کٹنا اور ہر جانا یا نہانے پانی کو نگلنے میں بھی سخت درد ہوتا اور مرض عدا پیاس کی برداشت کرتا ہوتا ہے۔
۲) مری کا تضخم اسنے جیل السرفوخ المری۔ اسکی علامات التهاب کو مشابہ ہیں۔ اسی طرح درد جیل غشا اور قے کی نکالیف ہوتی ہیں۔ پانی اور غذا کی کسی سے مرض زایل ہوتا رہتا ہے۔ مگر اوٹھا درد محدود رہتا ہے اور ورم کا درد منتشر ہوتا ہے۔ مری کا تضخم مدقون میں اچھا ہوتا ہے۔ بعض اوقات مری میں خوراک کر کے برائکس یا پیلور یا پیری کارڈیم میں جا کھلتا ہے۔

۳) سکرک آف اسانی گس مری کا تنگ ہو جانا۔ یہ مرض کسی طرح سے پیدا ہوتا ہے اول ورم یا زخم کے بعد زائد ریشہ بکر مری کو تنگ کر دیتے ہیں۔ دوم مری کے اندر سرطان یا رسولی ہو کر اسکو تنگ کر سکتے ہیں۔ سوم مری کے قریب کسی قسم کی رسولی یا دیل پیدا ہو کر اسنے دباؤ سے نکل ہو سکتی ہے چھارہ تشنج پچھلے مری کا فلج سکرک علامت حب ذیل ہیں۔ علامات۔ پہلے ہر قسم کے سکرک میں ابتدائی علامتیں بہت خفیف ہوتی ہیں کہیں کہیں غذا کر نگلنے میں تکلیف اور وقت معلوم ہوتی ہے مگر وقت رفتہ رفتہ بڑھتی جاتی ہے پسے نوالوں کا کٹنا دشوار ہوتا ہے چھریق سائل چیزوں کا پیچہ اور زنا بوجی داخل کرنے سے سکرک کی معیت آرا اور نگلنے میں معلوم ہوتی ہے تاکہ پیچہ میں لگا کر مرض کو ہلکا کر کے پانی پیسنے کے وقت تسکین تو تو ال ایک خاص جگہ پر پہنچا آلتا ہوا اور پھر تدریج سے اور معلوم ہو گا سخت حالتوں میں پانی ٹک کر کرکڑا کر کے اساتھ اس طور پر آوڑتا ہے جیسا کہ سب میں ہی آوڑا کرتا ہے جب مری میں زیادہ ہو جاتا ہے تو کھلنے سے اور پیسے کی چیزوں سے جی متاثر ہوتا ہے اور پیسے کی چیزیں کھانے کا مری میں ہلکا اور پانی میں کھلا ہوا ہوتا ہے پھر کھینچا جاتا ہے اور پھر کھینچا جاتا ہے اور پھر کھینچا جاتا ہے

رفع بھی ہو جاتا ہے۔ جب فالج کی وجہ سے سرکچر واقع ہو تو اسکی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ فالج کی وجہ سے مری کی یوا
آپس میں ہوتی ہیں۔ ایسی حالت میں خشک اور سخت نوالہ آسانی سے اتر جاتے ہیں۔ لیکن سیال چیزوں کا
نیچے اترنا دشوار ہو جاتا ہے۔ فالجی سرکچر کی یہی خاص پہچان ہے۔

(۴) اسانی فی گس کی سولہاں۔ ان میں سے سرطان بہت عام ہے۔ جب اسانی گس میں سرطان پیدا ہو جاتا
تو اسلی علامات حسب ذیل ہوتی ہیں۔ عسر البیع جو رفتہ رفتہ زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ غشیان اور تھے درد شدیدیہ جو
سینہ کو چیرتا ہوا اچھاڑتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ مریض بہت لاغر اور ضعیف ہوتا جاتا ہے۔ اوپر ہر کارنگ پھینکا اور
زرد پڑ جاتا ہے۔ تھے میں خون اور پیپ کو ساتھ کنسر سیدھی معلوم ہو سکتے ہیں۔ گردن اور بغلوں اور سینہ
کے غدود بڑھے ہوئے معلوم ہو سکتے ہیں۔

(۵) اسانی گس کا کشادہ ہو جانا۔ اگر یہ کشادگی عام ہو تو کوئی خراب علامت ظاہر نہیں ہوتی۔ لیکن
جب مری کو کسی حصہ میں تنگی واقع ہو کر اسکا بالائی حصہ کشادہ ہوتا جائے تو سرکچر کی علامات یعنی عسر البیع
غشیان تھے اور درد وغیرہ ظاہر ہوتے ہیں۔ لکن علاوہ خاص علامات حسب ذیل ظاہر ہوتی ہیں۔ محض سرکچر
کی حالت میں غذا رک کر فوراً دروید کرتی اور جی مثلاً کرتے آجاتی ہے مگر جب سرکچر کا بالائی حصہ زیادہ کشادہ
ہو جاتا ہے تب کسی قدر دیر تک لگی رہتی ہے پھر گرانی معلوم ہو کر چھینی غالب ہو جاتی ہے جب تک خود بخود
یا مصنوعی طور پر تھے ہو جاوے یہ گرانی رفع نہیں ہوتی منتھن اجزاء غذا کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی
رہتی ہے۔ قبض اوقات سرکچر کا بالائی حصہ کشادہ ہو کر رفتہ رفتہ ایک علیحدہ تحصیل کی صورت بنالیتا ہے
ایسی حالت میں غذا اور بعض دیر تک آسپیں جت رہ سکتی اور گرانی پیدا کرتی ہے منہ سے بدبو زیادہ آتی ہے۔

علاج اول اسلے جانی ش یعنی مری کی سوزش۔ یہ بیماری بہت شاذ ہے عموماً کاسٹمک پائیزن یا ضرب
سے ہوتی ہے اور بعض اوقات دوسرے امراض مثلاً دفتیر یا سوزش فیئر گس یا معدے کے بعد ہو جاتی ہے
اس مرض میں کسی شے کا ٹھکانا بہت دشوار اور دردناک ہوتا ہے۔ اور اکثر وجہ تکلیف ٹنگتی ہوئے تشج ہو کر
تھے ہو جاتی ہے۔ پس اسکے علاج میں سب سے مقدم یہ امر ہے کہ مار فیا کو کین۔ بسمتہ میو سلج۔ ٹریگے لٹے
ٹنچک اپیم وغیرہ سے خراش اور تشج کو دفع کیا جاوے اور غلے کے طور پر دو دھ بخی نیمیر شت مینہ وغیرہ
کھلائے جاویں۔ اگر مریض کسی طرح سے سائل غذا بھی نگل نہ سکے تو بذریعہ حقنہ غذا پانی چاہیے دیکھو یا
حقنہ کا۔ اگر تشنگی بہت ہو تو چھوٹی چھوٹی ڈیاں برف کی منہ میں رکھنا مفید ہوگا

دوم سرکچر آف دی اسانی گس یعنی مری کا تنگ ہو جانا یہ دو قسم کی ہو سکتی ہے تشنجی اور آرگنک۔

۱۔ تشنجی یعنی سپازمٹک سرکچر۔ اگر ہسٹیریکل یا ریبوئیٹک یا گاؤٹی نرلج ہو تو اسکا علاج مقوات
اور دلی تشنج اور مثلاً ایونیم بروماید کافور۔ ایون جینک۔ بیلاڈونا کوکین۔ ایسٹرن مشکافور
وغیرہ سے کرنا چاہیے بعض حالتوں میں بوجی کا استعمال ضروری ہوگا۔ بعض اشخاص میں حالت

زیادہ گرم یا زیادہ سرد یا سخت اور ثقیل اشیاء کھانے سے یا جلد جلد گلنے یا بھاگنے ہوئے کھانے سے پیدا ہوتی ہے پس انکو اس بات کا احتیاط رکھنا چاہیے۔

۳) اگر گینک سٹرکچر اسکے علاج میں سب سے مقدم یہ امر تحقیق طلب ہو کہ آیا یہ سٹرکچر زخم یا آتشک کہ بعد زیادہ فائبرس نشوونما ہوئی ہے یا کسی میلینٹ گروتھ یعنی ایذا رساں رسول کے سبب سے ہے پس اگر زیادتی فائبرس سے یہ سٹرکچر ہے تو اسکا علاج حسب ذیل ہوگا۔

روزانہ بوجی زیادہ زیادہ موٹی سٹرکچر سے گذار کر تھوڑا تھوڑا عرصہ اندر رہنے دینا۔ یا دن رات برابر چند روز یا چند ہفتہ رکھ چھوڑنا۔ اور غذا اس بوجی کے راستہ پہنچاتے رہنا۔ بوجی کے پاس کرنے میں نہایت نرمی آہستگی اور ہوشیارمی مد نظر رکھنی چاہیے۔ جلدی اور تیزی میں سخت اندیشہ ہے۔ اگر آتشک موجود ہو تو پوٹاسیم آیوڈائیڈ کا استعمال ضروری اور مفید ہوگا۔ بوجی کے سولے اور علاج بھی ہیں جو زیادہ اندیشہ ناک ہیں۔ اول دوپلے ساونڈ کے ساتھ زبردستی سٹرکچر کو کھول دینا دوم کاسٹک سولفائیڈسٹکسٹو کو جلا دینا سوم سٹرکچر کو انٹرل اسافوگاٹو میں ہی کاٹ دینا۔

کنسر کی تکلیف رفع کرنے کے واسطے افیون اور کیریوٹ ہموزن لیکڑا اور صابون میں گولیاں بنا کر کھلانا مفید ہوگا۔ آرسنک کا استعمال کنسر کی ترقی کو روکنے سے غذا ہر دو حالتوں میں لطیف رقیق اور سرخ ہضم دینی چاہیے اور اگر ضرورت پڑے تو بذریعہ حقنہ غذا پہنچانی چاہیے جب میلینٹ گروتھ کی وجہ سے ہر ایک غذا کا کھانا ناممکن ہو جائے تو ٹیورنج یا گسٹرومی بہت تغذیہ و طول عمر کر سکتے ہیں۔

ٹیورنج کا طریق یہ ہے کہ تم ایلاٹک ٹیوب ۱۰ لے لے گاؤم جھکا اوپر لائنڈ ۱۰ انچ سے ۱۲ انچ قطر میں ہو بذریعہ کائیکل بوجینر سٹرکچر کے اندر پاس کیے جاتے ہیں یہ بات کہ انکا بالائی سرا جو کشادہ ہوتا ہے سٹرکچر کے قریب جانیچے۔ اور تھیں کائیکل بوجی انکا لکڑی شیشی دھاگے کے ساتھ جو کشادہ سرے سے منہ میں کو میٹرکان تاس پہنچایا۔ یہ ذریعہ سنگ بک پلاسٹرکان کو دیکھتے قائم کیا جاتا ہے۔ ایک ٹیوب کو تین چار ہفتہ کے بعد بدلنا مناسب ہے اس طریق سے مریض چند ماہ یا سال زندگی آسانی بسر کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ٹیورنج ناممکن ہو تو اس حالت میں گیسٹرومی کرنی چاہیے دیکھو بیان گیسٹرومی کا۔

اسالی ٹیئر Ascites یعنی پیٹ میں پانی پڑنا ناہستقائ مرق البطن۔ اس مرض میں دل کی اور جھلی کے اندر جمع ہو جاتا ہے جسکا نام پیری ٹونیم یا مرق البطن ہے۔ اسکی وجوہات حسب ذیل ہوتی ہیں: ۱) واپٹ کو دوران خون میں روک و اضع ہو جانا مثلاً پورٹل وین پر کسی رسولی یا دہیلہ یا ورم مرارہ کی وجہ سے دباؤ رہنا یا جگر کی رسولیوں یا سروسس یا کنسر کی وجہ سے بھی ٹنک وین کا خون رگ جانا یا انفیرینا کا دباؤ پیٹنگ وین کے طے سے اوپر کسی رسولی یا پھیوڑے کا دباؤ پڑ جانا۔ یا امراض قلب یا کبش کی وجہ سے خون کا دوران اچھی طرح نہ ہونا۔

(۲) جلد اور گردن کے فادکی وجہ سے پسینہ اور پیشاب کر کے تہ پانی کم خارج ہونا۔
(۳) خون کا رقیق اور زیادہ مرطوب ہو جانا۔

(۴) کرانک پیری ٹونانی ٹیس کی وجہ سے رطوبتوں کا خارج ہو جانا اور عروق جاؤ بہ کار کجانا۔
(۵) پورٹل یا پیٹھک وین کا تھرو مپوس ہو کر دوران بند ہو جانا۔

(۶) بعض اوقات گرم سر دھونے سے دفعتاً پیٹ میں پانی پڑ جانا۔

عموماً تو یہ پانی کل جاتی کے اندر جمع ہوتا ہے مگر بعض اوقات اُس کے خاص حصہ میں زاید وصلوں کی وجہ سے ایک علیحدہ تھیلی جگر بانی کا اجتماع اُس خاص حصہ میں محدود ہو جاتا ہے یہ صورت خاص کر اُس وقت ہوتی ہے جب کہ پیری ٹونانی ٹیس کے بعد اسانی ٹیز ہو۔

اب نقشہ ذیل میں ان امراض کا نام دکھایا جاتا ہے اسانی ٹیز سے مشابہت رکھتے ہیں اور شناخت کی علامات بھی درج کی جاتی ہیں

امراض مشابہ	اسانی ٹیز
تشخیص	ایک خاص وقت کے بعد پیٹ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے عموماً یہ حالت کسی مرض جگر یا گردہ یا قلب کے بعد شروع ہوتی ہے۔
علامات موجودہ	پیٹ تنا ہولٹاف عموماً باہر کی طرف او بھری ہوئی۔ پیٹ کا او بھار ہر طرف یکساں مگر مریض کے مختلف وضعوں میں یہ او بھار اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے۔ سانس کھینچا آتا ہے۔
اسی اُن علامات و ملاحظہ	<p>پیٹ پر ایک طرف ہاتھ چھتا رکھ کر دوسری طرف انگلیوں کو سروں کی ٹکراویں تو پیٹ نیچے پانی کی لہر کر اوس ہاتھ کو ٹکراتی ہے غلچہ ایش کہتے ہیں</p> <p>پیٹ کو ٹھونک کر دیکھیں تو زیادہ حصہ میں ٹھوس آواز سنائی دیتی ہے۔ اگر مریض کو جیت ٹکا کر اس طرح ہتھک ان کریں تو ناف کے گرد صاف آوازیں ہوتی ہیں۔ اور پھلوں میں ٹھوس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیت لیٹھنے سے پانی پھلوں کی طرف چلا جاتا۔ اور پیٹ کا اوپر کا حصہ خال ہو جاتا ہے۔ اور اگر مریض کا پیٹ کھڑا کر کے ٹھونکیں تو پیٹ کے زیرین حصہ میں ٹھوس آوازیں آجاتی ہیں۔ ٹھوس حصہ میں غلچہ داخل کرنے سے پانی خارج ہوتا ہے۔</p>

اختیاران و ملا خط	علامات موجود	حالات مزین	امراض متشابه
فلکی اشیں اور شمس آوازیں ندارد موجود ہیں بعض اوقات جب رطوبت زیادہ خارج ہو جائے تو یہ دونوں علامتیں موجود ہو جاتی ہیں۔ مگر خاف و نادیدہ اجتماع عمومی محدود و متناہل پیش نہیں ہوتا اکثر سخت نفع دہتا اور تمام ہیٹ و بیول کی طرح بنتا ہے۔ بعض کو چپ ٹیٹو یا کھمبہ سے شمس آوازوں کا مقام نہیں برکتا کیونکہ اس مرض کی طبیعت پیچیدہ اور محدود ہے۔	پیش پر تھک جانے سے درد ہوتا ہے۔ بے چینی اور خفیاں بدلت رہتی ہیں۔	درد بخار اور صفی لازمی ہیں بغیر نیا تھک جانے کو سیکڑے رہتا ہے سیدھا کر نہیں تخلیف معلوم ہوتی ہو سانس کیساتھ مکھلیف معلوم ہوتی ہے۔	(۳) پیرمی ٹائڈ (۴) سرطان یا کسی اور قسم کی رسولی کا پیش کے کسی عضو کے ساتھ ہو جانا۔
فلکی اشیں ندارد و تمام اور بخار ہر آواز شمس باقی خالی لگی داخل کرنے سے ہانی برآمد نہیں ہو سکتا۔ مختلف ضموں میں و بخار کی وہی شکل رہتی ہے۔	امراض جوار کے ساتھ فساد اور فیض عمومی ساتھ ہوتی ہیں طحال میں کھینچا کر چھوڑ دینا چاہتا نا خون لب اور پلوں	طحال ہمیشہ بخاروں کے بعد برہمی ہے اور جگر نرسٹ شرب یا پیش بخار است کہ بعد۔	(۴) سرطان یا کسی اور قسم کی رسولی کا پیش کے کسی عضو کے ساتھ ہو جانا۔
اور بخار طحال یا جگر کی وضع و شکل کے مطابق ہوتا ہے۔ تمام ہیٹ یکساں نہیں رہتا مختلف ضموں میں وہی شکل رہتی ہے فلکی اشیں ندارد۔	اور فیض عمومی ساتھ ہوتی ہیں طحال میں کھینچا کر چھوڑ دینا چاہتا نا خون لب اور پلوں	طحال ہمیشہ بخاروں کے بعد برہمی ہے اور جگر نرسٹ شرب یا پیش بخار است کہ بعد۔	(۴) سرطان یا کسی اور قسم کی رسولی کا پیش کے کسی عضو کے ساتھ ہو جانا۔

رہنما	حالات مرض	علامات موجودہ	انتہا ان و ملاحظہ
(۶) مدہ کا حد زیادہ چھلپا یا۔ مثال لیش کر کے ہی شک	فاسٹ ہونے کی شرح نفع نہ سے بدلہ نہیں تو لاشی حالات میں	اوجہ خاص مدہ کہ تمام ہر ہر ہے۔ مٹھنے لاشی سے چند الہی وضع نہیں ان تو میں غذا مری ہوئی خارج ہوتی ہے۔	مدہ کے مقام پر ٹھکنے کی آواز دھول کے شاہ خصوصاً واز ندارد۔ قلعہ لاشی ندارد۔
(۷) حمل	حیض کا بند ہونا پستان کا بڑھنا۔ صبح کے وقت خلیان و تے۔	سوہو ہونے بختہ میں ماں کو بچہ کی حرکتیں محسوس ہوتی ہیں۔ رحم کا مدہ نرم اور ملائم ہو جاتا ہے۔ و جانی کی رنگت نیلی پڑ جاتی ہے۔ اگر رحم تک اونگلی پہنچا کر دفعتاً رحم کو دیکھ لیا جاوے تو بچہ اوجھلکھراونگی کو کرنا معلوم ہوگا۔	اوجہاں بندہ بچہ پیدائش سے شروع ہوتا ہے تیسری ہفتہ کے بعد شکم میں معلوم ہو سکتا ہے لاشی میں مدہ کی شکل دیکھ کر پستان تک۔ ساتویں ہفتہ ناف کا واز اور آٹھویں ہفتہ میں کوئی کے قریب۔ اور نویں ہفتہ میں کوئی تک چھ ہفتہ کے بعد کمر کے نیچے سے بچہ قلب کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ناف انول اور رحم کی رگوں میں خون کے دوران میں سانس آئیں گے اور آوازیں سنائی دیتی ہیں۔
(۸) اور مری کی سولی	پید و کی ایک طرف بہت آہستہ دھکا شریع ہو کر پڑتا جاتا ہے۔	عمل کی علامتیں ارادہ رحم اور و جانی ادیستان کی اہلی حالت	اور ہمارا نہ ہوا۔ وسطی خط سے ایک طرف زیادہ تر۔ فلکچو لاشی ندارد۔
(۹) شہانہ کا پستان سے تنہا	جس کی شکل سخت اور گھبراہٹ	—:—	اور واز شکم اور ہمارا نہ ہوا اور قائم فلکچو لاشی ندارد۔
دال حمل کا دبسل اور کھارنا مری سے غائب		تمام علامات حمل ندارد	اور واز خالی فلکچو لاشی ندارد۔ اور ہمارا قائم۔

علاج اول۔ خاص سبب کا علاج را، سرو سس آف دی لور یعنی جگر کی ساخت میں ریشہ زائد ہو کر اسکا تحت ہو جانا۔ اسکے علاج کے لئے دیکھو بیان سرو سس آف دی لور کا (۲) امراض قلب کی وجہ سے دوران شکم میں خلل واقع ہونا۔ اسکے علاج کے لئے دیکھو بیان قلب کی امراض کا (۳) امراض گردہ کی وجہ سے پیشاب کم خارج ہونا۔ دیکھو بیان برائیس ڈیز اور گردہ کے امراض کا (۴) انہما یعنی قلت و رقت خون دیکھو بیان انہما کا (۵) امراض جلد کی وجہ سے پسینہ کم خارج ہونا (۶) امراض شش کی وجہ سے دوران خون میں خلل واقع ہو کر شکم میں خون کا بند رہنا (۷) اسباب مختلفہ مثلاً وہیلہ۔ سرطان۔ تھرامبوسس۔ رسولی وغیرہ سے پورٹل وین یا انفیر پروینا کا واپر دباؤ بچکر اسکا طحال و گردہ وغیرہ کے دوران خون میں خلل واقع ہو جانا۔

جب تک مناسب تدابیر سے اسباب استقامت کے مرقا البطن کا دفعیہ کیا جاتا تک مستقل آرام حاصل نہ ہو تا کہ **دومہ۔** عام طور پر استقامت کا علاج۔ اسکا بیان استقامتیں دیکھو

اسکا خلاصہ مطلب صرف اس قدر ہے کہ مہرات معرقات اور سہلات جو جسم کا پانی خارج کریں مقویات فوٹو کونین۔ کچلہ وغیرہ اور عمدہ غذاؤں سے مریض کی طاقت و صحت کو ترقی دیں اور جو پانی کہ شکم کے اندر جمع ہو گیا ہے اسکو جراحی عمل سے خارج کریں۔

نسیجات را، بلیوئل سفوف ڈچی ٹالس و سفوف سلاہرہ ادویہ ایک ایک گرین لیکر ایک گولی طیار کریں۔ اور ایسی دو گولیاں روزانہ استعمال کریں (۲) کیلول ۴ گرین کیفین سائیٹراس ۴ گرین اکثر اکثر جنبشیں جب ضرورت ان سب ادویہ کو ملا کر آٹھ حبوب میں تقسیم کر کے ۲ یا ۳ گولی روزانہ استعمال کریں (۳) پاسی ایسی ٹاس ۳ گرین سپرٹ آف جونی پرنسف ڈرام سپرٹ آف ٹائیٹرک تھیر نصف ڈرام۔ انفیوزن ڈچی ٹالس نصف اونس ایسی تین خوراک روزانہ (۴) عرق جھاؤ چھٹانک عرق لکھو ۲ چھٹانک عرق کچنار ۲ چھٹانک۔ بجائی پانی کے چار پانچ دفعہ روزانہ ایکو پلانادہ، سنبل الطیب مصطفیٰ زعفران۔ طباشیر۔ دارچینی۔ بیج اذخر۔ سوگند۔ بالاقسط شیرین تخم کشوت۔ تخم کرفس۔ زراوند۔ دانہ الائچی سفید۔ خود عرق جملہ مساوی الوزن۔ گل سترخ۔ بموزن گل ادویہ سفوف کر کے اور شہد سے چنداں میں ملا کر بھون طیار کریں۔ خوراک ۶ ماشہ دو دفعہ روزانہ ہمراہ عرق لکھو و عرق بادیان۔

امراض قلب و امراض خون کی وجہ سے اگر استقامت کم ہو ہے تو منسلک ذیل نسخہ نہایت مفید ہوگا۔
 عکچر فی ری پر کلورائیڈ۔ ابوند لاکو اسٹرکینیا۔ ابوند کچر جنبشیں ۵ ابوند انفیوزن ڈچی ٹالس نصف اونس۔ ایسی تین خوراک روزانہ۔

اگر غصہ بالانہما سبب مرض علاج پذیر نہ ہو یا شکم میں پانی بکثرت جمع ہو کر باعث تکلیف و خلل صحت رہی تو ٹیپ کر کے

کر کے پانی نکال دینا چاہیے جسکی ترکیب حسب ذیل ہے۔

مرغض کو پہلے پیشاب کرائیں تاکہ مثانہ خالی ہو کر پیڈ میں اتر جائے چھ اسکو سٹول پر یا چار پانی کی بنی تختہ پر شکم کے گرد ایک چوڑا ٹیٹا یا چھ سروں والی پٹی پیٹ دیں نہ پنے ہاتھوں اور اوزاروں اور نیز مرغض کے شکم کو کامل طور پر لپٹے طاقت کی کاربانک لوشن سے انٹی سپیک کریں۔ وسطی خط میں ناف اوچے پوس کے درمیان ایک نشان لگا کر چاقو سے جلد کو شکاف دیں اور ایک باریک ٹیوکار وکیٹولا جلدی اور مستعدی کو ساتھ شکم کے اندر داخل کر کے پانی نکالیں۔ جب قدر پانی نکلتا جائے اور شکم کم ہوتا جائے ویسا ہی ٹیٹا یا پٹی کو بچھ کر دباؤ زیادہ کرتے رہیں تاکہ شکم میں خلا پیدا ہو کر خون کا زور اُس طرف نہ ہو جائے پانی نکالنے کے بعد سٹول نکالنے فوراً زخم کے کناروں کو چٹکی سے ملا کر ٹیوڈین سوپیورٹ کر دیں اور صاف اینٹی سپیک ٹی رکھ کر ٹیٹا کو بچھ کر ہاندھ دیں تین چار روز برابر فالین کی پٹی سے دباؤ قائم رکھنا چاہیئے۔

اگر مرغض زیادہ کمزور ہو تو عمل شروع کرنے سے پیشتر کوئی سٹی مولٹ نسخہ ضرور دینا چاہئے مثلاً ۱۱ سپرٹ مینیا ایروٹیک نصف ڈرام سپرٹ ٹائٹرک ایٹھ نصف ڈرام ٹینکچر سنکونا نصف ڈرام سپرٹ کورقار ۲۰ بوند ایکوا منٹھی ایک اونس (۲) برانڈی یا رم ۲ ڈرام ایک کلاس پانی میں ملا کر دم دوار الٹ ایک ڈیجیٹل ڈوز اگر اثنائے عمل میں ضعف طاری ہو تو ایک وخوراک اور مفصلہ بالانسوں میں سو دیکھتے ہیں جب پانی بہت زیادہ ہو تو ایک فغہ میں تمام پانی کا خارج کر دینا اندیشہ ناک ہوتا ہے اسلئے اسکا حفاظت کر کے کچھ پانی باقی رہنے دینا چاہیئے۔ اگر دوبارہ سہ بارہ پانی بھرتا جائے تو یہی عمل دوبارہ سہ بارہ کر سکتے ہیں۔ مگر سہ بارہ سب سے کہ جب یہ حالت ہو کہ پانی جلدی سے جمع ہوتا جائے تو امید صحت کم ہوتی ہے۔ ایک فغہ پانی خارج کرنے کے بعد سہلات معرقات و مدرات سے علاج جاری رکھنا چاہیئے۔

استرخاء مقامی فالج۔ لوکل پریلی سس کا بیان دیکھو۔

استرخاء محض۔ پلک کا گرے رہنا۔ ٹوسس۔ پلکوں کے امراض کا بیان دیکھو۔

استرخاء المعده۔ معدہ کا فالج۔ گیسٹرک پریلی سس گیسٹرک امراض کا بیان دیکھو۔

استرخاء المقعد۔ ریکٹم کے امراض کا بیان دیکھو۔

استسقاء۔ ڈرائیسی جلد بہر جلد کے نیچے یا اعضا کا اندر پانی جمع ہو جانا پہ تین طرح سے ہوتا ہے۔

اول۔ لوہر حیر کر خون کی رگوں میں سے پانی جھنکڑا دہ مقدار میں خارج ہو۔ یہ مفصلہ ذیل حالتوں میں

ہو سکتا ہے۔ اجتماع خون بثرانوں کا معمول سے زیادہ کشادہ ہو جانا خون میں پانی کے مقدار کا زیادہ ہو جانا۔

دوئم۔ سطر حسر کہ جو پانی معمولی طور پر خون سے چھٹا ہے وہ ساتھ کے ساتھ جذب نہ ہوتا ہے یعنی

عروق مجاذبہ کا فیصل ناقص ہو جاوے۔

سویچ اس طرح کہ دونوں اسباب جمع ہو جاویں یعنی خون کی رگوں میں سی پانی بکثرت خارج ہوتا ہے اور عروق جاذبہ کا فعل ناقص ہو جاوے۔
 (۱) اسباب قلب مثلاً ضعف قلب کی کو اٹیوں کے امراض قلب کی دیوار میں چرلی پڑ جانا۔ یا اوس کی دیواروں کا پتلا اور کمزور ہو جانا۔

(۲) امراض گردہ جنکی وجہ سے پیشاب کافی مقدار میں نہیں آتا مثلاً برائیس ڈریز۔

(۳) امراض جگر جنکی وجہ سے پیٹ کا دوران خون رُک جاتا ہے۔

(۴) متفرق اسباب گرم سرد ہو جانا جس سے پسینہ دفعتاً رُک کر خون کا رجحان اندرونی ساختوں کی طرف ہو جاتا اور پانی پُرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر جسم کے کسی حصہ کا دوران بند ہو جائے یا بہت دیر تک وہ حصہ بچا ہے تب بھی خون جمع ہو کر استسقاء ہو جاتا ہے۔ رقت و قلت خون کی حالت میں ایسا ہو جاتا ہے پیچھڑوں کے امراض مثل سل نینومونیا اور رسولیوں وغیرہ میں بھی دوران خون رُک کر پانی چھیننا شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ استسقاء کے اسباب نہایت مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے اصل سبب کا تشخیص کرنا صحیح علاج کی نہایت ضروری جزو اسباب امراض شش قلبیہ ہو جگر رقت خون گرم سرد ہو جانا اور مقامی رکاوٹیں ہیں۔

تشخیصی علامات ذرا استسقاء کے گروہ تمام بدن پر ظاہر ہوتا ہے۔ جس قدر رکھو کھلی جگہ ہو بقدر زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے آنکھوں کے گرد بہت زیادہ ابھار ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں چہرہ اور تمام بدن پانی سے بھول جاتا ہے۔ ترقی بہت جلدی کرتا ہے۔ دبائے سے تھوڑا دبا اور اوٹگیوں کا نشان دیر تک رہتا ہے۔ پیشاب میں البیومن بکثرت نکلتا اور مختلف قسم کے کاسٹ بھی نظر آتے ہیں۔

(۲) استسقاء قلبی۔ یہ زیادہ تر اوٹ مقامات میں ہوتا ہے جو قلب سے زیادہ فاصلہ پر ہوں۔ کیونکہ جس قدر قلب سے زیادہ فاصلہ ہو اوتقدر دوران خون ضعیف ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے ہاتھ پاؤں اور چہرہ پر شروع ہوتا ہے بہت آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے۔ دبائے سے دبا کر اوٹگیوں کا نشان جلدی غائب ہو جاتا ہے پیشاب صاف یا خفیف البیومن ہوتا ہے۔ مگر کاسٹ کسی قسم کے نہیں ہوتے۔

(۳) استسقاء جگری۔ اسکی ابتدا پاؤں اور شکم سے ہوتی ہے جسم کے بالائی حصوں میں ظاہر نہیں ہوتا آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے۔ پیشاب عموماً صاف ہوتا ہے۔

(۴) وہ استسقاء جو رقت خون سے پیدا ہو۔ یہ ہمیشہ مقامی ہوتا ہے خفیف اسباب سے ظاہر ہو جاتا اور جانا ہوتا ہے۔ پیشاب عموماً صاف ہوتا ہے۔

(۵) وہ استسقاء جو گرم سرد ہونے سے پیدا ہو۔ یہ دفعتاً تمام جسم یا کسی خاص حصہ پر ظاہر ہو جاتا اور بہت آسانی سے علاج پذیر ہوتا ہے۔

(۶) جو استسقاء مقامی رکاوٹوں سے پیدا ہو۔ وہ محدود ہوتا۔ جگر گردہ اور قلب کو متعلق کوئی فساد

ظاہر نہیں ہوتا اور آسانی سے جاتا رہتا ہے۔

جب تمام جسم کی جلد کے نیچے پانی جمع ہو جائے اُس کو اندر ساکت کہتے ہیں، اور جب کسی ایک حصہ میں ہو تو ایڈیا شکم کے اندر پانی جمع ہو نیکو سانی ٹیز یا ہائڈروپیری ٹونیم کہتے ہیں۔ سینہ کو اندر پانی جمع ہو نیکو ہائڈروپیریٹس کہتے ہیں۔ غلاف القلب کے اندر پانی جمع ہو نیکو ہائڈروپیریٹس کہتے ہیں۔ پیری کا ڈیل ڈیسی، فوٹوں کے اندر پانی جمع ہونے کو ہائڈروپیریٹس کہتے ہیں۔ اور کے اندر پانی جمع ہو نیکو ہائڈروپیریٹس کہتے ہیں۔

یہ مرض عموماً دوسرے امراض کے ضمن میں پیدا ہوتا ہے مثلاً برٹیس ٹیز، امراض القلب، ہیمیا، ہائڈریا، امراض جگر و شش وغیرہ۔ اس کے علاج، اس جگہ پر ہم علاج ڈراپسی کے عام اصول بیان کر دیتے ہیں۔ اس کا مختلف قسم کا بیان ان کتابوں میں درج کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ پس ڈراپسی یعنی ہتھاکر علاج کے اصول حسب ذیل ہیں۔

(۱) سبب کا دفعیہ کرنا۔ اگر امراض قلب و ضعف عروق کی وجہ سے تو مٹی ٹیس دیکر دوران خون کو صحیح اور قوی کر دینا چاہیے۔ اگر امراض گردہ، شش و جگر وغیرہ کی وجہ سے ہے تو ان کا جب حالت مرض علاج کرنا چاہیے۔ قلت رقت خون میں عمدہ زود ہضم غذائیں و مقویات فولاد و خید میں، عام ضعف اور لاغری کی حالت میں مناسب ورزش عمدہ غذاؤں تبدیل آب و ہوا اور مقوی ادویہ سے صحت و طاقت کو ترقی دیں۔

(۲) مہم حصہ کو آرام دینا۔ اگر ممکن ہو باقی جسم کی نسبت اونچا رکھنا اور پٹی وغیرہ کو دبانا و تسخیل اس میں مدد کرنا۔ پہلے اصولی طرف اور فوٹوں کی ایڈیمیا میں کار آمد ہوتا ہے۔

(۳) غذائیں خشک زود ہضم اور مقوی دینا حتی الوسع پانی اور رقیق غذائیں بہت کم۔

(۴) جمع شدہ پانی کے اخراج اور تحلیل کی تدابیر کرنا یعنی معرقات، مدرات و مسہلات دیکر پانی کے خارج کرنے یا جذب ہو جانے کی تدابیر کرنا۔

(۵) مناسب و متکامی سے جمع شدہ پانی کو خارج کر دینا۔ اسکی دو تدابیر ہیں اول پریستھیسس ٹلکی داخل کر کے پانی نکال لینا یہ دستکاری اسانی ٹیز ہائڈروٹھوریکس، ہائڈروپیریٹس کا دیم اور ہائڈروپیریٹس میں کار آمد ہے۔ دوم شگاف دیکر رزبک ٹلکی داخل کر دینا یہ عمل طبیعی استفادہ ہائڈروپیریٹس کا دیم اور ہائڈروپیریٹس میں کیا جاتا ہے۔

نسخات (۱) ریوند ۳ گرام، غاریقون ایکڑرام، ترب سفید ۲ ڈرام، زرافندہ ۳ گرام، گول ۳ گرام۔

انیسوں ڈرام ان سب کو کوٹ پیکیہ بخود کی برابر گولیاں بناویں، بغرض اسہال ایسے تین چار جوب و زائد دیکھتے ہیں (۲) شیر شتر سہرا آب کاخی و شربت نفثہ دینا اور کرنا ہے۔ اگر کھانسی ساتھ ہو تو شربت زوفا ملا سفیدہ گولیاں

(۳) مکوہ تین تولہ پانی میں جوش دیکر اور شربت بزدی ملا کر لانا (۴) بورہ ادنیٰ و رخن بابونہ میں ملا کر بن پر

طلاکرنا پسینہ لانا ہے (۵) مریض کو فرش پر لٹا کر تمام بدن کو سوا سر و چہرہ اگر گرم دیکے ڈانپ دینا خوب پسینہ

لانا اور طوبات کو تحلیل کرنا ہے (۶) پانی کو کاپرین کی جلدی پکاسی کر کے مریض کو باٹ دیش پیک میں پسینہ

اعلیٰ درجہ کا معرق اثر پیدا کرتا ہے۔

استسقاء - بیضہ - اوورین ڈرائیسی کا بیان دیکھو۔

استسقاء - حجاب الریم - ہاڈر و متھورکیس کا بیان دیکھو۔

اسپیغول - دافع سوزش سترق اور مدہنی - اسہال و تحش کہنہ قبض دایمی عسل البول سوزگ - دکام سوز

گردہ و خاہ میں مفید ہے بچوں اور بزرگوں کو لے بلا خوف استعمال کر سکتے ہیں خر ۲ ڈرام سے ۴ ڈرام تک۔

اسطوخودوس - مفرح منوی دل و دل غلیظین - دافع سوزش اور مخزج بلغم ہے۔ امراض سینہ اور ادجا

مفاصل میں مفید ہے۔ خر ۱ ڈرام سے ۲ ڈرام تک۔

اسقاط - دیکھو بیان ابارشن کا۔

اسنگلاس - isinglas - مقوی جسم ہے کیمیائی امخاؤں میں استعمال کیا جاتا ہے۔

اسوکا - Asoka - اسکی چھال قدرے قابض اور مکن رحم ہے اسکو عموماً مینورہیما اور

یواسیر میں استعمال کرتے ہیں۔ خر فلوئڈ اکثر ۱۵ اے سے ۴۰ یونڈ تک۔

اسہال ڈایا ریا - دست ہونا۔

اسباب (۱) خراش۔ انشروں میں مفصلہ ذیل اسباب کی خراش ہو کر اسہال کا باعث ہو جاتی ہے

اغزائے غذائیہ کا معدہ سے انشروں میں پہنچ جانا جن پر معدہ کی رطوبتوں کا عمل پوسے طور پر نہیں ہوا جو انشروں

میں پہنچ کر متعفن ہو جاتے اور طرح طرح کے فاسد مواد پیدا کرتے ہیں۔ غذا کو ساتھ ایسی چیزوں کا انشروں

میں چلے جانا جو نرم ہو سکیں مثلاً نمائیت ادنگکریاں وغیرہ کثرت صفرا۔ کم امعا۔ مدہ ۲ گرم سرد ہو کر

انشروں میں زیادہ خون جمع ہو جانا۔ (۳) انشروں کی سوزش۔ رسولی اور زخم دم، بچوں میں دندان

نکتنے وقت رہا، خاص امراض مثلاً ہیضہ پیش ثابہ یا بدلتہ نفرس۔ پانی ایمیل سل۔ دہا کوئی ٹی کل۔ اس کو مراد

وہ اسہال ہے جو کسی مرض کے انتہا کے بعد خود بخود کثرت ہوا یا کہنے میں رہا، معاوضہ کے اسہال۔ مثلاً

گردہ یا جلد کے امراض میں جب پشایاب اور پسینہ کافی طور پر خارج نہ ہوتا ہو (۸) عادت افیون کا ترک کرنا

(۹) انشروں کا سل الیومی ٹائیڈ ڈیزز۔

علاج (۱) ہر قسم کے اسہال میں غذا کی اصلاح کرنا نہایت ضروری ہے تمام غذائیں اس قسم کی دینی چاہئیں

جو سرخ یا ہضم اور بے خراش ہوں اور جبکہ فضلات بہت کم باقی رہیں اور جو متعفن ہو کر خراش و خراش

نہجائیں مثلاً کھینی رشوربا۔ دودھ۔ لایم و اثر یا سوڈا و اثر ملا کر، آتش جو سفیدی بیضہ سا گودانہ۔ اماروٹ

وال کا پانی کچھڑی (جو بہت نرم ہو)

انہیں سے دودھ جیسے پانی لایا و اثر یا سوڈا و اثر ملا دیا گیا ہو بکے عمدہ غذا ہے بشرطیکہ متعفن نہ ہو

اور اسکا تیز یا زکرا ساتھ مایع ہوا ان غذاؤں کے انتخاب کرنا۔ ہیں کے عمدہ ہمارے کی خوشی اور وقت

(۲) شکم کو آرام دینا اور گرم رکھنا۔ زیادہ حرکت اور چلنے پھرنے سے مریض کو منع کر دیں اور شکم پر نرم لالیٹین کا پٹا باندھیں اگر مفصلہ بالا ہر دو تداویر کی پوری پابندی کیجا تو اکثر حالتوں میں اسے قدر علاج کافی ہو جاتا ہے کسی دوا کی ضرورت نہیں رہتی۔ آرام ہو جانے سے تین چار روز تک بھی ان تدابیر کی پابندی کھانی چاہیے تاکہ مرض کا عود نہ ہو سکے۔

اسہال اطفال میں نہایت احتیاط لازم ہے کہ غذا ہر طرح سے صاف اور عمدہ کی ہوئی ہو نہ سب اوقات پر دیکھائے۔ بچہ سردی سے محفوظ رہے۔ اور کوئی زائد شے مثل مٹی۔ ریگ۔ دانہ۔ خاک۔ خشک ٹکڑے وغیرہ جو سنے اور نگلنے نہ پاوے یہی ایک احتیاطی جو صدمہ بچوں کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے جو جب اپنے سہاے میٹھے اور اپنے ہاتھوں سے ہر چیز پر کھڑکھڑی کرنے لگتا ہے تو یہ زمانہ اس کے لئے نہایت نازک ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر قسم کی خاک بلا اسکے شکم میں پہنچتی ہے۔ اور اُس طرف یہ ہے کہ اگر ان کے والدین کو ایسی حرکات و حفاظت کرنے کے لئے کہا جاتا ہے تو وہ اس بہ خوری کو ایک معمولی بات اور بچوں کی دائمی عادت سمجھ کر کچھ پروا نہیں کرتے۔ اس قسم کی بے احتیاطی عموماً خونریزی کے برابر ہو جاتی ہے۔

(۳) ادویہ چونکہ اسہال نہایت مختلف اسباب سے جاری ہوتے ہیں اسلئے مختلف قانونیں مختلف ادویہ مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اگر فساد ہاضمہ قبض ثقل معدہ۔ نفخ۔ قویخ وغیرہ کی علامات موجود ہوں تو بچہ سمجھنا چاہیے کہ اعمال کے اندر فاسد فضلات جمع ہیں جو موجب اسہال ہیں پس ایسی حالت میں امعاء کو صابون اور پانی یا میگنیشیا سلفاس کے خمد یا کیسٹرل کیلول برائٹ۔ مرلے بلبلہ معجون حیات بخش معجون سنار وغیرہ مسہلات و صاف کرنا چاہیئے۔ اور غذا و آرام کے متعلق جو تدابیر بیان کی گئی ہیں ان کی پابندی کرانی چاہیئے فساد ہاضمہ کی حالت میں اسے قدر علاج کافی ہے بچوں کو لیے بلبلہ و اجوائن اور گر گرینز اور عمدہ مسہلات ہر بعض اوقات کسی صفر سے غذا امعاء کو اندر متعفن اور ترش ہو کر اسہال کا باعث ہو جاتی ہے اور ترش و کارکتے ہوتے ہیں۔ اسکا علاج کھاسی ادویہ مثل سوڈا ابائی کارب۔ پینرٹ امونیا اور وینٹک بہمنجہ سب نائٹراس وغیرہ سے کریں۔

قابض اور قاطع اسہال ادویہ میں افیون سب سے اعلیٰ درجہ پر ہے۔ یہ ہر قسم کی سوزش۔ خراش۔ درد۔ قویخ۔ اجملع خون۔ تیزی حرکت امعاء اور زیادتی سیلان کو روکتی ہے مرض گردہ اور دماغ کی موجودگی میں اسکا استعمال جائز نہیں۔ بچوں کو بھی با احتیاط تمام نہایت قلیل مقدار میں دینی چاہیئے۔ اسکے فوائد احتیاط اور طریق استعمال افیون کے بیان میں مفصل درج کیئے گئے ہیں۔

بہمنجہ سب نائٹراس بہمنجہ سیلساس بہمنجہ کاربوناٹس بہمنجہ سائپٹراس۔ دارف سوزش۔ مسکن حرکت امعاء۔ جاذب یابح۔ دارف عضوت اور معتدل تشری ہیں۔ انکو چاک۔ پلو کرٹیا اور وینٹک اور سوڈا کے ساتھ ملا کر دینا اکثر اقسام سادہ اسہال میں نہایت مفید ہوتا ہے۔ کیئے کو۔ برائٹی۔ لاک۔ وڈ۔ غنچہ انار۔ بل۔ گری۔ پھول۔ کیکر۔ کمرکس۔ وٹاک کی کمی عمدہ قابضات ہیں۔ سادہ اسہال میں ان سے کوئی مفرد دوا یا تین چار ملا کر دینا چاہیئے۔

پیرسپو راہبوفیلیا۔ رقت و ملت خون (۴) کسی خونی برسولی یا اینوزوم کا انتہری کے اندر کھلیانا۔ (۵) ہمتاس الطشت کے معاوضہ میں (۶) ناکل درمعدہ کا خون بھی کبھی انتڑیوں کی طرف جا کر راز کو ساتھ خارج ہو جاتا ہے۔
 مینا میں اس امر کی تشخیص ضروری ہوتی ہے کہ وہ خون بوا سیر کا ہے یا دوسرے امراض کی وجہ سے ہے۔
 بوا سیری خون کی پہچان ہے کہ وہ براز سے آگے یا پیچھے خارج ہوتا ہے یا اوکی سطح پر لگا ہوا ہوتا ہے مگر جو خون دوسرے امراض میں انتڑیوں کے بالائی حصہ سے آؤ وہ براز کے ساتھ یکساں طور پر ملا ہوا ہوتا ہے۔
 بوا سیری خون نکلنے کے وقت رقیق اور صاف ہوتا ہے مگر دوسری امراض کا خون نجس اور سیاہ۔ اس قدر مختصر کے بعد خاص خاص امراض کی شناخت انکی علامات سے کرنی چاہیے۔

علاج۔ سب کے مطابق علاج کرنا چاہیے۔ عام حابس الدم ادویہ مثلاً ہینزی لین اگر ٹارگٹ الیم ٹیکٹ الیم گیلکٹ الیم ایسی ٹیٹ آف لڈ ٹیکچر ایچیم۔ ماز و وغیرہ حسب موقع استعمال کر سکتے ہیں۔
 اسی پیال Isapiol محک قلب و دوران خون ہو۔ سر و مینٹن کے ساتھ استعمال کرنے سے اس کے ضرر کی اصلاح کرتی ہے۔ لیکن اور مار میں کچھ کمی نہیں کرتی۔

اسی فی ٹیڈا۔ ہینگ۔

اصل الرازیاج۔ یعنی سوف کی جرٹ مسکن اور جماع۔ منضج۔ مدربول و حین معرق و رقد۔
 دافع شیع ہے خر ایک ڈرام سے ۲ ڈرام تک۔

اصل الہندبا۔ یعنی بیج کا سنی۔ مدربول۔ مصفی خون۔ مسکن دوران و محرک عروق جاذبہ ماسا رقیقا ہو۔

افونیا Aphonia بے آواز۔ کوئی لفظ یا آواز نکال نہ سکتا۔ کچھ واپس کو امراض کلیان۔

افیزیا Aphasia افیزیا کے متھے میں۔ قوت بیانہ کا زایل ہو جانا بشرطیکہ عضلات لفظ کو خارج

یا قوے عقلیہ کے نقص سے ہو۔ اسکی چار بڑی قسمیں ہیں۔ اول ایضیا۔ قوت کلام کا زایل ہو جانا دوم

اگر فیضیا۔ قوت تحریر کا زایل ہو جانا۔ سقار امیسا۔ اشارات سیخالات ظاہر کرنے کی طاقت نہ رہنا۔

چھا در امیشیا۔ اس میں ہر ایک چیز کا نسیان ہو جاتا ہے۔ قوت بیانہ کو دو بڑے جز میں ایک اطلاع

دوسرا ارادہ پھر ارادہ کی تعمیل مثلاً جو کچھ ہم آنکھوں سے دیکھتی یا کانوں سے سنتے ہیں اسکی اطلاع مرکز

بصارت و سماعت میں ہوتی ہوئی مرکز علم تک پہنچتی ہے اس کے بعد ہم کچھ بولنے یا لکھنے یا اشارات ظاہر کرنا

ارادہ کرتے ہیں پس اگر بولنے کا ارادہ کریں تو اعضائے لفظ کو حکم دیتے ہیں۔ اور اگر لکھنے کا ارادہ کریں تو اعضا

تحریر کو ارادہ اگر اشارات کرنے چاہیں تو جن عضلوں اشارہ کرنا ہوا اسکو حکم دیتے ہیں۔ اس طرح افیزیا کی دو قسمیں


ہوئی ایک نسری جس میں کلام یا تحریر کے سمجھنے کی قابلیت نہیں رہتی ایسے شخص کو بولنا اور لکھنا کبھی

نہیں آ سکتا دوسری جس میں لفظ یا کتابت یا اشارات کی قابلیت جاتی ہے ایسا شخص دوسری کلام یا

تحریر کو بخوبی سمجھتا ہے مگر خود بول نہیں سکتا اور نہ لکھ سکتا ہے اور نہ اشارات ظاہر کر سکتا ہے اس طرح ہوتا ہے۔

حکایت ام سے ڈرام تک

افیزیاکی تین اقسام ہوتیں۔ ایفیا۔ اگر فیفا اور ابمیا۔ اس تمام کیفیت خاکیم ہر طرح کہیں سکتے ہیں



بجے ایفیا پانچ درجہ ہیں۔ (۱) چند معلوم زبانوں میں سے ایک دو زبانوں میں کلام کوئی طاقت کا نابل ہو جانا (۲) چھو چھو لفظوں مثلاً ہاں و ناں سے زیادہ نہ بول سکے مگر جو الفاظ اسکے سامنے بولے جاویں انکو دودھ لکے (۳) آواز سے نہ بڑھ کر (۴) کوئی خیال بھی ظاہر نہ کر سکے صرف بمعنی آوازیں نکالو (۵) کوئی لفظ بھی ادا نہ کر سکے۔

اگر فیفا کے بھی پانچ درجہ ہیں (۱) مریض چھوٹے چھوٹے فقرہ غلط غلط اور بے ترتیب لکھ سکے (۲) خود کو لکھ سکے مگر نقل یا املا کر لکھ سکے (۳) انشاء و املا و نقل کی طاقت نہ رہے مگر اپنا نام یا دو ایک لفظ املا سکے (۴) حروف تو لکھ سکے مگر اکالانا اور الفاظ بنا نا بھول جائے (۵) کچھ بھی اور کسی طرح نہ لکھ سکے۔

تیسری افیزیاکی اقسام حسب ذیل ہیں۔ اول بیانی افیزیا جس میں ہر ایک چیز کا سہو ہو جاتا ہے (۱) عقلی نابینائی جس میں مریض کی بیانی سالم ہوتی مگر دیکھ کر پڑھ نہیں سکتا اور نہ نام لے سکتا ہے (۲) عقلی بھڑھن جس میں شنوائی قائم ہوتی ہے مگر آوازیں سن کر انکو سمجھ نہیں سکتا جس طرح موٹار افیزیا کے مختلف درجہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح پرنسری افیزیا کے بھی درجہ ہیں۔ اکثر اوقات افیزیا مرکب ہوتا ہے۔ یہاں تک تو افیزیا کی تعریف اور اس کے اقسام کا ذکر ہوا۔ اب رہا یہ سوال کہ کس قسم اور کس عضو کے فسادات سے افیزیا ہو جاتا ہے۔ اسکی بابت محققین کی فی زمانہ حسب ذیل رائے ہیں۔

عارضی افیزیا تو اکثر ناگہانی صدمہ یا خوف یا حیرت کی حالت میں ہو جاتا ہے بچوں میں کرم حاسدہ حملے سے ہو جاتا ہے۔ مگر ہنسیر یا اور تشنجی امراض میں بھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ دایمی افیزیا کی وجہ دماغ کے کسی حصہ کا جریان خون یا ایبازم یا فتنک فاسد ہوتا ہے۔ ان فسادات کو عموماً حسب ذیل بیان کیونگے ہیں (۱) موٹار افیزیا۔ بائیں طرف کا تھرا فریکل کنوا لیٹکس۔ بیکسٹرم اولی ایبازم انٹرکٹ پسیول کی انٹی پسیگٹ کو فاسد ہی ہو جاتا ہے (۲) اگر فیفا بائیں جانب کو دوسری طرف کی طرف

کے پچھلے حصہ میں فساد واقع ہو کر (۳) منسری افزیا۔ دماغ کے اس حصہ میں جہاں سلون آرٹری کی سفیناڈیل اور پرائیوسفی نائڈیل شافین بنجی ہیں سپر ارجی نل کنوالیوشن۔ اینکولرگامی رس۔ انٹر ارجی نل کنوالیوشن کا کچھلا حصہ (۴) سماعت لفظی کا افزیا۔ پائیس فزٹل لوب کو کچھلے نصف حصہ میں۔ (۵) بصارت لفظی کا افزیا۔ پائیس فزٹل کے پچھلے ثلث میں۔

علاج۔ جب کہ کثرت شغل یا کھرباٹ یا دماغی جوش کی وجہ سے افزیا شروع ہو تو اسوقت بڑی ہوشیاری اور احتیاط لازم ہوتا ہے کیونکہ اس کے احتمال مرض کی کمال زیادتی کا ہے۔ ایسی حالت میں مریض کو ہر طرح سے چین و آرام دینا تمام شغل بند کرانا اور مکمل دماغ اور یہ نڈلڈاسی بر ومانڈ۔ کلورل ہائیڈراس سہل ضروری کا احتمال ضروری ہو تو جبکہ افزیا دماغی طرف کشتیوں یا فالج کے بعد پیدا ہو تو ایسی حالت میں تشنج اور فالج کا علاج مقدم ہو گا تشنج اور فالج میں آرام ہونے کے ساتھ افزیا بھی دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مگر جب ضروری نہیں کہ ہمیشہ فالج اور تشنج میں آرام ہونے کے ساتھ ہی افزیا بھی دور ہونا شروع ہو جاوے ایسی حالتوں میں آہستہ آہستہ از سر نو لون یا الکھنیا یا پڑنا وغیرہ سکھانا چاہیے۔ ایسا کرنے سے اکثر کامیابی ہوتی ہے لیکن یہ تعلیم نہایت استقلال صبر اور عرصہ چاہتی ہے۔

افیسمیا Aphasia دیکھو بیان افیسمیا کا۔

افیون۔ اسکا خارجی استعمال بطور پلاسٹرائنٹ یا فوٹیشن کے درد اور سوزش کو کم کرتا ہے۔

افیون جب کھلائی جاتی ہے تو منہ کی ہو کس ممبرین اسکو بہت جلد جذب کر لیتی ہے جسکے سبب منہ میں خشکی اور عصبیت معلوم ہونے لگتی ہے بعد میں ہنچکے پہلے خفیف خراش کرتی ہے مگر بہت جلد یہ خراش خف ہو کر درد۔ جھوٹے وغیرہ میں بھی اور افعال معدہ میں کمزوری ظاہر ہوتی ہے اور بے موجود ہونو بیلہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے افیون باضمدہ کو خراب کرتی ہے اور مختلف اقسام کے درد معدہ نے سوزش معدہ جو تھیل اور خراش کنسنڈ خدا یا خراب یا آری ٹنٹ پائرن کے بعد ہو جائے اور تیز تر درد مزمنہ یا میگنٹ وغیرہ میں مفید ہے اصحاب اسکا اثر سید ٹیو ہے یعنی ہر قسم کا احساس درد و اعراض عروق باضمدہ و حرکت کم ہو جاتی ہیں گویا کہ مہاکو اسکا دافع اوجاع اور جاذب طوبات ہے۔ اس طرح سے مختلف اقسام اہمال تھیش شروع ورجہ ہیضہ یا ایفائیڈ فیور۔ ٹیو برکلو سمرا اور خراش کثندہ زہروں میں نہایت مفید ثابت ہوئی ہے مگر اس کے استعمال میں نہایت احتیاط لازم ہے عموماً اسکو بہت کم مقدار میں دیگر قابضات مثلاً چاک لڈینک ایسڈ وغیرہ کو ساتھ ملا کر دیتے ہیں۔ زیادہ مقدار میں سٹینکٹ اعصاب کو کمزور یا بالکل مفلج کر دیتی ہے اور اس طرح اس سے اہمال شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اصحاب کی حرکت کا بند کرنا منظور ہو مثلاً ہرنیا۔ انٹسٹائنیل۔ آبسرسن پیریٹائیس ہوسرل پر فوریشن۔ پیچر اور زخموں میں اسوقت افیون متواتر اور بے خوف استعمال کرنی چاہیے یہ مانک کہ مصنوعی یا قدرتی طور پر آرام حاصل ہو جاوے۔

بطور حقہ یا سپازیٹری کے استعمال کرنے سے مقامی درد اہمال پر پیشہ تشخّص مقعد اور خراش وغیرہ ہو جائیں
ماریفانوں میں بہت آہستہ آہستہ جذب ہوتا ہے خالص افیون قیلولوں تک پہنچ جاتی ہے۔

خون سے ماریفان تمام اعضا پر پہنچ کر اپنا اثر کرتا ہے لیکن نظام حسی پر اسکا اثر بڑی زیادہ ہے۔

دماغ کے کنوالیوشنوں کو تحریک ہو کر طبعیت شاد اور عقل چست ہو جاتی ہے ہر فعل و قولی اور اشارہ میں تاخیر
تیزی ظاہر ہوتی ہے مگر بعض اوقات زیادہ تیزی کی وجہ سے عقل اور فہم پر گزندہ طور پر خیالی نقوش اور نظاروں

کی طرف دوڑنے میں اس انبساط اور تیزی کے بدستوری اور افسردگی غالب ہوتی ہے۔ اور آخر کار غنودگی
ہو کر نیند آ جاتی ہے۔ اگر افیون زیادہ مقدار میں کھائی گئی ہو تو انبساط اور تیزی کی حالت ہونے نہیں پاتی بلکہ

شروع سے ہی سخت بیہوشی ہو جاتی ہے اور کسی قسم کی تکلیف اور حرکت وغیرہ اسکو معلوم نہیں ہوتی اس طرح سی افیون
دماغ کے لئے محرک الفاعل اور جذبہ منوم اور مخدر ہے پہلی سکر مکر قوت بنیانی میں فساد ہو جاتا ہے۔

پہلے پہل دماغ اور نخاع کو موٹا سنٹر کو تحریک ہو کر سنجینی اور تشبخی حرکات ظاہر ہوتے ہیں مگر جب دماغی افسردگی
اور سختی شروع ہوتی ہے۔ ساتھ ہی قوت حرکت بھی کمزور ہو جاتی ہے مگر بالکل زایل نہیں ہوتی حتیٰ کہ مریض کو

سخت ہر کی حالت میں بھی دونوں اطراف میں سہارا دیکر بچھ سکتے ہیں مگر کمزور قوت پر بھی ایسا ہی اثر ہوتا ہے
یعنی شروع میں اسکو تحریک ہو کر بعض اوقات تیز ہو جاتی ہے مگر بعد میں اسکو تسکین ہو کر تے بند ہو جاتی ہے مگر

تنفس پر شروع میں کچھ اثر نہیں ہوتا مگر اخیر میں سست ہو کر حرکات تنفس کمزور اور بیقاعدہ اور آہستہ ہو جاتی
ہیں ہر مریض مقدار میں افیون سے موت تنفس بند ہو کر ہوتی ہے۔

سنسری نروں کا فعل کمزور ہو کر احساس تکلیف اور درد وغیرہ کم ہو جاتا ہے۔
دل کی حرکت ابتدا میں قوی تیز ہو جاتی ہے مگر بعد میں دلکس عصب کو تحریک ہو کر حرکات قلب سست اور کمزور

ہو جاتی ہیں اور آخر کار واکس فلوج ہو جاتی ہے مگر چونکہ ساتھ ہی دل کو اندر انٹرٹنگ تکلیف بھی سست یا مفلوج ہو جاتی
ہیں اسوجہ سے حرکات قلب تیز نہیں ہوتی پاتی بلکہ بہت قلیل المقدار اور کمزور ہو جاتی ہیں بخلاف ذیادہ طور پر افیون

کی موت حرکت قلب بند ہو کر ہی ہوتی ہے۔
حرکات تنفس کو سست ہر قسم کے ریفلکس فعل مثلاً کھانسی، ہچک چھٹیک وغیرہ بند اور اخراج بلغم کم یا بند ہو جاتی

ہیں گویا کہ تنفس کے لیے افیون نہایت سخت مضغف ہو۔
جگر کا بیلیری اور گالائی کو چینک فعل بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔

قریبا ہر عضو کا خاص فعل کمزور اور ہر قسم کی خراش اور تکلیف کم اور ریفلکس حرکات بند ہو جاتی ہیں۔
افیون اپنے دافع اوجاع اور خواب اور تاخیرات کی وجہ سے نہایت کثرت سے استعمال کی جاتی ہے جبکہ درد۔

دماغی عجیبی کثرت محنت بخار جنون اور مختلف عصائی بیماریوں کی وجہ سے بڑی خواہی ہو یا نہیں افیون نہایت
مفید ہوتی ہے۔ دیگر خواب اور ادویہ مثلاً کلورل سفینوئل۔ پارالٹری یا مڈر برو یا ڈیزینک کنوولیوٹس یا سٹیسیکیم

ہینال، یکسو کاربائیفل، رائیل، رسارین، یورال وغیرہ سے اس بات میں ترجیح رکھتی ہے کہ یہ منوم ہونے کے علاوہ نہایت قوی، دافع اوجاع بھی ہے۔ اور دیگر دافع اوجاع ادویہ مثلاً الکونایت، بیلادونا، کونین وغیرہ پر اس بات میں غالب ہے کہ دافع اوجاع ہونے کے علاوہ خواب آور بھی ہے۔ تقریباً ہر قسم کی تکلیف مثلاً کمزوریل یا بیری کالک، اعصابی درد و وجع مفاصل، سرطان، ضربات، اور ام، فکچرس، دسکو کیسٹرز وغیرہ میں درد کو آرام دیتی ہے۔ گائوسٹینی فکرس میں نہایت احتیاط سے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔

تشخی امراض مثلاً صرع، دمہ، سینر، ماڈک، سٹرکچر آف دی یوٹیخرا وغیرہ میں اس کا کم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن نخلع کے تشخی اور درد میں مارینا کی جلدی پچکاری کے برابر شاذ و کونی استعمال نہیں ہے۔ قلبی امراض میں درد، بے چینی اور اختلاج کو بہت آرام بخشی ہے۔ مگر چونکہ یہ سخت درجہ کی مضعف قلب ہے اسلئے اسکو امراض کہنہ قلب میں جبکہ اسکی دیواریں اور کواڑ خراب ہوتی تو یا محض قلب ہی کمزور ہو گیا ہو اسکا استعمال نہایت احتیاط کو ساتھ کرنا چاہیے۔ ایسی حالتوں میں بیلادونا زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ عروق خون اور دوران پر اسکا اثر مدیو ہے اسلئے مختلف قسم کے جریان خون مثلاً ہائیپوٹنسی، ہیمیٹیس، میلینا اور اپنی سٹیکس وغیرہ میں اکثر مفید ہوتی ہے جبکہ انشڑیوں سے خون ٹکنا ہو اسکیل کا فائدہ تین طرح سے ہوتا ہے اول تو اس طرح کہ انشڑیوں کی بیری سٹانک حرکت کو کم کرتی ہے دوم ہر قسم کی خواش کو رفع اور سوم دوران خون کو سست طے فی القیاس پہنچاتی ہے۔ س میں بھی ایسی ہی فائدہ کرتی ہے۔ امراض سینہ میں کھانسی، درد، دکشی اور دیگر کالیف کو کم کرتی ہے۔ لگژن حالتوں میں اسکا استعمال نہایت احتیاط چاہتا ہے۔ مثلاً جب بروکائی یا لمونری دیسی کلمز میں رطوبت بہت جمع ہو ایسی حالت میں افین کا دینا نہایت مضر ہوگا۔ کیونکہ اس سے کھانسی بند ہو کر رطوبت خارج ہونے پاوگی بلکہ اندھی جمع اور مخم ہو کر دکشی باہر ہو جائیگی۔ برعکس اسلئے جبکہ کھانسی کسی لاعلاج سبب مثلاً پیپسٹروں کی رسولی، ذیابو، فیلکس آرٹریٹس وغیرہ سے ہو تو افیون نہایت مفید ہوگی۔ مخرج بلغم ادویہ مثلاً ایونیا اور اپنی کے کو انا وغیرہ کے ساتھ اسکا استعمال زیادہ مفید اور بے ضرر ہوتا ہے۔

ذیابیس میں شاید افیون کی برابر اور کوئی قوی الاثر نہیں ہے۔ اور ام، حادہ، بخارات اور آتشک میں کیلول اور افیون کا مجموعی استعمال نہایت مفید ہوتا ہے۔

انسٹائل پر فوریشن اور پیری ٹوٹائٹس میں نہایت سفیس قیمت دوا ہے۔

استقاط محل کے روکنے اور عسر ولادت اور آقریب تر کر کے ولسطے بھی استعمال کیا جاتی ہے۔ ماریفا زیادہ تر بائل کو ساتھ جسم سے خارج ہوتا ہے۔ پیٹاب میں بھی اپنی اصلی کیفیت پر خارج ہوتا ہے۔ اور خارج ہونے وقت مقدار پیٹاب و قوت دافع پیٹاب کو کم کر دیتا ہے۔ اور مرض گردہ میں اسکی جسم کے اندر جمع ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ اسلئے امراض گردہ میں اسکو نہایت احتیاط کو ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔

خارج ہوتے ہوئے ماریفا قدری خراش اور گرمی کرتا ہے اور بعض اوقات اس سے بخارات جلدی نمودار ہو جاتے ہیں جلدی شریانیں پھیل جاتی اور غدود پسینہ کو تھک ہوتی ہے۔ ڈوورس پاؤڈر کی صورت میں نہایت مفید معرق ہے۔ نزلہ۔ الفلو ایفز۔ بخار۔ اور وجع مفاصل کی شروع تیزی میں نہایت مفید اور قوی الاثر معرق اور دافع حرارت ہے۔

دودھ کے ساتھ بھی ماریفا خارج ہوتا ہے۔ ایسے دودھ پلانے والی عورتوں کو افیون احتیاطاً دینی چاہئے۔

افیون میں مفصلہ ذیل جوہر ہوتے ہیں۔
 ماریفا۔ کوڈایا۔ تارکومین۔ تارسین۔ تھیبے این۔ اوپیمین۔ گریٹوپین۔ میٹامرفین۔ پادیرین۔ ہارٹائی۔
 لاڈین۔

ماریفا کی تاثیرات افیون کے مشابہ ہیں محض فرق اس قدر ہے کہ افیون ماریفا کی نسبت دیر میں پناہ را اثر کرتی اور دیر میں ماریفا بجز جسم سے خارج ہوتی ہے۔ اسوجہ سے افیون کا اثر زیادہ دیر پڑے اور دیر پڑے اور امراض امعاء و شکم مثلاً اسہال۔ ہسٹرشن۔ ہرنیا۔ انشائیل۔ پرفوریشن۔ پیری ٹونائی ٹیغ وغیرہ میں زیادہ مفید ہے۔ کیونکہ سیدی دور تک پہنچتی ہے۔ ولیریم ٹریٹس اور دماغی خرابیوں میں بھی بوجہ دیر یا اثر رکھنے کے زیادہ تر مفید ہے۔ ذیابیطس میں ماریفا کی نسبت کم ضرر کرتی ہے۔ جب کسی سوزش پر لگانا ہو یا بطور حقنہ یا کیلول و کونین کے ساتھ یا بطور معرق استعمال کرنا ہو تب بھی افیون ہی زیادہ مفید ہوتی ہے۔ ماریفا جس مقام پر لگایا جاوے پہلے قدرے خراش کرتا ہے۔ مگر سیدھے ٹو اور ہینا لگتے تاثیرات میں ماریفا افیون پر ترجیح رکھتا ہے۔ کیونکہ افیون میں تھیبے این۔ کوڈین اور تارکامین اجزاء ایسے موجود ہیں جو کونولسینٹ یعنی تشنج پیدا کرنے والے ہیں۔

کوڈایا۔ یا کوڈین ماریفا کی نسبت زیادہ محرک نخاع اور کم مخمد دماغی اسوجہ سے اسکے استعمال میں بعض اوقات رعشہ ہوتا ہے۔

ذیابیطس میں نصف گرین سے ۲۰ گرین روزانہ تک پیسے شکر کو بہت کم کر دیتا ہے۔

تارکومین بعض کی سلسلے میں ہینا لگ اور بعض کی سلسلے میں کونولسینٹ ہے۔

تارسین۔ اوپیمین۔ گریٹوپین۔ میٹامرفین اور پے پادیرین کا اثر ماریفا کے مشابہ ہے۔

ہارٹائی۔ راکین اور لاڈین میں اپنے افعال میں کوڈایا کے مشابہ ہیں۔

تھیبے این نہایت قوی کونولسینٹ ہے۔

افیون اور ماریفا کو استعمال میں مفصلہ ذیل امور پر غیہ نظر کرنی چاہیے۔

القول کہ کلام امراض گردہ و شش و قلب۔ سرسام اور بیوشی شراب میں نہایت محتاط کرنا چاہئے۔ استعمال کرنا چاہئے۔ دودھ و عرق و کاکرخت نقصان کرتی ہے۔ ایک سالہ بچہ کو نصف قطرہ شکر و عرق و کاکرخت زیادہ

نریا چاہیے۔ سووم دو وہ پلانے والی عورات میں بھی اسکا احتیاط لازم ہے چھارہ عورتوں کو اسکی برکت مردوں کی نسبت کم ہوتی ہے بیچم خصوصیت مزاج۔ بعض اشخاص کو اسکی بہت برداشت ہوتی ہے بعضوں کو اس سے تھوڑی مقدار میں زیادہ نشہ ہو جاتا ہے۔ بعض کو بہک اور بے چینی زیادہ ہو جاتی ہے بعض مار فیا کی جلدی بچکاری سے نہایت مست اور زہد مال ہو جاتے ہیں اور سخت تلی اور غشی کی علامات شروع ہو جاتی ہے۔ ششہم عادات جو لوگ عادی طور پر اسکا استعمال کرتے ہیں انکو اسکی بہت برداشت ہو جاتی ہے۔ ہفتم در کجالت میں اسکی زیادہ برداشت ہو جاتی ہے۔

جب اثر میں کرساتھ ماریا کا استعمال کیا جاتا ہے تو علامات ناقصہ متلی غشی۔ بدبھنی قبض غیہ نہیں ہونی پاتی
خاصکر امراض قلب شوش۔ انشائل آرکیشن اور تشنجی امراض میں اثر میں کمارینا کرساتھ ملا کر دینا مفید ہوتا
ہے۔ مگر دماغی خلل خاصکر مانیاس اثر میں ندرینا چاہیے۔ زخم افیون پے سے ۴ گرین تک۔ اکثر گٹ اویم پے
سے ۴ گرین تک۔ اکثر اکٹم اوپیائی لکوی ڈوم ۱۰ سے ۴۰ قطرہ تک۔ ٹروچیسائی اوپیائی لمے ۲ تک۔ والی نم اوپیائی
۱۰ سے ۴۰ بوند تک۔ پلو لاپلہائی کم اوپیوم سے ۵ گرین تک۔ پلو لاپانس کو ۳ سے ۵ گرین تک۔ پلو س اوپیائی
۲ سے ۵ گرین تک کنفیٹشیو اوپیائی ۵ سے ۲۰ گرین تک۔ پلو اپی کاک کو ۵ سے ۵ گرین تک۔ پلو لاپی کو کوئی کم
۵ سے ۴۰ گرین تک۔ پلو س کائیٹو کو ۵ سے ۲۰ گرین تک۔ پلو س گریٹا ایروٹیک کم اوپیوم ۱۰ سے ۴۰ گرین تک۔ ٹیکچر اویم
سے ۴۰ بوند تک۔ ٹیکچر اوپیائی امونے ۳ سے ۶۰ بوند تک۔ ٹیکچر کفر کو ۵ سے ۶۰ بوند تک۔ ماریا ہائیڈروکلور
ایس پی ۴ گرین تک۔ لائیو مارینا ہائیڈروکلور اس ۱۰ سے ۵۰ بوند تک۔ ٹروچیسائی ماریفنی ایک عدد
۶ عدد تک۔ ٹروچیسائی ماریفنی ایٹ اپی کے کوئی ۱۰ سے ۴۰ ٹیکچر کلورافارمی ایٹ ماریفنی ۵ سے ۱۰ بوند تک۔
افیون کی عادات پر لے۔ عادت افیون بیان دیکھو۔

اکا سن پیل یعنی کیوٹار فلیکا۔ دافع سوزش بہل۔ دماغ۔ دافع تشنج اور متوی اعصاب ہر امر ضرر دماغی۔ بالہ بخویا۔ تشنج۔ صرع۔ فلج اور اوجاع مفاصل میں مفید ہے $\frac{1}{4}$ ڈرام سے ۲ ڈرام تک اسکا سفوف استعمال کر سکتے ہیں

اکائی نو کاس - **Ecchinococcus** جگر اور رحم کے امراض کا بیان دیکھو۔

التصباہ لکچرل Icthyol دوسرا نام اس کا سلفو اکیویوٹ آف ایونیم ہے تندست جلد پر لگانے سے
 اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا لیکن دسم کچھ پر لگانے سے فوراً اثر پائیں سکڑ کر اس جگہ کا خون کم ہو جاتا ہے اور سیرم کا اخراج
 بھی کم ہو جاتا ہے۔

داخل استعمال میں اکتھال معنی خون داخلہ اور جلع ممکن موزش۔ انٹی سپیک اور حالب اللہ تاخیرات کے ساتھ
اسکایرونی اور اندرونی استعمال ان تمام بیماریوں میں مفید ہے جس کی پرانی موزش کیوجہ عروق شعریہ موز اور کشادہ ہو
ہوں اور اجتماع خون از حد رہتا ہو اور مفصل ذیل امراض میں نہایت مفید ثابت ہوا ہے۔

(۱) سر اور چہرہ کی سپریمیا میں جو مریضان ڈیمینور میا میں اکثر مریض جاتا ہے۔

(۲) امراض جلد مثلاً انگریزا کئی۔ رنگ سرم۔ سالی کوکس۔ اریٹھیا۔ اریٹھیا۔ ڈرنے ٹائیس وغیرہ میں۔

(۳) لیسری لیسری جدام۔

(۴) ہریم کے رمیومی ٹرم اور گاؤٹ میں۔

(۵) امراض الفسوان مثلاً پیری مٹھائیٹس۔ کرائٹک مٹھائیٹس۔ انیسٹریٹس۔ سیلینچائیٹس۔ پیرومٹھائیٹس۔ بالوٹھائیٹس۔ بانیٹھائیٹس۔ اردزن آف دی سر وکس وغیرہ میں۔ ان امراض میں بطور ریجائیٹل نمین یا کیکٹل پازیٹری یا خارجی لپ ککلیسین یا لیولین میں ملا کر استعمال کرتے ہیں اور نیز کھلاتے بھی ہیں۔

(۶) کلوروسس۔ نیو برکلوکس اور سکرافیولا میں۔

(۷) پرانی سوزش معدہ و امعاء اور نیز ہمال مرنہ میں۔

(۸) الکالائزم میں اکتھیا کے استعمال سے الکالائک ٹریمرس ہی دور نہیں ہوتی۔ بلکہ ساتھ ہی سے نفرت بھی ہو جاتی ہے۔

(۹) امراض نفیس مثلاً ہائی پریسیا آف دی لیکس اور پرائیکل آستھما میں۔

(۱۰) فریکو کوسس میں رڈیل بخثرت اور بار بار نکلا۔

(۱۱) وجع الاذن۔

(۱۲) برنٹری علی ہونی جگھوں پر لگانا نہایت مفید ہے۔

(۱۳) لانس ایسیون اور ہائیڈروسکیل میں نیچے آؤڈین کی طرح جوف کی دیواروں کو جلد پیوست کر دیتی ہے اور بر خلاف اسکے اس کی تکلیف ۵ سے ۱۵ منٹ کو اندر بند ہو کر وہ جگہ بے حس ہو جاتی ہے۔ آؤڈوفارم پراسکوپہ ترجیح ہے کہ ماسولے اینٹی سپٹیک ہوئے کے گرنوٹیشن نہیں ہوتے تھی اور جوف کی دیواریں جلد پیوست ہو جاتی ہیں اور چونکہ سینک بھی ہے اسلئے خون کو بھی بند کرتی ہے۔

(۱۴) اری سیپلس کی ترقی کو روکنے اور مقام ماؤف کو صحت پر لانے میں نیچے آؤڈین سلور ٹائیٹریٹ۔ ٹگاف اور کاربالک ڈریٹنگ۔ کابربالک انجیکشن وغیرہ کو بند کرتی جاتی ہے۔

(۱۵) جسم کے روکنے اور دور کرنے اور خارج پیت بند کرنے میں نہایت زبردست

خود اکتھیا ہونے سے ہاگین کلاک۔

اکتھیوس Icthyasis جلد کے امراض کا بیان دیکھو
اکٹرس Icterus جلد کے امراض کا بیان دیکھو
اکٹروپین Ectropion بالوں کے امراض کا بیان دیکھو۔

آگنہ Agnina اسکے دوسرے نام لینولین ایلڈسپسٹینی اور دول فیٹ میں یہ روغنی شے
بھستہ پانی میں گھول کر پیا جاتا ہے۔ مریضوں کو اس طرح نہایت عمدہ ہے۔ لاسٹیل و سلین گلیسرین سمیل آئسٹ وغیرہ
دیگر روغنی اشیا پر جو مریضوں اور لینٹس وغیرہ کو مانے میں استعمال کی جاتی ہیں ان پر اس کو کسی طرح سے ترجیح ہے
اول اس طرح کہ یہ جلد پر کسی قسم کا خراش نہیں کرتی دوسرے جگہ اس کو کپڑے سے پونچھ کر خشک کر دیا یا دوسرے جگہ
نرم ہتھی ہو کپڑوں پر داغ نہیں لگتا۔ دوسرے جلد میں بہت جلدی اور زیادہ مقدار میں جذب ہو جاتی ہے۔ چھارہ دیگر
ادویات ہیں مگر ہر ایک سے ایک ذرات میں تقسیم ہو جاتی اور جلد میں جذب ہو سکتی ہے۔ پیچیم۔ یہ پانی میں بھی
مٹ جاتی ہے حتیٰ کہ موزن پانی میں لگا اس کی نرمی اور تاثیرات دوسری جگہ میں ششہم چونکہ اس میں ملا دوسرے تھوڑی
مقدار میں بھی کافی طبع پر جذب ہو سکتی ہیں اس لیے یہ ایک کفایت کی صورت بھی ہے ہفلم جلد کے لیے
پر اس کو لگا یا جاوے تو فوراً ہر طرف پھیل کر جذب ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ برخلاف اس کے جی اور ویسٹین جلد کے لیے
جذب کرنے کی طاقت نہیں رکھتی اس وجہ سے میوکس سرفوس پر الگ ہی لگو رہتے ہیں ہشتادہ چونکہ اس میں کستہ چرب
بھی ہوتا ہے اس لیے جلد پر ایک جگہ چپک کر لگی رہتی اور گرے نہیں پاتی۔

چونکہ یہ بہت ادویات کو جذب کر لیتی ہے اور خود جلد میں آسانی جذب ہو جاتی ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تمام مریضوں
میں اس کا استعمال کیا جائے اور نیز بہت سی ادویہ ہوائی کھلانے کے اسکے ساتھ جلد کے رستہ پہنچائی جائیں۔ ادویہ
کوئین پٹاسی اکیوڈائیڈ پارہ۔ کرائی سو فینک ایسڈ نیفٹھال میں ملا کر جلد پر مالش کر لیا جاتا ہے اور اثر کرتی ہیں۔
خالص آگنہ یا دیگر ادویہ شلہ کرائی سی روہین سیل سیلک ایڈ پٹاسی ایسی ٹاس نیفٹھال وغیرہ کے ساتھ ملا کر
استعمال کرنا مفصل ذیل جلدی امراض میں نہایت سہرہ اور قوی الاثر ثابت ہوا ہے۔ سوراموئس۔ ہر پتیز
کرائک ڈیوٹائیٹس۔ زواید جلدی۔ کیلا سٹیرس۔ اسی تھیم۔ پرورائٹس۔ سانی کوئس۔ ایل تھیلوما۔
لوپس۔ اگر یا۔ اکتھیوس۔ ہاتھ پاؤں کا پھٹنا۔ کوئیز غرض کہ ہر قسم کی جلدی ہونے سے سختی اور انحراف میں مفید
مالش کرنے سے بہت جلد جذب ہو جاتی ہے اور دیگر روغنی اشیا کی طرح بعد میں صابون کے ساتھ دھوئے
کی ضرورت نہیں رہتی۔

بعض اقسام میں صابون کے ساتھ نہایت دھونے سے جلد سخت خشک۔ اور لڑا ہوا جاتی ہے اور اکثر چھوٹی چھوٹی
پھینک بھی نمودار ہو جاتی ہیں۔ اگر صابون بجا آجی کر کے ساتھ ہاتھ پاؤں میں لگائیں تو ان میں یہ نقصان
نہیں ہوگا۔ کیونکہ معمولی صابون جلد کو خشک اور جلد سے صاف کرنے کے اس کی نرمی اور لچک کم کر دیتے ہیں
مگر لینولین اور لینولین کے ساتھ جلد کے لیے مالش کرنے سے اس کا نقصان کم ہو جاتا ہے۔

مختصری مقدار میں سٹرنٹ ہی خاصہ کسینہ اور
دودھ کو اخراج کو کم کرنا یا ہضم میں اور دوسرے

اگلی رسی کس البس - Agaricus Albus

اگلی ریسین - Agaricine

اگلی ریسین نہایت قوی انہائی ڈرائنگ یعنی پسینہ کو روکنی والا ہے بلکہ کے پسینہ روکنی میں نہایت قوی اور زود اثر
نہایت ہوتا ہے۔ مگر دیگر رطوبات جلدی اور شش کو اخراج میں کچھ تغیر نہیں کرتا۔ صحت کی حالت میں اگر کھلایا جاوے تو پسینہ کا
اخراج ایک خاص حد پر رہیگا۔ لیکن ہشیا کی کثرت اور پیاس کی کمی جس سے پانی وغیرہ کم پایا جاوے ساتھ ہی ساتھ عند
قائم کھینچو۔ اسہال کچھ التھیں ورس پاؤڈر کے ساتھ دینا مفید ہے۔ خمر کے ریس پاؤڈر ۲ سی ۲ گرین تک اگر
سین ۱۲ سی ۱۲ گرین تک۔ فلوئڈ اکثر ۳ سی ۲۰ بوند تک۔

اس میں ہوسکین حاصل ہوتا ہے جو پسینہ روکنے

اگلی ریسین مسکیریس - Agaricus Muscaris

میں نہایت قوی اور تیز اثر رکھتا ہے مگر دیگر جلدی غدد و دل اور تیز سیوری کلڈر کو پانی کو کاپین کی طرح
تحریک نہایت خمر مسکیرین نائٹرس ماسکیرین سلفٹ ۱۲ گرین سی ۱۲ گرین تک جلدی بچکاری میں۔

اکیو Ague یعنی تپ لرزہ۔ دیکھو بخارات موسمی کا بیان۔ ل۔

اکیو ویڈ Ague weed اکا دوسرا نام گزڈیا سکرونزلی موسمی بخارات اطحی او طیکر کوٹھنہ اور دیگر امراض ملیریا

الاکھی خورد و کلان۔ کمارٹے کم کا بیان دیکھو۔

البی نزم Albinism اگر پیدا ہونے سے پہلے علاج عام مقویات اور عمدہ غذاؤں سے کرنا چاہیو۔ اور اگر بعد میں تبدیلی

وغیرہ سے ہوئی تو ان اسباب کی مطابق علاج کرنا چاہیو۔ چونکہ اس مرض میں آنکھ کو روشنی کی برداشت بہت کم ہوتی ہے

جس سے بعض کو سخت دقت پہتی ہے۔ اس کا دفعیہ مناسب عبارتہ یا عینک سے کرنا چاہیے۔

البیومن Albumen یہ ایک نہایت اعلیٰ درجہ کی حیوانی غذا ہے۔ سفیدی بیضہ تمام البیومن ہے۔ دماغ و خون

آنکھ کی رطوبات تر جاجیہ و جلیدیہ اور لطف میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ سرد پانی میں حل ہو سکتا ہے لیکن گرم کرنے سے

جم جاتا ہے۔ الکحال اور ترشیاں بھی اسکو خمیر کر دیتی ہیں۔ نباتات میں بھی البیومن کی مقدار پایا جاتا ہے۔ بارہ

کے لٹو فادہ ہے اور نیز زہر سکھیاس میں بھی مفید ہے۔

البیومی نائڈوزیز Albuminoid disease اس بیماری کے دوسرے نام ویکسی۔ لارٹس

ایسی لائڈوزیجینٹن بھی ہیں۔ اس بیماری میں جگر گردہ تلی۔ غدد اور دیگر اعضائے کی ساختیں فاسد ہو کر

مرم کرنا شروع ہوجاتی اور ان کو خاص خاص افعال میں نقصان آجاتا ہے تمام بدن نہایت خفیف لاغر اور

پیکر رنگ کچھ ایک علیحدہ رنگت و پ حاصل کر لیتا ہے۔ جب گردہ میں یہ مرض ہو تو ہستقا۔ البیومی نوزیا اور

یوریمیا ساتھ ہونے میں۔ عموماً ایسے مریضوں کو بعد شروع ہوجاتا ہے جس میں مت تک پہ بکثرت خارج ہونے

منزلہ۔ جگر طحال اور گردوں میں بہہ مرض سب سے زیادہ ہوتا بعد ازاں غدود پھر امعاء پھر مشانہ پھر اوٹیم پھر
تھائیرائیڈ پھر دل اور پھر پیٹے میں جو عضو ماؤف ہوتا ہے اسپرٹوڈین لگانے سے کہہ از رو رنگ ہو جاتا ہے
پھر اگر اسپرٹوڈین سلفیورک ایڈڈ والا جاوی تو سیاہ ہو جاتا ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ اعضا کی ماؤف کے
ریشہ البیومی نہیں ہیں بلکہ جاتے ہیں اور انہیں سے پوٹاسیم سالٹ اور فاسفورک ایڈڈ بہت کم ہو جاتا ہے
برعکس انکو سوڈیم اور کلورین سالٹ نسبتاً زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جگر او طحال ہوا طور پر بڑھ جاتے ہیں۔
اسکی تشخیصی علامات حسب ذیل ہیں۔ (۱) بہت سی اعضا کا اکٹھے ماؤف ہو جانا (۲) اون کو امراض سب سے بیشتر
مدتوں پیپ کا جاری ہونا یا کسی اور پرلے مرض میں مبتلا رہنا۔

علاج۔ شمر مع آثار میں مغویات فولاد کا ڈولورائل در عمدہ غذاؤں خاصہ البیومنس غذاؤں سے علاج
کرنا چاہیئے۔ چونکہ پیپ کو ساتھ پوٹاسیم سالٹ بہت خارج ہوتے ہیں۔ اسلئے پوٹاسیم بانی کا سب۔ یا
پٹاسی سلٹ سٹراس کا استعمال مفید اور ضروری ہوتا ہے۔

البیومی نیوریا Albuminuria پیشاب میں البیومین خارج ہونا البیومین ایک مادہ غذائی ہے
جو انٹے کی مفیدی کشتاہ ہوتا ہے۔ اسکی خاصیت یہ ہے کہ آنچ دینے یا ترشی ملانے سے جم جاتا ہے۔ قاروہ
کو اوہال کر دیکھیں مگر البیومین موجود ہو تو البیومین کا بادل سا جم جاتا ہے اگر زیادہ کثرت سے ہو تو تمام پیشاب
اسکی تلچٹ سے بھر جاتا ہے۔ ترشی ڈالنے سے یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اوہال یا نائیکرک ایڈڈ ملانے سے پیشتر یہ
دیکھ لینا چاہئے کہ پیشاب کما۔ ایسا زیادہ ترش نہ ہو۔ اگر کما رہا ہو تو مقدار نائیکرک ایڈڈ ملا دیں کہ خفیف سا ایڈڈ
ہو جاوی اور اگر زیادہ ایڈڈ ہو تو لایکو اور پوٹاسی ڈال کر اسکو خفیف ایڈڈ کر لیں ورنہ اوہ چیزوں کی تہ جم کر
البیومین کا دھوکا ہو جاوے گا۔ بعض البیومی نوزیا غصہ ذیل اسباب سے پیدا ہو جاتا ہے۔

(۱) انڈے اور البیومین والی غذاؤں کھانے کے بعد۔

(۲) نمک چھوٹے پینے کے بعد۔

(۳) سروبانی سے فصل کرنا۔

البیومی نوزیا کا مرض مفصل ذیل حالتوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اول پٹائیں خون مار الدم یا پٹ یا لف کو
دوم گردوں کا اجتماع خون سواہ بخار اور دم گرد چھانہ امراض خون شل پر پورا سکر وی سیلیڈ
نقرس۔ ذیابطوس یوکیا یا تشکالہ پر قان پنجم حمل ششم ہائش ڈیز ہفتمہ گردہ کو امراض منزلہ ہشتم
نوزیر میں کسی وجہ سے روک واقع ہو جانا نهم سکہ ہارہ۔ فاسفورس پیکھیا سلور نائیکرک کو دہر یا قضا
میں کھانے سے دهم امراض معدہ و جگر جن سے یا ضہ خراب ہو جاوی یا زخم گردوں کے اعصابی خلل میں
مثلاً سکر کی مرض ششخ۔ اپوٹیکسی۔ مرگی۔ سکرانہ۔ اور ایس انفیلک گسے میں کثرت البیومی نوزیا سے خون
ناقص جاتا اور تمام بدن نال ہوتا کتا یا اعضا اور ساختوں کی جمل یا سہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔

اس میں مقام گردہ پر سینک کریں۔ اور داخلی طور پر دھرت اور مقویات فولاد و کوئین استعمال کریں۔
 تشنم جبکہ کسی اور البیوس طوبت کرتے ہو جیسی میسٹل نور یا یا کالی نور یا وغیرہ میں انکو واسطے دیکھو علاج ان امر
 التوا فقرات میں داہنی یا بائیں طرف زوال آجانا۔ پانی تل کیر نیز کا بیان دیکھو۔

الطری لٹری Alternatives یعنی وہ دوائیں جو کل جسم یا خاص حصہ جسم کو بلا ہمال اور کثرت اور کسی خاص پتہ پر حالت
 صحت یا مریض عام طور پر اکثر کا نام مصفی خون محلات افزائندہ صحت مفید صحت وغیرہ۔ ان کو کئی اقسام ہیں۔

اول وہ آلے تو جن کو کسائل حصہ یعنی پلازما پر اثر کرتے ہیں مثلاً پلاسما ایوڈائیڈنگن ایک ہڈیوں سے شہابی رکیں
 سیلی سیلیس چھلی کا تیل سوڈیم پیسیٹیم کلسیم اور گلیسیریم کے ساتھ تمام ایڈز یعنی جو صفات دوسرے آلے تو جن کا اثر
 خون کو وائٹ کالینیز پر ہوتا ہے مثلاً کوئین اور سے ٹریلایر وٹیکس وغیرہ۔ دوسرے وہ آلے تو جن کا اثر خون کو ریڈ کالینیز
 پر ہوتا ہے مثلاً ایوڈائیڈنگن ایک کونین۔ الکمال سوڈیم نائٹرائٹ سپرٹ آف نائٹریک ایسڈ۔ آرسنک۔ فاسفس
 آئرن ٹرینٹائن آئل۔ ایسڈ ہائیڈرو سائٹک الیوٹ۔ یارنارک ایسڈ اور سائیکل ایسڈ وغیرہ چھارہ وہ آلے تو
 جن کا اثر مایا بولزم یعنی جسم پر دھڑل اور زوال ہوتا ہے مثلاً پارہ۔ فولائی مونی۔ فاسفورس سم الفار گندہ کیمیم سلفائیڈ کیمیم مانی پو
 فاسفس۔ گکایک۔ انت مول میزیرین۔ جینہ کیفین۔ گارینا کوکا۔ ایسڈ سیلیک وغیرہ پنچم وہ آلے تو جن کا اثر خاص خاص
 ہوتا ہے مثلاً رائل باکم کو بائیو ایوڈائیڈنگن الکمال ریڈن اور تیل گندہ کالینیز اور کیمیم تفصیل کلیہ دیکھو بیان خون اور مایا بولزم کا۔

الستونیا اسکالرس Alstonia Scholaris دیشا باک۔ ڈیوین جنہی میں سکون شانا ہے جس میں سنو بارک طرح اثر
 کی چھال قوی یعنی پیراٹوک ہوتا ہے کھارات نوبی اور زیر ہمالیہ چینس منہ میں نہایت مفید ہے۔ ڈیوین جو اس منہ کی چھال میں ہو گا لاجا جائیے
 فواید اور خوراک میں کوئین کی بلکہ ہو لیکن کوئین کو ضرر ہے مثلاً بہرہ من گرائی سر بخوابی۔ بے چینی وغیرہ سوری سے

خمر سفوف (چھال کا) ۲۰ گرین سے ۶۰ گرین تک۔ فلوئیڈ کشرٹ ۲۵۰ ایوڈائیڈنگن۔ ڈیوین این ایوڈائیڈنگن۔
الستونیا کونستریکٹا Alstonia Constricta دوسرا نام اسکا اسٹریلین یا کوئینس لیڈنیز بارک

نہایت عمدہ قوی ناغ و متخلع۔ ناغ کھارات نوبی اور قلع کرہ ہو۔ کوئین اور دھس و اسکال مجموعی تاثیرات اپنی اندر رکھتا ہے۔
 خمر چھال کا سفوف ۳۰ گرین تک۔ ٹنگر پ ۲۰ ڈرام تک۔ فلوئیڈ کشرٹ ۳۰۰ ایوڈائیڈنگن۔
السرز Ulcers یعنی زخم۔ دیکھو بیان زخون کا۔

الستی یا لئیڈ۔ عام طور پر پلٹون میں استعمال کیجاتی ہو۔ اسکا پلٹس نہایت عمدہ ایوڈائیڈنگن ہو طلی جو جگر سے نکلتا ہے یا ہموڈ
 لائم وارڈ کو ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے اسکا نام کیرن آئل ہی بطور حقہ استعمال کرنے سے سہل اثر پیدا کرتی ہے۔
 جب اسکا فیوزن پلا یا جاتا ہے تو بطور ایکے تالو اور گلو کی جھلی پر لگ کر خرم کو رن کرتا ہے اس طرح گلو کی تھانی میں مفید
 ہو اور پیشاب کی نالیوں پر بھی اسکا اثر ویلنٹ ہوتا ہے اور پرانی کھانسی سوزاک و سوزش شانہ وغیرہ میں مفید ہے خون
 کی رجن لیکر نیزی نائٹ کی بہت میں گردوں و خلیج مٹی ہوتی اور اسی کرتی ہو۔ اسکا فیوزن سب ضرورت جلا سکتے ہیں۔

الکھال Alcohol یعنی شراب خارجی استعمال میں الکھال بطور اینٹی سیک۔ ڈرل انٹیکسٹ

ریفریجریٹ ہسٹی مولٹ اور روبی فیشنٹ کی استعمال کیا جاتا ہے۔ دلیبی جی سراج اکثر سخت ضربات اور زخموں کو شفا سے دھو لے ہیں۔ اس طرح سے یہ تمام ہوائی نہروں کو مار دیتا اور صاف کر دیتا ہے۔ ضرب خوردہ ساختوں کو جلد مضبوط کرتا اور بخیر سے سردی پہنچا کر ورم کو روکتا ہے۔ ہسپتالوں کی ممری اور کار بالک لوشنوں وغیرہ کا نہایت عمدہ فائدہ تمام بوسیدہ برائ ورم کو روکنے اور کئی اور کچلی ہوئی ساختوں کو سخت اور مضبوط کر دینا ہے۔ انہی بڑے بڑے سالم جلد میں ضرب ہو سکتا ہے اور اسی بنیاد پر فیشنٹ اوپیم اور نمٹ بیلڈونا وغیرہ استعمال کی جاتے ہیں۔ مالش کر کے نہایت بخیر بردورش کو زیادہ کرتا ہے۔ بلطو لرنٹ کفر نمٹ سوپ وغیرہ پرانی سوزش۔ ہڈیوں کے ورم جوڑوں کی سختی میں اسکی مالش مفید ہوتی ہے بعض اوقات اندرونی تکلیف و خراش رفع کرنے کے واسطے دشا کرانک برا کالی ش میں بطور لوکل روبی فیشنٹ بھی اسکو استعمال کرتے ہیں۔ اوی پریٹنگ لوشنوں میں بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔

جب پلا جاوے تو اول منہ کا اندر فوراً گرمی سوزش اور ایک خاص قسم کی تیزی پیدا کرتا ہے اور اگر غصہ و دیر نہ ہو رکھا جاوے تو اپنی صلیب سخت اور سفید رنگ ہو کر احساس کم ہو جاتا ہے۔ ہر طرح سے مختلف قسم کی سوزش دہن اور دانتوں کو درد میں مفید ہے۔

شراب جی کسی خوشکوار صوفیہ پی جاتی ہے تو جو اس کے خوشگوار ذائقہ۔ بو اور تیزی کے فائدہ کی لذت زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ ہشتما طرقتی اور منہ اور معدہ کے افعال باضمانہ تیز ہو جاتے۔

معدہ پر الکمال کا اثر کئی طور پر ہوتا ہے۔ اول تو معدہ کی رطوبات و غذا وغیرہ سے ملکر کچھ حصہ کا ایسی ٹانگ اور لڈی ہائیڈر جاتے ہیں۔ اور پین پیٹوٹز اور پروٹینڈز بھٹ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے یہ باضمانہ گت کرنا۔ دوم یہ کہ معدہ کی میکس ممبرین پر تیزی کر کے اسکی کچھ کے دوران کو تیز اخراج و عروق باضمانہ اور حرکات معدہ کو زیادہ کرنا اور شہما کو بڑھانا ہے۔ اس طرح سے تھوڑی مقدار میں باضمانہ کا اعلیٰ درجہ کا مدد اور محالوں ہے۔

بڑے بڑے شہریوں پر لے بیاروں اور محنتی طالب علموں میں جبکہ باضمانہ ضعیف ہو گیا ہو بطور دوا استعمال کرنا نہایت مفید ہے۔ سوم معدہ سے ریفلیکس طور پر اسکا اثر دور دور پہنچتا ہے۔ قلب کی حرکات تیز ہو کر لڈر پر تیز زیادہ ہو جاتا ہے۔ طبیعت بشاش اور قوی تر معلوم ہوتا لگتی ہے۔ تمام اعضا میں خون زیادہ پہنچانے کے افعال میں تقویت اور تیزی ہوتی اور جلد گرم معلوم ہونے لگتی ہے۔ لیکن اگر زیادہ مقدار میں شراب پی گئی ہو تو بھلا اس بشاشت اور تقویت اعضا کے فوراً کالی اور حسنی ظاہر ہوتی ہو اور بعض اوقات فوراً صدمہ پہنچ کر مہجی جاتا ہے۔ بعض قسم کو درد معدہ و اسما۔ فغ تشنج۔ اختلاج الغلب۔ بستی دماغ اور سردی کا احساس جو کزوری سے ہوں فوراً پیسے ہی ریفلیکس طور پر منع ہو جاتے ہیں۔

خون میں الکمال زیادہ تر اپنی اصلی ہیئت میں اور کچھ لڈنے ایڈڈ ہوتا ہے۔ اور کچھ حصہ اسکی ایسی ٹانگ ایڈڈ ہوتا ہے۔ خون میں ملکر کسی خلیش کو کم کر دیتا ہے۔

خون سے تمام اعضا میں اپنی اصلی ہیئت پر پہنچ کر تین قسم کے اثر پیدا کرتا ہے۔ اول اگر تھوڑی مقدار میں پیانے ہو تو کار بالک لڈ

اور پانی تبر حرارت غریزی کو مدد دیتا ہے جسے ایک قسم کی غذا بھی ہے۔ لیکن اگر زیادہ مقدار میں پیا گیا ہو تو یہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ فوراً اگر وہ بیشش اور جلد کے سبب خراج ہو جاتا ہے۔ یہ بہ یاد رکھنا چاہیے کہ دیگر کاربائیڈریٹس جسے شکر نشاستہ اور چربی وغیرہ کی طرح جزو بدن نہیں بنتا بلکہ محض حرارت اور قوت میں مدد دیتا ہے۔ دوسری اشیاء کی غذائیت اور قوت کو کم کرتا ہے۔ اس طرح سے کہ اول تو کبھی کم جذب ہونے لگتا ہے حرارت کم ہو جاتی ہے اور جسم کے اجزاء بکالے مصلع ہونے کو چربی میں بدل دیتا ہے جو جاتے ہیں اور بدن فرو ہو جاتا ہے۔ اخراج کو زیادہ کر لیتا ہے۔ کاربانک ایسڈ وغیرہ کم ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ جسم کی ساخت کو زائل اور مصلع ہونے سے روکتا ہے اسلئے اسکو بخاروں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ نسوم سٹیل خوراک میں تمام جسم کے دوران خون کو ترقی دیتا ہے۔ یہ اثر شروع میں ریٹیکس طور پر اور بعد میں قلب اور شریانوں کو متعلق اعصاب و اعصابی مرکوزوں اور کئی ریشوں کو تحریک ہو کر ہوتا ہے تمام جسم کی ارادی حرکات تیز ہو کر اور بھی ترقی دوران میں مدد دیتی ہیں لیکن زیادہ مقدار میں ہونے سے اسکا اثر برعکس ہوتا ہے یعنی حرکات قلب اور دوران سست ہوجاتے اور بعض اوقات فوراً حرکت قلب بند ہو کر موت واقع ہوجاتی ہے۔ نظام عصبی کو معتدل خوراک میں تحریک اور تقویت دیتا ہے جس سے دماغی قوائی تیز طبیعت شاد و نشاط اور حواس جسم کی قوت زیادہ ہو جاتی ہے۔ خاص کر قوت لطف اور حرکت تیز ہو کر طرب آمیز کلمات اور حرکات کی طرف طبیعت زیادہ زور کرتی ہے تمام جسم کی قوت زیادہ اور ہر قسم کی خواہش غالب ہونے لگتی ہے۔ زیادہ مقدار میں پینے سے تھوڑی دیر کے لئے یہ تمام اثر زیادہ تر تیز ہوجاتے ہیں لیکن پھر برعکس علامات ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ قوائی عقلی غبی حواس ظاہری سست حرکت و لطف کمزور ہو جاتا ہے تنفس میں دقت اور دوران خون میں کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ فشار دمگاتی ہاتھوں اور ٹانگوں میں لرزہ اور اکثر بیٹھنا اور کھڑے ہونا محال اور بعض اوقات ہر قسم کی حرکات ناممکن ہو جاتی ہیں اور مریض دفعتاً دوران تنفس بند ہو کر مر جاتا ہے نظام عصبی پر شراب کا اثر کچھ تو بواسطہ دوران اور کچھ بلا واسطہ ہوتا ہے۔ دیگر اعضا اور افعال جسمی پر اسکا اثر اعلیٰ بواسطہ دوران یا اعصاب ہوتا ہے مثلاً عضلات و ریش۔ حرارت جسمی مصلعہ ذیل وجوہات سے کم ہو جاتی ہے (۱) عروق جلدی میں خون بکثرت پہنچ کر تخییر زیادہ ہونے سے (۲) زیادہ تنفس (۳) کمی تغذیہ (۴) زیادہ مقدار میں عام کمزوری کی وجہ سے سگریہ یا دوسری کہ چونکہ جلد میں خون زیادہ جاتا ہے اسوجہ سے احساس گرمی زیادہ معلوم ہوتا ہے اسلئے دوسری میں اسکا زیادہ نقصان ہے۔

خاص فائدہ اور استعمال الکمال کے حسب ذیل ہیں۔

اول جسم کو زائل کرنے والی بیماریوں مثلاً بخار میں بلیڈیم ٹریٹمنٹ۔ لکیوٹ مانیا وغیرہ میں اس غرض سے دیا جاتا ہے کہ جسم کا زائل ہونا کم ہو جاوے معدہ متعلقہ و عصاب کی قوت قائم رہے اور حرارت زیادہ نہ ہو۔

دومہ جبکہ نبض نہایت کمزور اور رقیق ہو اور حرکت قلب بند ہو کہ موت کا اندیشہ ہو مثلاً غشی جریبان خون مدہ وغیرہ میں ایسی حالتوں میں شراب نہایت عمدہ سٹی مولٹ ہی مگر یہ یاد رہے کہ قلب کی پرانی آگینک ڈھنڈھ مثلاً فیٹی ڈیجینریشن، ڈائی لے میشن وغیرہ میں اسکا استعمال نہایت احتیاط کرنا چاہیے۔

سومہ اعصابی کمزوری، بالیجولیا، اڈاسی، اور سرگردانی جو زیادہ تفکرات اور محنت یا عادت شراب سی ہو نیز اعصابی دردوں، ہیٹیریا اور ہیجوالی میں، ایسی بیماریوں میں شراب ضرور فائدہ کرتی ہے لیکن اسکا استعمال میں نہایت احتیاط چاہیے ورنہ مریض کو عادی طور پر شراب پی کر کاہانہ بجاتا ہے۔

چھارمہ چونکہ اعتدال کے ساتھ استعمال کرنے میں اسکا زیادہ تر حصہ کاربانک ایڈ اور پانی بنکر خارج ہو جاتا ہے اور محض تقریباً فیصدی حصہ خالص طور پر خارج ہوتا ہے، اس طرح سے سپرٹس، اور وائینز، مر اور معرق بھی ہوتے ہیں یہ اثر جن اور بیر میں خاص کر دیکھا جاتا ہے۔

صورت استعمال عام استعمال کیلئے خالص کلیئرٹ، ہاک، نہایت عمدہ ہیں۔ گائٹ، شیمپین، اولڈ جن، وہکی، پورٹ شیرری، ڈارہ وغیرہ بھی حسب موقعہ استعمال کر سکتے ہیں۔ انکی عمدگی اس بات میں ہے کہ فیوئل ٹیل یعنی پروپیل، بیوٹل اور ایل الکھل نہیں نہ ہو۔ اسکی شناخت اسطرح ہے کہ تھوڑا سا الکھل ایک تھیلی پر ڈال کر دونوں تھیلیاں ملی جائیں۔ اگر فیوئل ٹیل موجود ہے تو سونگھنے سے اُس میں ایک خاص قسم کی بدبو معلوم ہوگی۔ ورنہ تمام الکھل صاف اڑ جائیگا اور کوئی بدبو باقی نہ رہے گی۔ لیکن یہ محکم لکرس اور وائینز کے لیے کام نہیں دیکھتا کیونکہ انہیں اور خوشبودار اجزاء ملائے ہوئے ہوتے ہیں۔ آمیزش پانی کی اسطرح سے تیز کی جاتی ہے کہ ایک چھوٹی پیالی میں قد سے بار دو رکھ کر اسپرٹ ڈال دیا جوی۔ اور تب سپرٹ کو آگ لگا دیا جوی اگر سپرٹ خالص ہے تو تمام جاکر بار دو کو اڑائے گی۔ اور اگر پانی موجود ہے تو بار دو کو آگ نہیں لگے گی۔

الکھل الزم - Alcoholism اس کو مراد وہ نقصانات اندرونی اور علامات فاسدہ ہیں جو حرکت شراب سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ فسادات چار طرح سے پیدا ہوتے ہیں اول شراب کی خراش اور سوزش سے دوم شرابی اعصاب کو ذریعہ سے سوم اور نہروں کی وجہ سے جو شراب سے پیدا ہوتے ہیں چھارمہ جسمانی نشوونما اور افعال تحلیل و تخریج میں خلل آنے سے یہ فسادات دو قسم کے ہیں۔ اکیوٹ اور کرائیک۔ اکیوٹ الکھل الزم میں مفصل ذیل حالتیں شامل ہیں (۱) معدہ اور انشڑوں میں سوزش اور نزلہ حادث جانا، پیوشی، ڈی ریم ٹرنیس کی بعض قسمیں۔ اکیوٹ مایا اور اکیوٹ میلنکولیا کرائیک الکھل الزم میں یہ حالتیں شامل ہیں اجتماع خون، اعضا اور دیگر ساختوں میں جربہ بن جانا، ڈی ریم ٹرنیس کے اکثر اقسام، بہت سی اعصابی امراض کرائیک، ڈیٹنشیہ۔

اب ذیل میں چند حالتوں کی کیفیت مختصر بیان کی جاتی ہے (۱) اکیوٹ انشڑی کشین شراب کی بہت سی اسحالت میں طرح طرح کے طرب آمیز خوش پیدا ہوتا اور خود بخود رنگانگ نظارہ نظر آتے ہیں، اگر بعد میں طاری ہوتی ہے، بعد کے مقام پر دبائے سے مدہ معلوم ہوتا

جی تھلا اور قوت آتی ہے۔ سرگھومتا اور درد کرتا ہے۔ نظر و حنکلا اور بعض اوقات یرقانی ہو جاتی ہے۔ زبان سلیکی بھوک نادر اور پیاس شدید چہرہ پھیکا اور زرد اور عام ضعف و نقاہت غالب ہو جاتے ہیں۔

(۴) اکیوٹ الکلی الکلی کو ما۔ شراب کی بیہوشی بخفیف حالتوں میں مریض پر دیتے تک نشہ کچھ حالت طاری ہوتی ہے مگر سخت حالتوں میں قطعاً بیہوش ہو جاتا ہے ارادی حرکت کی طاقت نہیں رہتی۔ سانس خزانوں کو ساتھ آتا۔ آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی اور بعض اوقات غیر مساوی ہو جاتی ہیں۔ جلد ٹھنڈی اور چپ چپی اور حرارت صحت سے کم ہو جاتی ہے۔

(۵) کرائمک الکلی الکلی کو ما۔ اسکی علامات حسب ذیل ہیں۔ رعشہ لرزہ۔ بد خوابی۔ کانوں میں گنجاہ خفیف درد اور گرانی سردوار۔ نقص بصارت۔ آنکھیں زرد و منہ سی بدبو۔ آشوب اور دوسرے بعض اوقات چہرہ پر سرخ پھنسیاں برآمد ہو جاتی ہیں۔ اکثر غشیان اور قے غالب ہوتی ہیں۔ رفتہ رفتہ سر و سس آن لیا

برائیس ڈیزیز۔ اسہال مزمنہ فیٹی ہارٹ کی علامات یک دفعہ یا یکے بعد دیگرے شروع ہو جاتی ہیں۔

(۶) ڈی لی ریٹم ٹری ٹنس۔ ہڈیان الخمر کبھی تو شراب کا ہڈیان دفعتاً شروع ہو جاتا ہے مگر اکثر مدت شراب نوشی کے بعد شروع ہوتا ہے اور عموماً اسباب ذیل میں سے کوئی اسکا محرک ہو جاتا ہے۔ تردد و محنت۔ ناگہانی صدمہ۔ دھوپ لگنا۔ فاقہ کشی۔ ضرب بخار یا کوئی مرض پہلے صدمہ میں گرانی معلوم ہوتی

ہے اور کسی چیز کے کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ پھر سنجینی اور گھبراہٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں میں رعشہ معلوم ہوتا۔ زبان بولتے ہوئے لرزتی جلد ٹھنڈی اور پسینہ سے تر ہو جاتی ہے

ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے نبض نہایت نرم اور کمزور پڑ جاتی ہے۔ نیند ہوا ہو جاتی اور اگر تھوڑی دیر کے واسطے خواب ہو بھی تو مشتاک نطائے مثلاً اسانپ بچھو بیٹریا وغیرہ دکھلائی

دیتی ہیں۔ بیداری میں طرح طرح کے متوحش خیالات پیدا ہوتے اور کانوں میں خود بخود آوازیں سنائی دیتی اور حشمتناک چیزیں نظروں کو سامنے آتی ہیں عزیزوں اور طبیعوں سے بظنی پیدا ہوتی اور دوست دشمن نظر آئے لگتی ہیں۔ دل ڈوبا ہوا یا حلق کھٹک اور سانس بند ہوتا معلوم ہوتا ہے

اگر جلدی تخفیف نہ ہو تو بھی خیالات بڑھ کر خود کشی تک نوبت پہنچا دیتے ہیں۔ آخر کار مکان ہو کر نیند غالب ہو جاتی اور مرض کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ بیداری کے بعد سخت ضعف معلوم ہوتا ہے۔

(۷) الکھانک التسنینی ٹی۔ کثرت شراب سے مفصلہ ذیل اقسام کے جنون پیدا ہو جاتے ہیں (۱) اکیوٹ مائیا (۲) اکیوٹ مائلکولیا (۳) کرائمک ڈیٹنشیاد (۴) جنون الخمر۔ اکیوٹ مائیا میں مریض دوسروں کے

لسنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اور اکیوٹ مائلکولیا میں خود کشی کو دوا پیدا ہوتے ہیں جنون الخمر میں یہ ہوتا ہے کہ مریض شراب ہی شراب پکارتا ہے جب قدر پینا چلا جائے اسے بقدر اور مانگتا ہے کسی حد پر نہیں

کرتا یہ حالت اکثر دورہ سے ہوتی ہے۔ ایام وقفہ میں مریض پارسائی کے ساتھ زندگی گزار دیتا ہے

مگر جب یہ جنون زور کرتا ہے تو پھر کوئی حد نہیں چھوڑتا۔ اگر انک ڈیمیشیا میں تمام قوتیں عقل و خلاقیت ناقص اور خراب ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تفصیل کے لئے دیکھو بیان اسپینیٹی اور ڈیمیشیا کا۔

علامہ ج۔ اکیوٹ کیسٹرائیٹس میں ٹیگرم پانی بکثرت پلانا چاہیے اور پھر کوئی ممکن مہل و کیرسٹنہ اوپیم ہائڈرو سائنک ایڈ وغیرہ سڈے ٹوڑ استعمال کرنے چاہئیں شراب ہی پر پزیر ہو اخوری کلیمید میں رشتہ بخود پزیر ہو اکیوٹ کو ماکہ حالت میں محدہ کو فوراً اسٹاک پمپ یا قوی اور دواؤں سے صاف کر دینا چاہیے۔ چہرہ پر پانی کے چھینٹے دینا۔ ٹانگوں پر رانی کی مالش کرنا۔ گرم بوتلیں لگانا مفید ہوتے ہیں۔ مریض کا سر اونچا رکھ کر اسکو سر دیانی یا برف سے سرد رکھنا چاہیے۔ اور باقی جسم کو گدے اور پنڈلیوں پر رانی کا پلستر مفید ہوتا ہے۔ ڈیلیئم ٹریمینس کا علاج حسب حالت مریض کرنا چاہیے جو انوں میں جبکہ ڈیلیئم ٹریمینس پہلی دفعہ ہوا ہو شراب و مطلقا پر پزیر واجب ہو ہلکی زود ہضم غذا مثلاً دودھ دینا چاہیے۔ خفیف مہل و کیرٹار نار ایسٹک پے گرین کی خوراک میں استعمال کریں۔ اگر رات کو نیند نہ آتی ہو تو برومانڈ آف پوٹاسیم و کچھ اوپیم کلورل ہائڈریٹ سلفوئیل۔ پارالڈی ہائڈ وغیرہ خواب آور ادویہ کافی طور پر ایک دفعہ یا لکئی دفعہ حسب ضرورت دین۔ مریض اندر میرے میں ہے۔ کسی قسم کا شور و غل اسکے قریب نہ ہو۔ اگر زیادہ شراب نوشی ہو وقتاً ڈیلیئم ٹریمینس کی علامات پیدا ہوتی ہوں تو محدہ کو فوراً ٹیگرم نمک پانی یا اسٹاک پمپ سے صاف کر کے ایک مہل و کیرٹار دینا چاہیے۔ ٹیگرم ٹریس ۵ ہونڈ ٹیگرم کیپی کم ۱۰ ہونڈ سپرٹل ٹیگرمس نائٹروسائی نصف ڈرام لکوا کفری ایک اونس یکسپرٹل تین گھنٹہ بعد پلاویں۔ اسکی ایک یا دو خوراک کو بعد مریض کو تکلیف ہو کر نیند آجاتی ہے۔ سن سیدہ مریضوں میں خفیف مہل و کیر اور ادویات کا استعمال شروع کریں۔ ہلکی زود ہضم غذا مثلاً دودھ بخنی نیم برشت بھینہ قلیل مقدار میں بار بار دیں۔ شروع میں سچا ابی روکنی کے لئے کثرت غذا سے ہی کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ سڈے ٹوڑ کا استعمال ضعیف لوگوں میں اندیشہ ناک ہوتا ہے۔ لیکن اگر بے خوابی کی وجہ سے سخت بچھینی ہو تو امر لا چاسی کو ٹیگرم اوپیم دے سکتے ہیں جبکہ گردہ دل و صمچ پزیر سالم ہوں تو دو سے سڈیوز کی نسبت اوپیم بہتر ہے۔ اگر ضرورت ہو تو اوپیم براڈی یارم وغیرہ کو ساتھ لے کے ہیں۔ اگر عشتی نیو مونا۔ یا محدہ کی علامات ہوں تو سٹی مولشٹن زادانہ طور پر دینا چاہئیں ہر قسم کے شور و غل اور انقلاب و مریض کو دور رکھیں۔

کرانک الکالزم میں سب سے مقدم یہ امر ہے کہ نہایت سریع الہضم غذائیں مثلاً کارٹا سوپ و دودھ بھینہ خام یا نیم برشت وغیرہ سے شراب کی تلافی کی جائے۔ ادویات میں ٹیگرم ٹریس مثلاً انکس و امیکا۔ کوٹن جنشین بکلیا وغیرہ کا استعمال کا سینے ٹوڑا دویہ مثلاً سپرٹ کلور فارم ۲۰ ہونڈ یا کیپی کم وغیرہ کو ساتھ مفید ہوتا ہے۔ اگر معدہ میں خراش ہو تو کھاسی ادویہ۔ ہائڈروسائیٹک ایسٹک کے ساتھ پلانی چاہئیں۔ جگر اور اسٹریوں کی حالت کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ بیجوا ابی کے لئے پوٹاسیم برومانڈ اور کلورل ہائڈریٹ

الکھانک النیسینی فی مین شراب می پر مہیز نہایت لازی امر ہے اور باقی علل و عام طور پر نسہ کی فی ذکر ناچا تھو۔

Alcoholism, Chronic

دوڑ میں پندرہ سنٹ کے بعد پانچواں میک اور چھٹا دوڑ کہ دوڑ گزرا ہوا اور موجودہ دوڑوں کی جگہ
ایک نیا کاروبار اس سرک میں ملا کر دیکھتے ہیں مانی کو کاٹتے ہیں۔ مانی بچکاری جی بہت جلد امریکی سی

دیکھو بیان الملحاح الزمہ کا۔

وہی جو بیان انکی الزم کا۔

الکلیں کی طرح سب نے ٹھن مپ کو نیا مار دیتے اور ایڈ کے ساتھ سالٹ بناتی ہیں مثلاً سیلی سین۔ نا۔ کوٹین۔ اور غیر
کوئی تین۔ سرکینین۔ کو نیا۔ بروشیا۔ مارفین۔ کوٹین وغیرہ ان کے نام کے اخیر میں ی۔ ن۔ یا ی۔ ا۔ ہوتے ہیں۔
ان کا بیان اپنے اپنے موقع پر کیا جائیگا۔

شیم-بیریم اور سیریم کے ساتھ شامل ہیں۔

اس کا پھل در اور محک جگر ہے۔ وقت پیشاب۔ سنتھا۔ اور فی الدم میں مفید ہے۔ ختم ٹکچر ایک ۲۵ ڈرام
تک پھل ۵ عدد تک۔ پانی یعنی عرق لے ۲ اونس تک۔

اور سترکینا کو نشہ میں نالغ ہے۔ یہ پیشہ یا دمہ۔ ہونچک کف۔ انجائنا پیکٹورس۔ ام الصبیان۔ درمعدہ اور
برو اعصاب میں استعمال کیا جاتا ہے

یہ قطرہ کے کیسپول یعنی گویان بنا کر کھلائی جاویں۔

Alain
Ales

مخرج صفرا اور سہل قولون ہو بہ تمام سہلات میں ہی نہایت طبی الاثر سہل ہو دس یا پندرہ گھنٹہ کو بعد عموماً سہال شروع ہوتے ہیں۔ زیادہ مقدار میں دینی سے متقد میں سوزش اور خونی اسہال ہو جاتے ہیں۔ اعضاء پیلوں بینی متقد۔ ضم۔ اور مثانہ وغیرہ میں اس سے کھینچن جو کرمیورسیا۔ اور ارجھیل اور بواسیر ہو جاتے ہیں جبکہ قولوں کی اینیسیا یا کمزوری کی وجہ سے دائمی قبض رہنا ہو تب اسکا استعمال مفید ہوتا ہے۔ بہہ برخلاف اور سہلات کو ہضم کو تقویت دیتا اور دائمی استعمال میں کوئی نقصان نہیں کرتا۔ اس لیے قبض دائمی میں نہایت مفید ہو۔ لیکن اگر سوزش متقد یا بواسیر یا مینوریجیا یا حمل موجود ہو تو اسکو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

جوان لڑکیوں کی کمزوری لیے نور ہیا اور قبض میں الزوا اور آئرن کی گولیاں نہایت مفید ہیں بطور حقنہ استعمال کرنا مخرج کرم ہے۔ خرم الوانین پے سی ہ گرین تک۔ الزوم سے ہ گرین تک۔ پلو لا الزوائٹ فری ہ سی ہ گرین تک اکثر الٹ الزوم سے ہ گرین تک۔ اینما الزوم الزوم ہ گرین۔ پٹاسی کاربوناس ہ گولین میسلیج آف شاپ۔ اونس ہونے ہیں پلو لا الزوم ہ سی ہ گرین تک۔ ٹیکچر الزوم سے ۲ فلوئڈ ڈرام تک۔ بار بار کی خوراک میں پلو ڈرام سے ۲ فلوئڈ ڈرام تک

الی سیم نیم **Elatarium** | یہ سب سے تیز یا ڈسے گاک پر گے ٹو ہے۔ پے سی ہ گرین کی خوراک میں لہجہ الی سیم نیم **Elatarium** پانی سے دست بڑی تکلیف اور سوزش کے ساتھ آتے ہیں۔ اسکو ڈرہی اور یو رسیکی حالت میں استعمال کرتے ہیں۔ دماغی کھینچن اور سخت قبض میں بھی جلدی فراغت کی غرض سے استعمال کرتے ہیں۔ خر الی ٹیم پے سی ہ گرین تک۔ اٹوٹیم پے سی ہ گرین تک۔ پیوس آئرنی کو پے سی ہ گرین تک الی ٹرس فی ری نوزا۔ **Aletris Farinosa** اسکو ٹو یونی کارن۔ کالک روٹ

اور سٹار گراس بھی کہتی ہیں۔ اسکی جڑ ستوی سدا اور قاطع کرم ہے زیادہ مقدار میں آوند اور تیز سہل ہے۔ رحم اور اعضاء تناسل کو تقویت دیتی ہے۔ استقاط پر ڈیسیس پوٹرائی لیے نوزیا۔ ڈسے نوزیا بہہ ہضمی اور بانجھ پن میں استعمال کی جاتی ہے۔ خر۔ سفوف۔ اگرین لے ٹرین پے سی ہ گرین تک۔ فلوئڈ اکثر الٹ ۱۰ سے ۳۰ بونڈ ٹیکچر پے سی ہ ڈرام اکثر الٹ اسے ہ گرین تک۔

الی سیم انانی زیم **Illicium Anisatum** یہ ایک قسم کا چینی درخت سونف سی چین میں اسکی سونف سے روغن نکالتے ہیں دیکھو سونف کا بیان۔

الی قنطاری **Elephantiasis** جب یہ مرض ٹانگ اور پاؤں میں ظاہر ہوتا ہو تو اسکو فیل پاکہتی ہیں۔

اس مرض میں جلد اور اسکے نیچے کی ساختیں موٹی ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تر ٹانگوں اور باہوں۔ اور اعضاء ذوالدین ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی غدد اور عروق جاذبہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ بخار بار بار ہوتا رہتا ہے۔ چونکہ پاؤں یا ٹانگ میں کثرت سے ہوتا ہے جو اسقدر موٹی ہو جاتی ہیں کہ انھی کو پاؤں کی مشابہت ہوتی ہے۔ اس لیے اس مرض کا نام ہاتھی پن اور فیل ہمشور ہو گیا۔ ہندوستان جزیرہ ملایا چین مصر عرب اور جزائر غرب الہند میں یہ مرض ہوتا ہے۔

سندر کے قرب میں زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی اس مرض کے ضمن میں خالی ٹار یا سینگوئیٹس۔ ہومی لٹس بھی دیکھا گیا ہے۔ ہاتھی کی ٹانگ کی طرح جلد نہایت موٹی۔ کھرری ہو جاتی اور اس میں تل پڑ جاتے ہیں۔ پادوں اور اونگی اونگیاں بڑھی ہوئی جلد کے اندر چھپ جاتے ہیں۔ فوطہ اس قدر بڑھ کر ہوئے دیکھے گئے ہیں کہ من سوائمن ٹکٹ من ہو گیا ہے۔ اندام نہانی کے لب بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔

اس کی ابتدا اکثر اس طرح پر ہوتی ہے کہ عام پچھلی ہو کر تیز بخار ہو جاتا ہے۔ پھر کمر۔ ران۔ اور رخصوں میں درد ہو جاتا ہے۔ فوطہ سو بکر ادنیٰ پانی پڑ جاتا ہے ساتھ ہی غلیان۔ اور تپ ہو جاتے ہیں۔ جلد متورم ہو کر اداس کے مساموں میں بھی پانی پڑ جاتا ہے۔ عروق جاذبہ بڑھ جاتے اور متورم ہو جاتے ہیں۔ متورم حصہ سے کہیں دودھ کے مشابہ کبھی پانی پاپ کے مشابہ رطوبت نکلنے لگتی ہے۔ اور کبھی شش میں چھوٹی چھوٹی چھبیاں یا چھالہ بھی ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ مرض نامعلوم طور پر شروع ہو جاتا ہے اور حد سے زیادہ بڑھ کر مریض کو تنک کر دیتا ہے اس کو بڑھنے کی رفتار کبھی بہت تیز ہوتی ہے۔ اور کبھی سست پڑ جاتی ہے۔

علامہ۔ اس کا علاج دو طرح پر ہے۔ ایک تو علامات کا درجہ اعلیٰ مرض کا شروع میں اکثر بخار۔ درد اور کمزوری ظاہر ہوتے ہیں۔ جس پر وجہ قواعد کلبہ بخار کا علاج مسہلات۔ مدرات۔ معرقات اور کوئین آرسنک الیکٹریسیٹی وغیرہ سے کرنا چاہئے درد کا دھبہ انہوں سے اور کمزوری کا علاج مقدمات فوٹا و سے استعمال درم کو دور کرنے کے لئے کوئی اندرونی علاج قبل اعتبار نہیں۔ آیوڈین۔ آرسنک۔ اور آئسرن اکثر استعمال کئے جاتے ہیں۔ مقام درم پر۔ پیر آیوڈائیڈ آف مرکری آئنٹ منٹ۔ بجلی۔

الیکٹریسیٹی۔ الائنک بیڈنچ سے دباؤ دینا۔ بڑی شریاؤں کا جو اس درم میں آتی ہیں بانڈھ دینا برف لگانا۔ ماؤف حصہ کو اوپنا کر کنا مفید ثابت ہوئے ہیں۔ جس جگہ ممکن اور مناسب ہو اوپر بڑھنے سے تمام زائد بالبدل کاٹ ڈالنا چاہئے۔ شروع میں سب سے پہلے اور ضروری علاج یہ ہے۔ کہ آب و ہوائی تبدیلی کرادجائے۔ یورپیوں کو جب ہندوستان میں رہنے سے یہ مرض دانگیس ہو جاتا ہے تو شروع میں یورپ واپس ہو جانے سے رفع ہو جاتا ہے۔

اعضائے تناسل کو ارض خانی میں جراحی کا عمل نہایت مفید ثابت ہوا ہر طریق عمل حالت مرض کے مطابق تجویز کرنا چاہئے۔

الیکٹریسیٹی Electricity یعنی بجلی۔ مصنوعی تین قسم ہوتی ہے۔

(۱) فرضل جو گڑے پیدا کی جاتی ہے اس کو شے ٹی کل اور فرنک لینک بھی کہتے ہیں۔ طاقت

میں اب اسکا استعمال نہیں کیا جاتا۔

(۲) میگنیٹک الیکٹرک کرٹ اسکوفراڈک یا انٹر پڈ بھی کہتے ہیں۔

(۳) گیلونیک اسکواٹراک اور کسٹ بھی کہتے ہیں۔ گیلونیک اور فراڈک میں فرق حسب ذیل ہے۔

اول۔ گیلوینک کرنٹ۔ یہ برابر پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نام گیلوینک کرنٹ بھی ہے۔ اس کی بجلی ہمیشہ ایک ہی رخ میں یعنی مثبت پول سے جو کاپر پلیٹ کو ساتھ ہوتی ہے۔ منفی پول کی طرف جو زنک پلیٹ کی طرف ہوتی ہے جاتی ہے۔ اس بجلی کا اثر کیمیائی اور حرارتی دونوں طرح کا ہوتا ہے۔ یہ اثر منفی پول کی طرف زیادہ تر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اس سے گرمی سوزش اور بعض اوقات سلفنگ بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے منفی پول کی جگہ ہمیشہ بار بار جسم پر بدلتی رہنا چاہیے، ورنہ اس سے جلنے کا اندیشہ ہے۔ اس کا اثر الیکٹریٹک بھی ہوتا ہے یعنی اس کی بجلی جسم میں کو گذرتی ہوئی اس کی بعض بعض سطوحات کا کیمیائی تجربہ کر دیتی ہے۔ مثبت پول کا نام لے نوڈ اور منفی کا نام کنکٹوڈ ہے۔ برخلاف فیوڈک کرنٹ کی اس کا اثر جو اس جسم کے اعصاب پر سوزش کی قسم کا ہوتا ہے۔ بعض اوقات زیادہ لگانے سے ناپیدائی اور پھر پٹن ہو جاتے ہیں۔

دوم۔ فیوڈک کرنٹ۔ اس کا اثر محض عارضی ہوتا ہے۔ اس کا رخ ہر وقت بدلتا رہتا ہے۔ اس کا کیمیائی حرارتی اور الیکٹریٹک اثر کچھ نہیں ہوتے۔ تندرست عضلات پر اس کا اثر بہت جلد ہی ہوتا ہے عضلات میں کھینچ محض اس کے شروع کرنے اور بند کرنے کے وقت ہوتی ہے۔ اس کا اثر جو اس جسم کے اعصاب پر نہیں ہوتا۔ یہ یاں رکھنا چاہیے کہ اگر اس کو بہت تیزی کے ساتھ دیر تک لگایا جاوے تو عضلات کی جس کو تھکا کر زایل کر دیا۔ اور اس طرح سے بجائی کا فائدہ کہ اس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ برخلاف اس کے گیلوینک کرنٹ تازگی بخشش اور عضلاتی حص کو قوی کرنے والا ہوتا ہے۔

طریق استعمال۔ بجلی ہمیشہ نہایت خفیف طاقت سے شروع کر کے آہستہ آہستہ اس کا زور بڑھانا چاہیے۔ مریض کو اگر تکلیف یا تکان یا بے چینی معلوم ہو تو فوراً اس کا استعمال بند یا زور کم دینا چاہیے۔ لگانے سے پیشتر جسم کو نمک پانی سے تر کرنا اس کی تالیف کو کم اور اس کی سرایت کو آسان کر دیتا ہے۔ اس کا استعمال بعض اوقات کسی خاص حصہ کے لیے اور بعض اوقات تمام جسم کے لیے مفید ہوتا ہے۔ جب کسی عضلہ میں بجلی گذارتی ہو تو یا تو اوپر راست یا بذریعہ اس کے عصب کو اس کو حرکت دینے کے ہیں۔

تشخیص اور علاج امراض میں بجلی بڑا کام دیتی ہے۔

تشخیص امراض میں بجلی سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ آیا سفلیج حصہ میں فالج سٹرل ہے یا پیری فرل جب تک عضلاتی ریشہ سالم اور ان کا تعلق اعصابی قائم ہے اس وقت تک فیوڈک اور گیلوینک دونوں بجلیوں کے لگانے سے وہ عضلات سکڑتے ہیں۔ لیکن جبکہ پیری فرل فالج ہو یعنی عضلات کا تعلق نخاع یا دماغ سے منقطع ہو گیا ہو یا جس حصہ دماغ یا نخاع سے وہ عصب ملتا ہے وہ حصہ ہی خراب اور بیکار ہو گیا ہو تو اس کی میں فیوڈک کرنٹ سے عضلہ نہیں سکڑے گا۔ کیونکہ اس بجلی کا اثر اعصاب کو ذریعہ ہوتا ہے مگر گیلوینک کو لگانے سے تاوقتیکہ ان میں بجلی باقی ہوں برابر سکڑتے ہیں۔ کیونکہ گیلوینک بجلی کا اثر لحمی ریشہ پر ہوتا ہے۔ اس کو اگر تیز و تیزیشن کہتے ہیں اور یہ مفصلہ ذیل مرضوں میں پائے جاتے ہیں۔ (۱) بعض اقسام پر الیمیا میں جو نخاع

کی خرابی ہو (۲) بچوں اور جوانوں کے سپائنل بریلی سسٹم پو لیومانی لائٹس انٹی ریڈ ایکوٹا اور سب ایکوٹا میں (۳) ٹرائیکل پرائی سس میں جبکہ اعصاب خراب ہو گئی ہوں (۴) جبکہ ریوڈیک انفلامیشن سے اعصاب کی ساخت خراب ہو کر فالج ہو گیا ہو (۵) لیڈ پرائی سس میں۔

علاج بجلی سے مختلف اعصابی اور دیگر امراض میں کیا جاتا ہے جسکی مختصر شرح حسب ذیل ہے۔
اول فالج میں جب کہ فالج کیوجہ کی پرورش ہو تب بجلی کا استعمال نہایت مفید پڑتا ہے۔ ایسی حالت میں سینے تھینک اعصاب پر بجلی کا اثر پہنچا کر تمام مفلوج کی پرورش زیادہ کر سکتے ہیں۔ دماغ اور نخاع کے کرائسٹ ویکزیشن میں گیلونیک کرٹ مفید ثابت ہوتا ہے۔ جب خاص خاص فالج زدہ عضلات پر بجلی لگانی ہو تو مفصلہ ذیل قواعد کی پابندی کرنی چاہیے۔

(۱) پیاد رکھنا چاہیے کہ بجلی لگانے سے زیادہ تیزی مطلوب ہوتا ہے کہ فالج زدہ عضلوں کو کچلی بیٹوں کی زندگی اور طاقت قائم رہے تاوقتیکہ دماغ یا اعصاب و فانی اصلی حالت پر بحال ہو کر عضلات مفلوج کی حرکات پر اپنا اختیار حاصل کر کے انہیں از سر نو جان ڈالیں۔

(۲) ہمیشہ وہی بجلی استعمال کرنی چاہیے کہ جسکے لگانے سے عضلات مستعدی اور جلدی کر سکا کرتے ہوں یعنی جب فیڈاٹ کرٹ کی رسی اکشن تیزی کے ساتھ ہو تو فیڈاٹ استعمال کرنا چاہیے۔ اور اگر گیلونیک کرٹ سوری اکشن تیز ہو تو گیلونیک کرٹ استعمال کرنا چاہیے۔ اس حساب سے پیریمیٹرل پرائی سس میں گیلونیک کرٹ ہی مفید ہوگا۔

(۳) شروع میں بہت ہلکی بجلی لگانی چاہیے۔ اور زیادہ دیر بھی نہیں لگانی چاہیے۔ سب سے بہتر طریق یہ کہ ماؤف عضلوں کو ایک ایک عضلہ کو دو دو تین بار حرکت دیا وری تمام عضلات کو ایک دفعہ ترتیباً حرکت دیکر دوبارہ از سر نو حرکت دیکتی ہیں۔

(۴) اگر اختیاری حرکت بالکل نابود ہو گئی ہو تو بجلی کی پوری حرکت پیدا ہو اور عضلات ذیل نہ ہوتے جلتے ہوں ایسی حالت میں زیادہ دیر تک بجلی کا استعمال کرنا کچھ مفید نہیں۔ برعکس اسکے جب اختیاری حرکت مطلقاً بند اور برقی حرکت کم ہو گئی ہو تو بجلی کے استعمال سے عضلات ماؤف کی پرورش شروع ہو۔ طاقت زیادہ ہوگی اور برقی حرکت آہستہ آہستہ اپنی اصلی حالت پر آجائیگی۔

جب برقی حرکت اصلی حالت پر آجاء و خواہ اختیاری حرکت بحال ہو یا نہی تو بجلی لگانا بند کر دینا چاہیے۔
(۵) جب کسی بجلی کو ساتھ حرکت پیدا نہ ہو تو کوئی امید نہیں رہتی تاہم صبر اور انتظار کے ساتھ کچھ عرصہ علاج ضرور کرنا چاہیے۔

دوسرے مختلف قسم کو دردوں میں عرق النساء درد شقیقہ۔ گیمے گو بیٹونیک۔ دوسروں میں بجلی کا استعمال بعض اوقات مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس سے درد کو آرام میں طبع ہوتا ہے اول کا و نثراری سنٹ اثر

سے دوم اعصاب پر فحاص اثر ہو کر سوم دوران خون پر اثر ہو کر۔

سوم تشنجی امراض میں بعض اوقات رعشہ۔ راکٹس کریمپ۔ کلوئک ٹارٹی کالسن تشنج رودہ و شائد میں جبکہ اور کسی طرح آرام نہ ہوا بجلی سے فائدہ ہو جاتا ہے۔

چھارہ امراض مختلفہ میں شاید ایسا کوئی مرض نہیں جس میں بجلی کا استعمال مفید بیان نہ کیا گیا ہو۔ لیکن مفصلہ ذیل امراض میں اسکا فائدہ قابل اعتبار ثابت ہوا ہے۔ انجائیا پکٹورس ہرنیزا سٹرمہ ہیموڈیکٹائٹس اکس انفلمک گائیٹر پوسٹ پازٹھم۔ ہیپورج ایجے ٹوریا۔ بوٹرائن ڈسپلین منٹ اور جلدی امراض۔ مثلاً کئی روزیشیا میں۔

پنجہر بطور کیلو سے تک کا ٹری اور گینوے نیچر کے بطور کا ٹری کے خون بند کرنے اور رسولیوں کے جلانے میں بجلی مفید ثابت ہوتی ہے۔ جگر کے ٹائی ڈے ڈسٹنسٹ میں اس سے سوراخ کیا جاتا ہے۔ اینورزم میں بجلی کے تار کے سرول پر دو سوئیاں لگا کر اس کی تحصیل کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ احتیاط رہے کہ سویچوں کے سے تحصیل کے عین وسط میں رہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مثبت سکر کی سوئی پر خون منجمد ہوتا ہے اور منفی سکر پر گاسیں بننے ہیں جو خون کے بہاؤ کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ اور کوئی نقصان نہیں کرتی۔ بعض اوقات یہ گاسیں راینورزم کو پھیلا دیتی ہیں۔ مثبت سکر کا منجمد شدہ خون بطور غیش شش شکر کے عمل کر کے اور زیادہ خون کو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ تمام اینورزم کا خون منجمد ہو کر اس کی تحصیل بند ہو جاتی ہے۔ جب سوئیاں نکالی جائیں تو فوراً ان کے سوراخ کلوڈین سے بند کر دینے چاہئیں۔

ایکس پیراگائیٹینس Ulex Paraguianensis پیراگائیٹ
یہ ہارٹ۔ اس کے پتوں میں چائے اور کافی کی طرح کافیں بکریہ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس کے پتے درد۔ مفرح اور زیادہ مقدار میں مسل اور مقفی ہوتے ہیں۔ اور زیادہ مقدار میں نشہ بھی کرتے ہیں۔ ہاضمہ اور اشتہا کو تقویت دیتے ہیں۔ لیکن مدت کا استعمال چائے کی طرح ہاضمہ کو خراب کرتا ہے۔

خود الک۔ پتوں کا سفوف ۲۰ سے ۶۰ گریں تک فلوئڈ اکسٹراکٹ ۲۰ سے ۶۰ ہونڈ تک۔

ایکسین یا پولیکسین Ulexin
ایکس یوروپئیس Ulex Europieus
ایکسین نہایت قوی مدہ ہے۔
قلبی استقامت مفید اور

شکرینا کا گڑہر ہے۔ خوراک ایکسین ۱/۲ سی۔ گریں تک

اماروسس Amaurosis
اس سے مراد وہ نقص بصارت یا نابینائی ہے جو
دماغی یا نخاعی اسباب سے پیدا ہو۔ اس کی عموماً یہ وجہ ہوتی ہے۔ کہ اشک نزد کے

راستہ پر دماغ یا خنجر کے اندر۔ رسولی یا پھوٹا یا آنکھ کا گنا یا جریان خون یا اجتماع آب ہو کر اس کے ریشوں کو دبالتا ہے کہیں رحم کے امراض مثلاً احتباس الطث و عسرت الطث اور ایام علی میں بھی رخی طور پر البسا ہو تا ہے کہیں رفتہ رفتہ اور کسی ہیئت جلد ترقی پکڑتا ہے۔ صداع اور دوران شریخ و علامات شروع ہر کہیں ساتھ ہوتی ہیں اور کبھی نہیں کیفیت اس مرض کی یہ ہے کہ نظر کے میدان میں مفصلہ ذیل یا تمام کے نقص واقع ہو جاتے ہیں۔ (۱) دسط کی نظر دھندلی اور باقی حصہ میں صحت کسی قدر کم۔

(۲) دسط کی نظر دھندلی اور باقی حصہ میں کم۔ ساتھ ہی بعض بعض نقطوں میں بالکل نثار۔

(۳) دسط کی نظر نثار دساتھ ہی اطراف کی نظر میں کمی۔

(۴) دسط کی نظر نثار۔ ساتھ ہی اطراف میں بعض بعض نقطوں پر نثار۔

(۵) میدان نظر کے نصف حصہ میں نظر نثار اور نصف میں سالم۔ اسکو بھی ادبیا کہتے ہیں۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے اس ہوتا ہے۔ یعنی ایک آنکھ میں تو اندرونی نصف کی نظر سالم ہوتی ہے اور دوسری آنکھ میں بیرونی حصہ کی اور کبھی ٹیپسری یعنی دونوں آنکھوں میں بیرونی نصفوں کی نظر نثار دہو جاتی ہے۔

(۶) ایک آنکھ کی نظر نثار اور دوسری میں سالم۔ یہ ایسی حالتوں میں ہوتا ہے جبکہ محض ایک آنکھ کی آنکھ نثار پر دباؤ ہو چکیاں اس امر میں پھیلی ہوئی ہستی اور آنکھ چپلا سفید مرجھا ہوا ہوتا ہے۔ آنکھ ظاہر دیکھنے میں بالکل صاف صحت صحیح سالم نظر آتی ہے۔ مگر میدان نظر کے حصوں میں نقصان واقع ہو جاتا ہے۔

نوٹ میدان نظر کی پیمائش حسب ذیل کی جاتی ہے جس شخص کا میدان نظر ناپا ہوا اسکو ایک یوار کے مقابل کھڑا کر کے ایک نقطہ قایم کریں اور اس سے کہیں کہ اس نقطہ پر اپنی نظر کا کر رکھیں۔ پھر اس نقطہ سے نیچے اور دائیں بائیں اونگی رکھ کر پوچھتے جائیں پہلے نقطہ پر نظر قایم رہنے کی حالتیں جقدر درنگ آرد گرد کے نقطوں کو دیکھ سکے وہی اسکا میدان نظر ہے اس کے ناپ کا ایک آدھ بھی ہوتا ہے جسکا نام پیری میٹر ہے۔

علاج اگر اسکا سبب سکالریت یا ڈیفیخیا یا زہر تماکو۔ سکس یا شراب یا ضرب ہے تو اس حالت میں فوراً سٹرکینیا کی جلدی پیکاری دے (۱) سپر پلرین روزانہ سے علاج شروع کرنا چاہئے۔ اور ساتھ اس کیلکس بجلی کا کمزور کرنٹ ایک سرالڈی پر اور دوسرا برادر پر رکھ کر گزارنا اور داخلی طور پر آرٹنک (۲) ہونڈاؤلس سالیوٹن (۳) کالانا سفید ہونگے اگر آنکھ کی علامات موجود ہوں تو پارہ اور پوٹاسیم آیوڈائیڈ کا کافی طور پر استعمال کرنا ضروری ہے اگر یہ معلوم ہو کہ دفعتاً کسی فضلات کے بند ہونے سے مثلاً قبض۔ بندش حیض۔ جس البواغ وغیرہ ہو کر یہ مرض لاحق ہوا ہے تو فوراً ٹیگز مسلمات اور مقامی پلسترٹوینٹن سے علاج کریں۔ اگر دماغ یا خنجر میں مہو بیج یا خطرہ ہو بس ایمو لزم ہو کر یہ مرض ہوا ہے تو اس کی تدابیر دی ہیں جو اپوٹیکسی میں بیان ہو چکی۔

ام الصبیان۔ انفنٹائل کنوٹنٹنز بچوں کے تشنج۔ بچوں میں یہ مرض عموماً دانت نکلنے کی وقت ظاہر ہوتا ہے پش اگر دو سال سے کم عمر کے بچے میں کسی قسم کی تشنجی حرکات ظاہر ہوں تو اس کی تدابیر

نہم اور غصے سے ملاحظہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی دانت شکستہ معلوم ہو تو اس کے سر کے مقابل سوڑھے میں شکاف دیں اور
کاسٹر ایل ایک دو ڈرام ہلکا روٹا سیم بروماڈ ایک سی ایم گرین تک کی خوراک میں متواتر کھلائیں۔

اگر امعاء میں سے کسی قسم کے کیڑے خارج ہوتے ثابت ہوئے ہوں تو ان کا مناسب علاج کرنا چاہیے۔
دیکھو اسٹائیل ورمز کا بیان۔ اگر معدہ میں غیر منظم غذائیں وجہ سے تشنجی حرکات ہوں تو اپنی کانک یا زنگ سلفا
پارانی سے قے کر اگر معدہ کو صاف کریں بعض اوقات محض تین ہی بچوں میں باعث تشنج ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو
ان کا دفعہ کاسٹر ایل سے کر سکتے ہیں۔ مگر چونکہ کاسٹر ایل کا فعل دیر میں ہوتا ہے ایسے ایسی حالتوں میں گرم
پانی و صابون یا گلیسرین کا حقنہ کرنا یا صابون کی تہی معقد میں رکھنا بہتر ہے۔ کیونکہ ان سے بہت جلدی
رودہ صاف ہو کر تشنج رفع ہو سکتا ہے۔ حقنہ کے ساتھ کاسٹر ایل بھی پالنا چاہیے تاکہ تمام امعاء بخوبی صاف
ہو جائیں۔ صفائی امعاء و رودہ کو بعد روٹا سیم بروماڈ ایک دو گرین کی خوراک میں ایک یا دو دو گھنٹہ بعد
پانی میں حل کر کے پلائیں۔ عموماً اس قدر علاج کافی ہو جاتا ہے۔ اگر ان تدابیر سے آرام حاصل نہ ہو تو پچھ
کو سینہ تک گرم پانی میں بٹھائیں اور سر اور گردن کو برف یا ٹھنڈے پانی کی گدی سے سردی پہنچائیں۔ گرم
پانی سے نکالنے کے بعد ٹانگوں کو گرم پانی کی بوتلوں سے گرم رکھیں۔ پنڈلیوں پر رانی کا پٹر لگائیں۔
اور سر و گردن کو بستور ٹھنڈا رکھیں۔ قفائے گردن پر برف کی ڈلیاں ملا کر یا تھیر و کلور فارم لگا کر تشنج
اکثر اوقات تشنجی حرکات کو فوراً بند کر دیتا ہے۔ اگر کچھ کارکنی مزاج ہو تو اسکی پرورش اور تقویت کیط
خاص توجہ کرنی چاہیے۔ دیکھو بیان رکٹس کا۔ اگر آتشک موروٹی موجود ہو تو مرکبات پارہ کا کچھ مدت
تک استعمال کرنا ضروری ہے۔

اگر تشنجی حرکات جنہر و عضلات سینہ پر واقع ہو کر دلکشی پیدا کریں تو بہت جلد حرکات تشنجی رفع کو نیکی کو تشنجی رفع
گردن و سینہ پر اگر کسی قسم کا تنگ لباس یا گلوبند وغیرہ موجود ہوں تو انکو فوراً دور کر کے چہرہ پر سرد پانی کو جھینڈ
دیں۔ اپنی کانک کے ساتھ قے کر ان میں مہل حقنہ کریں یا صابون کی تہی معقد میں رکھیں گرم پانی میں بٹھلا کر سر پر برف
لگائیں۔ اور ایک دو گرین کلورل ہائڈریٹ تین چار گزین روٹا سیم بروماڈ میڈیولج آف شارج میں ملا کر حقنہ کریں
اسل یا ٹیٹریٹ یا ایمو نیا سنگھاتے رہیں۔ رشک اور بیلادونا داغلی طور پر دینا ایسی حالت میں مفید نہیں۔

تشیجات جو ایک سال کے بچہ کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں۔

۱) روٹا سیم بروماڈ اگرین کلورل ہائڈریٹ اگرین سپرٹ کلور فارم ۵ ہونڈاب کا تو ایک ڈرام۔ ایلی ایک خوراک
ایک ایک گھنٹہ بعد م خوراک تک۔

۲) ٹیکو مرک ۳ ہونڈ سلفیورک اتھیر ۳ ہونڈ کیمف کو ۸ ہونڈ۔ اس میں چھ ہونڈ قے پانی یا دو دو میں ملا کر ایک
ایک گھنٹہ بعد پلائیں۔

۳) رشک ۴ گرین کا تو ۴ گرین اگرین۔ ان سب کو باہم باریک پیکر ۱۲ عدد پوٹریوں میں تقسیم کریں۔ اور ایک

پڑیہ قد سے پانی میں ملا کر گھنٹہ گھنٹہ بعد میں چار خوراک پلائیں۔

Amylum شاج نشاستہ کا سیلیم۔ سنگھ اور پیما کے ساتھ ملا کر پیشین امراض، ویشج فوڈ میں بطور حقنہ اور اسکا سفوف دیگر جاذب اور تسکین بخش اور یہ خفاہ پھنڈی، رنگ آسٹو وغیرہ کے ساتھ ملا کر بلدی امراض میں بطور ڈسٹک یا ڈور استعمال کرتے ہیں۔ داخلی طور پر اسکا بیکٹریا خفاہ کرنا معدنہ میں بڑوں خاص کر آئیوڈین پارہ اور مس کے لئے فائدہ رہے۔ جلی اور کھڑی ہوئی جگہ اکابر ورنافا فوڈ کرتا ہے۔

امانی اوڈیکسٹین Amylodextrine بہ نہایت لطیف اور زود ہضم نشاستہ جو قدرتی طور پر معدے کی معروق سے نشاستہ والی نمہ اول پر کیمیائی فعل ہو کر نشاستہ اور مصنوعی طور پر بہت ڈائلیوٹ ایڈ کا فعل نشاستہ پر کر کے بنا سکتے ہیں۔

امالیو ولیٹرکے نکات Amylovalerianic ether اسکواں ویشج اور اپیل آیل بھی کہتے ہیں۔ نہایت عمدہ مقوی اور اپنے افعال میں ولیٹرکے نکات جی۔ محرک۔ واقع نشج مخدر اور واقع اوجاع ہے۔ ماریفا اور کلورل ہائڈریٹ کی طرح خواب آور ہے۔ لیکن غلبہ کو کلورل کی طرح مست اور کمزور نہیں کرتا ہر قسم کے درد نشج اور قویخ میں جو معدہ۔ معالجہ کرنا گروہ کے متعائن ہو نہایت مفید ہے۔ نفخ۔ کوشی۔ سینوریلجیا۔ رہیوٹرم اور ڈسے فوریا میں بھی نافع ہے سیم ۵۰۰ ہونڈنگ

امالین ہائڈریٹ Amylone Hadrate اسکوٹشیری ال الکحال اور ڈائی میتھل ایتھل کا بلی نالی بھی کہتے ہیں کلورل اور بار ایڈی ہائڈلک طرح خواب آور پیشش قلب اور معدہ کے افعال کو کوئی خلل پیدا نہیں کرتا سیم ۳۰۔ ۵۰ قطرہ تک سفوف محکم کے ساتھ دیتے ہیں۔

امانی لائڈوزیز Amyloid disease دیکھو بیان البیومی لائڈوزیز کا۔

امپٹائیگو Impetigo جلد کے امراض کا بیان دیکھو۔

امپوٹینسی Impotency یعنی نامردی۔ اکثر اشخاص جو نامردی کے شاک اور ادویات

بہی کے متلاشی ہوتے ہیں انہیں دیکھا جاتا ہے کہ اکثر دراصل کوئی مرض موجود نہیں ہوتا اور انکی شکایت محض شہوت پرستی کے خیالات پر مبنی ہوتی ہے۔ قوت رجولیت طبعاً مختلف اشخاص میں نہایت مختلف درجہ پر ہے۔ ایک کر کے جو قوت نہایت کم ہے وہ دوسرے کو حساب میں کافی یا زیادہ ہوتی ہے۔ بہت سی وجوہات جو بد صحبت اور بد عادات کی وجہ سے ادویہ مسک دہی کے متلاشی بنتے ہیں انکی بالوں اور شکایات کو نہایت غور سے سنکر تشخیص کا ل علاج کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ خواہ مخواہ محرک دہی ادویات کا استعمال کرنا سخت اندیشہ اور ضرر رکھتا ہے۔ اکثر حالتوں میں اس شکایت کی وجہ کثرت جماع یا اغلام یا جلق ہوتا ہے یا محض ایک بیہودہ شوق و خیال اون کے دل میں قائم ہوتا ہے جو انکو بڑے نام بھی مسک ملدذا دویہ کی طرف گھینچا کر پس ایسی حالت میں نصیحت اور فہمائش کا راستہ ہو سکتی ہے حتی الوسع ان کی بد عادات اور بعضی خیالات کی

اصلاح کرنی چاہئے۔ نسخہ باز طبیوں کی طرح بے سوچے سمجھے ایک پرچہ اونکے ہاتھ میں دیدینا نہایت ظلم ہوگا۔ طبیب کے نسخہ سے اٹکھو یقین ہو جاتا ہے کہ اٹکھو کوئی مرض ضرور موجود ہے۔ اور جب بہت سی نسخہ استعمال کرنے سے کچھ فائدہ نہیں دیکھتے ہیں تو نہایت اوداس اور ناامید ہو جاتے ہیں جسکی وجہ اٹکا مرض خود بڑھتا۔ اور دیگر امراض کا باعث ہو جاتا ہے۔ ہماری رائے میں عام حالات نامردی میں سب سے عمدہ نسخہ حب ذیل ہے۔

- (۱) ہر قسم کی بدعادات بدخالات اور کثرت سے پرہیز رکھنا۔
- (۲) تاوقتیکہ شہوت خود بخود کافی طور پر غالب نہ ہو ہرگز جماع کا ارادہ نہ کرنا۔
- (۳) سست عادات سے نفرت محنت و ریاضت کی طرف رغبت بکلی ہوا میں ورزش اور عمدہ مقوی غذا کا استعمال زیادہ ترددات اور تفکرات سے اجتناب۔

یاد رکھو کہ ہر پزیرگار نوجوانوں کے لئے نسخہ باز طبیوں کی نسبت خود قدرت بدرجہا زیادہ حامی اور معاون ہے۔ صبر اور استقامت تمام ادویہ کی نسبت بدرجہا مفید ہے۔ پس اگر دراصل شہوت کم اور استادگی ضعیف ہے تو اپنی عادات پر نظر کر کے اٹکی اصلاح کرو اور چند مہینے صبر کیساتھ ارادہ جماع سے لاپرواہ ہو۔ پھر دیکھو کہ قدرت آپ کے لئے کیا کرتی ہے نسخہ باز طبیوں کے پاس اپنی عزت اور صحت خراب کرتے مت بھرو۔ اگر فصلہ بالا تدابیر کافی معلوم نہ ہوں اور مدت تک ضعف شہوت و استادگی جاری رہے تو مجبوراً مفصلہ ذیل ادویہ وغیرہ آزما سکتے ہیں۔ فولادکس و امیکا۔ ڈیمانہ۔ ہماری رائے میں سب مہی ادویہ کی نسبت زیادہ مفید اور بے ضرر ہیں۔ جب شہوت کافی معلوم ہو لیکن استادگی ضعف اور نا پائیدار ہو تو کنٹھیرڈیز فاسفورس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کے استعمال میں نہایت احتیاط لازم ہے۔ اگر عضو تناسل اور بیضہ بدعادت یا کثرت کی وجہ سے ربلے اور چھوٹے ہو گئے ہوں تو مالش اور بجلی کا لگانا مفید ہوگا۔ گیلوسے تک بجلی کا ایک سرسناخ کی زیریں حد پر اور دوسرا عضو تناسل۔ نقطوں سیون۔ اور سپیشک کارڈ پر ماری باری رکھنا چاہئے۔ یہ عمل میں بہن منٹ دو دفعہ روزانہ کر سکتے ہیں۔

- (۱) فاسفورس ایک گرین۔ اکٹراکٹ ڈیمانہ ڈرام۔ اکٹراکٹ نکس و امیکا۔ اگرین۔ فیروی سلفاس کس کیٹا ۲۵ گرین۔ ان سب کو ملا کر سو عدد گولیوں میں تقسیم کریں۔ اور تین گولی روزانہ استعمال کریں۔
- (۲) اکٹراکٹ ڈیمانہ ۳۲ گرین۔ اکٹراکٹ کو ۳۲ گرین۔ اکٹراکٹ نکس و امیکا ۲۵ گرین۔ فیرائی سلفاس کس کیٹا ۲۵ گرین۔ ان سب کو ملا کر ۳۲ عدد گولیوں میں تقسیم کریں اور دو خوب روزانہ استعمال کریں۔
- (۳) آرگوٹین ۳۲ گرین۔ اکٹراکٹ کنائس ۱۶ گرین۔ اکٹراکٹ نکس و امیکا ان سب کو ۱۶ عدد خوب میں تقسیم کریں۔ ایک گولی تین دفعہ روزانہ استعمال کریں۔

(۴) پل فاسفرس تالس ڈیڑھ گرین۔ آرسینی ایٹ آف آئرن ۱۶ گرین۔ آرگوٹین ایک گرین۔ ایسی تین خوب روزانہ۔

(۵) سیاب ۹ ماشہ کچھ سرخ ۹ ماشہ قرنفل ۹ ماشہ گندک ۲۴ ماشہ پہلے گندک اور سیاب کو باہم خوب سائید کر کے جب سیاب کی خاک ہو کر لے سکے ذرات بالکل نامعلوم ہو جائیں تو باقی ادویہ سائید کر کے اس میں ملا کر زردی بیضہ مرغ کے ساتھ کھل کر کے جب خوب باریک ہو جاوے تو بقدر غفل سیہ گولیاں بناویں۔ ایک گولی صبح اور ایک شام شورہا کو سفید کے ساتھ کھاویں۔

دیگر ادویہ جو مقوی باہہ شورہا میں مثلاً ارگٹ کباب چینی۔ ایفون۔ ٹرنٹائن۔ میٹھانیلیا۔ مہنگ۔ کستوری۔ سرخ مرچ۔ سالی۔ زالی۔ ثعلب۔ مصری۔ شتھقل۔ تخم گندہ۔ عطر قرچہ۔ مرادید۔ سینگو۔ وینیر۔ باس۔ پٹے۔ ریہ۔ وغیرہ ہماری سائے میں اصلاح عادات۔ پینہ نگاری وغیرہ کے مقابلہ میں انکا استعمال غیر ضروری ہی نہیں بلکہ اکثر سخت مضر اور اندیشہ ناک ہے۔

جب ضعف شہوت استادگی ضربات داغ اور تھلے کے بعد واقع ہو تو ایسی حالت میں تمام دماغ اور مخاع میں کلی گزاریں اور داخلی طور پر کلورائیڈ آف مرکری بیہ گریں یا کلورائیڈ آف گولڈ ڈائیڈ سوڈیم بیہ گریں یا پوٹاشیم آئیوڈائیڈ گریں خوراک میں مفید ہوگی۔

اگر کسی خاص مرض مثلاً سفلس۔ ذیابیطس۔ کثرت بول۔ بد ہضمی۔ بخارات۔ قلت دقت خون۔ بواسیر۔ تھیری۔ شتھقل کی وجودگی کی وجہ سے ضعف باہہ ہو تو ان امراض کا علاج مقدم ہوگا۔ اگر فطرت بیضہ پیرٹیک کارڈو متعلق کوئی مرض موجود ہو یا انکو اور کسی قسم کی رسولی یا ذہنی کاویا ہو تو عمل جراحی کرانا پڑیگا۔

املتاس کیسیا فینچولا۔ لین۔ منقی عصب و مسکن حدت خون ہے۔ اسکا اسہال میں کسی قسم کا درد نہ ہوتا ہے۔ دماغ ظاہر نہیں ہوتا۔ ہر عرصہ میں حالہ عورتوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ۲۰ اگرین۔ یونانی اطباء اسکو عموماً چار پانچ تولہ خوراک میں بغرض اسہال خیرے میں مخزن الادویہ میں اسکی خوراک ۵ مثقال سے ۲۰ مثقال تک درج ہے۔

اصل نائٹریس Amyl Nitris جس تمام پر گایا جاتا تو فوراً اس جگہ کے اعصاب کو مفلوج کر دیتا ہے۔ مگر اس عرض سے کبھی نہیں کیا جاتا۔ داخلی طور پر بخیر مرض بیضہ کشا ذونا در استعمال کرتے ہیں۔ عموماً جب اسکی ضرورت ہوتی ہے تو اسکو سکھاتے ہیں اسکا بخارات فوراً شش میں پہنچ کر خون میں مل جاتے اور کچھ مقدار میں ہموگلوبین کو ہلکے کر دیتے ہیں۔ بلدیہ میں۔ اسطرح سے اعراض کاربانک ایسڈ گیس اور جذب آکسیجن میں کمی ہو جاتی ہے۔

خون سے نکل کر نائٹریٹ آف ایل فور اہم کی تمام ساختوں میں پہنچا اور پہلے خاص اثر ظاہر کرتا ہے فوراً سر میں گرانی اور ضرباتوں کی دھڑک معلوم ہوتی ہے۔ چہرہ اور گردن پر سرخی۔ قلب کی حرکات تیز جیانی خراب۔ رتھار و ملگاتی طبیعت میفرانہ و تیلیان کشادہ ہو جاتی ہیں مگر یہ تمام علامات تھوڑی دیر پر خفیف تر ہو جاتی ہیں۔ دیاورہ مقدار میں سکھانے سے یہ علامات اور زیادہ خراب ہو جاتی ہیں۔ پھر فانی و ملغ

سخت نقصان اور سخت پید ہو دار ہوتے اور بعض اوقات سختی حرکات بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اسکا اثر زیادہ تر دوران خون کو متعلق ہی ہوتا ہے۔ اول تو اس طرح سے کہ تمام باریک شریانیں اور وریدیں کشادہ اور ساتھ ہی حرکات قلب تیز ہو جاتی ہیں لیکن بلڈ پریشر بہت کم ہو جاتا ہے۔ سطر سے گویا ایف ڈی ٹریکل یعنی بائیں بطن القلب کو بہت آرام ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مفصلہ ذیل امراض میں اسکا استعمال نہایت جلدی فائدہ کرتا ہے۔
 (۱) انجائیا پیکٹورس کو سخت درؤں میں (۲) ان تمام امراض میں جبکہ شریانوں کا تشنج ہو کر دوران میں خلل قائم ہو مثلاً مرگی۔ دم اور برائٹس ڈیزیز میں (۳) ہیوشی کلور فارم میں جبکہ قلب فالج ہو کر دفعتاً موت کا اندیشہ ہو۔
 (۴) سی سکس میں جبکہ دوران میں خلل واقع ہو گیا ہو (۵) بخاریں سنگھنا نالرزہ کو فوراً بند کر دیتا ہے (۶) زہر افیون کو کمین اور سٹرکینا میں بطور فائدہ استعمال کرتے ہیں (۷) مشتبہ اموات میں جبکہ غرقاب پھانسی یا غشی سے موت ہوئی ہو۔ (۸) لمبی گوار کا لک میں اسکی جلدی بچکاری نہایت مفید ثابت ہوئی ہے۔ طریق استعمال ۲۰ سے ۵ قطرہ تک خالص یا روغن دھنیا یا سپرٹ میں ملا کر سنگھانا۔ اسی قطرہ تک کھانا۔ ۱۰ فیصدی مقدار میں سپرٹ محل کر کے اسکے قطرہ کی جلدی بچکاری کر سکتے ہیں۔
آئل و لیٹری ناس - **Amyl valerianas** دیکھو بیان اماٹی لوویلرے تک ایتھر کا۔
ال ہائڈراس - **Amyl Hydras** دیکھو بیان اماٹی لین ہائڈرائٹ کا۔
ال ہائڈرائڈ - **Amyl Hydride** اسکا دوسرا نام رہائی گولین ہے۔ یہ مقامی طور پر جذب نہیں ہوتا لیکن تمام بخیر ہو کر بہت سخت سردی پیدا کرتا اور سطحی ساختوں کو سخت اور بھجور کر دیتا ہے۔ بوجھ سطحی سختی کے اس کو بھی گہری نہیں ہوتی۔ اسلئے اگر کسی مقام کو اوپر لین کی غرض ہو جس کو نام مقصود ہو تو سوا ہی الوزن ایتھر کے ساتھ ملا کر استعمال کرنا نہایت مفید ہو گا مثلاً پھوڑوں میں شکاف دینا زخموں کا سینا اور دانٹوں کا کھانا۔ اسلئے استعمال سے آسان ہو سکتا ہے۔ سنگھانے سے کلور فارم۔ ایتھر۔ ایتھل آیوڈائڈ اور ایتھل برومائڈ کی طرح تمام ہیوشی پیدا کرتا ہے۔ مفصلہ ذیل مرہم حل ہوئی جگہ پر لگا کر فوراً درد کو بند کر دیتا اور سطح زخم پر چھلی بنا کر ہوا سے محفوظ کرتا ہے۔
 کافور ایک ڈرام۔ سپرٹینی ایک ڈرام۔ رہا سے گولین ۱۲ اونس۔
 کافور اور آیوڈین اس میں حل ہو جاتے ہیں اور اس طرح بطور بخیر استعمال کی جاسکتے ہیں۔
املی۔ مفرح دافع تشنگی اور زیادہ مقدار میں سہل ہے خراش معدہ اور کثرت صفرائیں نہایت مفید۔
خ ایک تولہ سے دس تولہ تک۔

امولیٹنس - **Emollients** یعنی مقام ماؤف کو نرم کرنے والی اور درد کو تسکین دینے والی۔
 انکی تفصیل حسب ذیل ہے۔
 گوند چربی روئی گاگودات تاستہ۔ بیرا۔ ایلیا۔ میٹیم۔ کلورڈین۔ سائی ڈونیم۔ انجیر۔ جلیٹین۔ گلیسرین۔ آتش۔
 بھٹی۔ توری۔ شہد۔ انگلاس۔ السی۔ بادام۔ روغن۔ السی۔ روغن۔ زیتون۔ سفیدی۔ صفت۔

حکام بیان

جب امونیا بصورت لائیو ایریاگاس یا ایموینا کاربوناٹس کر کسی مقام پر لگایا جاوے تو مقامی خراش اور سوزش پیدا ہو کر اعضاء اور دوران کو تحریک دیتی اور زیادہ در لگانے سے آگے بھی ہو سکتا ہے۔ اس بنا پر اسکو بلی فیشیٹ اور کاؤنٹرڈیٹنٹ فاسک کے لئے بطور ٹینٹ ایموینا یا ٹینٹ گستر مقام دزد جوڑوں کی سختی اور سرفہ وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ بڑے ڈاکٹروں کے پیش پر لگانا فوراً اور دیر سوزش میں تخفیف کر دیتا ہے۔ سنگھٹا سے فوراً دوران میں اس اعضاء کو حرکت اور قوت بخشتا ہے۔ تاکہ میں تیز جلن سی ہو کر ٹوٹ جائے۔ آتی اور پانی آگے اور ناک سے جاری ہو جاوے۔ اسلئے اسکا سنگھٹا ناشتی اور دوشی میں مفید ہے۔

کھانڈے سے معدہ پر ہیکل فوراً سوزش اور تیزی پیدا کرتا ہے۔ اس وجہ سے زیادہ مقدار طبی مثلاً ۱۲ گرین کا بونیٹ آف ایموینا دے آ رہے۔ تھوڑی مقدار میں معدہ کو تحریک دیکر اخراج رطوبات اور دیر ارج زیادہ کرتا اور تمام جسم پر سٹی ہوا تیز پیدا کرتا ہے۔ گویا تھوڑی ہاضمہ ہے۔ اور تیز اپنے کھانڈے سے تیزی معدہ کی تیزی کو کم کر دیتا ہے۔ اسلئے اسکو ایڈز ہسٹما پر لگایا جاوے۔ اور دیر کی پختہ ہونے کا باعث بنتی ہے۔ بلی فیشیٹ میں اسکا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔

خون میں ہیکل کے کھانڈے اور قوت بخشاوے کو کم کرتا ہے۔ فاسفیٹ آف امونیا کاوٹ میں مفید ہے کیونکہ یہ پورک ایڈ کوئل کنوڑا ہے۔

امونیا تمام دماغ اور مصلع خاضعہ کو کم کر تھقس اور دوران کے لئے محرک ہے۔ سنگھٹا یا کھانڈے سے قلبی حرکات کو تیز اور پائیز پریش کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اسلئے اسکا استعمال تمام حالات سخت کمزوری مثلاً ایموینا اور سرفہ ضعیفان و سسٹمہ شخاص اور نہر سانپ میں بکثرت کیا جاتا ہے۔ کلورائیڈ آف امونیا ایک عمدہ مخرج صفر بھی ہے تمام امونیم سالٹ پیدا نہیں اور اخراج پوریا کو زیادہ کرتے ہیں۔

امونیا گردوں اور شش کے میوکس ممبرن کے لئے بطور نائیکرک ایڈ۔ یوریا اور یورک ایڈ خارج ہوتا ہے۔ اسلئے امونیم سالٹ و پشایاب میں نائیکرک ایڈ۔ یوریا اور یورک ایڈ زیادہ خارج ہوتے ہیں۔

برونخیل میوکس ممبرن سے خارج ہوتا ہوا اسکی رطوبات کو قیق اور آگوا اخراج کو زیادہ کرتا ہے۔ امونیا پائیز اور امونیم کلورائیڈ عمدہ اسپیکٹوٹ یعنی مخرج بلغم ہیں ساتھ ہی ساتھ کھانسی حرکات قلب اور تھقس کو بھی پائیز کرتے ہیں۔ امعاء میں خارج ہوتے وقت انکو تحریک دیتا اور زیادہ مقدار میں بطور سہل بھی عمل کرتا ہے۔ لائیو ایریاگاس ایسی ہیٹاس۔ لائیو ایریاگاس ایسی ہیٹاس۔ اور امونیم کلورائیڈ جلد میں ہیکل پینہ زیادہ نکالتے ہیں گویا کہ ڈایا فونیک یعنی مرق بھی ہیں۔

امونیا یا ایک تیز گاس جو امونیم کاربوناٹس میں ہی ہر وقت نکلتی رہتی ہے۔ نوشا اور اوچو نہ کر لانا ہے۔

بھی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھو عام بیان
لاٹکوار امونیا فارشیور محض خارجی طور پر ہولٹ استعمال کیا جاتا ہے۔

لاٹکوار امونیا بطور لوکل اور جنرل ہی ہولٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسے ہونڈ تک۔

لاٹکوار امونیا می ایسی ٹیس۔ معرق۔ مدر اور محرک اعصاب ہی۔ فیور کمپن میں بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔
امونیا کی بروماڈم۔ اس میں امونیا کی کوئی خاص تاثیر نہیں۔ بروماڈ آف پوناہم کو بیان دیکھنا چاہیے۔
امونیا کی بوراس۔ سل میں دیگر سڈیٹو ادویہ مثلاً کوڈینا اور باربٹرائٹس کے ساتھ نہایت مفید ہے۔ قورنج

گردہ میں جو پورک ایڈ کی گندوں سے ہوا ہو بیٹس سٹیس گرین درد و گھٹہ بعد دینا نگر وں کو حل کر کے
درد کو کم اور پیشاب کو خارج کرتا ہے۔

امونیا کی پکراس۔ پیریل بنجاروں اور دردوں میں نہایت مفید ثابت ہوا ہے۔ بعض اوقات کوشن اور آرتھریٹس
سے بھی زیادہ زندہ کر جاتا ہے۔ کوشن کی طرح کوئی خراب علامات مثلاً سرگرائی۔ کانوں میں گنجنا اور ہیرا این
غلیان۔ بخوبی وغیرہ پیدا نہیں کرتا۔

لاٹکوار امونیا کی سائیٹراس۔ مدر اور معرق ہی۔ فیور کمپن میں بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔

امونیا کی سیلی سلاس۔ اکیوٹ کیٹائل اور انفلیمیٹری ہایارین مثلاً اکیپیری بروکائیٹس۔ کروپ۔ اور
نیومونیا میں مفید ہے۔

امونیا کی فاسفاس۔ مجرن صفرا اور محرک اعصاب ہی۔ خون کو زیادہ کھار کر دیتا اور پورک ایڈ کو حل کر کے کھاتا ہے۔
اسلے گاوش میں مفید ہے۔

امونیا کی کاربونات۔ اس کی تاثیرات کا عام بیان میں مفصل ذکر ہو چکا ہے۔

امونیا کی کلورائیڈم۔ پانی میں حل کر کے کسی مقام پر لگائے سے۔ وہی پیدا ہوتی ہے یعنی لوکل ایفیکٹ
معدہ امعا اور جگر اور اعصاب کے لئے محرک۔ مدر۔ مخزن۔ بلغم اور معرق ہی۔ اس طرح گویا اثر کرتا ہے۔

امونیا کی گلائی سی ٹینٹراس۔ یہ محض بد ذائقہ ادویہ کی تلخی اور بو کی مٹانے کے لئے استعمال
کیا جاتا ہے۔

امونیا کی نائیٹراس۔ یہ محض نائیٹریل ایڈ گاس بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔

امونیا کی ویلیرین تاس۔ یہ ویلیرین کا ایک عمدہ پایدار سالٹ ہے۔ محرک معقوی اعصاب اور دماغ تشنج ہی
ہیشیریا کے مختلف امراض مثلاً تشنج۔ رقص۔ درد و اعتلاج وغیرہ میں مفید ہے۔ مختلف اعصابی امراض مثلاً درد و

بخوبی مرگی کو دیا اور مانجولیا۔ میں بھی اسکو استعمال کرتے ہیں۔

آئیوہوم کو کورک کلورائیڈ یعنی سال ٹیمپلر خیمہ کر دینا وسیلہ سے زیادہ دیر پائشی سینک ہے۔ کیونکہ پکوارائیڈ آف مرگی
کی رطوبات کے ساتھ ملکر جلدی ہے اور ہوتا ہے اسلے اسکی بجا اب سال ٹیمپلر کا استعمال عام ہوتا ہے۔

اناسارکا Anasarca

اناکیلویشن

Inoculation

جلد کے نیچے پانی جمع ہو جانا۔ دیکھو بیان ڈرلپی کا۔
 اس عمل اتفاقی یا ارادی کا نام ہے کہ جس میں کسی خاص
 بیماری کا مادہ براہ راست جلدی عروق یا جھلیوں کی سطح پر پنچر جذب ہو جائے اور خاص خاص علامات و
 نقصانات پیدا کرے۔ اتفاقی اناکیلویشن اس طرح ہے کہ کسی رگ یا نغم پر یا انگھٹاںک منہ مجری پیشاب یا مقعد وغیرہ
 کی جھلی پر کسی متعدی بیماری کا زہر لگ کر سرایت کر جائے اور خاص خاص علامات پیدا کرے جیسا کہ ایک
 سیلینٹ سچول دیکھی گیا۔ ہائیزوفوبیا وغیرہ امراض اس طرح سے ایک مریض سے دوسری شخص کی ہو سکتے ہیں۔
 ارادی اناکیلویشن میں عمل مختلف طور پر کرتے ہیں۔ اول اس طرح کہ ایک نشتر کے سرے پر مرض کا مادہ جو سیرم
 میں بکثرت ہوتا ہے لیکر دوسرے شخص کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ دیکھی نشین اسکی عام مثال ہے۔ عام طور پر
 غلطی سے اناکیلویشن اور دیکھی نشین کو ایک معنی سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن دراصل دیکھی نشین محض ایک خاص صورت
 اناکیلویشن کی ہے۔ دوم چھالہ اٹھا کر یا کاسٹنگ سے جلا کر یا گھسنے لگا کر کچھی جلد پر زہر یا مادہ لگا دیتے ہیں۔

انیس Anise یعنی سوئف۔ انکابیان دیکھو۔

انبہ۔ مفرح سمن۔ ملین اور ندر ہے۔ کچے آم ترش جاذب طوبات مقوی معدہ اور ہاضمہ ہوتی ہیں۔
 اچور یعنی آم کا خشک کیا ہو گا وانا فرس کرے اور عین ہاضمہ ہے اس کے تخم کا خمر مخرج کرم اور جاذب ہے۔ اسہال
 سفیدی زناں۔ بواسیر اور مینوریمیا میں مفید اور راوند و رمن کے لیے قاتل اور مخرج ہے۔ اس کے پتوں کا چبانا
 مسوڑھوں کو تقویت دیتا اور نیز اسہال میں مفید ہے۔ اس کا گوند عرق لیوں میں ملا کر خارش اور دیگر امراض
 جلدی میں استعمال کیا جاتا ہے۔

پوست آم یا چھال آم کا جو شانہ سوزش مہن و گلو میں بطور غرغره استعمال کرنا نہایت مفید ہوتا ہے۔
 سفوف چھال ۱۰ سے ۲۰ گریں تک۔ سفوف مغز ۲ سے ۲۰ گریں تک۔ فلوئڈ کسٹ ۵ سے ۲۰ بوند تک۔

انتشار الابداب۔ پلکوں کے بال گر جانا۔ پلکوں کے امراض کا بیان دیکھو۔

انتشار الشعر۔ بالوں کا گر جانا۔ الویشیا۔ گنج کا بیان دیکھو۔

انتصاب النفس۔ دکشی۔ ڈسپنیا۔ ایمفی سیما۔ ان امراض کا بیان دیکھو۔

انتھری روبن Anthracobin

کیمائی اور طبی خواص میں کرائی سے روبین کو مشابہ ہی
 گزیا سورائے سس اری ہی پلیس وغیرہ میں کرائی سے روبین کی طرح مفید ہے۔ لیکن اس قدر سوزش نہیں کرتا
 اس کا دوسرا نام ڈیسا کسی ایلن زیرین ہے۔

انتھریکس Anthrax

ہیگنٹ سچول یا پشینہ بافوں کا مرض جب اس کا خارجی بلہ معلوم ہو تو
 فوراً باوقفاً اسکو بطور چھال کر دو رکے ارد گرد کی ساختوں کو کاسٹنگ یا گلیونیو کاٹری سے جلا دینا
 چاہیے۔ اور بعد میں خم کو کاربانک آیل و آوڈو فارم وغیرہ سے ڈرل کر کے رہنا ضروری ہو گا۔ اگر کہل چھوٹا

ہو تو کاربالک ایڈ یا زنگ کلورائیڈ یا نائٹریک ایڈ یا نائٹریٹ آف مرکری سے جلانا یا سٹرانگ کاربالک ایسٹک اورو
گرد جلدی پچکاری کرنا کافی ہو سکتے ہیں۔ زخم مابعد کی ڈریسنگ کو اسلے کوئین و ٹرنٹائن کا ایملس بہت
مفید ثابت ہوئی ہیں۔

جب عام جسمی علامات بخار، ضعف، غیرہ ظاہر ہوں تو فورا غذا نیت اور اندرونی ادویہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے
دو دھنجنی بعضہ مرغ بکثرت کھلانے چاہئیں اور ادویہ کے طور پر کوئین سلفیو کاربولٹ سلفائینس کاربالک ایڈ
کرے زوٹ گایاکول سیلی نین سیلی سلیش نمکبات فولاد وغیرہ استعمال کرنی چاہئیں جب شش ماؤف ہو تو معلوم
ہو تو فورا امراض کو مکان کو بھرت ایو کے لہٹس آئل کرے زوٹ کاربالک ایڈ ٹرنٹائن تیری بن وغیرہ
سے بھر دینا ضروری ہوگا۔ دوسرے عوارضات مثل ذیل جبریاں خون۔ اسہال۔ قور۔ ایڈیما گلاس وغیرہ کا
علاج معمولی طور پر کرنا چاہیئے۔

انتھل منٹکس Anthelmintics

یعنی وہ ادویہ جو مخرج یا قاتل کرم امحا ہوں یہہ
دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک درمی فیون جو محض کرم کو محل سے خارج کر دیتے ہیں مثلاً جلب۔ سقمونیا عصارہ
لیونڈ۔ دوم درمی سائیڈ جو کرم کو ہلاک کر دیتے ہیں مثلاً سیل فرن۔ تارپین۔ کیلاکسو سینٹونین۔ بیج انار کی پھال
بعض ٹپ ورم بعض راؤنڈ ورم اور بعض تھریڈ ورم کے لیے مخصوص ہیں۔ پس انکی تفصیل حسب ذیل ہے۔
(۱) راؤنڈ ورم یعنی اسکیرس لمبری کاڈیز (حیات) کے لیے مخرج یا قاتل ادویہ۔ اینتھنٹیم الی ٹرس فیری توڑ
صبر۔ ایو سائیٹم کینا بنیم۔ اریکا۔ ہڈینگ۔ برگ نیم کیو پوٹ۔ ٹیم واپو کیو پوٹ۔ کیلیول۔ بیج دار عصارہ۔ ریونڈ
خظل۔ جب لاطین۔ ڈیفنی نیم۔ ٹی سیکریا۔ آیو ڈوفارم۔ میلی نین۔ آئری ڈین۔ جلب۔ میو کیو نا۔ ٹرنٹائن
ایفا کسی لین۔ کواشیا۔ ریو۔ سیوڈلا۔ سیبانا سینٹونین۔ سقمونیا۔ سوویم کلورائیڈ نمک۔ تاکو۔ ٹرنٹائن
نخم تریز۔ تھائی مال۔ سینٹونیکا۔ اور سینٹونین۔ مخصوص شمار کئی جاتے ہیں۔

(۲) ٹپ ورم خاص کر نینیا سلیم دکن و دانہ مکے لیے مخرج یا قاتل ادویہ۔ اینتھنٹیم گلیٹڈ و فورا۔ اریکاٹ۔ کلوروفارم
کوکاٹ۔ سیل فرن۔ کیلاکسو۔ ٹیفنی لین۔ پوسٹ بیج انار۔ سالوین۔ ٹرنٹائن۔ تھائی مال۔ میٹی کاتیل۔ ڈی ۲۔ ۳۔ ہونڈک
(۳) اگسی پورس و زمی کلیرس غرض ورم یعنی چلوٹ کے لیے مخرج یا قاتل ادویہ۔ چونکہ یہ کرم مقدس یا اسکے قریب
زیادہ تر ہوتے ہیں اسلئے عموماً حقہ سے دوا پہنچانا انکے واسطے زیادہ مفید رہتا ہے مثلاً کواشیا۔ کبکا
سلفیٹ آف آئرن۔ صبر نمک۔ سرکہ۔ ٹرنٹائن۔ کیسٹرل۔ ساکی۔ وغیرہ کا حقہ کرنا۔ داخلی طور پر
منفصلہ ذیل ادویہ کھلانے ہیں۔

نوٹ تفصیل کیلئے دیکھو

نٹی نوبلیس

Anthemis Nobilis

گل بابونہ خارجی طور پر پوستوں

کی طرح اسکے چوڑا منہ سے ٹوک کر نادر کو آرام دیتا ہے۔

داخلی طور پر خوشبودار تلخ مقوی معدہ ہے۔ اسکا ٹیکرم فیوزن زیادہ مقدار میں پینا ایک سالانہ اور بعض مسمیٰ ہے۔ جو غلبہ صفرا میں پیدا ہو اسکا روغن یا اگر اسٹراکٹ بغرض تقویت معدہ اور اخراج ریا ح سہلات کو استعمال کیا جاتا ہے۔
خمر روغن اسے ہر قطرہ تک۔ اسٹراکٹ ۲ سی۔ اگر تک فیوزن ۱۰ سے ۱۱ اونس تک۔

انٹروائیٹس Enteritis سوزش اسحاق کا بیان دیکھو۔

انٹروائیٹس Intertrigo چونکہ یہ محض ایک صورت اری تھیابا اگر تھیابا ہو جو بغل اور کولہ وغیرہ

مخامات میں جہانکہ جلد جلد سے رگڑتی رہتی ہے۔ واقع ہوتا ہے۔ پس اسکا علاج بھی انھیں اسباب کی مطابق ہونا چاہیے یعنی جابے ماؤف کو خوب صاف اور خشک رکھنا جاذب اندر مسکن سفوف مثلاً فادرل اس ارتھ زنک آکسائیڈ سے بورک ایسڈ لیمونہ وغیرہ کرنا یا زنک آکسائیڈ یا دیسلین گنین وغیرہ لگانا۔ باضمینہ و صحت کو مقویات۔ ورزش غفل اور عمدہ غذاؤں سے اصلاح کرنا۔

دیکھو بیان اری تھیابا و اگر تھیابا۔

انٹرکاسٹل نیوریلجیا Intercoastal Neuralgia اسکا علاج عام عصابی

در دوں کو مطابق کرنا چاہیے جسکے اصول مختصر طور پر یہ ہیں اگر کوئی خاص سبب مثلاً قبض۔ زیادتی محنت و تفکرات۔ قلت وقت خون بدھمی۔ مادہ وجع مفاسل یا آتش کسی رسولی یا انھار کا عصب پر دباؤ وغیرہ معلوم ہو تو اسکا علاج و دفعیہ کرنا۔ خارجی طور پر نفعال یا کلوئیل کمفر یا رالی کا پستیر یا اسپلا سرم کنٹھیریز یا سیلا ڈونا پلا سٹیا یا سیلا اور انٹی بائیرین و کوکین کی جلدی بچکاری یا ایوینکچر یا خشک گلاس یا سینک یا مالش وغیرہ واقع درد نڈا کرنا داخلی طور پر اینٹی بائیرین۔ اینٹی فیزین جیلیسی میم۔ آر سنک۔ پکریٹ آف امونیا۔ البسٹیم وغیرہ اینٹی پیریاکک ادویہ دینا اگر ضرورت ہو تو مدرات و سہلات بہت استعمال کرنا۔

انٹرمیٹنٹ فیور Intermittent Fever ملیریا فیورز کا بیان دیکھو۔

انٹروپین Entropion بلکوں کی امراض کا بیان دیکھو۔

انٹریلجیا Entralgia کالک۔ تو لہج۔ دیکھو تو لہج کا بیان۔

انٹرسسپشن Intussusception

انٹسٹینل آبسٹرکشن Intestinal Obstruction انٹروائی کارک جانا۔ انٹری کے

کسی حصہ میں ایسی روک واقع ہو جانا جسکی وجہ سے براز اور ریاہ کلی یا جرمی طور پر خارج نہ ہو سکیں۔
اقسام۔ (۱) انٹرسسپشن۔ انٹری کا ایک حصہ دوسرے حصہ میں اوڑھنا۔ یہ اس طرح سے واقع ہوتا ہے کہ کسی حصہ میں ریاہ جمع ہو کر اسکو پھلادین اور زائد و صلوں کی وجہ سے وہ حصہ چپکا ہوا بھی ہو ایسی حالت میں اخراجی حرکت کیوقت جب انٹری اوپر سے پیچھے کو سگڑتی ہوئی جاتی ہو اوپر کا حصہ پیچھے کے حصہ میں اوڑھ آتا ہے۔ پھر اسکا حصہ اوڑھنے کے بعد اخراجی حرکت کے ساتھ اوڑھ

زیادہ انٹری نیچے اترتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح سے انٹری سے انٹری بھر کر روک واقع ہو جاتی ہے جیسا کہ نقشہ ذیل میں ظاہر کیا گیا ہے۔

اکثر یہ حالت ایچ ایم کے انفال پر ہوتی ہے۔ ایچ ایم کا نہ سیکم کے اندر اتر کر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک لائن سے لیکر چار فٹ تک۔ اندر چلا جاتا ہے کبھی چھوٹی انٹری تمام درودہ سے گذر کر مفعد تک پہنچتی ہے جب انٹری کا ایک حصہ دوسرے مین اتر آئے تو اول پر دباؤ پڑ کر اسکا دوران خون بند ہو جاتا ہے جسکی وجہ سے اجتماع خون ہو کر پیلے اندرونی حصہ متورم ہو جاتا پھر مردار پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مردار شدہ حصہ کے چھپرے علیحدہ ہو کر لڑکوں کا ساتھ خلیج ہوتے رہتے ہیں اور بیچ کا حصہ بالائی حصہ سے بیوست ہو کر جانبی کی صورت ہو جاتی ہے۔ اور کبھی انٹری میں سوراخ بکھر پٹ کا درم ہو جاتا اور مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسکا دوسرا نام انونجی ٹین بھی ہے۔

(۳) انٹری کے اندر اشیاء وغیرہ جس کا اجتماع ہو کر روک ہو جاتا مثلاً براز، صفراوی تھیریاں، سکریم، اڈویہ، ناقابل ہضم مثلاً الکا، ڈائف آئرن، میگنیشیا سلفاس۔

(۴) خارجی دباؤ مثلاً رسولیون یا ڈنبل یا انورزم سے چونکہ انٹری کے اندر ہوں یا کوئی عضو مثلاً رحم اپنی جگہ سے جگہ کر کر انٹریوں کو دبا لے۔

(۵) سٹرکچر جو پیل یا سیلگٹ ہو سکتی ہے۔

(۶) سٹرنگوئیڈ ہرنیا جو دو قسم کا ہو سکتا ہے۔ اول خارجی یعنی اگلی نل فیمل ایسی لائن کل وغیرہ دوم اندرونی مثلاً ڈایا فربک، بیگ، جنس اوقات فلکے من و نزول یا ڈی لائن و ڈک مین انٹری اور ترک بند ہو جاتی ہے۔ پیری ٹوٹائی ٹس ہو کر فائبرس، رباط پنچا تے ہیں۔ اولوں میں انٹری اور ترک اندرونی ہرنیا ہو سکتا ہے۔

(۷) والوولس انٹری میں بل یا خم پڑ جانا۔

(۸) انٹریوں کے ریشوں میں شیش یا قلع کچھ ہو جانا۔

خواہ کسی طرح سے ہو جب انٹری میں سخت روک واقع ہو جاتی ہے تو براز اور یاں بند ہو کر سخت درد اور نفخ ہو جاتا اور مریض نہایت ہی سچین اور نڈ بال پڑ جاتا ہے نئے کثرت آلی اور کثرت ادھین براز خارج ہوتا ہے بیت پھول جاتا اور پیری ٹوٹائی ٹس ہو کر ہلاکت تک نہایت پہنچ جاتی ہے پیشاب بھی دباؤ کی وجہ سے بند ہو جاتا تمام کالیف کو دبا کر دیتا ہے ایسے مریض کے علاج میں ایک ایک منٹ جان کی قیمت رکھنا ہے مگر جو کچھ روک کے اسباب نہایت مختلف ہوتے ہیں اور ان میں سب کا علاج بھی علیحدہ علیحدہ ہے اس لیے اس کے لیے

علاج وجوات بالا پر نظر ڈالنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انشڑوں کی روک کا علاج کوئی آسان امر نہیں ہو بلکہ بہت غور و فکر چاہتا ہے۔ انشڑ خالی ہی میں کہ دوں۔ انہیں کچھ فائدہ نہیں آسکتی بلکہ عن جراحی ہی کچھ آرام کی امید ہو سکتی ہو ورنہ کچھ اگر تشخیص سے یہ معلوم ہو کہ روک کی وجہ کسی قسم کا خارجی ہاؤ ہو۔ تو اسکا علاج مالش وغیرہ سے ہو سکتا ہو۔ جہیں درد رفع اور قبض کا علاج طبیات مسہلات اور فحیح اور دیگر کر سکتے ہیں۔ اگر رحم بے جگہ گر پڑا ہو۔ تو اسکو خشک جگہ پر دیتا چاہئے اگر کوئی سسٹ موجود ہو۔ تو اسکا پانی نکال سکتے ہیں۔ جب چند روز قبض ہو کر انشڑوں میں پانی خانہ جمع ہو گیا ہو۔ تو پانی میں پانی میں قوی صابون ملکر اور اس میں ایک ونس کیسٹر آئیل ملا کر حقنہ کرنا چاہئے۔ اور داخلی طور پر کیوون یا گلیسر آئل یا گلیسرین سلفاسن دینا چاہئے۔ بعض اوقات پاخانہ خشک ہو کر ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ حقنہ اور مسہلات اس پر کچھ اثر نہیں کر سکتے۔ تو یہ حالت میں اگر قعدہ کے قریب ہی انگشت یا کسی چوٹے چمچے سے کھر کھر نکال سکتے ہیں پتھریوں کی روک میں مالش اور افیون سے آرام مل سکتا ہو۔

اگر روک کی وجہ شریخ ہو۔ تو حسب مقام و کیفیت شریخ تداریک کرنی چاہئیں۔ اگر شریخ سپنل اور قعدہ میں اسکو قریب ہی تو ریکٹل جو خیر ہو اسکو شادہ کر سکتے ہیں۔ پہلے روز چوٹے سے چوٹی بوجی جو اس میں داخل ہو سکے شریخ سے گذار کر ایک گھنٹہ رہنے دیں۔ اور پھر روزانہ بوجی کا نمبر حسب موقع بڑاتے جائیں ساتھ ہی ساتھ روزانہ مسہلات انکلیشن جنسے پاخانہ نرم اور قیق آتا رہے دیتے رہیں۔ اگر شریخ نیگلنگٹ ہو۔ یا کوئل میں بوجی کی شریخ سے درد واقع ہے تو مصنوعی اینس کی غرض سے دائیں یا بائیں طرف کلاٹومی کرنی ضروری ہوگی۔ کیونکہ کسی میں مریض کی جان بڑی تصور ہو سکتی ہے۔ کلاٹومی کا بیان دیکھو۔

اگر اندرونی یا بیرونی ہرنیا کا گھٹ جانے سے روک پیدا ہوئی ہو۔ تو اسکا علاج اپریشن سے ہی ہو سکتا ہو۔ دیکھو بیان ہرنیا اولیہ ڈاٹومی کا جب انشڑوں میں خم بائل ٹرک روک ہو گئی ہو۔ تو اس میں زیادہ مقدار میں نیم گرم پانی سے حقنہ کرنا یا مریض کو انکلیٹ کر کے خوب ہلانا مفید ہو سکتا ہے اسکی ترکیب یہ ہے کہ مریض کو پہلے خوب بیہوش کر دیا جاوے اور بعد میں ایک مضبوط قوی آدمی اسکی انگلیں پکڑ کر اسکو اٹھا اٹھا کر اوپر گھٹنوں کو موڑ دھون پر خم دیکر خفہ بار مریض کو ہٹا دے اور آپ بھی اچھلک کر نیسے بلے نام جو انشڑوں میں موجود ہو کھل سکتا ہو ورنہ اگر شریخ کھلی رہتی یا اتفاقی سوراخ میں یا انشڑ کی کچھ میں پھنس گئی ہو تو وہ ان سے ہی نکال سکتی ہے یہ خفیہ انٹنس سس سپیشن ہی حقنہ اور انکلیٹ کر کے ہلایے ہو سکتا ہو۔ اگر کسی مقام میں سوزش ہو کر انشڑی چپک گئی ہو تو شکم پر مالش کرنے سے علیحدہ ہو سکتی ہے۔ اس طرح ہلانے سے پختہ مریض کے شکم پر ہر طرف مالش کرنا۔ اور جب اس اٹھایا ہوا ہو نیم گرم پانی سے زیادہ مفید اور اس قسم کو نا اس عمل کی مدد ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر چپنس پہلے شکم پر مالش کرے اور پھر انکلیٹ کر پانی اور حقنہ کرنے کو نہایت کامیاب طریقہ خیال کرتے ہیں۔ درحقیقت اس میں ہر قسم کے فائدہ کی امید ہے۔ کسی قسم کے ضرر کا اندیشہ نہیں ہے۔

انٹنس سس سپیشن اگر تھوڑی دیر کا ہو اور قعدہ میں انگشت سے معلوم ہو سکتا ہے تو کھلی سپنل ساڈر اسکو

ہنا کر نیکرم پانی یا ہوا بذریعہ پمپکاری زیادہ مقدار میں امداد پہنچا نا چاہیے۔ اس سے تمام انٹری اپنی جگہ پہنچ سکتی ہے۔ پانی بذریعہ معمولی اینٹا سرخ اور ہوا بذریعہ دھونکنیوں کو پہنچا سکتے ہیں۔

یہ تمام تذکرہ بالا تذکرہ ایسی حالت میں مناسب ہیں جبکہ علامات درد نفع بقیہ راری اور نقاہت غیر خفیف ہوں اور رو کو زیادہ عرصہ نہ گزرا ہو لیکن جبکہ درد اور نفع نہایت سخت ہوں بقیہ راری اور نقاہت بدرجہ غایت ہو جس سے یہ ثابت ہو کہ سخت روک ہو کر تمام انٹری بدبو دار ہواؤں اور برازی بھر گئی ہے تب یہ نہایت ضروری امر ہو جاتا ہے۔ کہ انٹریوں کو فوراً تمام زہریلے مادہ صاف کر دیا جاوے اسکے واسطے انٹر اکٹومی کی جاتی ہے جسکی ترکیب مابیل ہے۔ شکم میں ناف کے نیچے وسطی خط پر شکاف دیکر ایک یا دو انگشت اندر داخل کیا ویراں انٹری کا پھولا ہوا حصہ شکاف دیکر شکم کے قریب کھینچ کر فوراً اسکو دیوار کے ساتھ دیا جاوے اور تب انٹری میں سطحی شکاف دیکر ٹروکار جسکے ساتھ بڑکی نلکی لگی ہوئی ہو اندر داخل کر کے تمام انٹری کو خالی اور صاف کر دیا جاوے اور جب انٹری صاف ہو رہی ہے سو وقت اور زیادہ ٹانگی لگا کر انٹری کو دیوار شکم کے ساتھ مضبوط طور پر پسی سکتی ہیں۔ یہ یاد رہے کہ ایسی حالت میں ایک ایک منٹ جان کی قیمت کھتا ہے پس ہرگز تامل نہ کرنا چاہیے۔ اور جب انٹری صاف ہو چکو تو بعد میں روک کا اصل سبب و اسکی جگہ تحقیق کر کے اسکا دفعہ کر سکتے ہیں۔ جو ٹانگی لگائی جائیں وہ انٹری کی اندرونی تہ تک نہ پہنچنے چاہئیں۔ سخت حالتوں میں ہی پوشش کرتے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر علامات سخت نہ ہوں تو شکم میں ناف کے نیچے وسطی خط پر شکاف دیکر دو یا تین انگلیاں اندر داخل کر کے ہر چار طرف خوب ٹولنا چاہیے پس ایک کو دیکھیں اگر وہ خالی ہو تو سمجھنا چاہیے کہ روک اس سے اوپر چھوٹی انٹریوں میں ہوگی اور اگر بھولا ہوا ہو تو کون میں۔ جب خاص مقام روک کا معلوم ہو جائے تو حسب کیفیت روک کو ہیر کر نی چاہئیں (۱) انس سسٹینش اگر ممکن ہو ہاتھ سے درست کرنا چاہیے۔ لیکن اگر بہت سا حصہ انٹری کا مروار ہو گیا ہو تو اسکو قطع کر کے بالائی کو زیرین حصہ سے بیورت کرنا چاہیے (۲) اگر کوئی رسولی قابل خارج ہو یا بڑا البیس ہو تو اگر ممکن اور مناسب ہو اسکی مطابق اور پریش کر سکتے ہیں (۳) اگر اندرونی سٹرنگیوٹومی موجود ہے تو اسکو درست کرنا چاہیے (۴) اگر انٹری میں بل یا ختم معلوم ہو تو اسکو بھی ہاتھ سے درست کر سکتے ہیں۔ (۵) اگر کرم یا پتھر یاں جمع ہو کر روک ہو گئی ہو تو اعلیٰ انگلیوں سے ہلا ہلا کر پریشان کر سکتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو بڑی پتھری کو دور خوردہ جگہ سے دور لیکر انٹری کو اندر ہی اندر چھوڑ دیں۔ مصلحت فیل حالتوں میں کلاٹومی کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اول جب کہ روک ڈسٹنڈ کولن سے نیچے واقع ہو دو مرحلہ گمانڈ فلیکشن میں بل پر کر روک ہو گئی ہو سب سے پہلے جب کہ رودہ میں کنیر ہو کر روک ہوئی ہو چھا کر صید الیشی طور پر پھندہ موجود نہ ہو۔ پتھر جب کہ ریٹم اور شانہ کو درمیان کنیر ہو کر پھنچا لائینی نامور ہو گیا ہو۔

ان تمام حالتوں میں رخ دیکر لے بلایا ونا اور انیون کم مقدار میں دیکھی ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ انیون سے انٹریوں کی دیواریں نہایت کمزور ہوتی ہیں اور انکی جمع ہونا اور بھی اندیشہ ہے اور تیز سے اس سے علامات

میں تغیر ہو کر تشخیص میں مشکل واقع ہو سکتی ہو۔ پہلے اس کو کھلائی میں نہایت احتیاط لازم ہے۔ انٹسٹینس میں اس کا یہ خاص فائدہ ہے کہ انٹریوں کی بیری سٹائلنگ حرکت کو بند کر کے اس کو زیادہ نہیں ہونے دیتی۔

خوفاک نہایت قلیل المقدار اور کثیر الغذا لائٹ مینی چاہیے۔ اگر مدہ میں کوئی شے ہضم نہ ہو سکو تو بذریعہ حقنہ دودھ۔ بخنی۔ برانڈی۔ بھنے۔ خام وغیرہ دیکر چاہئیں۔ دودھ ایسی حالت میں اکثر موافق نہیں ہوتا۔ ماروٹ۔ ساگو دانہ۔ بخنی اور شور و اچھے کئے ہیں۔ اگر قدرتی طور پر خود بخود ہضم کو آرام ہو جاوے تو بعد میں چند روز اس کو نرم رقیق غذاؤں اور ہر طرح کے آرام کی ہدایت کرنی چاہیے تا وقتیکہ تمام آثار درد وغیرہ جلتے ہیں۔

انسانی دل و دماغ - **Intestinal Inflammation** - انٹریوں کی سوزش

اسکی مختلف اقسام ہوتی ہیں (۱) الکیوٹ انٹرک کٹار یعنی انٹریوں کا نزلہ شدید (۲) محدود سوزش جسمیں انٹری کی تمام دیوار کی جگہ پر متورم ہو جاتی ہو (۳) ڈیوڈی نائیٹس۔ یعنی امعا اثنا عشر کا نزلہ (۴) ٹفالیٹس اور پیری ٹفالیٹس۔ اسپیسیکل اور اگلے گڑھ کی ساختیں متورم ہوتی ہیں (۵) کولائٹس یعنی رودہ کی سوزش۔ (۶) کرائک انٹرک کٹار یعنی انٹریوں کا پرانا نزلہ۔ اسباب۔ ضرب غیر زخم یا غیر ہضم غذا کی خراش۔ صفراوی کنکریوں یا سخت براز کا جمع ہونا زخم۔ رسولی کبھی کبھی قہری عضویات سے انٹری میں درم پہنچ جاتی ہے۔ علامات۔ قویخ کے مشابہ یا کٹ کر تاہو اور درگہ گراہٹ اور بلغم امیز اسہال۔ بدبودار اور پشیش کو مشابہ اسہال بچوں میں اکثر قے ساتھ ہوجاتی اور رقیق بلغمی بے رنگ یا سبز دست آتے رہتے ہیں سخت حالتوں میں بخار ساتھ رہتا اور عام قہا بہت زیادہ ہوتی ہو زبان سرخ اور خشک ہوتی ہو کبھی کبھی بخار بند ہوجاتی ہو اور کبھی تشنج اور بیوشی ہو کر موت واقع ہوجاتی ہو۔ محدود سوزش میں موقوف حصہ پہلے تشنج ہوجاتا ہے پھر مفلوج۔ ہر طرح سے آبکشرش ہو کر سخت علامات شروع ہوجاتی ہیں جو ٹفالیٹس آبکشرش میں بیان کی گئی مقام و درم سخت درد ہوتا ہے جو دبائے اور حرکت کی زیادہ ہوجاتا ہے غلیان قے نفع ہو کر وریض کو جلد جان بلب کر دیتے ہیں قے میں براز آنے لگتا ہے زبان خشک اور سیاہ ہوجاتی ہے۔ ڈیوڈی نائیٹس میں یرقان ساتھ ہوتا ہے کیونکہ صفراوی نالی نزلہ اور درم کی وجہ سے رگ جاتی ہے ٹفالیٹس اور پیری ٹفالیٹس میں اپنی کچھ ران بردہانے سے سخت درد ہوتا ہے اور وہ مقام دیکھنے سے متورم نظر آتا ہے۔ امراض متشابہ۔ اسہال پشیش۔ قویخ پیری ٹفالیٹس پیٹ کا پھوڑا کبھی خاص جگہ میں درم کا ہونا نایفائدہ دلایا۔ علامات تشخیصی۔ مچھن اسہال میں بخار۔ اور درد محدود نہیں ہوتا اور نہ اسپیسٹک خون ساتھ خارج ہوتے ہیں پشیش میں درد محدود نہیں ہوتا بلکہ کئی کئی طرح سے تمام حکم میں ہوتا ہے شدت بخار نفع اور خاص قسم کی بدبودار مینی قویخ میں بخار نہیں ہوتا۔

پیری ٹفالیٹس۔ مریض سکڑا ہوا ہوتا ہے ہر قسم کی حرکت سخت درد ہوتا ہے پیٹ کا سسٹن سلطوم ہوتا ہے سانس میں بٹ کر حرکت کر کے دیکھتا ہے شدت درد اور نفع

پیٹ کا پھوڑا۔ اسکا ورم علیحدہ دیوار شکم میں یا پیٹ کے اندر معلوم ہو سکتا ہے۔ انٹریوں کو نل میں اس سے کچھ خلل نہیں آتا اور نہ براز کے ساتھ پیپ یا خون یا بلغم خارج ہوتے ہیں۔
 ٹائیفائیڈ یا ریاس بخار ٹائیفائیڈ کی خاص علامات ساتھ ہوتی ہیں زیادہ تفصیل کے لئے ان امراض کا بیان دیکھو۔
انسانی نل ٹیوبرکل۔ انٹریوں کا نل۔ بعضوں کی یہ سلسلے ہر کہ سل کا اصل مادہ یعنی ٹیوبرکل بیلانی سرایت کر کے انٹریوں میں سخت پھنسیاں جنکا نام ٹیوبرکل ٹائیفائیڈ ہے بنا دیتے ہیں اور بعض کی یہ سلسلے ہر کہ غدود بڑھ کر گلے شروع ہو جاتے ہیں مگر ٹیوبرکل بیلانی انٹریوں میں شاذ و نادر ہی جگہ کرتے ہیں۔ یہ مرض بچوں میں کثرت ہوتا ہے۔ جوانوں میں پھیپھڑے کا نل ہونے کے بعد اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ ٹیوبرکل بیلانی ٹیوبرکل کے ساتھ معدہ میں چلے جاتے اور پھر وہاں سے انٹریوں میں پہلے انٹریوں کے غدود میں اور ذرات بن کر سخت نوڈ بن جاتے ہیں۔ پھر یہ نوڈ گلے گول زخم سے بچاتے ہیں جو ہر طرف انٹری کی ساختوں کو کھاتے جلتے اور بڑھتے جاتے ہیں۔

علامات۔ سخت اور ناقابل علاج اسہال جاری رہتے۔ مرض بہت جلد گھٹتا اور نحیف ہوتا جاتا ہے براز کے ساتھ بلغم اور گلی ہوئی ساختیں خارج ہوتی ہیں۔

انسانی نل نیوفارمیٹیشنز۔ انٹریوں میں رسولیاں پائی ساختیں ہو جانا مثلاً سرطان ٹیوبرکل۔
 البیومی ٹائیفائیڈ۔ ٹائیفائیڈ زائڈ ریشہ۔ ولای کا بڑھ جانا۔ رسولیاں پیدا ہو جانا۔ ان تمام امراض کا علاج علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا ہے۔

انسانی نل ڈیزیزز Intestinal diseases یعنی انٹریوں کے امراض انکی تفصیل ذیل ہے۔
 (۱) قلعج (۲) قبض (۳) اسہال (۴) ملینا یعنی پانچمانہ کے ساتھ خون کا خارج ہونا (۵) سوزش امعاء۔
 (۶) کٹار یا انٹرکٹار یا انٹرائل ٹس۔ ڈیوڈی ٹائٹنس۔ ٹیفلائی ٹس۔ پیری ٹیفلائی ٹس۔ گولائی ٹس (۷) پھیپش (۸) انٹریوں کی رسولیاں اور زخم یعنی انسانی نل نیوفارمیٹیشنز اور انڈر (۹) ٹیوبرکل فونڈی انٹیشنز (۱۰) البیومی ٹائیفائیڈ ڈیزیز (۱۱) انٹرائل ٹس (۱۲) انٹرائل ورم۔

آپ اب دیکھ رہے ہیں انسانی نل نیوفارمیٹیشنز اور انڈر اور انٹرائل ورم کا بیان کر لیں۔ باقی امراض کا بیان مگر ناموں میں دیکھو۔
انسانی نل نیوفارمیٹیشنز اور انڈر Intestinal New Formations یعنی انٹریوں میں رسولیاں اور زخم وغیرہ ہو جانا۔

(الف) نیوفارمیٹیشنز مفصلہ ذیل اقسام کے ہوتے ہیں۔ (۱) کنڈیسی سرطان (۲) ٹیوبرکل یعنی مادہ سل۔ (۳) ٹائیفائیڈ کا مادہ (۴) البیومی ٹائیفائیڈ کا مادہ (۵) فائبرس ٹیوبرکل (۶) رسولیاں جو کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ ولای کا بڑھ کر پولیپس بن جانا۔ چربی یا پانی یا غدود یا جھول والی رسولیوں کا بننا۔
 (ب) زخم امعاء۔ انٹریوں کے زخم۔ یہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو خاص خاص امراض کے زخم

میں پیدا ہو جائیں مثلاً آشک، بزل، پچس، سرطان، ٹائیفائیڈ، البیومی ٹائیڈ، ڈیزیز میں انکو سپر سی فلک السرز کہتے ہیں۔ دو دیر وہ جو علیحدہ طور پر پیدا ہوں۔ یہ چار طرح سے ہو سکتی ہیں۔ (۱) کسی سخت شے کی رگڑ یا کاٹ کر نیوالی چیزوں کا اثر مثلاً پتھری، کنکر وغیرہ منہم دانہ۔ خشک شدہ ہوان کی ڈلیون کی رگڑ سے۔ یا سنگیہا، یاد اچکنا یا کسی تیزاب کی کاٹ سے (۲) دم ہو کر یا سپر کر یا چھپچھپ کر کسی حصہ میں زخم ہو سکتی ہیں۔ (۳) قریب پہوڑا انٹری میں سورج کر سکتا ہے (۴) خاص انٹری کی دیوار میں پہوڑا ہو کر اندر اندر چھوٹ جا۔ ان چاروں قسموں کے زخموں کو غیر سپر سی فلک کہتے ہیں جب انٹری میں کسی قسم کا زخم ہو جا۔ تو اسکی علامت حسبِ لہو ہوتی ہیں کسی خاص نقطہ پر شکم میں درد معلوم ہوتا۔ اور دبا نیسے اسکی زیادتی ہوتا۔ گرد دکا ہونا لازمی نہیں ہے۔ کہی ایسا ہی ہوتا ہے کہ باوجود زخم کے درد نہیں ہوتا۔ خاص مقام پر قلعج کا درد محدود رہتا۔ دستوں میں خون، بغم اور پیکل خارج ہونا بعض اوقات سخت قبض رہتا ہے۔ اگر زخم ڈیوڈی نم یعنی امعاء انا عشر میں ہو تو سخت قہر ہو جاتی ہے اسہال درد تھے فساد اضمہ اور کی غذائیت کی وجہ سے مریض گھٹتا جاتا اور جلدی لاغر و کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر زخم انٹریوں کی دیوار کو کھاکر جوف شکم میں جا کھلو۔ یا اسکا زہریلا اثر سرایت کر جاو۔ تو سپری ٹونالیٹس ہو جاتا یا شکم کے اندر خون کثرت سے بہ جاتا ہے۔ کبھی زخم اچھا ہو کر شکر ہو جاتا ہے۔ سب کے زخموں میں بہو کہ بہت لگتی اور دست براہ جاری رہتے ہیں سپر سی فلک السرز میں خاص خاص امراض کی علامات ساتھ موجود ہوتی ہیں۔


ان امراض کی تفصیل پر نظر ڈالنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انکی تشخیص اور علاج بنیاداً مشابہہ اور شکل امراض کا علاج معجز اسبقدر ہو سکتا ہے کہ جو علاوہ درد تو اسہال، بلیٹا وغیرہ شدید معلوم ہوں۔ انکا دفعہ کرتے رہیں اور مقوی غذاؤں اور دواؤں وغیرہ سے مریض کی طاقتیں رکھیں مفصلہ ذیل عام اصول کی پیروی مفید ہو سکتی ہے۔

- (۱) غذائیات لطیف سیرج لہضم رقیق اور سادہ کھلائیں۔
- (۲) اکلید آرام دیں۔ ہر قسم کی حرکات اور ترددات سے آزاد رکھیں۔
- (۳) مسکن امعا اور مثلاً افیون، بیلادونا اور ہیستیمہ کا استعمال کھیں۔
- (۴) زخموں کو اندمال کو لئے مفصلہ ذیل تدابیر ہیں۔

ہستیمہ کاربوناٹس ڈوورنس پاؤڈر کے ساتھ کھلانا نائیٹریٹ آف سلور (۵) سے ۹۰ گرین تک، تین پائینٹ پانی میں ملا کر حقن کرنا سلفیٹ آف کاپر ایسی ٹیٹ آف لڈ آکسائیڈ آف نیک بےغھے لین سیلال براسرین آئیوڈو فارم آئیوڈول۔ پانی ڈرائین ٹیکہ ہا میلین

و غیرہ براہ دہن یا دبر استعمال کرنا۔

انٹسٹینل ورم Intestinal Worms گرم امعا و دہم کے ہوتے ہیں بد اول ہستوڈ سینوڈ فینے کی طرح چپے اور بے ہوتے ہیں اسلئے انکا دوسرا نام ٹیپ ورم بھی ہے اسکی تین برسی جن میں جو انسان کی انٹریوں میں داخل کر لیتی ہیں۔



اس جو رس کا۔

اول ٹینیا سلیم۔ سرگول یا قد سے بیضوی۔ چار منہ جسے اپنی غذا چوتاہے۔ ایک تھوٹھنی

اجہری ہوئی جبکہ گرد و قطاریں سخت ڈنکو کی ہوتی ہیں۔ گردن پتلی اور لمبی ہوتی ہے۔

دو لیم ٹینا میڈیو کئے لاثا۔ سرگول۔



چار منہ مگر تھوٹھنی اور ڈنک ندارد۔ اور

مگردن ٹینا سلیم کی نسبت موٹی۔

سویدہ۔ ہاتھ کو کیسے لس لٹیں۔ اسکا

سر مدگر کی شکل کا۔ دونوں طرف لمبی شگافی منہ

گردن پتلی۔ ڈنک ندارد۔



ٹیپ۔ ورم کمر لگ الگ چورس ٹکڑے ہوتے ہیں جو طے چلے جانے میں اور اگر مریض کے پاخانہ

کے ساتھ ٹوٹ کر نکلتے رہتے ہیں یہ الگ ٹکڑے دانہ کدو کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس واسطے انکا نام کدو دانہ عام

طور پر مشہور ہے مگر کدو دانہ پورا کثیر انہیں ہوتا۔ بلکہ اسکا ٹکڑا ہوتا ہے۔ کل طول ٹپ ورم کا ایک گز سے

بچاس گز تک دیکھا گیا ہے اوسگاہ ۵ فٹ سے ۲۰ فٹ تک لمبا ہوتا ہے۔


دویم ہینے ٹوڈیا چار قسم کے ہیں جو انسان کی انٹری میں دخل کر لیتے ہیں۔

(۱) ایسے رس لمبری کا ٹڈیز۔ یعنی حیات یہ ظاہر ادبھین میں خراطین یا کیچون کر مشابہ ہوتے ہیں مگر طر

موٹے اور دم کی طرف گاؤ دم ہوتے جاتے ہیں۔ طول ۶ انچ سے ۱۱ انچ تک موٹائی ۱ انچ سے ۱ ۱/۲ انچ

تک۔ رنگ سرخی اور زردی مائل۔ سر پہنہ کے گرد تین چھوٹے چھوٹے اونچا ہوتے ہیں۔ منہ کے

اندز بہت سے چھوٹے چھوٹے دانت ہوتے ہیں۔



حیات جیسے ایسکیرس لمبری کا ٹڈیز۔

۳) اگسی یورس واری کو لے رس۔ تھریڈ ورمز چلو نہ بہت چھوٹے اور ٹکڑی طرح دونوں

طرف گاؤ دم ہوتے ہیں۔

۴) ۱ انچ سے ۱ ۱/۲ انچ تک لمبا اور پھلور سرے پر پھیدہ ہوتا ہے جسکے کہ اعضاء ولادت ہوتے ہیں۔ اور

مادہ نصف انچ کے قریب لمبی جی نہ سے باج یعنی نیادہ

اور سیدی ہوتی ہے۔ سر میں تین لمبوں والا منہ

ہوتا ہے پشت اور پیٹ کی طرف پر کی طرح کی قدر

پیدا ہوتا ہے۔





۱۳) ٹرائی کو کیفے لسٹ سپار۔ ہیر ورمز بال کپڑے سر پہنے ہوئے ہیں اور ایک دو پانچ لے ہوئے ہیں۔ یہ بالوں کی طرح پتلے اور ایک دو پانچ لے ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔

۱۴) انکائی لاسٹوم ڈیوڈی نلی۔ یہ چھوٹے چھوٹے سرخ رنگت کو کپڑے ہوتے ہیں جو سر کر وریب کلہاڑی کی طرح مڑے ہوئے ہوتے ہیں جس میں جسم سخت اور مضبوط اور پیالی نما ہوتا ہے۔

۱۵) جبرے میں دو دانت اور اوپر کے جبرے میں چار دانت ہوتے ہیں۔ مادہ قرینا نصف انچ اور زرد رنگ زیادہ ہوتا ہے۔



خورد و بینی نظارہ

انکائی لاسٹوم ڈیوڈی نلی

۱۶) آبان کیڑوں کی سوانح عمری سنورا اسٹو ویجی کدروانہ انسان کو معا میں ہوتے ہیں اور ان کی کڑے ٹوٹ کر براؤن سا تھخہ خارج ہوتے رہتے ہیں ہر ایک کڑے انڈان خود بھی ایک کامل حیوان ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک کڑے میں نر اور مادہ کے خاص اعضاء اکٹھے ہوتے ہیں۔ خارج ہوئے بعد انڈانوں میں کوانڈے پیدا ہو جاتے اور پھر خراب پانی یا بھیلوں وغیرہ کو ذریعہ سے کسی دوسرے حیوان کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ انڈوں میں ہینچکر انڈوں کا چھلکا پھٹ جاتا اور بچہ باہر آ جاتا ہے اب یہ بچہ یا تو انڈوں میں بسیر کر لیتا ہے یا اون کو چھید کر گوشت یا جگر یا کسی اور عضو میں جو اسکے مناسب حال ہو جا چھتا ہے اور پرورش پاتا جاتا ہے یہاں تک کہ اسکی گردن کو بچھے ایک تھیلی لگ جاتی ہے۔ اس حالت میں اسکو سسٹی سرکس یا لیڈر ورم کہتے ہیں۔ پھر اتفاقاً جب کوئی انسان ایسے جانور کا گوشت کھا بیٹھتا ہے جس میں کوئی لیڈر ورم ہو تب یہ لیڈر ورم اسکی انڈوں میں ہینچکر رہنا شروع کرتا ہے تھیلی گر جاتی اور وہی چو گوشت کڑے گتے چلے جاتے ہیں آخر کار کئی ٹ یا کئی گز کا بسافیتہ سا بن جاتا ہے۔ پس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سسٹوڈ کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک تھیلی دار صورت جسکو لیڈر ورم کہتے ہیں۔ اور دوسری فیتہ والی صورت جسکو ٹیپ ورم کہتے ہیں جس جانور میں ٹیپ ورم ہو تو اسکے انڈوں سے براہ راست اوسکو اندر ٹیپ ورم نہیں بنتا بلکہ پہلے دوسرے کسی جانور کے اندر اوس کے انڈوں میں لیڈر ورم ہو کر پھر اس میں اندر ٹیپ ورم بنتا ہے مثلاً ٹینیا سولیم کا ٹیپ ورم انسان کے اندر ہوتا ہے۔ براؤن کے ساتھ اسکے کڑے خارج ہو کر انڈے باہر آ جاتے ہیں جب کوئی سو اسکو کھا جاتا ہے۔ تو اسکے گوشت میں اسکے لیڈر ورم بن جاتے ہیں اور جب انسان سو کا گوشت کھا جائے تو اسکی انڈوں میں ٹیپ ورم ہو جاتا ہے اس طرح ٹینیا میڈیو کے لاکھا ٹیپ ورم انسان کے اندر اور لیڈر ورم بھیلوں یا جھینگوں کے اندر ٹینیا اکائی نو کا کس کا لیڈر ورم انسان کے اندر اور ٹیپ ورم بھیڑ یا کتے کی انڈوں میں ہوتا ہے

۱۷) اصطلاحاً جس طرح لوگوں کو اندر ٹیپ ورم ہو اسکو انکا میزبان کہتے ہیں اور جس کے اندر انکا بیڈر ورم ہو اسکو انکا حامل

اسطر جرنیا سولیم ٹینا میڈ پوکے ٹالا اور باہر کو کیٹے لس لپس کامیزبان انسان ہر اور ٹینا سولیم کا
 حال سور ٹینا میڈ نو کیٹے لانا کا حال گائے بیل اور باہر کو کیٹے لس لپس کا حال مچھلیاں -
 ۲) نیمے ٹوڈز میں کوئی حال نہیں ہوتا بلکہ جس حیوان کے اندر ہوتے ہیں تو اسکے پیٹ میں ہی خارج ہر
 اسی قسم کے حیوان میں خراب پانی یا پھلوں وغیرہ کے ذریعہ پینک پکڑے لگجاتے ہیں مثلاً چلو نہ ایک انسان اگر اندر
 نکل کر انڈے دیدیتے ہیں پھر یہ انڈے پانی یا پھلوں یا ساگ پات کے ساتھ دوسری انسان کے اندر
 پہنچ کر پک جاتے اور بچہ نکل آتے ہیں۔ یہ کیڑے انسان کے اندر کس جگہ اور کس تعداد میں رہتے ہیں۔
 ٹیب ورم۔ انسان کی چھوٹی انٹریوں میں رہتے ہیں شاذ و نادر وہ اور مدہ میں بھی آجاتے ہیں۔
 تمام مکڑے مگر ایک فیتہ سا بنجاتے ہیں۔ ان کی اور خوراک کی نالی نہیں ہوتی بلکہ درخت کی طرح باریک نالیوں
 کا سلسلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ اپنی غذا چوستے ہیں۔

حیات یعنی لارونڈ و دم جنکو ایسکیس لمبری کا یڈیز کہتے ہیں یہ زیادہ تر چھوٹی انٹریوں میں
 رہتے ہیں مگر کبھی کبھی رودہ متعدد بھری بول اور فرج میں اور کبھی مدہ مری۔ ناک جنہ اور زرخہ میں بھی چکر
 جلتے ہیں۔ تعداد میں کبھی ایک یا دو اور کبھی سینکڑوں ہو جاتے ہیں۔

چلو نہ یا تھس یڈ ورم یا کسی یوسر میں ورمی کوئی مریں۔ زیادہ تر یکم میں ہوتے ہیں دیر یا
 سے کبھی کبھی انٹریوں متعدد فرج اور عضو تناسل کی کھال میں اور کبھی مدہ میں چل جاتے ہیں۔ تعداد میں
 سینکڑوں اور ہزاروں ہوتے ہیں۔

ٹرائی کو کیٹے لس ٹوسپار۔ بال کیڑے زیادہ تر یکم میں ہوتے کبھی کولن اور الیم میں بھی چل جاتے ہیں
 تعداد میں تھوڑے سے اور کبھی سینکڑوں ہو جاتے ہیں۔

اکھانی لاسٹو م ڈیوڈی نلی۔ کھانسی کی شکل کے کیڑے۔ بہہ ڈیوڈی نم یعنی امحائے اثنا عشر میں
 ہوتے ہیں۔ کبھی ایک اور کبھی بہت سی ہو جاتے ہیں۔

علامات۔ بعض اوقات کسی قسم کی کالیف ظاہر نہیں ہوتی مگر اکثر ٹریون میں خراش ہونے کی وجہ سے سوزش
 کی علامات ظاہر ہوتی اور آفون کے اسہال آتے ہیں۔ منہ آنکھ۔ ناک اور اوہ ہر دیر فرج اور عضو
 تناسل کے گرد کھجی رہتی ہے جسم لاغر ہوتا جاتا ہے۔

ذیل میں ان کی خاص خاص علامات درج کی جاتی ہیں۔

ٹیب ورم اور اوڈ ورم یعنی گڈا وڈانہ و حیات جسم کے تمام سوراخوں کو گرد کھجی رہتی ہے چھوٹا
 ہوا دانت رکھتا اور رالین کثرت سے جاری رہتی ہیں۔ کانوں میں شور۔ آنکھوں میں جھنڈ اور شعلہ
 سر میں درد چکر اور گرانی۔ پتلیان کشاوہ۔ بلکین بھی ہوئی ہے ہرہ اور اطراف کے عضلات میں بے ارادہ
 حرکات بعض اوقات تشنچ اور احتلاج القلب حلق میں تکی۔ حیض کے فسادات وغیرہ ظاہر ہوتے ہیں

طبیعت بخیر۔ اور کبھی ہوئی رہتی ہے جسم لاغر اور پھیکا لے آب ہوتا جاتا ہے۔
چلو نہ۔ چونکہ یہ بہت ہی بیشمار ہوتے ہیں اسلئے تمام مذکورہ بالا علامات زیادہ تیز ہوتی ہیں۔ کبھی اسہال
جیش اور خراج المقعد بھی ہو جاتے ہیں۔ کبھی عضائے ولادت میں پیچ کر حلق کے متحرک ہو جاتے ہیں۔
ٹرائی کو کیٹس دسپاریں کوئی خاص علامات ظاہر نہیں ہوتیں۔

اکائی لاسٹوم ڈیوڈی ٹلی۔ کھارڑی کی شکل کے کپڑے۔ یہ رگوں میں خون چوتے سے ہیں۔ جب ایک کو
چھوڑ کر دے۔ ہی رنگ کی طرف جاتے ہیں۔ فوٹکے دنگوں میں خون جاری ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ خون اس قدر
سے خارج ہوتا ہے کہ سرخ ہوتا ہے۔ ہاضمہ خراب رہتا ہے۔ جریان خون کی وجہ سے جسم بہت جلد لاغر
کمزور اور بے آب ہو جاتا ہے۔ تبخیر خراش اور اسہال لدم اس کیٹس کی خاص علامات ہیں۔

تشخیص تمام علامات مذکورہ بالا پر نظر کر کے خیال ہو سکتا ہے کہ کس قسم کے کپڑے موجود ہیں مگر یقینی رائے جب
قائم کی جاسکتی ہے جبکہ مریض کا راز خوب غور سے شول کر کپڑے میں چھان کر دیکھا جائے۔

علاج۔ اول۔ سیسٹوڈینیٹ ڈرام کا علاج بیشتر اس سے کہ مریض کو کوئی مخرج کرم دوا دیا جائے۔ دو مین ڈرام
ملیناٹ تیرین۔ تاکہ انٹریان براڈ اور لیڈ مار طوبات صاف ہو جائیں اور اس عرصہ میں غذا رفیق مشن بخنی
اور شور بایتے ہیں۔ تیز مہلات کو کرم کے ٹکڑے علیحدہ ہو کر خارج ہو جاتے ہیں اور پھر اسکے سر کا نکالنا مشکل
ہو جاتا ہے۔ سلیفٹ آف سوڈا یا سیٹینیا ایک دو ڈرام یا کیسٹرائل چار ڈرام بہتر ہو گئی تیسرے یا چوتھے
کوئی قاتل اور مخرج کرم دوا استعمال کرنی چاہیے۔ جنکی تفصیل حسبِ دل ہو۔

میل زن۔ اسکا لکھوڈ اکثر الٹ نصف ہو ڈیڑھ ڈرام تک۔ ہم ڈرام سرپ اور ۱۲ اونس سے مین وار میں
لاکر اشد خوراک کو تین حصہ کر کے نصف نصف گھنٹہ کے وقفہ سے دینا بہتر ہو گا۔ اگر دو گھنٹہ تک اس کا حرکت
ہو کر کرم خارج نہ ہو تو کیسٹرائل ہم ڈرام یا سلیفٹ آف سوڈا یا سیٹینیا تین ڈرام دینا چاہیے۔

دیہی علاج اب تک عام طور پر بے بہتر خیال کیا جاتا ہے۔ اگر ایک روز کے استعمال کو کرم کا سر خارج نہ ہو تو دوا
بہتہ کے وقفہ سے دوبارہ کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ تا وقتیکہ سر خارج نہ ہو دوبارہ کرم کڑھ جائیگا اندیشہ ہے
کسو۔ اسفوف ۲ سے ۴ ڈرام تک۔ کو سین یعنی کسوکا الکا الکا اکثر ۳ گزین۔

انار۔ اسکی چڑکی چھال ڈیڑھ چھٹانک لیکر چھٹانک پانی میں بارہ گھنٹہ تک بھگو دیں اور پھر اسکو ال پر
جوش میں چھٹانک نصف پانی بھجادی اور اس جوشانہ کو تین چار دفعہ کر کے ایک گھنٹہ کاندھ پلائیں۔ اور
اگر ضرورت ہو تو بعد میں ایک خفیف سہل بھی دیں۔ ٹینٹ آف پلٹین ۲۰۰ گزین قدرے پانی میں ملا کر دیکھو ہیں
ٹوڈیا یا اسکو زیادہ مقدار میں کیسٹرائل کے ساتھ ملا کر دینا چاہئے۔ تاکہ جلدی سے انٹریوں میں پیچ کر کرم پر اپنا اثر کرے
ایک اونس ٹینٹائن ایک اونس کیسٹرائل کو ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں۔

کیلہ ۲۔ گزین کی خوراک میں شہدین ملا کر دینا چاہئے۔ اور دو گھنٹہ انتظار کر کے بعد ایک خفیف سہل دیں۔

نشتائی مال۔ چونکہ زیادہ مقدار میں جو اخراج کرم کے لیے ضروری ہو یہ دوران اور تنفس کو نہایت ضعیف کرتی ہے اس لیے اسکا استعمال کسی سرسٹی مولٹ دوا کو ساتھ کرنا چاہیے تین تین گرین کی گولیاں صابون اور سپرٹ میں بنا کر بیس بیس منٹ کو وقفہ سے تین چار گولیاں دودھ اور برانڈی کے ساتھ حسب ضرورت دیکھتے ہیں۔

کردن آئل ایک قطرہ کلورافارم ایک ڈرام گلیسرین، اڈرام۔ ہکا نصف ایکہ فمہ اور دوسرے نصف آدھ گھنٹہ بعد دینا نہایت عمدہ مخرج کرم ہے۔ زیادہ تفصیل کے لیے دیکھو بیان انحصار نکاس کا۔
حفظاً مقدم کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیشہ گوشت اچھی طرح چکاو اٹھا یا جائے اور کبھی بچا گوشت کا کڑا کی چھری نہ تھک نہ لالی جاوی موشی کی صحت اور دشت کی طرف نہایت توجہ ہونی چاہیے۔

دوم۔ الیکٹریس لمبری کا ٹڈی یعنی راونڈ ورم کا علاج۔ اسکے علاج کا خلاصہ مقرر ہے کہ ایک روز کی قحاشی اور استعمال مہلات کو بعد مفصلہ ذیل ادویہ میں سے کوئی دوا استعمال کیا وے۔

۱۔ سنٹونیکا ۱۲۱ سنٹونین ۲۵۲ گرین تک کیڈیٹل اور شکر میں گولیاں بنا کر ایکسٹریٹل میں ملا کر دیکھتے ہیں۔ بچوں میں اسکے استعمال سخت قوی اسہال تشنج اور بیہوشی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پس ان میں نہایت احتیاط لازم ہے (۳) کیلا۔

سوم۔ اگسی پورس دی کلیرس یا تھریڈ ورم کا علاج۔ اسکے علاج میں چند مشکلات ہیں۔ اول یہ کہ قریباً تمام جھوٹی اور بڑی انٹریوں میں پہلے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوم یہ کہ یکم اور دوسری فارم انڈیکسنگ کی کفایت قائم مستقیم اور قولوں سے انکو بدیعہ روزانہ حقیقہ صاف کرتے ہیں مثلاً انفیورن آف کو شیا جو شانہ برگ اپو کے لپٹس۔ لائٹم وارنٹسب ما آف الونز تک ۴ ڈرام ایک پائٹ پانی میں ملا کر گلیسرین اور پانی مساوی وزن۔ صابون اور پانی ۳۲ گرین صابون فی اولس پانی میں) سفیدی لین ۵ اے ۳۰ گرین ایکٹ اولس اولو آئل میں ملا کر خارجی طور پر دوسرے گرد مری آئینٹ کا لگانا خارج شدہ کرم اور بقیہ کے لیے قاتل ہوگا۔

روزانہ حقیقہ کے ساتھ داخلی طور مفصلہ ذیل ادویہ استعمال کر سکتے ہیں کیلومل سیمونیا جلیب۔ گندک۔

یونیورسٹی بقویات نولاد اور نبات وغیرہ مثلاً سلفیٹ آف آئرن۔ کواشیا کا ڈولوریل۔ فیبری ایٹ کوئین سائیراز۔
چہرہ۔ قرنی کوئیکس ڈسپار اور مکمل ہسٹوم ڈیوڈی نیل انک علاج میں کوئی خاص تدابیر اور قواعد نہیں زیادہ تفصیل کے لیے دیکھو بیان انحصار نکاس کا۔
انشتائی نل میمورج Intestinal Hemorrhage اسہال الدم ملینا دیکھو بیان اسہالی الدم کا
انجائنا پیکٹورس دیکھو بیان کارن کا

Angina Pectoris وجہ القلب اور کبھی تو دھت اور کبھی
تھوڑی تھوڑی بے چینی اور قلب کے مقام پر تکلیف ہو کر دل میں ایک سخت درد اٹھتا ہے جو بہاڑا ہوا

یاخیر نہ ہو یا جھوٹا ہو یا معلوم ہوتا اور مختلف سمتوں خاصکر بائیں بازو کی طرف پھیلتا ہے۔ ساتھ ہی سخت درجہ کی دکشی اور تقریری ہو کر جان ہوا ہوتی معلوم ہوتی ہے۔ چہرہ سیلا اور پھیکا ہو کر پسینہ سو تر تہر جاتا ہے۔ کہتی تے اور ڈکار بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ مرض تین قسم کا ہوتا ہے (۱) خفیف جسمین دہنیں جاتا (۲) اعصابی جسمین تمام قسم کی تکالیف تھوڑی تھوڑی ہوتی ہیں۔ اسکو انجائنا کاذب کہتے ہیں (۳) انجائنا صادق جسکا بیان کیا گیا۔

یہ مرض عیاش فقرص مزاج کو بڑھاپا میں ملتا ہے۔ مردوں میں عورتوں کی نسبت دس گنا زیادہ ہوتا ہے عموماً پہلے سیکوی قلب یا شریانوں کا مرض ہی موجود ہوتا ہے۔ مثلاً قلب کی پیارو نکا پتلا اور کشادہ ہو جانا۔ اسکی دیواروں میں چربی پڑ جانا۔ یا رٹایا کار دزی آرٹریز میں چونا پڑ کر تھوڑا ہو جانا۔ وجع القلب کو دورہ کی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک خود قلب کی دیواروں کا تشنج یا فالج ہو جانا۔ دویم ویسویٹا اعصاب کی تحریک و شریانوں کا سکڑ جانا۔ الغرض خواہ خود قلب کی دیواروں میں اعصابی خرابی ہو کر تشنج یا فالج ہونے یا شریانوں کو سکڑ جانے سے جب دوران خون ٹک جاتا ہے۔ تو بایں بطن القلب سخت تنجنا اور زور کرتا ہے۔ اسی وجہ سے سخت درجہ کا درد اعصابی دکشی اور بچینی اور دہشت مرگ غالب ہو جاتا ہے۔ مریض سینہ سینہ ہو کر ڈنڈال پڑ جاتا ہے۔ ابتدا اسکی نفخ، تعالت، مدد، غنصب یا جذبہ ہوتی ہے کہی اچانک گرم سرد ہونے سے ہی اسکا دورہ ہو جاتا ہے۔ الغرض ایسے ہی خفیف اسباب سے اسکا دورہ ہوتے رہتے ہیں۔

علاج۔ اس مرض کا علاج تین علاج میں منقسم ہو سکتا ہے اول اول دفعہ میں دوم ابتدائے علامات درد کی حالت میں سوم حالت دورہ میں۔

۱) زمانہ وقفہ میں اسباب مختلفہ کی طرف توجہ اور اول دفعہ کی کوشش کرنی چاہیو پیل کالو حب الی اصول میں رالف) اگر مریض لاغر اور کمزور ہو تو اسکی صحت اور طاف کو بڑھانا ہر قسم کی سخت جسمانی اور دماغی سے پرہیز کرنا اور خاصکر زوری قلب کا دفعیہ کرنا۔

۲) بائیمہ کو درست رکھنا اور قبض و نفخ معدہ سے بچانا۔

۳) چائے کافی۔ تماکو شراب وغیرہ دیگر اشیاء کی عادت سے جو جسم میں ہر ایک مادہ جس کو سکتی ہیں منع کرنا۔

۴) مادہ نفوس۔ وجع معالج وغیرہ جو خون میں موجود ہوں انکا دفعیہ کرنا۔

۵) اگر قلب اور شریانوں کی ساخت خراب و سکڑ رہی ہو تو کالو حب الی حالتوں میں آونک و دیگر تین تقویت قلب دفع و دین نہایت مفید ثابت ہوئے ہیں۔ تقویات فوٹو۔ ٹیکٹیلیر یہ نیزت۔

۶) فاسفرس۔ دبی ٹالس ہی مفید ہیں جب قلب شریانوں کی ساخت خراب ہونی شروع ہو گئی ہو تو پوٹاسیم آیوڈائیڈ نہایت مفید ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ تمام غدود اور اعضا کو تحریک دیتا۔ ساخت کی خرابی کو روکتا اور انحراف فضلات کو زیادہ کرتا ویسویٹا دماغی میلٹی کو کم کرتا۔ اور تمام اعصابی دزدوں کو آرام دیتا ہے۔

اگر طبع کا خیال ہو تو کوئین کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئین تھانی گرین کی خوراک میں تین دفعہ روزانہ کھلائی جاوے تو اچانا کا دورہ رک سکتا ہے۔

ابتدائی علامات اور خاص دورہ کا علاج ایک ہی طرح پر ہے چونکہ اسکا درد اور صطرا اور عصابی اور تشنجی ہوتا ہے۔ اسوجہ سے نائٹرائٹس مثلاً نائٹرائٹ آف ایل۔ نائٹرائٹ آف سوڈیم اور نائٹرو گلیسرین نہایت مفید ثابت ہوئے ہیں۔ کیونکہ یہ فوراً شریانوں کے تشنج اور عصابی درد کو رفع کر دیتے ہیں۔

نائٹرائٹ آف ایل کا عمدہ طریق استعمال یہ ہے کہ تین چار یا پانچ قطرہ کا کیپسول ایک مال میں چھوڑ کر فوراً سونگھ لیا جاوے۔

نائٹریٹ آف گلیسرین ایک فیصدی کے حساب سے پانی یا الکل یا کسی دغ میں حل کر کے اسکے ایک قطرہ پلاؤ چاہئیں اور چند منٹ کو وقفہ سے اسی مقدار میں متواتر دین۔ کل میں قطرہ تک اس حل کی تلاش کئے ہیں۔ سوڈیم نائٹرائٹ اگر تین سے اگر تین تک کی خوراک میں دے سکتے ہیں۔

چونکہ یہ اور نہایت صریح تاثیر ہیں اور اپنے اندر دفع درد تشنج خاص کرتی ہیں اسلئے انکا استعمال نہایت عام ہو گیا ہے بعض اوقات انکا استعمال میں کامیابی ہی ہوتی ہے انکے ساتھ کسی دوسرے مرکب مثلاً ۳۰ قطرہ سلفیورک ایٹھرائٹ رام نائٹرائٹ ایٹھرائٹ ایک ڈرام سال والو نائٹرائٹ کسی قدر بڑائی۔ یا ٹنگ پرفر کا استعمال مفید ہوتا ہے۔

جب کسی نائٹرائٹ کا استعمال سونا کامی ہو۔ تو کلورافارم یا ایٹھرائٹ یا سوڈیم یا ایٹھرائٹ بروائیڈ کا استعمال کرنا چاہئے مارفیا کی جلدی پیکاری ہی بعض اوقات دورہ کو فوراً خفیف یا بالکل بند کر دیتی ہے مارفیا اور کلورافارم کا جیسا کہ عام کمزوری قلب میں بادشہ ہوتا ہے۔ وہ اندیشہ درد قلب کی حالت میں نہیں تھا۔ احتیاطاً این کو ساتھ کسی عمدہ شے جیولٹ مثلاً سلفیورک ایٹھرائٹ اور نونیا کا استعمال کر سکتے ہیں۔

اگر کسی قسم کا سبب موجود ہو مثلاً نفخ قبض۔ معدہ میں کوئی خراش کندہ ہو تو اسکا دفعیہ فوراً دفع رج مسہلات یا عقیات سے کرنا چاہئے۔ دیگر تدابیر جو حسب موقع مفید ثابت ہوتی ہیں حسب ذیل ہیں۔ پاؤں کو گرم پانی میں نہانے مقام قلب پر پوٹش یا رائی کا پلستر لگانا۔ نم ٹہی پر جو تکین لگانا۔ گیلونیک پیل کرنا (اسطرح کہ ایک لٹرنٹ پر اور دوسرا آخری فقرہ گردن پر رکھا جائے) مریض کو ہر طرح آرام دینا۔

انجلیکا Angelica آرک انجلیکا آف سنیل۔ اسکی جڑ خوشبودار مقوی سعدہ اور دفع ریح اور تیز کنندہ اشتہار ہے۔ دیگر مقویات کو ساتھ معدہ کی کمزوری اور قویٰ میں مفید ہے۔ اسکی پھل اور شاخوں کی بھی یہی تاثیرات ہیں۔ سرکرمین بہک کر دنیا داری امراض کو محفوظ رکھتا ہے۔ تازہ جڑ کو گرم پانی کا نافع ہے۔

خوراک سفوف جڑ کا ۳۰ ۶۰ گرین تک جڑ کا فلوئڈ اکثر ۳۰ ۶۰ ۷۰ بونڈ تک تخم کا فلوئڈ اکثر ۵ سے ۱۰ بونڈ تک۔

انجیر منفع محل اہم عین مسن اور مہی ہے۔ اسکو چیر کر اور گرم کر کے ذہل اور دم خاص کر دہن اور سوڈیوں کے

قرب میں لگانا مفید ہو اسکے درخت کو عرق میں ایک پونچھنا سنہلک غرست ہوتا ہے جسکا اثر فائبرین اور دودھ پر ہے اس طرح ہوتا ہے۔ یہ نشاستہ پر اپنا کیمیائی فعل کر کے اسکو شکر میں تبدیل کر دیتا ہے شربت انجیر بھی اس عرق کے خواص رکھتا ہے پس شربت انجیر کا بچون کے نشاستہ والی غذاؤں اور دودھ میں ملا کر دینا مثلاً باضیمبوگا انجیکشن Injections دیکھو بیان ایٹا یعنی حقہ دہائیو ڈریک انجیکشن و پکارسی کا اندر این - حفظ - دیکھو بیان کالولسمنہ کا۔

اندر جو - اسکے دوسرے نام لسان العصار اور زبان بخشک میں اسکے درخت کی چھال مقوی نافع بخارات نوبتی اور دافع بخار ہے مختلف حمیات - اسہال و پیش میں استعمال کی جاتی ہے اسکے تخم نہایت عمدہ قابض مخرج کرم - رافع ریح ہیں پچھل اسہال - خونی بواسیر برقان اور کرم معاین مفید ہیں - خم سفوف چھال ہے اگرین تک تخم ہے ۶۰ گرین تک -

اندھی جیچین Indigestion مسپیسیا یا برہمنی سورہمنی تخمہ فساد ہاضمہ چونکہ اسکے اسباب نہایت مختلف قسم کے ہوتے ہیں اسلئے اسکا علاج بھی مختلف اسباب اور حالات کو مطابق مختلف طور پر کیا جاسکتا ہے اسکو ہم ذیل میں تین حصوں پر منقسم کر کے بیان کرتے ہیں۔

اول اصلاح غذا چونکہ شرع فعل ہاضمہ دانٹوں اور ہانے ذہن سے ہوتا ہے اسلئے ہاضمہ نہیں کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اگر دانٹوں کے کسی مرض کی وجہ سے اچھی طرح پرچہا نا محال ہو تو اسکا علاج کرنا چاہیئے ورنہ ہر ایک غذا نرم رقیق اور لطیف صورتوں میں دینی چاہیئے جبکہ مرض دندان کی وجہ سے غذا کا چباننا ممکن ہو اسوقت روٹی دانہ وغیرہ سخت چیزیں کھانا بعدہ پر دانٹوں کا ہار ڈالنا اور اسکو درد قریح نقل اور سوزش وغیرہ کے خطرہ میں ڈالنا بہت بیکٹ - نرم چاول کچھری - پلاؤ - کھیر ساگو ونا ڈبل روٹی دودھ باسانی دیکھتے ہیں۔ اگر دانت سالم ہیں تو ہر ایک سخت غذا کمال طور پر خوب رگڑا پسکر نگنی چاہیئے ہر ایک غذا عمدہ طور پر کی ہوئی اور خوش ذائقہ ہونی ضروری ہے کچھ پھل کثرت روغن و شیرینی اور تمام ثقیل غذاؤں سے پرہیز لازم ہے - تمام ٹھانی سے بچھنی کی حالت میں یہ وقت ہوتا ہے کہ معدہ میں ترش و متعفن ہو کر علامات نقل و نفخ زیادہ پیدا کرتی ہے - کچے پھلوں اور زیادہ چکنائی کا ہضم کرنا مشکل ہے۔

تشم سیری مریض ان بدہضمی کے لئے سخت مضر ہے۔ انکو ہمیشہ غذا قلیل اقدار کثرت سیر غذا کافی وقفہ سے کھانی چاہیئے ہر بار سیڑی سے میں یورین صابان کو بدہضمی کی حالت میں تین دفعہ اور ہم لوگوں کو دو دفعہ روزانہ سے زیادہ کھانا ہرگز مناسب نہیں ہے خشک غذا اگر باضیمبوگا یا کھنڈ سے چمکھنڈ تک وقت دیکار

ہے۔ ٹمپسیا میں اس سے زیادہ کثرت شراب متا کو، چمکے اور قبوہ، معدہ کو سخت ضرر پہنچاتی ہے لیکن اس سے بچ کر دینا چاہیے۔

دوم۔ پابندی شرائط حفظ صحت سے مست بھی رہنا۔ کثرت تفکرات و زردوات۔ زیادہ محنت ہر قسم کا کھانا۔ گنجان ٹھنڈا اور تنگ مکان میں رہنا۔ غلیظ رہنا بہبودہ توہمات اور وساوس بڑھتی کا باعث بنتی ہیں۔ پہل نہیں ہی اگر کوئی سبب موجود ہو تو اسکی اصلاح کرنی چاہیے۔

سوم۔ مناسب ادویات سے فعل معدہ کی اصلاح اور تائید کرنا۔ یہ مفصلہ ذیل طریقوں سے زیادہ کیا جاتا ہے۔

(الف) معدہ کو قوت دینا۔ اس مطلب کے لیے بیشتر ادویہ جو معدہ کے لحمی ریشوں اور غدود کو طاقت دیں استعمال کی جاتی ہیں مثلاً کوشیا کلبا جنشین کسکریلیکس و امیکا۔ کوہن چرائیا۔ ناسپال۔ ہائڈراسٹس کیناؤر وغیرہ تلخ مقویات اگر معدہ میں ترشی زیادہ ہو جسکی وجہ سے ترش کار آتی ہیں تو انکو ساتھ کھاری ادویہ مثلاً سوڈی ہائی کاربامونیا۔ کاربونات پوٹاشی کاربونات سبب سے بڑھ کر نائٹریک اسٹال کرنا بہتر ہے اور اگر ترشی کم ہو جسکی وجہ سے کھاری ڈکار آتے رہیں تو ترش ادویہ مثل ہائڈروکلورک ایسڈ سلفیورک ایسڈ نائٹریک ایسڈ۔ نائٹروسیوے نک ایسڈ۔ ٹائڈناک ایسڈ سائیکلک ایسڈ وغیرہ ملا دینی چاہئیں۔ اگر امراض مزمنہ معدہ کی وجہ سے اخراج پسینہ سرد دیا کم ہو گیا ہو تو مصنوعی پسینہ یا انگلو دین دینا چاہیے۔

شجاعت (اول) سوڈی ہائی کاربونات ۵ اگرین ٹیکچرکس و امیکا ۵ ہونڈیکچرکس ۳ ہونڈیسپرٹ امونیا ایروٹیک ۳ ہونڈیفیوزن چرائیا ایک وٹس ایسی تین خوراک روزانہ۔

دوم ایسڈ نائٹرو ہائڈروکلورک ڈائیوٹ ۵ ہونڈیکچرکس ۲ ہونڈیکچرکس و امیکا ۵ ہونڈا کوٹھنی ایک وٹس ایسی تین خوراک روزانہ۔

رسیموم لوگ۔ اجوائن سیاہہ مرچ نمک ساوی لوزن بیکرسفوف تیار کریں خوراک تین رتی تین دفعہ روزانہ۔

(ب) ترش اسروخ اور سوزش قلبی کا علاج کرنا۔ اسکا علاج خوشبودار مفتح کھاری اور دافع ہج

ادویہ ہو کیا جاتا ہے مثلاً پوڈینہ پیرپٹ۔ لوگ۔ سونف اجوائن۔ زیرہ سیاہہ مرچ۔ تھمال بکری زوٹ سپرٹ کلوروفارم سوڈی ہائی کارب۔ سپرٹ امونیا۔ اٹروٹیک۔ بسمتھ۔ ب نائٹریک اس۔ بسمتھ۔ کاربونات س میگنیشیا کاربونات جب ترشی اور تلخ معدہ میں اٹھکر پیدا ہو تو ڈائیوٹ ہائڈروکلورک ایسڈ مفید ہوتا ہے۔

شجاعت (د) بسمتھ۔ ب نائٹریک اس۔ اگرین سوڈی ہائی کاربونات ۵ اگرین بکلیسین ایک ڈرام

افیوزن کلبا ایک وٹس۔ ایسی تین خوراک روزانہ۔

(۳) ایسڈ ہائڈروکلورک ڈائیوٹ ۵ ہونڈیسپرٹ کلوروفارم ۳ ہونڈیفیوزن چرائیا ایک اور ایسی تین خوراک روزانہ۔

(۲) سوڈی بائی کارب ۵ گرین بیگنیشیا کاربوناٹس ۲۰ گرین چکن کارٹے مم کو ۲۰ بوند ہرٹ امونیا ایروٹیک نصف ڈرام عرق سولف ایک آؤنس ایسی تین خوراک روزانہ

ترشی اور جلن معدہ میں جو کھانسی سے تین چار گھنٹہ بعد محسوس ہوا کرتی ہے اسکی واسطہ بیگم پانی چھ سات چھٹانک کے قریب پی لینا نہایت مفید ثابت ہوتا ہے اگر ترشی زیادہ ہو جو خالص پانی سے رفع نہ ہو سکے تو کسیدہ سوڈا ملا دینا چاہئے

بعض اوقات کثرت ترشی کیوجہ سے سخت درد اور تشنج شروع ہو جاتا ہے کفشی کی نوبت پہنچ جاتی ہے ایسی حالت میں سوڈا زیادہ مقدار میں پانچ چھ ڈرام روزانہ کے حساب سے دینا نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ درد تشنج ٹھیک ہو کر قروح اور ڈالی نے ٹیشن کے اندیشہ سے نجات ملتی ہے

ج نقص ہاضمہ کیوجہ سے جو فائدہ زہریلے مادہ اور ہوا میں پیدا ہوتی ہیں انکے زہریلہ اثر کو دیکھنا اور انکو معالے صاف خارج کر دینا یعنی گلے سے مناسب مہلکات اور مہلات سے امحا کو صاف کرتے رہنا

قبض ہو کر تمام فضلات و غذا امعا کے اندر مٹنی شروع ہو جاتی ہے جس کیوجہ سے خراب ہوا میں پیدا ہو کر امعا اور معدہ کو پھیلا دیتی ہیں۔ نفخ درد قوی لہجہ۔ نفل۔ غشیان۔ نفرت غذا اور عدم اشتہا کا باعث بنتی ہیں شکم کا دوران خون سست پڑ جاتا اور تمام امعا و معدہ کے غدود کا فعل ضعیف یا بند ہو جاتا ہے

بہت سے زہریلے مادہ مثلاً ٹوئے اینڈ انڈول سکولٹل۔ سلفور بیڈ۔ بائیڈروجن کاربوئیڈ بائیڈروجن وغیرہ خون میں جذب ہو کر عام ضعف۔ نقاہت سستی گرائی سر صداع۔ سہرو نبات خارش استرخائے اطراف کمی حرارت غریزی۔ ضعف بصر و سامعہ و ناطقہ پیدا کرتے ہیں۔ پس جب بدہضمی کے ساتھ قبض بھی شامل ہو تو بلا تامل امحا کو مناسب مہلکات سے صاف کرتے رہنا ضروری ہے

کبیلول۔ صبر۔ اپنی کاک اکثر اٹکٹکس و امیکا ریونڈ چینی اس مطلب کیلئے استعمال کر سکتے ہیں کیلول علاوہ مہل ہونیکے امحا کو ایٹمی سیٹنگ کرتی اور انکے تمام مافیہ کو مٹرنے سے روکتی ہے

صبر میں دیگر مہلکات کی نسبت یہ خوبی ہے کہ اس کے اثر کے بعد قبض نہیں ہوتا اور مدت کی استعمال سے کوئی ضعف امعا نہیں پیدا ہوتا لیکن جب رودہ مستقیم میں سوزش ہو یا بواسیر موجود ہو تو اسکا استعمال مناسب نہیں ہے اپنی کاک نہایت عمدہ معالے کے غدود کا محرک ہے اکثر اٹکٹکس و امیکا لحمی ریشوں کیلئے مفوی ہے

نشجات (۱) صبر ۵ گرین۔ کاک ۵ گرین۔ اکثر اٹکٹکس و امیکا ۵ گرین۔ اکثر اٹکٹکس جنشین ۵ گرین۔ ان سب کو ملا کر ایک گولی تیار کریں اور ایک گولی سوتے وقت استعمال کرتے ہیں بعض اشخاص پر ایسی ایک گولی کا کچھ اثر نہیں ہوتا کہ صبح کیوقت ایک خوراک مفصل ذیل نسخہ کی دیدنی چاہئے ۱۔ بیگنیشیا سلفاس ۲۔ ڈرام سوڈا بائی کارب ۵۔ بوند نمک ۵۔ گرین بائی

ایک آؤنس (۲) اسکپور ایک گرین ریونڈ چینی ۵ گرین اجوان ۲ گرین ایسی ایک پوٹیرہ روزانہ ۴۔ مرزلی اہلہ دو بعد (۳) اگر بدہضمی جو کوئی فساد جگر یا پتھر یا اس کا علاج عام صولہ کو مطابق کرنا چاہئے ان اعضائے کراہت میں

(۵) اگر بدھمی دوسرے امراض مثلاً بخار سکرافیولا وج معال نفیس انشک وغیرہ کے ضمن میں واقع ہو جاتی ہے اس علاج ان امراض کا علاج ہے

(۶) جب بدھمی محض عام ضعف اور نقاہت کی وجہ سے ہو تو تقویات کو مین فولادکس و امیکا و پیرین وغیرہ سے اس کا علاج کرنا چاہئے

معدہ اور امعاء کے مقام پر مالش کرنا چند اقسام کی بدھمیوں میں نہایت مفید ثابت ہوا اسکا طریق یہ ہے کہ کھانے سے دو تین گھنٹہ بعد معدہ پر کارڈیک اینڈ یعنی فم معدہ کی طرف سے یا پورک اینڈ کی طرف اس بارہ منٹ تک برابر مالش ہمیشہ ایک ہی رخ کو بچانا چاہئے پہلے بہت نرمی اور آہستگی کیساتھ شروع کریں کہ مریض کو بالکل ناگوار معلوم نہ ہو اور بتدریج زور دیتے جائیں اس مالش سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ معدہ کے اندر سے جو ہضم شدہ غذائی کھانے کیلوس کیلوس سے

خارج ہو جاتا اور باقی بے ہضم نہیں پاتا ہے یہ باتانہ فضلات میں جو ہضم شدہ کے اختتام پر معدہ میں گرانی مردود اور مردود پیدا کیا کرتے ہیں اس مالش سے خوب تخفیف اور آرام معلوم ہوتا ہے پھر ایک دو گھنٹہ بعد انٹریوں پر مالش کرنی چاہئے علمی قبض میں پانچ جبے منٹ روزانہ استفرغ سے پیشتر زور دہ کی سمت میں مالش کرنا یعنی دہائے کوسے سے شروع کر کے

جگر کی طرف کو جگر سے طحال کی طرف کو اور پھر طحال بائیں کونے کی طرف کو مالش کرتے جانا نہایت مفید ہے اس سے قدرتی طریق اخراج کو مدد اور امعاء کے لحمی ریشوں کو تقویت ملتی ہے روزانہ غسل کرنا ورزش اس مالش کی مدد ملتی ہے

انڈی گوٹری Indiogotri بیٹی سبائٹکٹور یا تھوڑی مقدار میں اس کی جڑ اترے ٹوٹیلین مرکب ہر حیض مقوی اور ایٹمی سبٹکٹ ہر زیادہ مقدار میں سخت قے آور اور سہل ہے اسکو ایمینوریا امراض جگر عام کمزوری سکرافیولا اور وبائی امراض مثلاً ٹائیفیس ڈائفٹریا ڈیفٹریا اور گینٹرین میں استعمال کرتے ہیں ابام حل میں اسکے استعمال سے اسقاط کا اندیشہ ہوتا ہے خارجاً بطور سفوف یا مرہم یا بوٹیس استعمال کرنا زخموں اور ورم کیلے مفید ہے خم فلوڈ کٹرکٹ ۵ سے ۱۵ بوڈیٹھی سین ایک سے کم گرین نک

انڈین ٹرمک Indian Turmeric انڈین سپاک نارڈ Indian Spike Nard انڈین کارن Indian Corn انڈین کاکلز Indian Cocols

انڈین لائسیم Indian Lyceum انڈین لکوریس Indian Liquorice انڈین نارڈٹری Indian Nardtrex انڈین والٹ Indian Walnut

انڈین لکوریس Indian Lyceum انڈین لکوریس Indian Liquorice انڈین نارڈٹری Indian Nardtrex انڈین والٹ Indian Walnut

انڈین صمب Indian Hemp

گاٹھا اسکا بیان دیکھو

انسومینا Insomnia: بخوابی سہرا اسکا علاج مطابق سبب کرنا چاہئے پس اگر درو یا بخار کیوجہ سے بخوابی ہو تو اسے علاج کی طرف توجہ مقدم ہے اگر خور و نوش کے متعلق اسباب بخوابی موجود ہوں مثلاً چائے کافی تمکو وغیرہ کا استعمال یا بے وقت زیادہ شب گزرنے پر کھانا تو انہی اصلاح کرنی چاہئے بعض اشخاص میں دائمی قبض یا نفخ یا بد ہضمی یا کم غذائی یا شکم سیری بخوابی لاحق ہو جاتی ہے بعض میں کثرت مطالعہ یا تکلیف جسمانی سے بعض کو محض عام کمزوری یا محض پاؤں کو سردی معلوم ہوتی ہے پس ایسی حالت میں ان اسباب کا دفعیہ کرنا ضروری ہے عام طور پر بخوابی کی شکایت میں فوراً کسی مسکن دماغ یا منوم دوا کا استعمال کر دیا جائے یہ طریق نہایت نامناسب اور اندیشہ ناک ہے اس سے مرض کسی خاص منشی یا منوم دوا کا عادی ہو سکتا ہے پس اگر دائمی بخوابی ہو تو اسکا علاج سبب کے مطابق ہی کرنا چاہئے منوم دوا کے لینے میں نہایت احتیاط لازم ہے

آقیون سخت درد اور تکلیف کچھ انتہیں آفیون کے اعلیٰ مسکن اور منوم ہیں لیکن دائمی بخوابی میں اس سے پرہیز لازم سوڈیم یا پوٹاشیم برومائڈ کے عام اور بے ضرر خواب آور ہیں ۱۰ سے ۲۰ گرین تک کی خوراک میں قدرے کلوروفارم و اثر اور وہی کی کے ساتھ ملا کر دیے جکتے ہیں

کلورل نہایت عمدہ خواب آور ہے اس سے یقینی طور پر بہت جلد دماغ کو تسکین ہو کر نیند آ جاتی ہے مگر یہ ضعف دل ہے اور اسکی عادت بھی ہو جاتی ہے پس اسکا کبھی کبھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن عادی طور پر نہیں پوٹاشیم برومائڈ کے ساتھ ملائے سے تھوڑی مقدار میں اثر کرنا ہے اور بالحد کی ضرر بھی نہیں ہونے پاتی۔

سلفونیل سب سے زیادہ عام اور مبضر ہے لیکن اسکا اثر دیر میں ظاہر ہوتا اور دیر تک رہتا ہے پس اسکو وقت خواب کے ایک دو گھنٹہ پیشتر ۱۰ سے ۲۰ گرین کی مقدار میں گرم پانی یا دودھ میں ملا کر دینا چاہئے اگر وقت خواب پر دیکھا تو ایسا ہوتا ہے کہ تمام رات غنودگی میں گذرتی اور لگے روز بھی غنودگی رہتی ہے اسکی عادت نہیں ہوتی دائمی بخوابی میں اسکو ایک ایک روز کے وقفے سے استعمال کرنا چاہئے کیونکہ اسکا اثر اگلی رات تک رہتا ہے

پارائیڈ ہائیڈریز و اثر بے ضرر اور عمدہ خواب آور ہے لیکن تنفس میں اس سے سخت تضن ہو جاتا ہے جس وجہ سے اسکا استعمال عام نہیں ہوا ایک ڈرام یا اس سے زیادہ خوراک میں استعمال کرتے ہیں

کلورل یا ہائیڈر اسکا استعمال کلورل کیجگہ عام ہوتا جا یا ہی اسکی نسبت زیادہ مبضر لیکن کم طاقت اور بد اثر ہے خوراک ۲۰ سے ۴۰ گرین تک ٹریڈیل و ٹرائی اول یہ ادویہ سلفونیل کے مشابہ اور اسی طریق اور اسی مقدار میں دی جاتی ہیں

الکحل یہ ایک نہایت عمدہ خواب آور ہے وقت خواب سے ایک گھنٹہ پیشتر دینا چاہئے تاکہ زمانہ تحریک و تفریح وقت خواب سے پیشتر گزر جائے اس مطلب کیلئے وہی آیل اور پورٹو و سری مشراہوں کی نسبت بہتر ہیں جب تشنجی امراض کیوجہ سے بخوابی ہو تو کلوروفارم اور ایچر کا سنگھانا نہایت مفید ہے

ٹیکو پستی فلور اسکٹور یا نہایت عمدہ اور بضر خواب آور ہے۔ کسی قسم کا نہ نہیں کرنا اور نہ نہات نسکب بخش
 لانا ہر مرض کو آسانی سے جگا سکتے ہیں۔ طرفہ یہ ہے کہ بیداری کی وقت طبیعت باطل صاف معلوم ہوتی ہو اور پھر فوراً نیند آجائی
 یا یوسین فرسکے داغی خل خلا کیوٹ مانیا کی خرابی میں سے اعلیٰ درجہ کی منوم ہے۔ خوراک پہ گریں سیر براہ
 دہن یا بلہ گریں بذریعہ جلدی بیکاری دیکھتے ہیں۔ قلبی امراض میں اسکی احتیاط لازم ہے

بعض حالتوں میں بگرم پانی سے نہلانا نہایت مفید خواب آور ثابت ہوا ہے اگر خاص وجوہات سے نہلانا مفید ہو
 تو ایسا کر سکتے ہیں کہ گرم پانی میں پیٹ بھگو کر پوٹ کر فوراً ٹانگوں پر باندھ دجاوے اور اس پر موم جامہ یا لٹا پیرجہ لپیٹ کر
 گرم موزہ بننا دئے جائیں ایسا کرنے سے ٹانگوں کے عروقی کشادہ ہو کر خون کا رجوع اس طرف ہو جاتا ہے۔
 داغی گنجین کی خرابی میں یہ ترکیب نہایت مفید ہے۔ تفصیل اور یہ خواب آور کیلئے دیکھو بیان منومات کا

النبیثی Insanity دیوانگی جنون۔ اسکی تین بڑی اقسام ہیں اول ایمبشیا۔ جس میں
 فطرتاً تمام قوائے عقلی ناقص رہ جاتے ہیں دویم ڈیمینشیا۔ جس میں بیدار بننے کے بعد قوائے عقلی ناقص
 ہو جاتے ہیں۔ سویم مانسیا۔ جس میں داغی مرکزوں کا فساد ہو کر وقتاً فوقتاً جنون کے دورہ ہوتے
 رہتے ہیں مگر دائمی نقص کچھ نہیں ہوتا

(۱) ایمبشیا۔ اس میں فطرتاً تمام قوائے عقلی ناقص رہ جاتے ہیں اس واسطے اسکو فطرتی ڈیمینشیا
 بھی کہتے ہیں۔ کبھی تو یہ نقص کلی ہوتا ہے کسی بات کی سمجھ اور تمیز نہیں رہتی گھاس بھوس کو مشابہ زندگی
 ہو جاتی ہے اپنے عزیز واقارب اور کھانے پینے کی چیزوں کی تمیز مطلقاً نہیں رہتی کلی ایمبشیا کو ایڈیوکی
 بھی کہتے ہیں جزوی ایمبشیا میں کس قدر عقل و تمیز باقی رہتی ہے اور مرض کچھ بات چیت کر سکتا ہے
 بعض خطوں میں ایمبشیا کثرت سے ہوتا ہے ایسی صورت میں اسکو کوری فی ترم کہتے ہیں
 علاج۔ اس کا علاج جسمانی۔ اخلاقی و داغی اور طبی تدابیر سے کرنا چاہئے

اول جسمانی تدابیر مرض کو عمدہ فضا سے اور خوش باش دوستوں کی صحبت میں رکھنا عمدہ غذائیں کھلانا
 کمزور عضلات کو ماش اور حرکت سے طاقت دینا جقدر باسانی ممکن ہو ورزش کرنا ہمیشہ بگرم پانی سے خوب غسل دینا
 دوم۔ اخلاقی تدابیر مرض پر کبھی سختی نہ کرنا۔ ہمیشہ نہایت نرمی اور آہستگی سے اسکو محبت۔ مروت اور سلوک
 کے سبق دینا۔ لوگوں کے حقوق اس پر اور اس کے لوگوں پر جیسا کہ ہیں اسکو سمجھاتے رہنا

سوم۔ داغی تدابیر ہمیشہ فنی تھی اسبیا اسکو دکھا کر انکی رنگت بوقطع وضع مقدار اور فاست سمجھانا اور پھر اس
 دریافت کرنا ہر ایک چیز جو دیکھنے یا سننے یا چھونے میں آئے اس کی بابت اس فوراً بطور دل لگی نہ کرنا
 اگر زبان گنگ یا ناقص ہے تو الفاظ ادا کرنے کی ہمیشہ اس کو ورزش کرانا

خیالی نقشوں اور زبانی کہاوتوں کے بجائے ہمیشہ مشاہدہ کی چیزوں کی بابت تذکرہ رکھنا
 چہارم۔ طبی تدابیر جو حالت و علامات ہضم۔ دماغ تلخ اعصاب کے متعلق پیدا ہوں انکا علاج کرنا یا ٹیکو کینٹک

یعنی چھوٹے سروائیڈ میں کھوپری کے ٹھکانے کا ٹھکانا جو نہ کیا گیا ہو لیکن یہ تاہم ابھی تک قابل اعتبار ثابت نہیں ہوئی کئی ٹیک ایڈیوسی میں تھائیرائیڈ غدود سے علاج کرنا نہایت یعنی طرفہ ثابت ہوا ہے۔ ۲۶ گریں کی خوراک میں کچا تھائیرائیڈ غدود بھید کا ہفتہ میں دودھ کھلایا اور نہایت کامیابی حاصل ہوئی۔ اسکی جلدی بچکاری اور طریقہ پلانے میں بھی کامیاب طرفہ ثابت ہو سکتا ہے کسی طریق پر تھائیرائیڈ سے علاج کیا جاوے گا کئی ٹیک ایڈیوسی میں اسکی عجیب عجیب تاثیرات ثابت ہوتی ہیں قدرتی تھائیرائیڈ ہوا بھید بھید خوش وضع ہو جاتا ہے ڈول شکم۔ سیدھا ٹانگیں اور ہاتھ چھینے لگتے۔ رستی اور پیو دگی کے بجائے جستی اور بچہ کے آثار نمایاں ہوتا ہے اور عام جسمانی اور دماغی توازن ترقی کر پڑتی ہیں (۲) ڈومینٹیا۔ اس میں بیداریش کے بعد قوائے عقلی ناقص ہو جاتے ہیں۔ کہیں تو دفعہ ہوا جاتا ہے کہیں خراب علامات مثلاً شراب فوشی اور جن کیوجہ سے رفتہ رفتہ ترقی کرتا ہے کہیں خود بخود ہو جاتا اور کہیں دوسرا مرض مرگی ایو بلیکسی ٹائیفیس اور ٹائفاؤڈ کے ضمن میں پیدا ہوتا ہے

(۳) مانیا۔ اس سے مراد وہ تمام اقسام جن میں جو دماغی فسادات کیوجہ سے وقتاً فوقتاً دورہ کے طور پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں گردانگی نقص کوئی نہیں ہوتا دفعہ کے زمانہ میں عموماً کوئی نقص ظاہر نہیں ہوتا اسے دو طرح سے اقسام ہیں۔ عقلی اور اخلاقی۔ بھربر ایک انہیں سے کلی ہوتا ہی یا جزوی۔ بس کل اقسام مانیا کی حسب ذیل ہیں ادل کلی عقلی مانیا۔ اس میں سرعت کے ساتھ یکے بعد دیگرے طرح طرح کے خیالات پیدا ہوتے اور چوتھے نظارے سامنے آتے ہیں جن بھوت۔ چڑیل وغیرہ وہی چیزیں دکھائی دیتی اور سخت گھبراہٹ یا غصہ یا جوش کی حالت میں ہاتھ پاؤں کو مارتا یا بھاگتا دوڑتا ہے کہیں خود ضرب کھا بٹھاتا یا دوسروں کو مارتا ہے جلد کا حس حسست بڑھ کر گرمی سردی کم معلوم ہوتی اور تکلیف کا احساس بھی کم ہو جاتا ہے بعض اوقات وحشتناک درد انگیزہ ہونے پیدا ہونے میں جو مرض کی حالت کو اداسی حسرت اور ماتم کا سامنا دیتے ہیں اسکو بالیخولیا یا میلنکو لیا کہتے ہیں کہیں اس کے برعکس ماجرا ہوتا ہے

دویم جزوی عقلی مانیا۔ اس میں ایک سے کم غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں جو مرض کو صحیح معلوم ہونے میں مثلاً وہ اپنے آپ کو بادشاہ یا ولی خیال کرنا اور لوگوں کو حکم یا ہدایت کرنا ہے کہیں کسی شخص کو اپنا دشمن قاتل سمجھ بٹھاتا اور اس شخص پر چارہ ہوتا ہے کہیں اپنے جسم کو شیشہ یا دھات کا بنا ہوا خیال کرتا ہے

سوم جزوی اخلاقی مانیا۔ اس میں عقلی مانیا کی طرح جھوٹے نظارہ یا وہی ضیق پیدا نہیں ہوتے اور قوت فہم اور تیز رفتاری رہتی ہے مگر قدرتی جذبات۔ رحم و غضب۔ محبت و عداوت۔ رغبت و نفرت۔ الفت و وحشت وغیرہ میں تغیرات عظیم واقع ہو جاتے ہیں جن میں اصلاح کرنا مرض کے اختیار سے باہر ہوتا ہے سابقہ عادتوں اور ادوں خواہشوں جذبات و خیالات میں خلل آ جاتا ہے

چہارم جزوی اخلاقی مانیا۔ اس کے عجیب و غریب نظارے دیکھنے میں آتے ہیں جو حسب ذیل درج ہیں کسی کو۔ دوسروں کے قتل کرنے کا جنون ہوتا ہے اس کو ہوسا نی ڈل ماننا ہوتا ہے

کسی کو خود کشی کا جنون ہو جاتا ہے اسکو سوئی سائی ڈل مانیا کہتے ہیں
 کسی کو چوری کا جنون ہو جاتا ہے اس کو کلیٹو مانیا کہتے ہیں خواہ چیز کارآمد ہو یا نہ ہو مگر وہ چور اپنی کوشش کرتا ہے
 کسی کو آگ لگانا کا جنون ہو جاتا ہے یہ اکثر جوان عورتوں میں جو اختناق الرحم کی مرض میں مبتلا ہوں پو کرتا ہے اس کو
 یا ٹرو مانیا کہتے ہیں

کسی کو فرط محبت کا جنون ہو جاتا ہے جس کو عشق یا رالو مانیا کہتے ہیں
 کسی کو شراب کا جنون ہو جاتا ہے کہ جب قدر پیتا جائے اسقدر زیادہ خواہش بڑھتی جاتی ہے کسی حد تک
 بس نہیں کر سکتا اس کو ڈیپو مانیا کہتے ہیں
 کسی کو گھر سے اس قدر نفرت ہو جاتی ہے کہ ایک دم اپنے گھر میں بیٹھ نہیں سکتا اسکو ناسٹلیا کہتے ہیں
 کسی عورت کو شہوت اسقدر زور سے اٹھتی ہے کہ کسی کی شرم و حیا نہیں کر سکتی اور نام فیود عقلی سے
 خارج ہو جاتی ہے اسکو نمفو مانیا کہتے ہیں جب مرد میں شہوت مجنونانہ حد کو پہنچ جائے اسکو سیٹی رلےس کہتے ہیں
 کسی کا دل ہمیشہ گرفتہ او داس رہتا طرح طرح کے تفکرات اور توہمات بلا وجہ پیدا ہوتے رہتے ہیں اس کو
 یائی یو کا ٹڈرایس کہتے ہیں
 کسی کو مجتلب اور بغرض کتابوں کے مطالعہ کا اسقدر جنون ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ نئی نئی کتابوں کی ہی تلاش
 میں رہتا ہے اسکو بیلو مانیا کہتے ہیں

اس کے سوائے اور ہزار اقسام میں جنکے علیحدہ علیحدہ نام رکھے گئے
اسباب دیوانگی (اول) دماغ یا کھوپری کی بناوٹ میں نقص رہنا مثلاً سر کا چھوٹا اور بد وضع
 ہونا دوم خون کی آمد رفت میں خلل رہنا مثلاً کثرت شراب پینے جرسن تمباکو سی (سوم) دماغ سے
 زیادہ کام لینا یا زیادہ صدمہ پہنچنا یا زیادہ ترددات و تفکرات جماع (چھارم) اعصابی امراض مثلاً مرگی
 رعشہ اختناق الرحم - سرسام - اپولپسی (پنجم) دماغ کی ضربات یا بھوٹے یا دم
 تشخیص دیوانگی - دیوانہ کے جسم کو غور سے ملاحظہ کرنے کے بعد مفصلہ ذیل امور ثابت ہو سکتے ہیں
 (۱) کھوپری کی بد وضعی (۲) چہرہ کی خاص کیفیت (۳) رفتار کی تیزی وضع (۴) پنجابی بیودہ کو اس
 فنور ہضمہ (۵) ذہن - حافظہ اور استدلال میں طرح طرح کے نقصانات (۶) دیوانہ کی سابقہ حالات
 معلوم کر کے کسی مرض یا خراب عادات یا ضربات کا پتہ لگ سکتا ہے جو موجب دیوانگی شمار کئے گئے ہیں
 بناوٹی دیوانگی تیز مفصلہ ذیل امور سے ہو سکتی ہے اول چہرہ کے نقش و نگار اور قطع وضع صحیح المزاج
 کے مطابق ہونا دوم کسی جسمانی نقص کا موجود نہ ہونا سوم بلا کسی وجہ کے اچانک ظاہر ہو جانا - چھارم
 علامات یکساں نہ ہونا بلکہ مخالف اور متضاد صورتوں کا پیدا ہونا پنجم چہرہ سے وضع اور نمائش کا اظہار ہونا ششم
 ہر رنگ زیر ملاحظہ رکھنے سے تمام بناوٹ کھل سکتی ہے

علاج۔ چونکہ اس مرض کا علاج خاص خاص کارخانوں میں ہی ہو سکتا ہے اور اس کا مختصر بیان بھی ایک علیحدہ ضخیم جلد چاہتا ہے اور مریض جو نکاح، بزم، مکان اور عزیز و غیب رہتا بھی مضر ثابت ہوا ہے پس ہم اسکے علاج کیلئے صرف مفصل ذیل دریا کی طرف ہی توجہ دلائی (۱) حتی الوسع بہت جلدی۔ مریض کو کسی بالکل نئے میں پہنچا دینا چاہیے کیونکہ جو قدر دیر گزرتی جائیگی اس قدر علاج میں قوت ہوگی (۲) جو علامات و امراض اسکے ضمن میں پیدا ہوں ان کا مناسب علاج کرنا چاہئے مثلاً کمزوری اور لاغری کیلئے کاکو نور آئل فولاد اور دیگر مقویات کمی استہناس مقویات و محرکات معہہ اور بخوبی میں مناسب منومات جنون کی بخوبی میں تابوین۔ سب سے عمدہ ثابت ہوئی ہے

انطباقی الحمی مری کے امراض کا بیان دیکھو
انتخار الاذن کان کا پھٹ جانا

انتخار الدم من الاذن کان سے خون بہنا

انفلوانزا Influenza وبائی نزلہ یا زکام یہ ایک خاص قسم کا وبائی زکام ہے کہ دور

دور کے خلعوں اور ملکوں میں بہت جلد پھیل جاتا ہے اسکے ساتھ بخار شدت کا ہونا اور عوارضات بھی لاحق ہو جاتے اور نقاہت انتہا درجہ کی رہتی ہے بلحاظ عوارضات اسکی تین قسمیں ہیں اول سادہ بلغمی بخار پہلے کمر میں سردی محسوس ہو کر لرزہ کی ساتھ بخار ہو جاتا ہے سر اور اطراف میں درد ہوتا اور انتہا درجہ کا ضعف غالب ہو جاتا ہے حلق کی اندر خشکی اور کھر کھری ہو کر خشک کھانسی اور پھٹی اور رفتہ رفتہ تر ہوتی جاتی ہے دم جلدی جلدی اور کھچکھرتا ہے۔ تھوڑی دیر میں ناک بھی بہنے لگتی ہے۔

دویم وبائی بلغمی بخار جسمیں نیو مونیہ اور دیگر سیدہ کے عوارضات شامل ہو جاتے ہیں ابتدا میں بھی وہی علامات ظاہر ہوتی ہیں جو سادہ بلغمی بخار میں مذکور ہوئیں یعنی لرزہ کی ساتھ بخار پھر خشونت حلق نزلہ زکام کھانسی و کشتی ابتدا سے انتہا درجہ کا ضعف کمر اور اطراف میں درد بعد میں برانکائی ٹس اور نیو مونیہ کی علامات شروع ہو جاتی ہیں شدت ضعف کی وجہ سے اخراج بلغم محال ہو کر دکشتی اور نقاہت اور زیادہ ہو جاتے ہیں اکثر مریض نیم مردگی کی حالت میں پکے لگ جانا یا ٹڈ حال پڑا رہتا ہے عموماً گیلبری برانکائی ٹس ساتھ ہوتا ہے پیشانی سر اور کمر اور اطراف میں درد اور زیادہ ہوتا جاتا ہے

سومیم مرکب بلغمی بخار۔ جسمیں معہہ اور انٹریوں کے امراض اور جمع مفاصل شامل ہو جاتے ہیں شروع سے سر کمر اور تمام جوڑوں میں درد شدت رہتا جی متلاتا اور سنے آتی ہے کبھی اسہال اور کبھی اسہال الدم و کسیر بھی ساتھ ہو جاتے ہیں جگر خراب ہو کر یرقان کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں درد و قہر سے ہونے والے کڑھج کیوقت معدوم یا خفیف ہو جاتے ہیں کبھی قسم دوم و سوم کے عوارضات ایک ہی مریض میں اکٹھے ہو جاتی ہیں اگر انفلوانزا کے ایام میں دوسرے وبائی امراض مثل طائیفس طائیفایڈ ہیپتہ چیک و غیرہ پھیلے ہوئے ہیں تو وہ زیادہ مہلک ثابت ہوتے ہیں بہت سے مقامی امراض مثلاً خناق کھیر بخور دہن دم نورش و غیرہ

اور پھوڑے پھنسی انفلوانزا کے ایام میں بکثرت ہو جاتے ہیں

انفلوانزا کی اصل وجہ بھی تک یقینی طور پر معلوم نہیں ہوئی

علاج شروع علامات صداع درد معدہ و امعاء اسہال بخار عام ضعف و راعضا شکنی وغیرہ کیوقت محرکات
جذبات معرقات و مسکن اوجاع ادویہ مثلاً سیلی سین سیلی سلیس ایٹی پائرن - اینٹی فیبرین فلسٹین کسلیٹین
ڈوورس پاؤڈر ٹائرس ایچراور ایسی ٹیٹ آف ایمونیا کا استعمال کرنا مفید ہوتا ہے سیلی سلیٹ آف سوڈیم یا سیلی سین
کا استعمال ایسی ٹیٹ آف ایمونیا کے ساتھ فوراً بخار درد اور راعضا شکنی کو کم کر دیتا ہے ایٹی پائرن درد سرد معدہ
وغیرہ میں اکثر یقینی فائدہ بخشتی ہے لیکن ان ادویہ کی عارضی اور دلربا تاثرات پر فریقہ کوکرتاج بد انفلوانزا کی
طرف جو غایت ضعف اور پسیدہ ہو تو بہ کم نہ کر دینی چاہئے یعنی شروع سے عام تجربیکہ اور تقویت کی طرف خاص توجہ
دہنی چاہئے سیلی سین اور ایٹی پائرن وغیرہ رفع درد بخار و راعضا شکنی میں نہایت عمدہ ادویہ ہیں۔ لیکن
آخری نتیجہ کی طرف سے جو زیادتی پسیدہ اور ضعف ہو اندیشہ ناک بھی ہے۔

درد اور راعضا شکنی کے کم کرنے کی آخری ضعف کو روکنے اور اصل زہر انفلوانزا کو مارنے میں کوئین کی
پر ابر کوئی دوا نہیں ہے اسکا استعمال تھوڑی مقدار میں فینسٹین یا ایسی ٹیٹ آف پوٹاش اور امونیا کارب یا
کلورین اور کلورٹ آف پوٹاش کے ساتھ بطریق ذیل کر سکتے ہیں

(۱) کوئین ایک گرین فینسٹین ایک گرین ایسی ایک پوٹریہ ایک ایک گھنٹہ بعد

(۲) کوئین ۴ گرین لیکر سائیکل لیسڈہ اگر گرین کب ساتھ بائیں حل کر دو اور اس میں امونیم کاربونیٹ ۵ گرین پوٹاسیم

بائی کارب ۴ گرین بائیں حل کر کے لادو ایسی ایک خوراک تین تین یا چار چار گھنٹہ بعد پانی چاہئے

(۳) ایک بارہ آونس کی بوتل لیکر اس میں ۴ گرین کلورٹ آف پوٹاش باریک یا ہوا اور ۷ قطرہ سٹرانگ ٹینڈو

کلورک لیسڈ ڈاکٹر فوراکارک خوب مضبوط لگا دو تب فوراً کلورین گیس پیدا ہو کر بوتل کو بھر دیگی گا ہے گا اس بوتل کو

بلا تے رہو تب بوتل میں غوراً بائی ڈاکٹر اور کاگ بند کر کے خوب لائے رہو تاکہ کلورین بائیں حل ہوتی جائے یہ یاد

رکھو کہ اگر بوتل میں جلدی سے پانی بھر دے تو فوراً تمام کلورین نکلی جائیگی اس بارہ آونس حل کلورین میں ۲ سے ۴ گرین

تک کوئین اور ایک آونس سرپ آرنیشیا ملاؤ اور پھر اس کی ایک آونس دو دو یا تین تین گھنٹہ بعد دیتے رہو

خفیف مرض میں کسی خاص سلسلہ علاج کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ صرف سیقدر کافی ہوتا ہے کہ مریض کو آرام

دیا جائے سردی سے حفاظت کجائے غذایق لطیف اور محرکات مثلاً پورٹ وین یا شمپین و بجائے پیاس

کے لئے لیمونٹ اور سنگلزہ وغیرہ دے جاویں اگر قبض کی شکایت ہو تو سلفٹ آف سوڈا یا سائٹریٹ آف

مینگنٹ یا حسب ضرورت دیکھتی ہیں اگر میزجاری درد اور راعضا شکنی زیادہ ہو تو ڈوورس پاؤڈر اگر گرین

سیلی سین ۱۰ اگر گرین ایسی ٹیٹ آف ایمونیا نصف آونس اور کیمفرواٹر ایک آونس ملا کر ایک خوراک سو تے

وقت ایک یا دو رات دیکھتے ہیں بعد میں چند روز کوئین کا استعمال ضروری ہے

حفظِ مقدم کے طور پر شش اور اس کے متعلقات اور گلو کو زیرِ انفلوائنزا سے بچانے کے لئے اینٹی سبیک ویزاںز باس کا استعمال مفید ہے۔ اگر زکام بروز نکالی ٹس نمونیا وغیرہ کی علامات پیدا ہوں تو ان کا علاج عام اصول پر کرنا چاہئے۔ سری برو سیائل انفلوائنزا میں جبکہ صدرِ جبران اور دیگر داغی علامات پیدا ہوں تو برو ماٹیز اور افیون کا استعمال کر کے ہسکان کے درد اور نزلہ میں کلورافارم اور ٹیچر اوڈین کے دس میں قطرہ ایک گرم کنی ہوئے کینگ گلاس میں ڈال کر اسکے ابخرہ کان کے اندر بیچاٹے مفید ہیں ضعفِ مالعص کے علاج میں شکر کنیا کوکا۔ وینائیٹ آف آمزن کوہن اور شرا مفید ہیں ضعفِ قلب جو اکثر انفلوائنزا کے بعد باقی رہتا ہے قابلِ خاص فوجہ اسکے لئے ڈی ٹیلیس۔ شکر کنیا۔ ایرن۔ فاسٹر فاسٹائڈ آف نرک حسبِ حالت دیکھئے ہیں

انفٹائیل بریلی سس Infantile Paralysis اکویوٹ اردنک برالی سس پولیو مائی لائٹس ایٹی ریڈیوٹ جیوں کا فالج پولیو مائی لائی ٹس ایٹی ریڈیوٹا۔ کبھی تو یہ مرض بالگاہی طور پر شروع ہو جاتا ہے اور کبھی بخار یا شخ یا نڈیان یا بیہوشی کے ساتھ عموماً شروع میں قریب قریب تمام جسم کی قوت حرکت ماری جاتی ہے اگر بعد میں آدھے جسم یا کسی خاص حصہ میں یہ نقص رہ جاتا ہے۔ موقوف حصہ کے بعض بعض عضلات میں حرکت قائم رہ سکتی ہے۔ کبھی کبھی وہ عضلات بھی بحالت ہو جاتے ہیں جن اعصاب دماغ سے آتے ہیں مثلاً چہرہ کے عضلات اکثر وہ صحیح سالم رہتے۔ ریفلکس حرکات بہت خفیف یا معدوم ہو جاتے ہیں جس میں کبھی تو خلل آ جاتا ہے اور کبھی نہیں آتا جب ہاتھ پاؤں کے بعض عضلات صحیح رہ جاتے ہیں تو ایک طرف کھینچ ہو کر بد وضع کیاں ظاہر ہو جاتی ہیں یعنی ہاتھ پاؤں ایک طرف کوڑ جاتے ہیں۔ پاخانہ اور مثاب بدستور آتے رہتے ہیں۔

علاج اس مرض کے علاج کو تین مدارج میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

اول ابتدائی مرض میں جبکہ بخار اور سوزش نخاع کی علامات ظاہر ہوں۔ اس میں دو دفعہ بخار و سوزش دینی چاہئیں قوی چکنو ٹیگر کوٹ ایک قطرہ۔ سائیرٹ آف پوٹاش ۲۰ گرین قدری شربت لیون اور پانی ملا کر چار چار گھنٹہ بعد دینا چاہئے۔ اگر اس سے ایک روز تک حرارت کم نہ ہو۔ تو کوہن اوٹینسٹین نصف نصف گرین مقدار میں دینی چاہئے۔ اگر ضرورت ہو تو ایک روز دوا شہل مثلاً گیلول ایک دو گرین ۵ گرین پچھلیب کو کو ساتھ ملا کر دے سکتے ہیں۔ امکان اور پانی جو جسم کو سہج کرنا بخار کیلئے نہایت مفید ہے۔ آؤٹ حصہ نخاع پر ایک ایک گھنٹہ بعد ہر لگانا نہایت مفید ہے۔ اگر جب اس مرض پر چند ایام گذر چکے ہوں۔ تو بغرض کارڈی ٹیشن سینگی یا ٹرانگٹ ایوڈین یا ٹنٹ کیفر لگانا چاہئے۔ پستور سنو نیم سوچن میں زیادہ وقت ہو جاتی ہے۔ داخلی طور پر آرگٹ۔ پوٹاسیم ایوڈائیڈ۔ پوٹاسیم بروائیڈ حب موقعہ استعمال کرتے چاہئیں اگر تسبی حرکات اور تفراری شروع ہو جو ہوں۔ تو پوٹاسیم بروائیڈ اور کلورل ایڈرٹ مفید ہوتے ہیں۔

دوم وسطی مرض میں جبکہ باہوں یا ٹانگوں یا سر و ذہن فالج ظاہر ہو گیا ہو تو رفع کمزوری اور تسکین بد وضعی کی

کوشش کرنی چاہیے۔ عضلات کی زایل شدہ طاقت کو بحال کرنے کے لیے سٹرکین اور آرسینس ایڈ نہایت عمدہ اودیں ہیں۔ لیکن سٹرکین سے بخال کے گنہگار اور سوزش کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پس اسکو کم سے کم شروع مرض سے ایک ماہ بعد استعمال کرنا چاہیے۔ عضلات و آف کی مائش کرنا۔ دوسری شخص سے انکو حرکت دلانا اور بجلی لگانا نہایت ضروری اور مفید تدابیر ہیں۔ بجلی کا استعمال دو تین سال برابر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر دو سال کے بعد تک کچھ فائدہ معلوم نہ ہو تو اسکا جاری رکھنا لا حاصل ہے۔

سوہم نتائج مرض میں بد وضعکی اعضا کا علاج مناسب ان زاروں درخشنوں سے کرنا چاہیے۔
انفٹائیل و ریزینر Infantile disease بچوں کے امراض کا بیان دیکھو۔
 انفٹائیل کنڈلشنز دیکھو بچوں کے تشبیہ و کیمیا میں ان امراض کا بیان۔
 انقباض عضلات سٹرکین سے کرنا چاہیے۔
 انقباض المعدہ۔ اٹھوانا۔

انقباض الاذن کان کا اکھر جانا۔

انکانتی ٹینس Incontinence سلسل بول کا بیان دیکھو۔

انکالی لاسٹوم ڈیوڈیل Anchylostomum Duodenale بچوں کے امراض کا بیان دیکھو۔

انکمپی ٹیبلٹی Incompatibility تناقض ادویہ کا بیان دیکھو۔
انگسٹرا بارک Angustia Bark کسپیر یا بارک کا بیان دیکھو۔

انگلو وین Ingluvine نہایت عمدہ مقوی ماضیہ جوہر مرغیوں کی بھری میں سے کالاجا

ہے۔ اہل چین قدیم زمانہ سے پرانی بدبھری میں بھری کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ انکو کاٹ کر تیز گرم پانی میں گلاتے اور جب کلک لکٹی کے طور پر ہوجاتی تو نمک مرچ وغیرہ ملا کر کھانے کے بعد کھلاتے پس پیل کا کیشیا میں اسکا جوہر یعنی انگلو وین الگ کیا گیا ہی تمام علامات بدبھری مثلاً عدم اشتہا۔ نفخ و درد معدہ۔ غشیان۔ تو نفرت غذا۔ غلظت وغیرہ میں نہایت مفید ہے۔ سپین کو تمام فوائد اس میں موجود ہیں۔ لیکن ایسی طرح کھا کر ادویہ کا کوئی تناقض نہیں کھتی۔

ایام عمل کی قیمن خاص کر مفید پڑتی ہے۔ ڈاکٹر چارلس لوس صاحب اسکو تو اویشیاں حمل میں مخصوص خیال کرتے ہیں جس سے کہ کوئین بخارات ملیریا میں اور کبھی نفیس میں مخصوص خیال کیا جاتی ہے۔ نیز دیگر اقسام قیمن ہی جو سوزش معدہ و سرطان رحم وغیرہ سے پیدا ہو۔ نہایت مفید ثابت ہوئی ہے۔ کسپیرینسٹری کا ادویہ جو انہیں بھی نہایت مفید ہے۔

خودک خود گرین بچوں کو اس سے گرین۔ سوزش معدہ کی حالت میں اسکو سمیٹھ اور ٹنڈر و سائنک ایسڈ کے ساتھ دیکھتے ہیں بعضی میں ٹنڈر و کلورک ایسڈ۔ کھاری اور تلخ مقویات معدہ اسکا ساتھ حسب ضرورت ملا سکتے ہیں۔

انگروینگ ٹو نیل Ingrowing toe Nail ناخن کو امراض کا بیان دیکھو۔

انودینس Anodynes مسکن درواوید۔ انونی نین۔ الیٹا۔ فیون۔ آتھیر۔ ہونیم کلورائیڈ۔ ایل ٹیٹیرٹ

اہل و نیکرے رشتہ کے سبب چلیں۔ انہیں فیہرین۔ انہیں یاہیرین۔ انہیں ریشین۔ انہیں بلیاؤدناہر و ماہر۔
 پوئل کھولن ہاڈریت۔ یاہیر و دین چلیں میہ۔ جیٹا ڈاک وڈ۔ سالی نوکلا سیم۔ سوڈی نائیرس سیرنوم
 سکر اقولیر یاڈوڈرم فینیشین۔ اہل یورنی تھین۔ کھول ہاڈریت۔ کھول کازن بانی سلفاڈ۔
 کھول روڈین۔ کھول رافازم۔ کوکین۔ کاکس۔ کوڈایا۔ کوڈایا۔ کھولیریا۔ کابو۔ گابا۔ لوپولس۔ فینشال میتیس
 میتیس لین بلیو۔ موڈوروم انہی سے فیکل وین۔ مارفاٹین۔ نائیر و گلیکیرین۔ ولس برنم پروم ہاڈین
 ہاڈو سائین۔

انورسٹما۔ اینورزم کا بیان دیکھو۔

انورشن Inversion رحم کا اندر کی جانب پلٹ جانا۔

جب رحم کی دیوار ڈھیلی اور کمزور پڑ جاتی ہے جیسے متواتر حملوں۔ جریان خون اور رسولوں کے بعد تو خفیف
 اسباب سے اسکی دیوار کا بالائی حصہ اندر کی طرف دب جاتا ہے کبھی کسی رسول یا بقیہ آنول کی کھینچ سے ایسا
 ہو جاتا ہے۔ کبھی محض کھانسی یا بوجھ اٹھانے یا کوڈنے یا پیٹ پر دباؤ پڑنے یا استغفر لع کے وقت کچھ سے ایسا
 ہو جاتا ہے۔ جب کسی قدر حصہ اندر کی طرف خم کھا جاتا ہے تو کچھ تو اپنے وزن سے اندر کی طرف اور ترنا جاتا ہے
 اور کچھ اسطرح سے کہ رحم کا عمل اس حصہ پر غیر ضرت سے کھول پر ہوتا ہے جو سکرٹسکر اسکو اور دبانا جاتا ہے یہاں تک
 کہ کل رحم پلٹ کر خم سے باہر آ جاتا ہے پس انورشن کے دو درجہ ہیں۔

اول وہ درجہ جس میں ایک حصہ دیکر رحم کے اندر ہی اندر رہے۔ دوسرے درجہ جس میں کل رحم پلٹا کھا کر اندر
 سطح باہر آ جاوے جب یہاں ہوتا ہے تو ہر وقت دروزہ کے مشابہہ درد ہوتا اور اکثر خون جاری ہوتا رہتا ہے
 متعدد کے اندر اٹکی داخل کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ رحم کسی قدر اپنی جگہ سے دبا ہوا ہے۔ درجہ اول میں
 اگر رحم کے اندر ساونڈ کرنا چاہیں تو پورے یعنی ڈھائی انچ تک اندر داخل نہو سکیگا اور مریض کو سخت تکلیف محسوس
 ہوگی۔ درجہ دوم کی تشخیص اسطرح چہرہ آسانی ہو سکتی ہے کہ فرج کے اندر اٹکی داخل کرنے سے پتا چلا
 رحم صاف معلوم ہو جائیگا بعض اوقات رحم پٹا کھا کر فرج سے بھی باہر آ جاتا ہے۔ اسوقت گویا کہ دو امراض
 یعنی انورشن اور خروج الرحم جمع ہو جاتے ہیں۔ ابتدائی حالت میں رسولی اور پالی پس سے اسطرح تیز ہو سکتی
 ہے کہ سادند پاپر و بپو دا جاسکتا ہے۔ بلکہ بعض حالتوں میں مہول سے بھی زیادہ۔ اور ان کی سطح دردناک ہوتی
 علاج شروع میں بائیں اوویہ شلاٹسکرمی سیٹ یا پیرکلوڈائیڈ فائین پانی میں حل کر کے اسکی پیچاری کریں اور پلٹ
 کی گدیوں جھلو کر رحم کے اندر کہیں جنم گرفتہ حصہ کو داغ دینا یا کاشک سے جلادینا اگر ابتدائی مرض میں کیا جائے تو اسکی طرفی کوڈر
 دیتا ہے اگر یہ تدابیر کام نہ ہوں تو مناسب دستکاری کے ذریعہ سکودرست کر دینا چاہئے پھر پیچاگہ کو پانی کی
 جہلیوں کے ساتھ کشادہ کر کے گردن رحم میں چارٹ گاٹھوڈیں اور برش سے بہرہ لیں کہ پٹا کھا کر اسکی طرفی کوڈر
 صاف کریں اور کھول اقدام باہر کے ذریعہ پیوش کر کے وضع لٹھاؤں پر شاوڈیں اور ان مصلوڈیل میں علویں سوڈیکل کر کے

۱) مریضہ کو وضع لٹھا ٹیوی برش کر دہنہ ہاتھ کے ایک انگوٹھے اور انگشت کے ساتھ پٹے ہوئے رحم کو بکڑیں اور بائیں ہاتھ کے ساتھ شکم پر مخالف دباؤ قائم رکھ کر بند ریح اسی کو اندر بکڑیں ساتھ ہی ساتھ دہنہ ہاتھ کے ساتھ باقی انگشت کے ساتھ گردن رحم کو پھیلاتے ہیں بعد ازاں کوئی ربا زٹر مثلاً کپ ربا زٹر استعمال کریں دہنہ ہاتھ سے ربا زٹر کی پیالی فنڈس پر قائم کر کے کمانی کے ذریعہ دباؤ پہنچائیں

۲) مریضہ خاص اوزار کے متواتر تجربی دباؤ پہنچا کر رحم کو درست کرنا اسکے لئے مفصل ذیل احتیاط ضروری ہیں

الف۔ اگر متواتر دباؤ سے کسی قسم کا دریا نقصان معلوم ہو تو وقفہ دیدینا چاہیئے۔

ب۔ پوٹاسیم برومائڈ یا کلورل ہائیڈریٹ سی بھی درکھ ہو سکتا ہے۔


ج۔ ایام حیض کے درمیان میں یہ اوزار لگانا چاہیئے۔

د۔ اگر کوئی رسول معلوم ہو تو اوزار لگانے سے پیشتر اسکو نکال دینا چاہیئے۔

اس عمل کے واسطے آونک صاحب کا سگمانڈر ربا زٹر نہایت موزون ہے جسکے استعمال کی ترکیب حسب ذیل ہے۔
 اول پٹے ہوئے فنڈس کا مقدار تحقیق کر کے اسکے مطابق پیالی انتخاب کریں سکر پر چکا لگا کر کندہ کے تسمہ سینٹی پن کے ذریعہ قائم کریں۔ بعد ازاں ربا زٹر کی پیالی فنڈس پر لگاویں مریضہ کی برداشت کو مطابق اشیوں کو تنگ و رکشادہ کرتے رہیں۔

۳) غیر اطرین یہہ ہو کہ شکم کو کمزور بنی البطن کی طرف سے رحم کو کشادہ کرتے ہیں۔

۴) ایسٹوشن یعنی خارج شدہ حصہ رحم کو قطع کر دینا یہ عمل آخری درجہ مجبوری کی حالت میں جبکہ زندگی کی سولے قطع کے نظر نہ آتی ہو کیا جاتا ہے۔ اس عمل میں جریان خون کا سخت اندیشہ ہو۔
 مقدار انقطاع رحم کی حالت اور طبیب کی ہر موقعہ تجویز پر منحصر ہے



لے نیوٹن یونیورسٹی **Inhalation Levinii** یہ ایک نہایت عمدہ مقوی قلب ہے۔
 اجماعاً ناپیتھورس نیوٹن یونیورسٹی میں دھواں دھواں میں فلوئڈ اسٹرکٹ کو دو مین قطرہ بار بار استعمال کر نیسے آرام مل سکتا ہے اسکو
 استعمال ہو خود بخود ملا استادگی عضو تناسل کو انزال ہو جاتا ہے۔ اعصابی مزاج کو لوگوں میں اسکا استعمال بڑی احتیاط سے
 کرنا چاہئے۔ ڈبی ٹالس کو ساتھ ملا کر دینا نہایت عمدہ مقوی قلب ہے۔

لے نیوٹن **Inhalation** یعنی ادویہ کو بھانپ بنا کر سونگھنا۔ اسکی مختلف تدابیر ہیں بعض ادویہ
 معمولی حرارت ہوا میں خود بخود اڑتی رہتی ہیں مثلاً کلوروفارم۔ ایٹھر۔ ایل ایٹھر۔ بالی کلورائیڈ آف پھلین۔
 یہ ادویہ ناک اور منہ کو قریب کر نیسے خود بخود اندر پہنچ جاتی ہیں۔ بعض ادویہ کو تیراگ پر اڑا کر سونگھا سکتے ہیں مثلاً گندک
 کیلومل اور بعض ادویہ کو کھوئی ہوئی پانی میں ملا کر جس سے وہ بھانپ کر ساتھ ملا کر اڑتی ہیں مثلاً کریزوٹ کاربالک سیڈ
 ایو کیلٹس آئل بعض گرم پانی میں ملا کر سونگھا سکتے ہیں مثلاً انجیرو زین کو۔ آئل آف ٹرنپٹائن آئل آف فروو۔ پانی نال
 اور بعض اسطر جنگہائی جاتی ہیں۔ کہ انکو کسی قیق میں حل کر کے بطور فورہ کو ناک یا منہ کو اندر پہنچا دین۔

ان سب تدابیر کو مد نظر رکھ کر مختلف اقسام کے انجیلر ایجاد کیے گئے ہیں۔ امراض دہن گلو ناک زرخہ اور زرخہ
 میں مختلف اغراض سے ادویہ سونگھائی جاتی ہیں مقصود کو لحاظ سے انہیں بیشتر کی عموماً مفصل ذیل میں افادہ
 اقل سندھو یعنی مسکن سوزش درد دہا پانی کی بھانپ نہایت عمدہ مسکن سوزش درد دہی سوزش گلو۔ زرخہ
 زرخہ نالی مثلاً فریجائیٹس۔ لیرجائیٹس۔ کروپ۔ براکائیٹس۔ آستھا وغیرہ میں بطور دافع درم۔ مسکن درد
 اور مخرج بلغم کام دیتی ہے ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷

(ب) شورہ کی بھانپ جسکی ترکیب یہ ہے کہ تیس چالیس گرین ٹھلی شورہ ایک وزنی پیمین حل کر کے سفید جاذب یعنی بلاٹنگ پیپرین جذب کر لیا جاتا ہے اور اس کاغذ کو جلانے کے بعد دھوئی دینا دورہ کو حلیت ختم کر دیتا ہے۔

(ج) ایک گرین فوین مرخ گرم دھات کے ٹکڑے پر آکر سوکھنا نزلہ کو آرام دیتا ہے۔

(ج) ایک گرم بیون سرخ گرم دھات کے ٹکڑے پر آڑا کر سونگھنا زلہ کو آرام دیتا ہے۔

(د) مختلف ادویہ مثلاً کباب جینی دہتورہ وغیرہ کے چرٹ بھی استعمال کئے جاتے ہیں۔

(۹) بعض ادویہ پانی میں حل کر کے فوریہ پر سے گلو کے اندر نہچائی جاتی ہیں مثلاً اگر یہ ہشکری یا اگرین سلفیٹ آف آئرن اور ہگرین سلفیٹ آف زنک یا قطرہ سلفیوس ایسڈ یا ایک قطرہ کاربالک ایسڈ فی وٹس پانچمین ملا کر سپٹورام لیکٹک ایسڈ یا اگرین ٹینک ایسڈ اوٹس پانی میں ملا کر بالاکٹور ایوڈائی

یہ انکوار مٹائی یا واپس لے لی گئی ڈیڑھ گھنٹہ کے اندر

چھارم مہیو شے نک یعنی حابلہ دم مثلاً فیٹی بائیرین ۹۰ گرین ۱۰ اونس تیز گرم پانی میں حل کر کے نصف نصف گھنٹہ بعد کھانا ہر قسم کے نفث الدم کو آرام دیتا ہے۔

[illegible]

Anethum ٹل فروٹ تخم سویا۔ دیکھو بیان سویا۔

پسینہ کا نہ آنا۔ امراض پسینہ کا بیان دیکھو۔

Anhidrosis

سپینہ کاغذ آنا۔ امراض سپینہ کا بیان دیکھو۔

Anæsthetics بے حس کرنا والی اور یہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔

اقل وہ ادویہ جو سنگھانیے تمام کمرہ بے حس کر دیتی ہیں۔ اسے سی اسے مکسچر میں الکحل ایک حصہ کلوروفارم

۲ حصہ الراجحہ حصہ ہوتا ہے۔ ایجنٹر سلفیورک۔ امونائیڈ کلورائیڈ۔ ال نائٹرٹ۔ اتھیل ڈین بائی کلورائیڈ۔ اتھیل پروائیڈ۔ اتھیل آئیوڈائیڈ۔ آلی سوپوٹل نائٹرس۔ کابن بائی سلفائیڈ۔ کابن شیئر کلورائیڈ۔ میتھیلین بائی کلورائیڈ۔ نائٹرس آکائیڈ گیس۔

دعویہ وہ ادویہ جو کسی خاص مقام پر لگانے سے جے حسی پیدا کریں اسلئے ائمہ اہل السنۃ اہل البیدائی پر
اسمعی کم اسی تخرافین۔ انھیں سیرے۔ آلو ڈول بولڈین۔ برو سین جنرل ٹروپین، بھی این جمنیا
سیلوئیسٹر سٹروفتھین سیٹ۔ نوکارمین۔ مگڈلینیا ٹراٹک۔ کارین بائی سلفائیڈ کوکٹین۔ کفر فینک
کینڈول۔ کھٹے ان۔ لینولین شتھال متھل کلورائیڈ۔ ہیلی بورن۔ ہائیڈروجن براکائیڈ۔

کلوروفارم: ایک حصہ، ایتھریل فیک ۵ حصہ، متھال: ایک حصہ، نہایت عمدہ لوکل مسٹھینک ہے

کسی مقام پر پرف یا جلدی اگر جاتے والی مافات مثلا اتیر کلو ما فارم وغیرہ سے سردی پینچر
اٹک کر جس کر سکتے ہیں۔

انکے کہ جس کو کہتے ہیں۔

انیتھیشیا Anesthesia بے حسی دیکھو درزہ اور جس کے امراض کا بیان۔

انیکیا Onychia ناخن کے امراض کا بیان دیکھو۔

انیلجیٹکس Analgesics انڈو اینرژک اسکا بیان دیکھو۔

انیلجیسین Analgesin اسکے دوسرے نام اینٹی پائیرین اور ڈالی میتھل آگسٹی لی زین پر

اینٹی پائیرین کا بیان دیکھو۔

انیلجیشیا Analgesia تکلیف کا حس نہ رہنا۔ دیکھو جس کے امراض کا بیان۔

انیلین Aniline اسکا دوسرا نام فینیل امین ہے۔ تشبیہی امراض رعشہ اور سل میں استعمال کی جاتی ہے۔

استعمال میں ایک جصد الی لین سات آیل الیو کے لپس یا انائیس یا پیپرٹ نکھاتے ہیں۔ اسکا اندر

استعمال سے جلد نیلون ہو جاتی ہے۔ لیکن نیل خود بخود جلد ہی جاتا رہتا ہے سو اسطرح کا کچھ اندیشہ نہیں۔

خبر سلفٹ آفانی لین پر گرین سو شروع کر کے مگرین تک یا اس سے زیادہ بھی دیکھتے ہیں۔

اینما Enema اسکے دوسرے نام لیومنٹ کلسٹر اور حقنہ میں مستقیم کے اندر کسی قیق شو کی

پچکاری کر کے کو حقنہ کہتے ہیں۔ بلحاظ فائدہ کے اینما کی مختلف اقسام ہیں۔

(۱) اینما اینڈیک یعنی مخرج کرم حقنہ تفصیل کے لہو دیکھو بیان اینٹائیل ورمزاد تھیلٹکس کا۔

(۲) اینٹی سپارناؤک مثلاً نصف ڈرام کلورل ہڈریٹ پانی میں حل کر کے اینما فی ٹیڈ و دین ڈرام

سلفورک اینٹی ٹریگرم پانی میں ملا کر اینما اینٹی ٹریگرم بنی۔

(۳) اینٹرجنٹ آئی میٹا۔ جو اسہال یا خون یا رطوبات کو اخراج کو بند کرنے یا رتوں کو مندل کرنے کے واسطے

دئے جاتے ہیں۔ اسداد اسہال کے لئے اینما اوپائی نہایت مفید ہے۔ بندش خون کے لئے برف

سو ٹھنڈا کیا ہوا پانی استعمال کرتے ہیں۔ رتوں اور اخراج رطوبات کے علاج میں مفصلہ ذیل اینما سفید ہیں۔

(۱) سلور نائٹریٹ ۵ اگرین پانی ۴ پانٹ ۲۱ سلفٹ آف زنک یا الیم ایک دو گرین پانی ایک انس۔

سلفٹ آف کلر ایک گرین پانی ایک اولس۔

(۲) امولی اینٹ اینٹیشیا۔ یہ بغیر ص دفع خراش اموا پر درش جسم دیکھتی ہیں مثلاً لاسٹا۔ السی

یا جو کا جوشانہ یا خالص روغن السی جیش میں چار پانچ انس نیکرم پانی یا دودھ او سہلان بطور

اندر دینی سبک استعمال کیے جاتے ہیں۔

(۳) نیو ٹریٹ اینٹیشیا مثلاً سیف لی اور سفید ملا کر اسمیں سو چار پانچ انس (۲) ڈی فائبرسی سے ٹھنڈا

تازہ اور خشک کیا ہوا (۴) پانی اور سفید لی ملا کر (۵) براندی اور پانی۔

اگر مستقیم میں خراش اور سوزش معلوم ہو تو قدرے نیکروم ملا دینا مفید ہوتا ہے۔ دودھ اور رائی

کے ساتھ سپین ملا دینا مدد دے گا۔ دیکھو بیان سپینو تازہ جلد کا

(۶) سڈے ڈائسمیا مستقیم اور مثلاً کو رد واد سوزش میں مفید ہیں مثلاً نصف ڈرام سے ایک ڈرام تک
ملکچر اوپیم۔ ایک انوس میوٹک آف شارج میں ملا کر۔

دھابریگے ٹو یعنی مہل حقہ مثلاً (۱) اینا آف میگنیشیا سلفاس (۲) اینا آف الوزد (۳) صابون اور پانی کا حقہ
(۴) انگلیسین نصف ڈرام سے ۳ ڈرام تک۔

انے مرثا مینی کوکیٹا **Anamirta Penicuiata** اسکے دوسرے نام مینی سپرم کا کولس۔
انے مرثا کا کولس **Anamirta Cocculus** انڈین کاکڑ اور کاکڑی اور زہرہ ماہی ہیں۔

اسے نوے میں سے بکر وٹا کسین نکالا جاتا ہے۔

اسکے پھل میں کچلہ کی تاثیرات موجود ہیں تھوڑی مقدار میں پرانے فالج مرگی۔ رعشہ دکھشی۔ اور سفکس کو فالج
میں مفید ہے۔ زیادہ مقدار میں تمام حیوانات کے لئے زہر ہے اسکے پھل کا سفوف ۱۰ گرین ایک اونز سیلین میں
ملا کر گلابون خشکی کھجلی اور دوا میں مفید ہے بکر وٹا کسین سل کے ترقق شبینہ میں پچا گرین صبح اور
شام دینا نہایت مفید ہے۔ فالج کہنے مرگی اور رعشہ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ زہر مار دینا اور کلورل ٹیڈرٹ
کا فاد زہر ہے۔ کیونکہ یہ ڈال کے مرکز و لیو موٹار کو تحریک دیتا اور مرکز تنفس کو مغلوب ہونی سے روکتا ہے۔

خمر تخم کا کولس۔ ۱۔ ۳۰ گرین تک۔ فلوڈا کسٹرکٹ ایک سی قطرہ
بکر وٹا کسین ۳۰ سے پچا گرین تک۔

انی موینی پلسی ٹیلا۔ **Anemone Pulsatilla** [پیسے ٹلا کوٹائیٹ کی طرح مخدر و مضغ
انی موین۔ **Anemonin**۔ دوران اور تنفس پر زیادہ مقدار میں ٹلا

اور نخاع کو مغلوب کر دیتا ہے اور گردوں معدہ اور امعاء میں سوزش پیدا کرتا ہے طبی مقدار میں مقوی عصا
اور دافع تشنج ہے۔ آتشک اور مختلف جلدی امراض میں بطور مصفی خون اسکو استعمال کرتے ہیں۔
میکس مبرن کی ہر قسم کی سوزش مثلاً گونریل یا فیمیلیا گیسٹریٹس لیرنجاٹیس لیرنجاٹیس۔ زکام انٹرائٹس اور
میکس ڈایاریا میں نہایت مفید ہے سپرٹیک کارڈ اپنی ڈوئی سل وریٹیٹی کل کر درم میں در دوا و سوجن کو اندام
دیتا ہے۔ کالوفیلین۔ اور انی موین ملکہ نہایت عمدہ مدہیض اثر رکھتے ہیں۔ انی موین لمبی ٹلا بے قاعدگی ایام دے
نوریا۔ اور لمے نوریا لیو کوریا اور پریسمپس پوٹرائی مین بہت فائدہ کرتا ہے۔

دماغ اور اسکے غلافوں کی سوزش صراخ ایکلمپنیا اور مختلف تشنجی امراض میں بھی بہت مفید ہے۔ خمر سفوف لمبی ٹلا
۲ سے ۵ گرین تک۔ فلوڈا کسٹرکٹ اسے ۵ ہونڈ تک۔ خشک اکسٹرکٹ لم سے ۱ گرین تک۔

انی موین ۱/۲ سی پچا گرین تک۔

Anemia

انیما

یعنی قلت رقت خون

کلوروس

پرانی شش انیمیا۔ زہریلے انیمیا میں تین مختلف حالتیں ہیں اول وہ جسمیں کل بدن کا خون نسبتاً کم ہو جاتا ہے دوسرے جسمیں خون ناقص پڑ جاتا ہے یعنی پانی زیادہ اور سرخ ذرات کم ہوتے ہیں۔ سوسرے وہ جسمیں کہ شریانیں بڑے طور پر بھر کر نہیں جیتیں۔ ان تینوں حالتوں میں خون کی ایجاد کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ فائبرین نسبتاً زیادہ ہو جاتا ہے۔ سبز انیمیا جو اکثر نوجوان لڑکیوں میں فسادات حیض کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خون کی رنگتوں میں ایک قسم کا کیمیائی تغیر چلتے ہے اسباب۔ اول عام انیمیا۔ (اول جسم سے خون بکثرت خارج ہو جانا مثل کمسیر یا نفث الدم یا قے الدم یا یا اسہال الدم یا بول الدم کی صورت میں خون کا تھوڑی تھوڑی مقدار میں بار بار خارج ہونا۔ دفعتاً خارج ہونے کی نسبت زیادہ مضر اور مہلک ہوتا ہے۔ دوسرے عادات خراب آب و ہوا کھانے پینے کی تنگی۔ غذا خراب سوسم پرانے امراض خاصہ مثل اسہال پیش۔ دبلیہ البیومی نائڈ و زیز کثرت جماع۔ جلق بخار وغیرہ چھادے سکے اور پارہ کا زہر۔ بچوں میں مٹی کھانے کی عادت۔ (پنجم) عورتوں میں حیض کے فسادات مثل عسرت الطمث۔ کثرت الطمث وغیرہ۔

دویم کلوروس۔ یعنی سبز انیمیا کے اسباب۔ اسکی ہی جو حالتیں ہیں اول میں بڑے نوجوان محض ظاہر ہوتا ہے۔ سوسم پرانی شش انیمیا یعنی زہریلے انیمیا کے اسباب دل اکثر چاؤں میں یہ مرض ظاہر ہوتا ہے (۲) معدہ اور انٹسٹینوں کے امراض (۳) کھانے اور پینے کی کمی (۴) خراب آب و ہوا اور سست عادات (۵) صدمات تردوات و تفکرات (۶) خون کا جسم سے بکثرت خارج ہو جانا (۷) انٹسٹینوں کی کڑے خاصہ انکائی لاسٹوم ڈیوڈی نلی اور باکھو کی کیفی لس لیٹس

الفرض اسکے تمام اسباب قریب قریب ہی ہیں جو معمولی انیمیا کے ہیں مگر یہ مرض زیادہ تر زچگی کی حالتیں ظاہر ہوتا ہے۔

علامات۔ اول انیمیا اور کلوروس۔ تمام بدن کا رنگ پھیکا زرد اور موم کو مشابہ ہو جانا۔ جلد تیلی نرم اور شفاف ہو جاتی ہے۔ ہونٹے۔ مسورے۔ زبان۔ آنکھیں صاف نیلی یا سفید یا پھیکی پھیکی نظر آتی ہیں عضلات ڈھیلے اور نرم ہو جاتے ہیں۔ ناخنوں سے خون کی سرخی جاتی رہتی ہے۔ مخنوں اور پلکوں کے گرد تہج رہتا ہے۔ چہرہ اسکرہ ہوا یا پھولا ہوا نظر آتا ہے۔ سستی اور ضعف اسقدر غالب ہے کہ کچھ کام کرنے کو مریض کی طبیعت نہیں چاہتی۔ سردی لگتی ہے۔ تھوڑے سے پھرنے سے دھکشی اور اختلاج القلب شروع ہو جاتے ہیں کبھی کبھی غشی ہو جاتی ہے۔ سر میں گرانی یا خفیف درد۔ کانوں میں شور اور گنجا رہتی ہیں۔ اٹھتے وقت آنکھوں کے آگے اندھیرا یا بخنور سا آجاتا ہے۔ طبیعت مٹا حال رہتی ہے اور اکثر کھجوری ہو جاتی ہے۔ بھوکہ نہیں لگتی۔ اکثر قبض رہتا ہے۔ عورتوں میں عسرت الطمث۔ قلت الطمث اور جریان کی شکایت رہتی ہیں۔

دویم پرانی شش یعنی زہریلے انیمیا کی علامات یہ مرض ایک دفعہ شروع ہو کر ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے

اور بہت جلد مریض کو ہلاک کر ڈالتا ہے اس واسطے اسکے نام زہرِ یلہ اور ترقی پذیر اور مملکتِ اینبیا بھی ہیں نام علامات معمولی اینبیا کو مثلاً یہ ہوتی ہیں مگر فرق یہ ہے کہ ہمیشہ بڑھتی جاتی اور کسی علاج سے نہیں رکتی سوڑ ہے کھوکھلے ہو کر دانت ہڈی لگجاتے ہیں منہ خشک رہتا اشتہا غایب اور غشیان و قی غالب ہوتی ہیں۔ جلد کے نیچے اور اندرونی جوڑوں میں کبھی پانی بھر جاتا اور کبھی خون جمع ہو جاتا ہے بخار ۱۰۱ اور ۱۰۲ درجہ کے درمیان رہتا ہے۔ یہ مرض عموماً چھ مہینے سے پندرہ مہینے تک ثابت ہوتا ہے کبھی کبھی اس میں کمی بیشی ہی ہوتی رہتی ہے۔ خون کے سرخ ذرات پیدا ہی کم ہوتے اور صنایع ہی زیادہ ہوتے ہیں اور حیات میں معمول سے بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں۔

معائنہ مابعد مرگ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ معدہ اور انشڑوں کے غدود اور اعصاب میں فاسد تیزات ہو جاتے جگر طحال اور گردہ میں فولادی ذرات جمع ہو جاتے ہیں۔ دل جگر گردہ اور شریانون میں چربی پڑ جاتی ہے۔ ہڈیوں کے گوشت میں معمول سے زیادہ سرخ ذرات بنتے ہیں۔

علاج اسکے علاج کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

اول۔ اصلاح غذا۔ اکثر حالتوں میں قسم اور مقدار غذا اور اوقات تناول پر توجہ کرنا سرف اینبیا کر لے کافی ہوتا ہے حیوانی غذا میں یعنی گوشت۔ انڈہ۔ دودھ۔ روغن کھن وغیرہ خوشگوار اور سریع البضم صحتوں میں بکثرت استعمال کر لے چاہئیں۔ اگر ماضیہ ضعیف ہو تو ان غذاؤں کے ساتھ ہائڈروکلورک ایسڈ۔ پیپ سین۔ انگلو وین۔ پیکر لے ٹین وغیرہ تائید ماضیہ کے لیے دے سکتے ہیں۔ تازہ خوشگوار سوہی مہوہ جات بھی حسبِ پند و قبولیت طبیعت کھانے چاہئیں۔

دوم۔ پابندی اصول حفظ صحت۔ شہرہ کی بند اور صلی ہو بہت عادات۔ دنیاوی تفکرات و مقصدات خون کو ظلیل اور رفیق ہونے کو عام اسباب ہیں پس ایسی مریض کے لیے کھلی ہوا میں مناسب ورزش کرنا شہر کی بجائے کسی صاف گاہ میں قیام کرنا۔ زیادہ تفکرات سے اجتناب اور اعتدال کو ساتھ اپنونا غل میں مصروف رہنا نہایت مفید ہیں۔ صاف ہوا کھلی روشنی۔ مناسب ورزش۔ با اعتدال محنت۔ جو عادات سے اجتناب الکی برابر کوئی شے مقوی خون اور پرورندہ جسم نہیں ہے۔ جو شخص زیادہ بیٹھے رہنے والے ہیں انکو بتدریج ورزش کی عادت ڈالنی چاہیے شروع میں گھوڑے یا ٹم کی سواری۔ روزانہ غسل سائش اور مٹھی چابی کافی ورزش خیال کئی جاسکتے ہیں۔

سوم۔ مناسب دویہ کا استعمال۔ سب سے پہلے معدہ اور اسحاق کی حالت پر توجہ کرنی ضروری ہو اگر معدہ میں خراش یا دائمی قبض کی شکایت ہو تو اسکا علاج مقدم ہے۔ دائمی قبض کی حالت میں اگر فولاد کا استعمال کیا جائے تو کچھ فائدہ نہیں کرتا کیونکہ براہِ کی سلفیورٹ ہائڈروجن گیس فولاد کی ساتھ ملکر سلفیڈ آف آئرن بنا دیتی ہے جو قابلِ تحلیل نہیں ہے اگر معدہ میں خراش موجود ہے تو اسکو اور زیادتی ہو کر معدہ کے متعلق ضعیف

زیادہ ہو جاتی ہیں پس مہدہ اور اس کا اصلاح کے بعد فولاد کسی مناسب رت میں استعمال کرنا چاہئے
ڈایلاڈائرن فیری ایٹ۔ کونین سائٹراس۔ فیری ایٹ امونی سائٹراس۔ فیری کاربوناٹس کی ریشا
وینیم فیری۔ فیری ٹارٹریٹ۔ برادہ فولاد ٹیکنیکل۔ فیرم ریڈکٹیم مہدہ مرکبات فولاد میں فولاد کو استعمال سے
اکثر قبض خراش مہدہ اور سیاہی دندان کی شکایت ہو جاتی ہے۔ انکی طرف ضرور توجہ رکھنی چاہیے ڈایا
لائڈ ڈائرن کے استعمال میں یتھکایات عموماً نہیں پائی جاتی جبکہ فولاد آب سالی مہم ہونا مناسب ہو۔ یہ تخمینہ
کیا گیا ہے کہ جوان مرد کے خون میں فولاد تقریباً ۲۰ گرام ہوتا ہے اور انیمیا کی حالت میں زیادہ و زیادہ گرام
کے قریب کی ہو سکتی ہیں اس حساب کی ردی فولاد بطور تقوی خون کم مقدار میں ہی استعمال کرنا چاہیے۔
جیلائیمیا کا سبب خاص مرض مثل آئنک۔ لیوکوریا۔ البیومی نوریا۔ جریان خون پرانا بخار پچش وغیرہ
ہوں تو ان امراض کا علاج ضروری ہے۔ اگر دفعتاً خون بہت خارج ہو کر سخت انیمیا ہو گیا ہو تو
اسکے لئے حسب ذیل تدابیر ہیں۔

(۱) ۲۰ اونس بنگرم پانی میں ایک ڈرام نک حل کر کے کچی رید کے اندر بذریعہ پچکاری ہینچا نا۔

(۲) دوسری انسان کا خون ۱۲۰ اونس لیکر اسکا تمام فائبرین الگ کر کے ورید کے اندر پچکاری کرنا۔

(۳) براہ راست دوسری شخص کے بازو میں مرین کی بادو میں شربانی یا وریدی خون شریان یا ورید
اندر بذریعہ خاص اوزاروں کے ہینچا نا۔

(۴) ۲۵ اونس تک حیوانی خون کا فائبرین نکال کر دزائنج و شام حقنہ کرنا اگر ضرورت ہو تو اس قدر کے لائڈ نکال کر

(۵) دو مین گرام تک فی اونس پانی میں حل کر کے جلدی پچکاری کرنا بھی اکثر بہت مفید ثابت ہوا ہو۔ دیکھا
پچکاریوں میں دخل ہوا اور کیف اجڑے نہایت احتیاط لازم ہو۔ ان تمام تدابیر میں نک پانی کی پچکاری
زیادہ مفید اور بے خطر ہے۔

جوان لڑکیوں میں چودہ اور سترہ سال کی عمر کے درمیان اکثر انیمیا ہو جاتا ہے جسکی وجہ سے عام رنگ دی لیل اور کم
طور پر فہم ہو جاتا ہے اسکا نام کلوروسس ہے۔ علاج عام انیمیا کی طرح کرنا چاہیے۔ اس میں مرکبات فولاد کا تین چار مہینہ تک
برابر استعمال کرنا ضروری ہے کیونکہ اسکو دورہ کا اندیشہ ہوتا ہے۔ چونکہ اس میں اکثر امراض متعلق اعضا و ولادت مثلاً
ہیپووریا۔ ہیپوٹوریا۔ لیوکوریا بطور سبب یا نتیجہ دیکھ جاتے ہیں اسلئے مناسب موقع پر چکنٹ آف پوٹاش کونین او
آرسنک بھی فولاد کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے۔ پریشی انیمیا میں آرسنک یعنی سم الفار۔ فاسفس اور آکسیجنیشن
مفید ہوتے ہیں۔ فاولرس سالیٹن ۳۰ قطرہ تین دفعہ روزانہ شروع کر کے ۱۵۰ یا ۲۰۰ قطرہ تک پہنچا سکتی ہیں اکثر حالات میں سر
مہلک ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک دفعہ آرام ہو جاتا ہے اور بار بھی ہو جاتا ہے غذا اس مرض میں خالص آبی چاہیے بعض محققین کی رائے
ہے کہ پریشی انیمیا میں سلیکد جمع ہونے سے ہوتا ہے اس اصول پر ڈیٹا سیفٹھا اور دیگر اینٹی سلیکد دوی بھی اس مرض میں بجاتی ہیں
اینوزم Aneurism انورسٹا اور سائٹراس کی کسی حصہ کی بھول جانے کو اینوزم کہتے ہیں اسکی تہ میں ہیں۔ اولیٰ

جس میں ریان کوٹا کوٹ بارگشاہ ہرکچہ فیروز اور دونوں طرف کا دھوم ہوتا تھا وہیں یہی قسم کو فیوس فارم یعنی مکھانا کہتے ہیں وہم تھیلی
اس میں شریان کسی ایک مقام پر کشادہ ہو کر تھیلی کی طرح ہو جاتی ہے۔ کبھی تو تمام کوٹ اس کشادگی میں شامل ہوتے ہیں اور کبھی
محض بیرونی کوٹ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شریان کے ہر سہ کوٹ گلکراؤ میں سولج ہو جاتا اور خون گرد کی ساختوں میں
جمع ہو جاتا ہر صیغہ وہ قسم جس میں شریان دیوار کی تہوں کو درمیان جمع ہو جاتا ہے اسکو ڈسکٹنگ یعنی پھاڑتا ہوا اینورزم
کہتے ہیں کبھی تو ایسے اینورزم کا خون پیرسی جگہ پر اندرونی کوٹ کو پہاڑ کر اندر جاتا ہے تو اسے اوکھی پر دو کچھ میں ہی جمع ہو جاتا
علامات اینورزم کی حسب ذیل ہوتی ہیں۔ شریان کے کسی مقام پر ہاتھ رکھنے سے اس او بھار کا قلب
کی طرح دھڑکنے لگتا رکھنے سے رگڑ کی آواز سنائی دینا جسکو فوڈائی کہتے ہیں۔ اگر او بھار سے اوپر
شریان کو دبا دیں تو او بھار فوراً کم ہو جاتا ہے اور دھڑکنے اور بروای بھی موقوف ہو جاتے ہیں۔
اور کسی رسولی میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں بعض نرم رسولیاں ایسی ہوتی ہیں جو کسی بڑی شریان
کے اوپر پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان میں شریان کے ساتھ دھڑکا بھی محسوس ہوتا ہے مگر ان کا او بھار
شریان کے دباؤ سے کم و بیش نہیں ہوتا۔

یہ تو اینورزم کی تشخیصی علامات ہوئیں مگر علاوہ اور صد ماتیج در پیچ علامات ہیں جو اس اید او بھار
کے دباؤ سے پیدا ہو جاتی ہیں مثلاً اگر کوئی عصب قریب ہو تو اسپر دباؤ رہنے سے درد رہتا ہے
اور نیز جن عضلات میں وہ عصب جاتا ہے ان کا حس و حرکت مائے جلتے ہیں اگر کسی بڑی ورید
پر دباؤ ہے تو دوران خون بند ہو کر وہ ورید بھول جاتی اور تھپج یا ورم یا سودا الفنیہ یا دبیلو وغیرہ
پیدا ہو جاتے ہیں۔ اطراف کی بڑی ورید پر دباؤ پہنچنے سے وہ حصہ مردار پڑ سکتا ہے۔ قلب پر دباؤ
پڑنے سے اختلان یا غشی ہو سکتی ہیں۔ پھیپھڑوں پر دباؤ پہنچنے سے خشک کھانسی اور دمکشی
ہو جاتی نرضرہ اور خنجرہ پر دباؤ پڑنے سے دم بند ہو سکتا ہے۔ مری پر دباؤ پڑنے سے غذا اور پانی
کا گلٹنا دشوار ہو جاتا ہے۔ الغرض جس عضو یا عصب یا ورید کے قریب اینورزم ہو اسی کے متعلق
علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔

بڑا اینورزم جو مدت تک ہو وہ اپنے دباؤ سے قریب کی ساختوں اور اعضا کو کھانا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ
سینہ اور شکم کے اینورزم تناسل کی ہڈیوں تک کو کھا جانے میں کبھی خود بخود پھٹ کر جریان خون ہو دقتا ہلاکت
کا موجب ہو جاتے ہیں۔ کبھی ورم ہو کر مایہ پھوڑا نکر یا خون کی تہیں دن کر اندر رفتہ رفتہ جکراؤ سکونا ہو کر دیتا اور
دوران خون کسی اور قریبی شریان کے راستہ سے شروع ہو جاتا ہے یہ اینورزم کا ایک قدرتی علاج ہے۔

اگر اینورزم کو اندر سے دیکھا جاوے تو او کی اندر خون کی تہیں جمی ہوئی نظر آتی ہیں پہلو ایک تہ بنتی ہے پھر
اوسکی اوپر ایک اور تہ چماتی ہے۔ اس طرح سے تہ پر تہ بنتی چلی جاتی ہے۔ یہی تہیں آخر کار اوسکو بند کر دیتی
ہیں مگر یہاں شاذ و نادر ہوتے ہاں اسے علامت مرض دیگر پیچیدگیوں کی سبب سے پہلو ہی جلتا لگتا ہے۔

۱۔ کباب اینورزم (۱) شریانی دیوار کا دم یا آتشک یا فقس یا امراض گردہ کی وجہ سے ہوتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے (۲) قلب کا بڑھ چا یا کبھی اختلاج ہوتا ہے سنت عادات کی بعد و نقصان بھاگ دوڑ اور محنت کا اتفاق ہونا (۳) جوان مردوں میں یہ مرض کثرت سے ہوتا ہے کیونکہ انکو بھی اتفاقی بہاگ دوڑ اور محنت کی زیادہ اتفاق پیش آتے ہیں۔

علاج۔ اینورزم کا علاج اس کے مقام وضع اور قات کیطابق ہوتا ہے سینہ اور شکم کے اینورزم پر جراحی عمل کرنا خوشحال امر ہے ایسے انہیں مفصلہ ذیل تدابیر کیجاتی ہیں اور بلاشبہ اکثر انہیں کامیابی بھی ہوتی ہے (۱) تاجیم اور دماغ کو حتی الوسع ہر قسم کا آرام دینا۔ اور ہر طرح کی حرکت سے بچانا۔ اس ترکیب میں مریض تین چار یا پانچ جیسے مہینہ برابر لیٹر پر چٹ لیفا رہتا ہے۔ ہرگز اسکو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیجانی اور کروٹ بدلنے کی اجازت بھی نہایت زحمی اور آہستگی کے ساتھ ہوتی ہے۔ غذا بہت کم دیجانی ہو اور ہر قسم کی محرک مٹنی ہو یہ میز کرنا چاہیے غذا و زرات (۱) اولن و دودھ اور (۲) اولن خشک غذا مثلاً گوشت بچھل مہینہ وغیرہ مناسب مقدار میں با بکٹ وغیرہ کے لئے جاتے ہیں۔ دوران خون کو مست کرنے اور اسکو قوت بخا دو نیز کرینک غرض سے مفصلہ ذیل ادویہ استعمال کیجاتی ہیں۔ پوٹاسی آئیوڈائیڈ (۱) سے ۲۰ کرین کی خوراک میں تین دفعہ روانہ اکثر مفید ثابت ہوا ہے۔ ایسی ٹیٹ آف لڈ (۲) جی ٹیس اکو نائیٹ و سکوٹرم و ریڈی کلورائیڈ آف بیریم (۳) گرین (۴) آئرن مرکوریل انکشن رائٹک کی حالت میں۔ آن ادویہ میں سو آئرن اور کلورائیڈ آف بیریم قابل توجہ ہیں۔ خارجاً کو اولین کالپ نہایت مفید ثابت ہوا ہے۔ اس سے درد اور ٹرپ میں کمی ہو کر اینورزم تدریجاً جسامت میں کم ہو جاتا ہے (۵) ارگوٹین کی جلدی پچکاری۔ اس سے اینورزم کی تھیلی سکڑے اور اسکو ارد گرد کی شاخیں سخت ہوجاتی ہیں (۶) گیلوی نوپنک۔ دیکھو بیان الیکٹریٹی کا۔ (۷) سمجھ کر بننے والی ادویہ یا کسی غیر جنس شے کا انجما دو خون کی غرض سے اینورزم کے اندر پہنچانا۔ مثلاً کلورائیڈ آف آئرن کی پچکاری (۸) امیل امبولائی کے بننے اور اینورزم میں سخت ہو نیکا اندیشہ ہے۔ جھوٹے اینورزم یا دیری کو زونیز کے لئے مفید ہو سکتا ہے۔ غیر جنس شے مثلاً اکیونک یا الوی کے تارکٹیکت ممال وغیرہ اندر پہنچانا بھی اکثر بے سود اور مہلک ثابت ہوا ہے۔ جب اینورزم کسی بازو پر یا سطح کے قریب واقع ہو تو مفصلہ ذیل جراحی عملوں میں سے کوئی عمل حسب موقعہ کر سکتے ہیں۔

(۱) تام اینورزم کو نکال دینا (۲) جس شریان پر وہ اینورزم واقع ہو اسکو اینورزم کے قریب دونوں طرف باندھ دینا (۳) اینورزم کی تھیلی پر دباؤ دینا (۴) شریان متعلقہ پر قلمی جانب دباؤ رکھنا۔

(۵) دشکاری۔ بیرونی دباؤ مالش اور ہلانے چلانے سے اینورزم کی اندرونی سطح پر منجمد خون اور فائبرین علیحدہ ہو کر شریان کو روک سکتا ہے اور اسکے نکل جانے کے بعد تمام اینورزم کی تھیلی انجماد خون ہو کر بند ہو سکتی ہے۔

رخ درد کیلے افیون۔ مارفیا۔ گانجا سائیٹی پائیرین ایٹمی نمبرین۔ پوٹاسیم آیوڈائڈ غیر استعمال کریں
اولی سٹی Obesity
 فریبی کا بیان دیکھو۔

اورڈونٹالجیا Odontalgia
 درد دندان۔ دندان کو امراض کا بیان دیکھو۔

اورڈیم البی کیننس Odium Albeans
 یہ ایک قسم کا خور و مینی نباتات جو مرض
 قشرش میں منہ کے اندر جگہ کر لیتا ہے۔ قشرش کا بیان دیکھو۔

اورام الاذن۔ اٹائٹس و اوٹریا کا بیان دیکھو۔

اورام الانتین۔ فوطوں کے امراض کا بیان دیکھو۔

اورام رحم۔ رحم کے امراض کا بیان دیکھو۔

اورام مشانہ۔ مثانہ کے امراض کا بیان دیکھو۔

اورام مقعد۔ ریکٹم کے امراض کا بیان دیکھو۔

اورام ونبورسم۔ البیس کا بیان دیکھو۔

اور گلاس کنٹریکشن Hour Glass Contraction
 رحم کا گردن

کے اندر دنی سوراخ کے قریب تنگ ہو کر شیشہ ساعت کی شکل ہو جانا۔

اورینا۔ Ozaena ناک سے بدبو آنا۔ اخراج اللانف۔ اسکی اصلیت یہ ہے کہ آتشک یا خنازیر کی وجہ سے ناک کے اندر

خراب قسم کا زخم ہو جاتا ہے جسکی وجہ سے بدبو دار رطوبت جاری رہتی یا سخت کھرنڈ بنتے رہتے ہیں۔ زخم کی وجہ سے

آخر کار ہڈی اور مری بھی گلنی شروع ہو کر ناک بیٹھ جاتا اور بد وضع ہو جاتا ہے۔ یہاں رطوبت رقیق ہوتی ہو

پھر غلیظ اور پھر کھرنڈ نکلتے ہیں۔ حلقوں میں یہ حالت رہ کر ناک بد نما ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اور وجوہات سے

بھی بد بو آتا کرتی ہو۔ مثلاً شور دہن۔ عدم زبان۔ مردار و ان۔

دانت اور زبان کا صاف نہ رہ کر کھنا پھینچنے کا مردار پڑ جانا۔ گنگرین۔ حلق کو چھالے اور پھوٹے۔ سرری

بیان اور امتحان سے طبیب ان امراض کو بخیر الانف خیال کر سکتا ہے مگر ناک اور منہ کو ملاحظہ سے صاف طور

پر تشخیص ہو سکتی ہے۔

علاج اس مرض کے علاج میں تین اصول ہیں۔ اول ناک کے تمام غلیظ اور عفونت دار بلغم اور چھلکوں کو کامل

طور پر صاف کرنا۔ دوم مقامی طور پر جاذب اور دفع بد بو اور بد بطور پکچاسی یا سوا اریسینی کے استعمال کرنا

سوم اگر کوئی مرض اندرونی مثلاً آتشک۔ سکر افیلا۔ یا عام کمزوری موجود ہو اسکا علاج کرنا ان اصول

کی تکمیل کے بعد ہو سکتا ہے۔

دوا ناک کا تمام غلیظ بلغم اور پشیر لویں صاف کرنا۔ اسکی چند ترکیبیں میں داول، بذریعہ پکچاسی یا

نیزل ڈوش کے پکچاسی کر کے وقت بوقت دوا کرنا۔ ناک کو پھلی سوراخ کو کامل طور پر بند کر لیتا ہے۔ اور

دوم منہ کے راستہ آگاہ ہوتا ہے اسلئے پچکاری میں کسی قسم کا اندیشہ نہیں کیونکہ تمام پانی دوسری تھلے سے خارج ہوتا رہیگا پانی نیم گرم اور اسمیں ایک ڈرام سوڈا باہانی کارب اور نمک حل کر کے استعمال کرنا چاہیے (دوم) بذریعہ جاذب روئی یا کپڑے جو تھلے بہتر رہے کہ پہلو پچکاری کے ساتھ دونوں تھنوں کو خوب صاف کر کے بعد میں باقی ماندہ کو آہستہ آہستہ روئی یا کپڑے کے ساتھ صاف کر لیا جائے (سیدیوم) گیلوی نوکا ٹری کے ساتھ پہلے اسکے تار کا ایک سراناک کو اندر داخل کر کے پھر بجلی پیدا کی جائے جب بجلی تیز گرم ہونے لگے گی تو تمام جھپکڑ سوختہ ہو کر علیحدہ ہوتے جائینگے ہر طرح سے انکو باسانی نکال سکتے ہیں (چھکاسم) فیراؤک کرٹ کے ساتھ۔

۲، صفائی کے بعد جاذب اور دفعہ بد بودا ویہ بطور پچکاری یا نسوار یا بتی استعمال کرنا داول پچکاری کو مفصلہ ذیل دوینی پائٹ پانی میں حل کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ پریگنیٹ آف پوٹاش ۲ گریں کلور آف ڈنک ہم گریں سلفیٹ آف ڈنک ۵ گریں کاربالک ایڈ ڈرام سلور نائٹریٹ ۸ گریں پھٹری ۱۰ گریں سہاگ ۸ گریں کلورائیڈ آف پوٹاش ۲۰ گریں ٹینکلیک آڈین ۳۰ ہونڈ بورک ایسڈ ۲ ڈرام نیفتھال ۸ گریں کروڑو سلیمیٹ ۴ گریں نیفتھال ۲ ڈرام ڈالکی ال ۲ اولس میں حل کر کے (دوم) اگر بورک ایسڈ سمجھنے میں نہیں آوڈو فارم کیلوٹل۔ کافور چار پانچ حصہ چاک شکر یا نشاستہ میں ملا کر بطور نسوار استعمال کرتے ہیں۔ روئی یا کپڑے کی تہی بالسم آف پرویا گلیسرین ایک حصہ اور پانی تین حصہ یا نیفتھال ایک حصہ اور پانی ۸ حصہ میں تر کر کے ناک کو اندر رکھنا مفید ہے۔ اگر ناک کو اندر کوئی زخم ہو تو اسپر نائٹرک ایسڈ یا نائٹریٹ آف سلور یا آئیل آو ڈائیڈ یا کاشری لگا کر جلادیں اور اگر مردار بڑی موجود ہو تو اسکا کانا ضروری ہے اگر یہ مردار بڑی معمولی طور پر کسی موحجہ کی گرفت میں نہ آسکے تو بالائی لب کو اوپر کی طرف اٹھا کر اور تیز چاٹو کی نوک سے ٹگاف دیتی ہوئی ناک کی مرویل و درمیان فی پردہ کو نیزل سچا میں سے علیحدہ کر کے نکالنے کی کوشش کریں

۳، امراض موجودہ کا علاج عام اصول کے مطابق کرنا چاہیئے۔

اوپتھیمیا Ophthalmia کنجیکٹائیو کے امراض کا بیان دیکھو۔

اوپتھیمیا سیرپنٹینا یا Ophioxylum Serpentaria دافع بخار و قاتل مخرج کرم

Ophicxyline

Olfactory Narve

Oak Poison

Oxygenated Water

عصب شامہ دیکھو بیان شامہ کے امراض کدہ
میں ناکسی کو ڈنڈرن کا بیان دیکھو۔

ہائڈروجن پراکسائیڈ یا ہائڈروجن

اوکسیجینیٹڈ واٹر ہائڈروجن پراکسائیڈ کا بیان دیکھو۔

اوکسی فینال Oxyphenol ڈالی ہائڈروکس بنترال ڈالیا ٹانگ کا ربالک ایسڈ۔
پورسینس کو مین رسار سین۔ رسا سینال۔ دیکھو رسار سین کا بیان۔

اوکسی اوریا Oxyuria
اوکسیک ایسڈ ڈالیا تھینس
اوکسی لیٹ آف لائم کیلکولس
Oxalic Acid Dialhesis
Oxalate of Lime Calculus

آکسی لوریا کے علاج میں اصلح خوراک و عادات و پابندی اصول حفظ صحت ضروری امر ہیں جن اشیا میں کہ اگر ٹانگ ایسڈ پایا جاتا ہے مثلاً چائے۔ کولا۔ چوکولیٹ۔ تھوہ مولی۔ اکو۔ سٹریسم جو۔ کلی۔ گیہوں۔ گو بھی۔ گاجر۔ تاکو۔ آلو بخارا۔ رنگترہ۔ لیموں۔ وغیرہ۔ سٹرابری۔ اہلی۔ انہ۔ ان سی۔ بہیز کرانا چاہیے۔ کافی درخش ہمیشہ خوبالش کے ساتھ نہانا۔ پانی میں تیز نمید ہیں۔ غذائیں زیادہ تر گوشت اور دوہ استعمال کر لینے چاہئیں۔ بطور ادویہ نائٹر وہائڈروکلورک ایسڈ۔ ٹنگنکس و امیکا اور الفیوزن کو اشیا نہایت مفید ہیں۔ فیری ایٹ کوئین سائٹرس رقت خون کی حالت میں مفید ہو۔ اگر باضمہ کے متعلق کوئی فساد ہو تو اسکی اصلح کرنی چاہیو۔ جب اس کی پتھری بجائے تو عام قواعد جراحی کے مطابق اسکا علاج کرنا چاہیے۔

اوکسی پورس ورمی کولیرس Oxyuris Vermicularis انٹینل ورمز کا

اولڈ مینس ہیرڈ Old Man's Beard کالونٹیس ورمینی کا۔ اسکا بیان دیکھو۔
اولما۔ بائرنک گائے کے پیشاب میں باریک پیکر اسکا لپ کریں اور اس کے اوپر برگ مہتورہ گرم کر کے باندھیں۔ دیکھو بیان ہو پوکا۔

اولی اک ایسڈ Oleic Acid یہ جلد میں باسانی اور جلدی جذب ہو جاتا اور جود ہات یا الکلیلاڈ اس میں حل کیا گیا ہو وہ مقامی استعمال ہو اپنا اثر کر سکتا ہے۔ مٹھو۔ دلی۔ ٹیس لمس سے بناؤ جاتے ہیں۔ دیکھو اولئیس کا بیان۔

اولی ایٹس Oleates مفصلہ ذیل ولی ایٹس۔ اولی اک ایسڈ اور دیگر اشیا معدنی یا نباتی کو ملا کر بنائے جاتے ہیں۔ اولی ایٹم الیومنائی۔ اولی ایٹم آرجنٹائی۔ اولی ایٹم آرسینی سائی۔ اولی ایٹم لیمونائی۔ اولی ایٹم کیڈمی آئی۔ اولی ایٹم گوہرائی۔ اولی ایٹم فیرائی۔ اولی ایٹم ہائڈروجنائی۔ اولی ایٹم سیگنیائی۔ اولی ایٹم نکل۔ اولی ایٹم پلیمائی۔ اولی ایٹم سینائی۔ اولی ایٹم زنائی۔ اولی ایٹم کولی ٹینی۔ اولی ایٹم اہروینی۔ اولی ایٹم کوکے ابی۔ اولی ایٹم مارینی۔ اولی ایٹم کوئینی۔ اولی ایٹم سٹرنینی۔ اولی ایٹم وری ٹرینی۔

اولیم انٹیمی ٹرس Oleum Anthemedis روغن گل بابونہ تھینس فی ہر بیان دیکھو۔
اولیم اینینی سالی۔ روغن سولف۔ خمر۔ پ۔ ہونڈی۔ ہونڈک۔ سپرٹ ولیم اینی سالی ۵ سو ۲ ہونڈک۔

Oleum Iodi اولیہ ایوڈائی
جب ضرورت ملانے سے بنتا ہے۔ باسان جلد میں جذب ہو جاتا اور اس کا دماغ باقی نہیں رہتا اور نچر ادا

منٹ آؤڈین کی طرح اس کا لپ کرنا وجہ النفاصل کسرفہ۔ درم سکور وغیرہ میں مفید ہے۔

Oleum Ergotae اولیہ ارگٹ
ارگٹ کا بیان دیکھو

Oleum Olive اولیہ اولو

روغن زیتون۔ خارجی استعمال۔ جلد کو ملائم اور صاف کر دیتا ہے۔ دوسری ادویہ مثلاً الیونیا اور لام وغیرہ کی مالش کا نہایت عمدہ ذریعہ ہے جلی ہوئی جگہ جلدی امراض اور سطحی زخموں پر لگانے سے اس مقام کو ملائم اور ہولے محفوف کر دیتا ہے۔ دوسرے روغنوں کی طرح مالش کرنے سے جلد میں جذب ہو کر جسم کو غذائیت بخشتا ہے۔ داخلی استعمال میں قدرے عین جو کم مقدار میں سوزش معدہ کو جو خراش کنندہ سمیات سے پیدا ہوا آرام دیتا ہے۔

اسما سے عروق یا ذہین پہنچا کر خون میں مل جاتا اور تمام ذرات جسم تقسیم ہو کر غذائیت کا کام دیتا ہے۔ سنگ مرارہ میں اس کا یہ خاص فائدہ ہے کہ صفراوی نالیوں میں پہنچ کر کنکریوں کو نرم کر کے خارج کر دیتا ہے۔ یہی حال تمام روغنوں اور چربیوں کا ہے کہ زیادہ مقدار میں کھائے کچھ بھر بہت خارج کرتے اور اس کو قوت کرنیستہ میں سوڈی سیلی سلاس کی نسبت بھی انکی قوت اخراج صفر زیادہ خیال کیجاتی ہے لیکن چونکہ اکثر حالتوں میں روغن زیادہ ختم نہیں ہو سکتے ایسے بہتر یہی ہوتا ہے کہ پہلے صفراوی امراض کا سوڈی سیلی سلاس وغیرہ سے علاج کیا جائے اور اس میں اگر ناکامی ہے تب اولو ایل آزمایا جادے۔ سنگ مرارہ میں بہتر طریق استعمال حسب ذیل ہے۔

روغن زیتون ایک ونس پانی ہم اولنس میں ملا کر اس میں سے نصف پندرہ پندرہ منٹ بعد پلایا جاوے اس سے درد رفع ہو جاتا اور کنکری خارج ہو جاتی ہے اگر دورہ کی علامات ہوں تو اور خوراک دیکھتی ہیں۔

خبر پل اولنس سے ایک دانس تک۔

Oleum Eucalyptis اولیہ ایوکالیپٹس
خارجی استعمال میں ایاب نہایت عمدہ اینٹی سپٹک

Eucalyptene ایوکالیپٹین

ڈس انفیکٹ۔ انڈو این۔ اسٹریچٹ اور ٹانک ہر

Eucalyptia ایوکالیپٹیا

ایسے بطور مالش یا لپ مقامی امراض میں استعمال کیا

جاتا ہے مثلاً سکور۔ وجہ مفاصل سرد و دانت۔ بدبودار زخم یا تھک کس۔ اسی ہی ٹپس۔ اگر سیا۔ افستھی ٹنکرم اور مس وغیرہ میں۔ داخلی طور پر اسکی تاثیرات ٹرینٹائن ہو مٹا دینے کو تین کی طرح انٹی بائیوٹک اور انٹی پیرکس ہے۔ گردہ اور پھیپھڑوں کے راستہ خارج ہوتا ہوا اپنا شش مولٹ اور اینٹی سپٹک اثر کرتا ہے۔ بطور اینجولیشن یا سپرے یا پچکاری یا لپ مختلف امراض ٹانک۔ گلو مین۔ حنجرہ۔ سینہ مثلاً نزلہ۔ زکام اور زینا براکائی ٹس۔ برانکوریٹس۔ نکی ایٹھس۔ ڈیفیٹیر یا وغیرہ میں استعمال کرنے سے تمام جملی پر مقوی۔

مصلح اور دوس انٹیکٹ اثر پیدا کرتا ہے۔ موسمی بخاروں ٹائیفائیڈ فیور سکارلیٹ فیور اسہال حاد و مزمنہ و مہال الہ
ہیضہ قرحہ معدہ مصراع اور مختلف امراض اعضا و شامیل مثلاً انفرالٹس سٹائٹس سوزاک یوری تھرائٹس
یوٹیرائٹ کنار۔ سائٹ شکر دیو کوریامیں اسکا داخلی اور خارجی استعمال نہایت مفید ثابت ہوا ہے زخموں کو دھوئے
اور ہر قسم کو ڈرینج کر لینے نہایت عمدہ اینٹی سپٹک ہے۔
خمر لے ۵ پونڈ تک یا زیادہ ایو کے لیٹیا یا ایو کے لیٹین ۵ سے ۱۰ پونڈ تک۔

اولیم ایولی کن **Oleum Eulachon** کینڈل فش آیل رکادور آکیل کی طرح بیروغن
بھی تمام جسم کے لئے پرورش کنندہ اور امراض سکر فیولا اور یوبرکل میں مفید ہے خمر اسے ہم ڈرام تک۔

اولیم پانی نالی بیوچی لیونس **Oleum Pini Pumillonis** بیوچی لین پانی نالی
نہایت قوی اینٹی سپٹک دوس انٹیکٹ ڈی اوڈورٹ اور نہایت عمدہ خوشبودار ہے بطور اینٹی لیشن
سپر مختلف امراض گلو و سینہ مثلاً ڈیفیٹھریا۔ ترلہ۔ زکام۔ برانکائٹس۔ برانکوریٹس۔ یا نیومونیا۔ دمہ۔ سل۔ ورم حنجرو
و گلو۔ اور بنا میں مفید ہے مریض کے کمرہ کو اینٹی سپٹک کرنے اور خوشبودار بنانے میں کوئی نظیر نہیں کھتا
وجہ مفاصل۔ نفرس۔ سگور۔ ورم۔ ورم عرق النساء اور اگر یامیں اسکا لیپ یا مالش مفید ہیں۔ گردہ دھنا اور
شش کے متعلق مختلف قسم کی سوزش اور عفونت میں اسکا داخلی استعمال نہایت فائدہ کرتا ہے خمر ۲ قطرہ ۵ قطرہ

اولیم پانی نالی سلوسٹرس **Oleum Pini Sylvestris** فروڈ آیل۔ وجہ مفاصل
میں بطور مالش کے استعمال کیا جاتا ہے۔ بطور اینٹی لیشن امراض گلو اور زرخہ میں سٹی مولٹ اینٹی سپٹک اور
اینٹی سپازمک فائدہ بخشتا ہے۔ اسکی ہم پونڈ ۲ گریں کاربونیٹ آف ٹنگسٹک اسٹکٹراکٹک ایکٹوئس پانی میں
ملنے اور بطور بحال سکھاتے ہیں۔

اولیم پوگوسٹیمین پائچولی **Oleum Pogostimen Patchouli**
اولیم پٹ کولی **Oleum Patchouli**

نہایت عمدہ قابض گرم ہی ایسی خوشبو سے بھر پو۔ کھل جوں۔ لیکھ۔ لکھی۔ چوٹی وغیرہ فراہم ہوا جاتا ہے۔
اولیم ٹیری۔ تھینی **Oleum Terebinthine** ٹرینٹامین۔ مقامی استعمال
میں ٹرینٹامین سی مولٹ اینٹی سپٹک اور دوس انٹیکٹ ہیوٹا لیل کولکائے سے کیتھریٹس اور
اور جن معلوم ہوتی ہے مگر جلدی سے یہ تکالیف دور ہو جاتی ہیں بطور ٹول سٹی مولٹ اور کاوشکاری کے
وجہ مفاصل۔ درد اعصابی۔ قولنج۔ نفقہ معدہ۔ برانکائٹس اور نیومونیا میں استعمال کیجاتی ہے سودا
س خراب خموں۔ ہسپٹل کنیکرین اور منیکش ڈگریوں میں اسکا مقامی استعمال نہایت مفید ہے۔
معدہ براسکا اثرکاری نیو یعنی مخرج ریل ہوتا ہے۔ لیکن اسکو بدترافہ اور بدبو کی وجہ سے اس مطلب کے
لے اور جو کچھ دوس استعمال کیے جاتے ہیں۔ انٹرکوبہر اسکا اثر سٹی مولٹ اور دوس انٹیکٹ ہوتا ہے۔ زیادہ

مقدار میں قاتل کرم اور سہل ہے۔ اسہال بخشیش نفع بقیض۔ اسہال الدم اور کرم امعا کرلیے مفید ہے۔ اسکی بھاپ ناک، منہ، گلو، نر خرہ، اور براگانگی کی جھلی پریشی مولٹ ڈس انفیکشن اور مصلع اثر پیدا کرتی ہے۔ اسلیے بطور انہیش مختلف امراض سینہ مثلاً براگانگیس، براگی ایکٹس، دمہ نیو مونیاسل، برانگو، یا۔ گنگرین آف دی ٹنگ اور نزله و زکام میں استعمال کی جاتی ہے۔

میکس جھلیوں سے اور آسانی کے ساتھ جذب ہو کر خون میں لجاتی ہے لیکن خون براگانگی کو جھلیاں تباہ نہیں ہوتا خون سے خارج ہو کر تمام اعضا پر ڈیر پینٹ اثر پیدا کرتی ہے۔ پوری خوراک کو صفت۔ نا توانی، غشیان سستی اور غنودگی غالب ہوتے ہیں اور زیادہ خوراک کو غشی بھی ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ دماغ اور کھج پر بھی ضعف دہشتی لاتی ہے۔ اسوجہ سے اسکا استعمال مختلف قسم کے دردوں میں کیا جاتا ہے قلب کی حرکات ضعیف و رشت ہو کر حالب الدم اثر پیدا ہوتا ہے۔ اسوجہ سے ہر قسم کے جریان خون میں جوشش معده، رحم، گردہ و مثانہ وغیرہ سے ہو کر نہایت عمدہ حالب الدم اثر رکھتی ہے۔ حرارت جسمی اس کو کم ہو جاتی ہے۔ فاسفرس کے ذریعہ اور مغز میں فادزہر کا کام دیتی ہے۔ سلیٹ آفسکا پر کر بعد اسکو استعمال کرنا چاہیے۔ گردہ، کھنکھ، جلد پستان، جگر اور امعاء کے رگ۔ اور لطیف و غنول کی طرح خارج ہوتی اور اپنا مفعول اثر پیدا کرتی ہے۔ پسینہ زیادہ ناتی اور بعض اوقات جلدی بخارات نمودار کر دیتی ہے۔ ہوائی نالیوں پر اسکا اثر پی مولٹ ڈس انفیکشن اور کسی قدر اسپیکٹوٹ ہوتا ہے۔ اور اسوجہ سے کرائنگ براگانگیس، براگی ایکٹس اور گنگرین آف دی ٹنگ میں مفید ہے۔

گردہ پر اسکا اثر تھوڑی مقدار میں بھی اسی قوت ہوتا ہے کہ کادہ و جینا میں مختلف جن و خون ظاہر ہوتے ہیں۔ تھوڑی مقدار میں دے۔ لیکن زیادہ مقدار میں جس بول کے علاوہ اور تکالیف بھی زیادہ کر دیتی ہے اسوجہ سے برانگیس ڈیزیز اور میوٹو یا میں اسکا استعمال کمال احتیاط سے کرنا چاہیے۔ مگر سے خارج ہونے وقت صفراوی کنکریوں کو ملائم کر کے خارج کر دیتی ہے۔ اسوجہ سے صفراوی کنکریوں اور پتھروں میں اسکا اکثر استعمال کیا جاتا ہے۔ خمر و پستانین سے ۲۰ قطرہ بطور محسج کرم سے ہر ڈرام کنفیکشن میں ہفتی ۱۰ سے ۲۰ گرین تک۔

انیمائیٹری فمضی ایکل ونس میوچ آف شاچ ہاؤنس میں ملا کر۔

Oleum Oniperum

اولیم جونی پریم جلدی امراض مثلاً سوزائے سس، اگر یا ناوس، یو بزو وغیرہ میں شراب میں حل کر کے یا صابون بنا کر یا ساوی وزن روغن ملا کر اسکی ماش مفید ہے۔ خمر اسے ہاؤنس تک۔

Oleum Dipteroarpi

اولیم دیپٹروکارپی باسک تائیرات کو پایا باس کے مشابہ ہیں۔ اسکی طرح نہایت عمدہ مخرج ٹم ہے لیکن جلد پر کوئی انجریلت پیدا

تینیں کو پاؤں کی بجائے سوزاک۔ گلیٹ۔ برص اور مختلف امراض جلدی میں مفید ثابت ہوا ہے۔ خارجی طور پر تین حصہ لایم و اٹھ میں ملا کر جلدی امراض میں اسکی مالش کی جانی ہو تین حصہ کر لے دیکھو بیان کو پاؤں کا۔
خمر بطور مصفی خون ۲۰ سے ۷۰ قطرہ تک۔ بطور مخرج بلغم ۲ سے ۲۰ ڈرام تک۔

اولیم ڈیلنی *Oleum Deelinæ* یہ محض مٹی کا تیل صاف کیا ہوا ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی بدبو نہیں رہتی۔ مختلف اقسام اگر زیادہ سوائے سس۔ اپنے ٹانگوں میں اسکی مالش مفید ہے۔

اولیم ساسافریس *Oleum Sassafras* اسکا اثر دماغ پر بخیر اور شہی ہوتا ہے۔ زیادہ مقدار میں مختلف قسم کے تشنجی حرکات پیدا کرتا اور رحم کو سکیر کر باعث استقامت ہو سکتا ہے طبی مقدار میں محرک مدہ معرق۔ مصلح خون۔ اور مقوی ہے۔ اعصابی درد میں مقام مافوق پر مالش کرنے سے درد موقوف ہو جاتا ہے زہر تاکو اور بین بین کر لے فاذر ہے۔ خمر ۲ سے ۱۰ بوند یا زیادہ۔

اولیم سنٹولی *Oleum Santali* روغن صندل۔ اپنے افعال اور فوائد میں کو پاؤں کا شہا ہے۔ ستر اسکا کھانا کو پاؤں کی نسبت آسان تر ہے تشنج کے لیے کو پاؤں کا بیان دیکھو خمر ۱۰ سے ۲۰ قطرہ تک۔
اولیم گدینی *Oleum Gadini* اولیم جونی پرم کا بیان دیکھو۔

اولیم گال تھیری *Oleum Gaultheriæ* ونٹر گرین آئیل۔ یہ خوشبودار محرک۔ اینٹی سپٹک۔ مدہ حیض۔ مولد شیر اور قدرے جاذب ہے۔ اس میں سیل سلک ایڈ قدرتی طور پر موجود ہوتا ہے اور اسید جو سو دوح مفصل کو بخار اور درد میں بہت فائدہ کرتا ہے لیکن سیلی سلک ایڈ اور سوڈیم سیلی سلاس کی طرح معدہ اور جلد کے متعلق خراب علامات نہیں پیدا کرتا۔ شریوں میں اسکا استعمال نہایت احتیاطاً کے ساتھ کرنا چاہیے کیونکہ انہیں سیلی سلک ایڈ کی طرح ڈیلیم ٹرینس کی علامات پیدا کر دیتا ہے۔ اگر زیادہ اور دیکھو جلدی امراض میں بطور مدہ استعمال کرنا مفید ہے خمر ۵ سے ۱۰ یا ۲۰ قطرہ تک۔

اولیم گائی توکارڈی *Oleum Gynocardia* چال وگر آئیل۔ داخلی طور پر مصلح خون اور مقوی ہے۔ سکر فیو لاسل۔ ورح مفصل اور امراض میں مفید ہے۔ خارجی طور پر مختلف جلدی خالصہ اگر زیادہ لیس کے سیر اور واد میں استعمال کیا جاتا ہے خمر ۵ سے ۱۵ بوند تک بہتر ہے کہ پہلو تھوڑی مقدار میں شہج کر کے آہستہ آہستہ اسکی خوراک زیادہ کی جاوے۔

اولیم گرجن *Oleum Gurjun* اسکا دوسرا نام اولیم ڈیپٹر وکار پائی ہے اسکا بیان
اولیم مری *Oleum Morrhuæ* گاڈلور آئیل۔ روغن ماہی۔ گاڈلور آئیل کا بیان دیکھو
خارجی طور پر اسکی تاثیرات اولیم آلو کے مشابہ ہیں بغرض پرورش جسم ناقوان بچوں میں اسکی مالش نہایت فائدہ دیتی ہے۔ داخلی طور پر نہایت سرعۃ البضغ روغن غلیظ ہے۔ اس میں آئیوڈین برومین اور فاسفیس قدرتی طور پر موجود ہوتی ہیں۔ جو گاڈلور آئیل کے استعمال سے اپنا خاص اثر بھی ظاہر کرتے

ہیں۔ روغن مایہی میں ماسواوان اجڑنے دیکر روغنوں مثلاً کھن، گھی، بالائی، روغن بادام، روغن زیتون کی نسبت زیادتی ہے کہ یہ انکی نسبت آسانی مفہم ہو جاتا ہے۔

تمام جسم کو لاغر کرنے والے امراض مثلاً سکرافیو لاس۔ سرفہ مزمنہ آتشک۔ وجع مفصل۔ عام لاغرئی کمزوری میں روغن مایہی بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ اعصابی کمزوریوں اور تکالیف مثلاً در و فالح نقاہت یا یوکی وغیرہ میں بہت مفید ہے۔ زیادہ بخار، نفث الدم، اسہال اور سوزش معدہ کی حالت میں اسکا استعمال ممنوع ہے۔

خود اک لے دے فلویڈ ڈرامک۔

اسکی تاثیرات
دوسری خوبیاں
لطیف روغنوں کو

Oleum Menthae Piperitae

Oleum Menthae Viridis

Menthall

مشابہ ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھو بیان لونک کا۔

ثابت ہوا ہے۔ تین لاکھ حصہ میں اسکا ایک حصہ بھی میلانے اور اوکا تخم مارنے کے لیے کافی ہو۔ اس حساب سے یہ کارہالک ایسڈ، آیوڈو فارم، آیوڈین، کرڈروسیل، میتھیو بدرجہ لاندہ قوی الاثر ہے۔ ایک اونس روغن میں اسکا ایک قطرہ معمولی آئیل ڈریسنگ کرنے کافی ہے۔ ہر قسم کی خارش اور ہر سوزش کی تکلیف کو مفصلہ ذیل ترکیب سے لگانا فوراً آرام دیتا ہے۔

اولیم منٹھی ۵ قطرہ۔ سہاگہ ایک ڈرام۔ نیگرم پانی ۱۶۔ اونس۔ خواہ خارش کسی وجہ سے ہو اسکا ایک دفعہ لگانا فوراً آرام کر دیتا ہے۔ لیکن زخم اور گتاف کی جگہ پر اسکو نہیں لگانا چاہیے۔ بل میں اسکا انہیلیشن ڈیفیٹر یا میں اندرونی لیپ اور بیضہ میں اسکا پلانا مفید ہیں۔

خود اک اسے ۵ قطرہ تک۔

اؤنکس Anyxis
اؤنیکیا Anychia

اگر مانگ ٹونیل

ناخنوں کی سوزش

ناخنوں کو امراض کا بیان دیکھو


اؤنگا۔ بٹ کڈا۔ اخراج پارہ کے لئے مجرب ہے۔

اؤوریز Ovaries

یعنی انہیں کے امراض۔ انہیں دو غدد

اجزاء ہیں۔ جو جسم کی ہر دو جانب پیدا کو اندر براؤنگنیٹ میں واقع ہیں عورت کو بیضہ

انہیں میں پیدا ہوتے ہیں۔ انکی شکل و اوصافی وضع مفصلہ ذیل نقشہ میں دیکھو۔



امراض آئینہ کی مختلف فرست صلی ۱۶۷۱ء سے شروع ہو۔ اور اوکا علاج صفحہ ۱۶۹ پر دیکھو۔

اول ہر نیا یعنی متقن انیشین۔ رحم یا فرج میں پیدا ہونے کے سبب کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ
الغائی طور پر یہی مرض ہو جاتا ہے اسمیل و دوری اپنی جگہ سے اوکھڑا انگلی ٹل کناں میں آ جاتی ہے۔
کھانسنے سے اندام نہانی کی طرف اسکا اوجھار زیادہ ہو جاتا ہے جو اخروٹ کو برابر ہوتا ہے رحم کو پیچھے
کی طرف کھینچنے سے اور دوری بھی کھینچ جاتی ہے ورم غدود میں یہ علامات نہیں ہو سکتی کہ کھانسنے سے اندام کی طرف
اوجھار بڑھتا ہو اور رحم کے کھینچنے سے کھینچ جاوے۔

دوم خروج الانیشین۔ پرولیپس آف اورری۔ اسمیل دوری اپنی جگہ سے اوکھڑا رحم کر سکتے
یا پیچھے یا ایک کنارہ پر پلٹا کھلے ہو و حصہ کے نشیب میں گر پڑتی ہے جل کے بعد دفعتاً جھٹکا پیچھے پڑتا
رحم کی بجائے رہا جانے سے ایسا ہو جایا کرتا ہے۔ فرج اور مقعد کے اندر اوگلی داخل کر کے اٹاوا اور دوری
کو معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ جب اوگلی کا دباؤ اور دوری پر پہنچتا ہے تو فوراً درد و سام معلوم ہوتا ہے۔

سیوم۔ ورم الانیشین۔ اووے رائی ٹس۔ او فورائی ٹس۔ یہ دو قسم کی ہوتی ہے حاد اور مزمن
یعنی ایکوٹ و کرائیک ایکوٹ او فورائی ٹس میں اور دوری کے مقام پر درد شدہ محسوس ہوتا ہے جو بیہوش
کئے دیتا ہے۔ دبانے سے درد اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی بھک۔ گھبراہٹ۔ صداع اور تشنج کی علامات
پیدا ہو کر مگی یا اختناق الرحم پیدا کرتے ہیں جلع میں سخت تکلیف معلوم ہوتی اسلئے ناکھن ہو جاتا ہے۔
حیض کے متعلق فسادات مثلاً عسرت الطمث۔ کثرت الطمث اور جربان ظاہر ہو جاتی ہیں مقعد یا فرج
کے اندر ایک انگشت پہنچانے سے اور دوسری شکم پر کھنے سے اور دوری کی ورم اور درناک حالت
کو آسانی معلوم کر سکتے ہیں۔ کرائیک اور فورائی ٹس میں یہ تمام علامات خفیف ہوتی ہیں چلنو پھرنے اور
استغفار غ میں بھی درد ہوتا ہے۔ اگر دونو انیشین میں ورم ہو تو عورت بانجھ ہو جاتی ہے۔

یہ مرض اسباب ذیل سے پیدا ہوتا ہے۔ کثرت جلع۔ کثرت شرب۔ سوزاک۔ زنا کاری۔ مانہ حمل۔ زنا۔
ادھوری جلع رحم یا اسکی گرد کی ساختوں کا ورم جلق۔ رحم کے اندر ماس و تد داخل کرنا ایام حیض
میں سردی لگنا۔

قدم کا نتیجہ۔ یہ ہوتا ہے کہ اصلی ساختیں خراب ہو کر ریشہ زائد بن جاتے ہیں یا بھڑا یا است
بے یاکل اور دوری ٹکڑا خون یا لمبیار طوبوں کی قیلی بن جاتی ہے۔

چھادم اورری کی رسولیاں۔ ان کی علامات حسب ذیل ہوتی ہیں۔ کینج ران میل و بھار
شروع ہو کر وسطی خط کی طرف تدریجاً بڑھتا جاتا ہے جو رسولی کی طرح دوسری ساختوں سے
علیحدہ معلوم ہوتا ہے۔ شکم کی جلد ساتھ کے ساتھ تنی اور پتلی ہوتی جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ شکم کی وریاں
پھول جاتی اور سفید دھاریاں نظر آنے لگتی ہیں۔ اوجھار و الجھ میں فلک الیشن معلوم ہوتا ہے
اگر اوکھڑا ایک طرف پھیلے ہو تو دوسری طرف انگیوں کے ساتھ گراوین تو نچے ہی ہے ایک گہری

چھال معلوم ہوتی ہے۔ ٹھوکنے سے تمام اوجھار ٹھوس معلوم ہوتا اور اسکا مقام اٹھنے بیٹھنے سے نہیں بدلتا۔ شکم کے باقی حصہ میں آواز ٹھوکنے سے صاف معلوم ہوتی ہے۔ چہرہ کی خاص کیفیت ہو جاتی ہے جسکو امراض اور وری کا چہرہ کہتے ہیں۔ مگر عام صحت اور طاقت جلدی زائل نہیں ہوتی۔ حیض کم ہو جاتا ہے کبھی کبھی اسکی کثرت اور احتباس بھی ہو جاتے ہیں۔ عموماً کوئی مرض قلب یا گردہ یا جگر میں موجود نہیں ہوتا۔ جس سے یہ خیال کیا جاسکے کہ مراق البطن میں پانی بڑ گیا۔ اطران میں بھی کچھ تہج یا سور القینہ نہیں ہوتا۔ حل کی طرح یہ اوجھار نہ تو وسطی ہوتا ہے اور نہ ماہ ماہ ایک خاص رفتار سے بڑھتا ہے۔ ہستقا، مراق البطن کی طرح ناف باہر کو نہیں ابھرتی حل کا ذب کی طرح کلور افارم سنگھانے سے یہ اوجھار غائب نہیں ہوتا۔ مفصلہ ذیل امراض میں بعض اوقات اشتباہ ہو سکتا ہے غیر معمولی فربہ، اجتماع براز، احتباس البول ہو کر شانہ کا تنجنا، تہج معدہ، رحم کے اندر خون یا پپ جمع ہو جانا، رحم کی رسولیاں، ہانڈر و سلیکٹر، استسقا، طحال، یا جگر کا بڑھ جانا، شکم کی رسولیاں، شکم کے غدود کا بڑھ جانا، حل کا ذب رحم سے باہر حل بھج جانا، پیڈوکا پھوڑا، ہانڈریناس جو علامات اور پر بیان کی گئی، انپر مجموعی نظر ڈالنے سے وری کی آسانی تشخیص ہو سکتی ہے۔ نیز دیکھو بیان اسالی ٹیز کا۔

اور وری کی رسولیاں تین قسم کی ہوتی ہیں اول وہ رسولیاں جنہیں بانی بڑ جاتا ہے۔ اکلوسٹ کہتے ہیں بعض اوقات اسیں پرسٹ ایک خانہ والی ہوتی ہے تب اسکو یونی لاکورسٹ کہتے ہیں بعض اوقات اسیں بہت سی خانہ ہوتے ہیں تب اسکو ملٹی لاکورسٹ کہتے ہیں۔ دوام میلگٹ یعنی انداز ساں رسولیاں جو سخت ناہموار اور دردناک ہوتی اور ہمیشہ بڑھتی رہتی ہیں سیومہ متفرق قسم کی رسولیاں یعنی ساوی رسولیاں یا مرکب غیر جو تک ان ہر چار اقسام کے علاج میں بہت اختلاف ہو اسکے ذیل میں تشخیصی علامات نقشہ وار دکھائی جاتی ہیں۔

دایونی لاکورسٹ سطح ہموار۔ فلکچریشن صاف طور پر ایک حصہ سود و سر حصہ تک ترقی تند بیچ۔ دوسری ساختوں سے عموماً علیحدہ ہوتی ہے۔ عام طاقت و صحت میں جلدی زوال نہیں آتا۔ اگر ٹکلی داخل کجاوہ تو کل ایک ہی دفعہ نکلی ہو کر بیٹھ جاتی اور عموماً پھر بھر جاتی ہے۔

(۲)۔ ملٹی لاکورسٹ سطح ناہموار۔ الگ الگ حصہ معلوم ہوتے ہیں فلکچریشن علیحدہ علیحدہ محسوس ہوتی ہے۔ ترقی جلدی کرتی دوسری ساختوں کے ساتھ عموماً پیوستہ ہوتی عام طاقت و صحت میں جلدی زوال آجاتا ہے۔ اگر ٹکلی داخل کجاوہ تو کل ایک دفعہ میں نکلی نہیں ہوتی بلکہ جن حصہ میں ٹکلی داخل ہوئی ہے وہی حصہ خالی ہوتا ہے باقی بے دست و پیر رہتے ہیں۔

(۳)۔ میلگٹ رسولیاں۔ سطح ناہموار سخت ہوتی ترقی بہت جلدی کرتی، قریب گرد و بڑھ جاتا عام طاقت و صحت میں جلدی زوال اگر سر بیضہ لاغرا و نفیس ہو جاتی ہے ہمیشہ درد رہتا ہے جو رات کو زیادہ شدید

ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی استسقا راق البطن بھی ساتھ ہو جاتا ہے۔ نکلنے والے کر کے کچھ پانی نہیں نکلتا۔ یہ رسولی وغیرہ عموماً چالیس سال کی عمر کے بعد ظاہر ہوتی ہے۔

(۴) ساوی یا مرکب سولیاں۔ ان میں علامات ملی جلی ہوتی ہیں۔

سٹ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ کبھی تو اندر ہی اندر پھٹ کر جذب ہو جاتی ہے کبھی چوڑا بنا کر متعدد یا فرق یا مثانہ کے رہتا اسکی پیپہتی رہتی ہے۔ کبھی اسکی جڑیں بڑا کر خون بند ہو جاتا ہے تب اس میں اجمل خون ہو جاتا یا اسکی اندر خون خارج ہو کر جمع ہو جاتا ہے۔ کہو، ایسا ہوتا ہے کہ پہلی جڑ ٹوٹ جاتی ہے مگر اور حصوں میں دوسری ساختوں کے ساتھ ملکر پوش پاتی رہتی ہے کبھی دونوں اور یوں میں سٹ ہو کر آپس میں جاتی اور پھر درمیانی دیواروں میں سوراخ ہو کر ایک بن جاتی ہیں۔

علامہ (۱) ہرنی یعنی فتق الانثیین۔

(۲) پریسپس یعنی اورری کا اپنی جگہ سے گر پڑنا۔

ان ہر دو امراض کا علاج یہ ہے کہ فرق کے اندر گرم پانی کی پچکاریاں کریں جلع سے مریضہ کو منع کروں اور نرم ہوائی یا رنگ یا مانج پیسری لگاویں مریضہ کی چار پائی کو پاؤں کی طرف سے سر کی نسبت قریباً چھینچ اوپکار کھیں۔

اگر اورری اپنی اصل جگہ سے اٹھ کر رحم اور متعدد کے درمیان دھکاس پاؤں میں کر پڑے تو فرق کی دیوار میں تنگاف دیکھو اور دم فار سپس کے ذریعہ کھینچ سکتے ہیں۔

(۳) اووے رائیش یعنی ورم الانثیین اس مرض کو اووے رائیش بھی کہتے ہیں مریضہ کو آرام سے لیٹے رہنے کی سخت تاکید کریں۔ پاؤں کی طرف سے چار پائی کو توڑنا چھینچ اوپکار کھیں۔ اندام نہانی یا دبر پر جو تنگیں لگائیں چڈے میں رانی کا پتھر لگانا یا چالہ اٹھانا مفید ہیں مفصلہ ذیل نسخہ کا طلا چڈوں میں کرنا درد کو تخفیف دیتا اور شروع درجہ میں ورم کو آرام دیکھتا ہے۔ کھورافہ دم ایکل ولس لیمنت بیلادونا پلادونس روی مصطی ہو ڈرام۔ کافوریم ڈرام۔ ریختی فائیڈ سپرٹ ایکل ولس ریختی کونائیٹ ایکل ولس۔

اگر مرض آتشک کا شبہ ہو تو مرکبات پارہ۔ آبودانڈ آف پوناسیم د اعلیٰ طور پر استعمال کرنے چاہئیں۔ برصائد زخمی تخفیف درد اور سوجش کو لیے مفید ہیں جہاں نذایر سے صورت آرام پیدا نہ ہو تو اوورٹھی جو کا طریق حسب ذیل ہو عمل میں لاسکتے ہیں۔ اس عمل سے دو گھنٹہ پیشتر مریضہ کی اسکا کو ذریعہ حقہ صاف کریں۔ ڈیڑھ ارب لپٹا تنگاف دیں تب ایک گھنٹہ زخم کے اندر داخل کر کے زخم قندس معلوم کر کے قلوین ٹیوب۔ براؤن لگتے اور اورری کو معلوم کریں مگر قلوین ٹیوب کسی قسم کی سطوت سے پر مصلوم ہو تو ذریعہ اسپرٹ تمام پانی نکال لیں۔ اگر خون یا سطوت خارج ہو کر جہاں میں تو سینچوں کو ساتھ خوب صاف اور خشک کر دینی چاہئیں۔ اس کے بعد سپس کے ساتھ اورری کو کچھ کر زخم تک سینچیں اور موائون زخم کے

کناروں کو ساتھ ہی ساتھ خوب دباتا ہے۔ فلوپین ٹیوب کو اچھی طرح معلوم کر کے ایک دوسرے لگیچر کا حلقہ براؤنگنٹ کو وسط میں سو گزاریں مگر یہ خیال رکھیں کہ کوئی شریان یا ورید میں چھید نہ ہو جائے پھر اس حلقہ کو واپس رحم اندر سے نکال لیں۔ اس طرح کر کے دو وری اور فلوپین ٹیوب و حلقوں کے اندر آجائیں گے۔ تب ایک سر واپس کردہ حلقہ کے اندر گزار کر ہر دوسروں کو خوب زور سے کھینچیں اور گرہ دیکر قطع کر دیں۔

آؤ فوکیٹی کی ضرورت مفصلہ ذیل حالتوں میں پڑتی ہے۔

(۱) رحم کے مائیوٹے ٹاجن سے ہلاکت کا اندیشہ ہو۔

(۲) امراض انٹین جکی وجہ سے زندگی و بال ہے یا ہلاکت کا اندیشہ ہو۔

(۳) فلوپین ٹیوب کا امراض جو علاج پذیر نہ ہو سکیں۔

(۴) عسرت الطمث کے لاعلاج امراض۔

(۵) جبکہ رحم کی رسیوں کی وجہ سے انٹین کے قطع کرنے کی ضرورت پڑے تو ہر دو انٹین قطع کرنے چاہئیں عسرت الطمث دائمی کی وجہ سے جبکہ یہ مد نظر ہو کہ پیشیل زوالت شروع ہو جاوے تب بھی ہر دو انٹین نکالنے ضروری ہوتے ہیں۔

(۵) اور سی کی سسٹم یعنی تھیلی آریولیال کو علاج کے مہول حسب ذیل ہیں۔

اول مرضیہ کی صحت اور طاقت کو ترقی دینا اور قائم رکھنا۔

دوم۔ ٹپ کر کے پانی نکالنا تاکہ رسولی کا حجم کم ہو کر اسکی کالیف میں کمی ہو جائے۔

سوم۔ جراحی عمل سے رسولی کا نکال دینا۔

سادہ اور یکجہانہ رسولیوں میں پانی نکال دینا چند طرح سے سفید ثابت ہوتا ہے

اول اس طرح کہ اسکا حجم کم اور نشانہ اسکا وسیعہ وغیرہ پر دباؤ کم ہو کر اسکی متعلقہ علامات مثلاً عسر البول قبض اہمال وکشی وغیرہ میں تخفیف ہو جاتی ہے۔

دوم بعض اوقات ایک دودفعہ پانی نکالنے کے بعد سسٹ کی دیواریں ہیوت ہو کر اسکو بند کر دیتی ہیں۔

مگر کبھی چند خانہ والی سسٹوں میں بھی کالنا کچھ ضرر کی بات نہیں۔ بلکہ اس سے زیادہ پانی کا بوجھ پریشاب کا امیون اور مرضیہ کی کالیف کم ہو کر اسکی صحت اور دیوانو کے قابل ہو سکتی ہے

ایک یا دو دفعہ ٹپ کرنے سے کسی قسم کا ضرر نہیں ہوتا بشرطیکہ انٹی سپیکٹامیر کا مل طور پر کیریائیل اور رسولی پانی یا ہوا انکم کے اندر داخل نہ ہونے پائے مضر الذکر احتیاط پس منحل صاحب کرائفین ٹروکار میں بخوبی ہو سکتی ہیں۔

آدوے ریائومی دو طریق سے کی جاتی ہیں (۱) اپیری ٹونیم کے اندر سے (۲) پیری ٹونیم کے باہر سے۔

پیری ٹونیم کی اندرونی جانب سوا دو ریائومی کرنے کے لئے مفصلہ ذیل سوال و تدابیر ہیں۔

(۱) اوپریشن سے ایک وزمیشتر رضیہ کو کیسٹرائل میں تاکہ اعضاء صاف ہو جائیں اور صبح کے وقت شروع عمل سے دو تین گھنٹہ پیشتر حقہ کریں تاکہ رودہ بخوبی صاف ہو جائے۔ ہر وائڈ ناؤ رافین کا استعمال مابعد کے در و دیکھا لیف کو کم کھٹا کر (۲) رضیہ کے تمام کیم کو کال طور پر صاف اور اینٹی سپیک کریں۔ عمل شروع کرنے سے پیشتر تمام ادوات کو ایک ترتیب سے لگالیں۔ اور نیز معاونین کو ان کے متعلقہ فرایض بخوبی سمجھا دیں۔ تاکہ ان کا عمل میں گھبراہٹ اور دقت واقع نہ ہو۔ (۳) پلنے اور معاونین کے ہاتھوں تمام ادوات اور سچ وغیرہ کو کال طور پر اینٹی سپیک کریں۔

(۴) ۴ بجے سے ۶ بجے تک لمبا تنگاف وسطی خط میں ناف سے شروع کر کے ایسا دیں کہ ٹرین میں سوس نیشیا تک پہنچے۔

(۵) پیری ٹونیم کھولنے سے پیشتر تمام خون سپسر ویز فار سپس کے ذریعہ بند کر دیں۔

(۶) بعد ازاں ڈبل تریک کو ذریعہ پیری ٹونیم کو اتھا کر چاقو کے ساتھ اس میں تنگاف دیں۔

(۷) اگر پیری ٹونیم کے اندر پانی معلوم ہو تو رضیہ کو ایک پہلو پر اٹکا کر ایسا انتظام کریں کہ تمام پانی وائر پر دف چادر اوپر سے گذرنا ہو ایک جگہ بالشی وغیرہ میں جو میر کے قریب رکھی ہو پہنچے۔

(۸) جب سٹ کو اچھی طرح سے معلوم کر کے اس کے تمام وصل کال طور پر معلوم کریں۔

(۹) ٹروکار۔ اندر داخل کر کے سٹ پانی نکالیں۔

(۱۰) سٹ کو کھنچ کر باہر نکالیں اور جب قدر اور وصل ہوں اٹکھی توڑ دیں۔

(۱۱) جیسا کہ سٹ باہر آتی جائے معادن اس کو پلنے ہاتھوں پر سہا رنا ہے تاکہ اس کے بوجھ سے زیادہ کھینچ نہ پڑے۔

(۱۲) جب سٹ باہر آجائے تو اوکی جڑ کو اچھی طرح سے معلوم کر کے قطع کریں۔

(۱۳) تمام خون اور پانی کو پیچوں کے ذریعہ کال طور پر خشک اور صاف کر دیں۔

(۱۴) رخم کو سیتے وقت یہ احتیاط رکھیں کہ پیری ٹونیم کے کنارے جبک ٹیمیک بالمقابل ہو جائیں۔

دوسرا طریقہ اوپر دیا ٹومی کا اکثر اپیری ٹونیل ہے چونکہ یہ طریق روز بروز متروک ہوتا جاتا ہے اس لیے اس کی تشریح

کرنی غیر ضروری معلوم ہوتی ہے صرف اس قدر بیان کر دینا کافی ہے کہ اس میں رسولی کی جڑ بذریعہ کلیپ یا کلیپ کا ٹری

قطع کی جاتی ہے۔

اٹالے عمل میں خواہ کسی طریق سے ہو مزید احتیاط کے لیے ایسی سپیک لوشن کا ہایت باریک خواہ برابر

جاری رکھنا چاہیئے۔ تاکہ رخم کی تمام ہوا اینٹی سپیک رہی۔

اوپر پری ٹنگ لوشن **Evaporating Lotions** تبخیر ہو کر اڑ جائے والے لوشنز

جس مقام پر یہ لوشن لگائے جائیں اس پر فوراً تبخیر ہو کر اڑ کر ٹھنک پیدا کرنے لگیں کو سیکر خون کم دیتے اور ہلکے

کا حصہ کم یا معدوم کر دیتے ہیں ان کے بڑے اجزاء تبخیر ہو جاتے ہیں۔ کافور، نوٹا اور سرکہ دیاں ہوتے ہیں

ایلیج اسود۔ ایلیج سیاہ۔ ایلیج زنگی۔ زنگی ہٹر۔ سہل۔ بھٹی خون۔ معوی حواس۔ وائڈ۔ وائڈ۔ وائڈ۔

خبر ۲ ماشہ سے ۶ ماشہ تک۔

البلج صفر - ہلید زرد، مقوی دماغ و معدہ - مفتوحہ - مہل - مقوی حواس و ذہن - نافع خفقان و عتقان و سمیات و سد و استتقا و خمر ۵ پے ماشہ سے تولہ تک -

البلج کابل - ہلید کالا - انبیاثر - مہل - مد مقوی حواس - نافع و وار د سد و لیان و الیخویا و لقوہ خمر ۱۰ پے ماشہ سے تولہ تک -

ایتھر سلفیورک ایتھیر **Ether sulphuric** اس میں ۱۲ فیصدی خالص ایتھیر ہوتا ہے۔ ۵۰ درجہ فارنہائٹ سے کم حرارت پر خود بخود جل جھٹکا ہے -

ایتھیر پور **Ether Pure** یہ ۹۶ درجہ کی حرارت پر جل جھٹکا ہی سپرٹل ایتھیرس - اس میں ایتھیر ایک حصہ اور یکٹی فائیڈ سپرٹ ۲ حصہ ہوتی ہے سپرٹل ایتھیرس کو - اسکا دوسرا نام ہاف مینس آٹوٹائین بھی ہے خارجی طور پر لگانے سے ایتھیرس جلدی اثر کر سخت سردی اور بے حسی پیدا کر دیتا ہے خفیف دستکاریوں میں اس سے مقامی بے حسی پیدا کی جاتی ہے - اور اعصابی دردوں کو بھی اس کے لگانے سے فوراً تخفیف ہو سکتی ہے اگر اس کے بخارات بند رکھی جائیں تو سوزش کر کے چھالے پیدا کر دیتا ہے

اسکا ذائقہ نہایت خراب تیز اور جلانے والا ہے فوراً منہ کے اندر اپنی تیزی سے تھوک بکھرت پیدا کرتا - معدہ میں پہنچتو ہی جلن اور تیزی کر کے خون کی رگوں کو لکھی ریشوں اور اعصاب کو تحریک دیتا اور ریاہ کو خوب خاموش کرتا ہے اس طرح نہایت قوی مخرج ریاہ ہے ساتھ ہی ریفلیکس طور پر امعاء و ملتہا کو تحریک دیتا ہے گویا کہ نہایت زود اثر عام محرک بھی ہے - کلورافارم کی طرح نہایت جلدی سے خون میں جذب ہو کر اپنی خاطر تاثیرات یعنی عام تحریک اور مخرج پیدا کرتا ہے - غشی - اجمائیا ریپکیٹورس منقاہت فوہتہا و صرع و ہسٹیریا - شخی کھانسی اور دمہ میں مفید ہے - کلورافارم کی طرح خاموش ہوتا ہوا قریباً ہر رطوبت جسمی کو زیادہ خارج کرتا ہے - اور صفراوی کنکریوں کی تحلیل میں مدد دیتا ہے - کلورافارم کی طرح سنگھانے سے عام ہیپوٹھی پیدا کرتا ہے - مقابلہ کے لیے دیکھو بیان کلورافارم کا خمر ایتھیر ۱۰ ہونڈ سے - ۳ ہونڈ تک بار بار کی خوراک میں ۴ ہونڈ سے ۶ ہونڈ تک ایک خوراک میں -

ایسی ٹنگ ایتھیر ۶ ہونڈ سے ۹ ہونڈ تک ایک خوراک میں - ۲ ہونڈ سے ۴ ہونڈ تک بار بار کی خوراک میں
ایٹریٹریا آف وچائنا - **Atresia of Vagina**
ایٹریٹریا آف ولوا - **Atresia of Vulva**
ایٹریٹریا آف یوٹرس - **Atresia of Uterus**
وچائنا - تھیکہ کا پیدائشی یا اتفاقی طور پر بند ہونا - ایٹریٹریا آف ولوا - اندام نہانی کا پیدائشی یا اتفاقی سبب سے بند ہونا - ایٹریٹریا آف یوٹرس - فم و جم کا پیدائشی یا اتفاقی سبب سے بند ہونا -

اتفاقی ایٹریٹریا کا سبب عموماً یہ ہوتا ہے کہ پیدائش کے بعد یا تیزابوں وغیرہ سے غم کر کے انفصال

کے وقت سطح متصلہ ہو سکتا ہو جاتی ہیں۔

اسکا علاج حسب مقام و کیفیت جس بر وقتہ تجویز ہونا چاہیے جراحی عمل ایسا امراض میں دو غرض سے کیا جاتا ہے
 اول یہ کہ بند شدہ حیض کو واسطے کیا جائے دوم یہ کہ صورت جملہ عیدہ ہو سکے۔ ایڈولنی ڈین کی بستہ کی سی میں دو
 قسم کے خطر ہیں اول یہ کہ ہوا داخل ہو کر بند شدہ خون و فضلات کو متعفن کر کے بخار متعفن پیدا کرے دوم یہ کہ
 وقتاً رحم میں انقباضی حرکت پیدا ہو کر خون اور فضلات کو قلو بہن ٹیوب میں پہنچائے اسلئے مریضہ کی باہرئی
 کے واسطے دو احتیاط نہایت ضروری ہیں اول کہ تمام اوزانات اور اپنی معاونین کے ہاتھوں کو کامل طور
 پر اینٹی سپٹک کیا جاوے۔ دوم یہ کہ خون کو کمال تدبیر کے ساتھ نکالا جائے بہتر یہ ہے کہ پہلی دفعہ میں
 محض تہائی کے قریب خون در طوبت خارج کیجائے اور ایک ایک ہفتہ کے بعد وہی عمل کیا جائے حتیٰ کہ رحم
 کامل طور پر صاف ہو جائے جبکہ اندام نہانی یا تہیگاہ پیدائشی طور پر بالکل غائب ہو تو اسلئے اور پیش طریق خیال
 مریضہ کو کھلوا فارم سے بہوش کر کے وضع لہذا ٹومی پر لٹا دیں اور مثانہ کے اندر کٹیجیہ پہنچا کر مقعد کے اندر انگشت
 داخل کریں دبر اور پجری پیشاب کو درمیان ایک چھوٹا سا شگاف دیکر ناخن اور دستہ چاقو کے ساتھ کھرجے ہوئے
 بند شدہ خون یا رطوبت کو ابھارتک پہنچیں ٹروکار اور کینولا اس ابھاریں داخل کر کے کینولا کے راستہ
 ڈائریکٹر اندر پہنچاویں اور کینولا واپس نکال لیں پھر ڈائریکٹر کے ساتھ ساتھ چاقو داخل کر کے شگاف کو فراخ
 کریں بعد میں ڈریج ٹیوب داخل کر کے حسب قاعدہ اینٹی سپٹک ڈرینگ کرتے ہیں جبکہ بائین جھلی کی وجہ
 سے تہیگاہ بند ہو کر جملہ و اخراج حیض نامکن ہو جاوے تو اسکا عمل صرف اس قدر ہے کہ جھلی میں شگاف
 دیکر ڈریج ٹیوب دو تین روز اندر رکھیں تاکہ پھر وہ جھلی بند نہ ہو سکے اور اینٹی سپٹک کوشنوں کے
 ساتھ تھوکر ڈریس کرتے رہیں۔

بہت عمدہ مفوی طب ہے۔
 دل کی حرکات کو قوی الطاف
 قلیل التعداد اور باقاعدہ کرتا

Adonis Vernalis
 Adonidoquercitrin
 Adonidin

ایڈولنی ڈین
 ایڈولنی ڈین
 ایڈولنی ڈین

اور آرٹھرٹک ٹین کو زیادہ۔ مدد بھی ہے۔ دبی ٹیس پر اسکویر ترجیح ہے کہ اسکی طرح جسم میں جمع ہوتا نہیں ہوتا۔ آسانی
 ہضم ہو جاتا اور اثر بھی جلدی کرتا ہے۔ مائیکرل رگجی ٹیشن۔ بیقاعدگی اور وقفہ حرکات قلب۔ ڈائی ڈیٹین
 استقبالیہ ناف ہے خیم ایڈولنی ڈین پہ گرن ہو کر گرن تک۔ برگل ورتشاخ کاسفوف سے ۶ گرن تک۔
 - فلوئڈ اکسرکٹ ۲ سے ۱۰ پونڈ تک ٹنگچر اسے ۳ پونڈ تک۔ الفیوزن پہ اونس ہو ایک اونس تک

Adhesive Plaster
 زخموں کے کناروں کو ملائے اور اونکو گرد سے محفوظ رکھنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ پلیوسپی۔ آرکائیٹس۔ ایڈیما
 آفنی پری پیوس۔ درم مفاصل وغیرہ میں بغرض سہائے کیساں باو اور برف حرکت اسکی بنیاں لگانی نہایت فائیدہ

کرتی ہیں تفصیل کے لئے ان امراض کا بیان دیکھو۔

ایڈیپس لینئی - Adeps Lanae دول فیٹ پشتم کی چربی۔ انگین کا بیان دیکھو۔

ایڈیما - Oedema ڈراپسی کا بیان دیکھو۔

ایڈریسٹوز نیر - اس مرض میں جلد کی رنگت زردی یا سبزی بایل یا تلخے یا دھوئیں کے مشابہ ہو جاتی ہے۔ بدن ظاہر الاغر تو نہیں ہوتا مگر تمام عضلات ڈھیلی اور سست پڑ جاتے ہیں طبیعت نڈھال رہتی اور کسی کام کو دل نہیں چاہتا ہے۔ معدہ کے مقام پر خفیف درد اور جلن کا احساس رہتا ہے مریض تدریج زائل ہوتا جاتا اور آخر کار ملاک جاتا ہے یہ مرض عموماً برسوں رہتا ہے۔ اسکی اصل وجہ کے بارے میں حکما کا اتفاق نہیں ہے۔ بعض کی یہ رائے ہے کہ یہ مرض سپرائیل باڈیز کے فسادات مثل ورم۔ رسولی۔ پھوڑا۔ اس سرطان۔ نیرال البیومی ٹائڈوزن وغیرہ سے پیدا ہوتا ہے بعض کی یہ رائے ہے کہ سپرائیل باڈیز کے قریب جوا عصاب ہیں مثلاً سیمی لوزر گینگ لیں اور سور لیکیس اور پندو باؤ پور پنخو یا ان میں ورم مچ جانے سے ظاہر ہوتا ہے چونکہ یہ نازک اعصاب قریب ہیں اسلئے سپرائیل باڈیز کے فسادات کے ساتھ ان میں بھی نقصان واقع ہو جاتا ہے۔

علاج اس مرض میں سپرائیل کیسپولز یا شکم کے سپے خنیک گنیگیا اور اعصاب کی ساخت میں فساد واقع ہو کر سخت ضعف و رقت و رقت خون پیدا ہو جاتے۔ اکثر قے اور اسہال خود بخود لاحق ہوتے اور جلد آنکھوں سطح تھیکا ہ رتان و دہن کا رنگ زردی یا سبزی بایل ہو جاتا ہے۔ دراصل اس مرض کا کوئی علاج ابتک دریافت نہیں ہوا محض علامات موجودہ و حالت مریض کے مطابق علاج کیا جاتا ہے۔ ضعف اور انیمیک کے واسطے آرٹک اور سٹرکینا دیتے ہیں۔ خراش معدہ تبوع اور غشیان کے لئے بسمتھ آگسی لیٹ آف سیریم ہائیڈرو سائیکل ایڈ کرے روٹ ٹایم وائر سوڈا وائر۔ برف وغیرہ مفید ہیں۔

اسہال کا علاج بسمتھ۔ کپٹھ کو۔ چاک اور کائینو سے کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر فیکنی صاحب اس مرض میں آیوڈین کا داخلی استعمال کیا۔ مگر یہ معلوم نہیں کہ اس سے کوئی عمدہ نتائج پیدا ہوئے یا نہیں عمدہ غذاؤں و مقویات فولاد آرٹک و سٹرکینا اور علاج علامات سے مریض کی زندگی کچھ زیادہ کر سکتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ مرض آخر کار مہلک ہی ثابت ہوتا ہے۔

ایڈیو سکرسی - عجائبات مزاج و طبع کو ایڈیو سکرسی کہتے ہیں۔ اسکا کوئی خاص سبب بیرونی و اندرونی

معلوم نہیں ہو سکتا۔ بعض کی یہ رائے ہے کہ اسکا تعلق دماغ اور اعصاب سے ہے بعض میں پیدائشی اور بعض میں خود حاصل کردہ بعض میں عارضی اور بعض میں دائمی ہوتا ہے مریض ہستہ۔ دیوانگی اور ایام حمل میں کی عام مثالیں دیکھی جاتی ہے کہ مریض کی طبیعت فضول چیزوں کی طرف راغب و معمولی اشیاء کی طرف متغیر ہو جاتی ہے اسکے عجائبات حواس ظاہری و باطنی کے متعلق بہت مشاہدہ میں آتے ہیں مثلاً بعض اشخاص خون نکلتا دیکھ کر اسکی برداشت نہیں کر سکتے بعض کو مشک۔ گلاب۔ پیپریش کی خوشبو سے غشی کی حالت ہو جاتی ہے بعضوں کو خاص آواز سے نفرت

ہوتی ہے جو اوروں کے نزدیک خوشگوار ہے۔ غذا اور ادویہ کے متعلق بھی اسکے عجائبات بہت دیکھنے میں آتے ہیں۔ مثلاً بعض اشخاص کو دودھ فضل و بعض کو مسہل کا کام دیتا ہے۔ چائے جو عام کے لیے محرک اور قدرے قابض ہے بعض کے لیے مسہل ہے۔ افیون طبی خوراک میں بھی بعض اشخاص میں نہر کی علامات پیدا کر دیتی ہے۔ انڈا اچھلی۔ گوشت۔ کاڈو۔ رائیل بعض اشخاص کو سخت نقصان کرتے ہیں۔ بعض اوقات مریض کا مضر خیال ہی خیال ہوتا ہے کہ فلاح شے اسکو سخت نقصان کرتی ہے اور اصل اسکی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ غرض کہ طبیب کر لیے یہ مسئلہ نہایت حیرت انگیز ہے اور بعض اوقات اسکو سخت ابتلا اور مشکلات میں ڈالتا ہے۔

ایڈیوسنی Adocy. فطری جنون۔ اسکا علاج جسمانی۔ اخلاقی۔ دماغی اور طبی تمام اسی سے کرنا چاہیے۔

اول جسمانی تدابیر۔ مریض کو عمدہ فضائے اور خوشباش دوستوں کی صحبت میں رکھنا۔ عمدہ غذا میں کھلانا۔ کمزور عضلات کو مائل اور حرکت سے طاقت دینا۔ جتنی بآسانی ممکن ہو ورزش کرانا۔ ہمیشہ نیک گرم پانی سے خوب مکرخل دینا۔

دوہرا اخلاقی تدابیر۔ مریض پر کبھی سختی نہ کرنا۔ ہمیشہ نہایت نرمی اور آہستگی سے اسکو محبت و مروت اور سلوک کر سبق دینا۔ لوگوں کے حقوق اسی پر اور اسکے لوگوں پر جیسا کہ میں اسکو سمجھانے میں ہوں۔

سومہ۔ دماغی تدابیر۔ ہمیشہ نئی نئی اشیاء اسکو دکھا کر انکی رنگت۔ پور۔ قطع و وضع مقدار۔ اور قانینت پھر اس سے دریافت کرنا۔ ہر ایک چیز جو دیکھنے سننے یا چھونے میں آئے اسکی بابت اس سے فوراً بطور دل کا تذکرہ کرنا۔ اگر زبان گنگ یا ناقص ہو تو الفاظ ادا کرنے کی ہمیشہ اسکو درمیش کرانا۔

خیالی نقشوں اور زبانی کہاوتوں کی بجائے ہمیشہ مشاہدہ کی چیزوں کی بابت تذکرہ رکھنا۔

چھادہ۔ طبی تدابیر۔ جو حالت و علامات ماضیہ و ماضیہ خناع۔ اعصاب کے متعلق پیدا ہوں۔ انکا علاج کرنا۔ مایکرو کیفک یعنی چھوٹے سرد والی ایڈیٹ میں کھوپری کے ٹھوڑے کات کرکھانا۔ انکو تھوڑا کیا گیا تو لیکن یہ تدابیر ابھی تک قابل اعتبار ثابت نہیں ہوئی۔ کرٹھی تک ایڈیوسنی میں تھارائنڈ غدد و عروق علاج کرنا نہایت مفیدی طریقہ ثابت ہوئے۔ ۶-۷ گرین کی خوراک میں کچا تھارائنڈ غدد و ہیمید کا ہنہ میں دودھ کھلایا اور نہایت کامیابی حاصل ہوئی۔ اسکی جلدی ایچکاری اور ٹرنسپلانٹیشن بھی کامیاب طریقہ ثابت ہوئے۔ خواہ کسی طریق پر تھارائنڈ سے علاج کیا جاوے۔ کرٹھی تک ایڈیوسنی میں اسکی عجیب عجیب تاثیرات ثابت ہوتی ہیں۔ قدرے جاتا پڑا ہوا بیڈ میں نہ خوش وضع ہو جاتا ہے ڈول شکم سینہ۔ ناگیں اور ہاتھ چھنے لگتے سنتی اور بیوی کی بجائے جستی اور سچہ کے آثار نمایاں ہوتے اور تمام جسمانی اور دماغی قواؤں ترقی پکڑتے ہیں۔

ایرار ویاپا وود Araroba powder گولپاؤڈ کر اسو روین کر اسو روین کا بیان دیکھو۔
ایروروت Arrowroot غذا کا بیان دیکھو۔

ایر سٹال **Aristol** اسکا دوسرا نام آیوڈائیڈ آف تھائی مال ہے۔ آیوڈو فارم اور آیوڈول کی طرح اینٹی سپٹک ہے۔ لیکن اس میں کوئی پروٹین نہیں ہوتی اور نیز مقامی استعمال میں جذب ہو کر کوئی نقصان بھی نہیں کرتا۔ آتشک کی زخموں کا بہت جلد اس سے اندمال ہوتا ہے۔ جلدی امراض مثلاً سوراخ و سس خارش بہر سوزہ اگر کیا۔ لوبیر وغیرہ میں گہا پاؤڈر کی طرح مفید ہے۔ اور نیز میں اس کے استعمال سے بروکم زخموں کا اندمال جلد اور چھٹکوں کا بننا بند ہو جاتا ہے۔

ایرویانسن **Arrow poison** سر وفتنص کا بیان دیکھو۔
ایرومٹک بٹرس **Aromatic Bitters** یعنی وہ ادویہ جو تلخ اور خوشبودار ہوتی ہیں مثلاً کسر بلا گل بابونہ جنیشین چرائیا۔ لیو پلس۔ لیموں۔ رنگترہ۔ کینلا۔ کیسیریا۔
ایرومٹکس **Aromatics** خوشبودار ادویہ مثلاً پیرسٹ۔ پودینہ۔ لوگ اجوان زیرہ۔ الاچی خور و دکھان۔ وال چینی۔ وحینا۔ کیچوٹ آئل۔ ایو کے لپس آئل۔ سولف۔ لیوینڈر۔ سینبل۔ کلاب زنجبیل۔ جافیل۔ سو یا شک۔ سنبل۔

ایری تھیر افلیم کالی نیر **Erythrophleum Guinese** ساسی مارک کا بیان
ایری تھیرما **Erythema** سرخی جلد۔ اس سے مراد جلد کی وہ سوزش ہے جو سطح پر ہو سکے اسباب نہایت مختلف ہوتے ہیں۔ پس اس کے علاج میں سب سے مقدم یہ امر ہے کہ اصل سبب دریافت کر کے اسکا دفعہ کریں مثلاً اگر برائی برصی یا سوزش معدہ موجود ہوں تو اسکا مناسب علاج کریں۔ اگر جھلی آیوڈا اڈا پوٹاسیم کباب چینی کو پاؤڈر اور پینٹائن وغیرہ کے کھانے سے ایری تھیرما ہوا ہو تو اُسے پرہیز کرنا کافی علاج ہے اگر کوئی خاص سبب دریافت نہ ہو سکے تو ایک ماٹ وغیرہ کا مہل دیکھ لھاری اور تلخ ادویہ استعمال کریں۔
فنسجی آت (۱) سوڈا بائی کاربوناٹس ۳ گرین۔ بسمتھ کاربوناٹس ۱۰ گرین۔ گلیسرین ۲ ڈرام۔ انفیوزن چرائیا۔
اؤنس الی تین خوراک روزانہ (۲) سوڈا بائی کاربوناٹس ۴ اونس۔ اجوان ۴ ڈرام۔ آرٹک ایک گرین۔
ان سب کو ملا کر سفوف تیار کریں۔ خود لاک ۵ گرین تین دفعہ روزانہ جبکہ ایری تھیرما پڑنا پڑ جائے تو ملا تار اور آرٹک کا استعمال ضروری ہو۔

مقامی علاج عام اصول کے مطابق کریں جلدی امراض کا بیان دیکھو۔
ایری ڈکٹین گلوٹی نوزم **Erydiction Glutinosum** یربانیہ کا بیان دیکھو۔
ایری سی پس **Eryseplas** اری سی پس کا بیان دیکھو۔
ایرکا **Areca** ایریکا کیٹھو۔
ایرکا کیتھو **Areca Catechu** ایریکا کیٹھو۔
ایرکا نٹ **Areca Nut** ایریکا نٹ۔

Arecoline

ایریکولین

Arecanussi

ایریکونسی

سہاری میں کیے کوئی ایک لٹریٹ سے روغن اور گوند
 موجود ہیں۔ درجہ برائے کولین اور ایسی کے این جی
 اس میں پائے جاتے ہیں اس کے کھانے سے خشک یا دوا و سپینہ مخرج ہو تلیے طبیعت کو خفیف کر دیر یا قشر ک
 حاصل ہوتی ہے۔ پان اور چنے کے ساتھ اسکا استعمال ثبوتیہ طور پر عام ہوتا جا تا ہے۔ امعاء پر اسکا اثر قابض اور
 مخرج کرم ہے پشیش اسہال و زکرم معانی میں مفید ہے۔ اس کے کوڑا کا سفید عمدہ بخن کا طعم دیتا ہے۔
 خم۔ بطور قابض داکرین سے ۲۰ گریں تک بطور مخرج کرم ۱۰ سے ۲۰ قطر تک۔ بطور مخرج کرم اسے ۲ درام تک۔
 فلوئڈ اکثرٹ بھور قابض ۱۰ سے ۲۰ قطر تک۔ بطور مخرج کرم اسے ۲ درام تک۔

Azeline

ایزیلین

اور ایسی لین۔ یہ ہیں فلسین کا بیان دیکھو۔

Aspedosperma Quebrico

Aspedospermine

ایسپیدوسپیرمین

Quebreine

کیوبریکین

Aspirator

ایسپیریٹر

ڈالیوے فایز اور ریس کا اسپریٹر اسکی عام مشلات ہیں۔
 اس کے استعمال میں امر قابل یادداشت ہے کہ جو نہیں سولی کا سوراخ جلد کے نیچے پھنچ جاوے تو فوراً پکھاریو
 کا ہٹن کھینچ کر اس کے اندر خلا پیدا کر لینا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے جب سولی کا سوراخ پیپ یا اور خلا پیدا
 اندر پہنچا۔ تو اس وقت نوارہ کے طور پر و رطوبت پکھاری کے اندر چڑھ کر یہ تناوگی کہ اب سولی کا سوراخ میں پھنچ
 تک پہنچ گیا ہے ورنہ اندیشہ ہو کہ سولی جو ف کی گند کر گہری ساختوں میں جا گھے اور پھر پیپ وغیرہ کا کچھ تہ نہ رہے
 پیپ ایک دفعہ بذریعہ پکھاری باہر آپ کے تو سافین لکشن کی ترکیب کی باقی تمام باہر نکال سکتے ہیں اگر خلا کی کھینچ سے
 پیپ ہلنے لگے تو دوبارہ دینے اور نیچے سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ اور نقصان کا اندیشہ ہے۔ اسپیریٹر کے استعمال
 کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

(۱) تشخیص امراض۔ ابیس۔ پانیو تھوریکس۔ پیلوریسی۔ ہائڈروپیری ٹونیم۔ لورسپیس۔ ہائڈروپیری کارڈیم۔
 سٹ ہائڈرڈسٹ۔ ہائیڈیلنکس وغیرہ میں نمبر ایک سولی بلا خوف و اندیشہ داخل کر کے اپنی تشخیص کا طمان
 کر سکتے ہیں۔ اگر ہوائی زہروں سے کال طور پر حفاظت کی جائے تو سولی کے داخل کر نہیں کوئی اندیشہ نہیں
 (۲) علاج امراض پیری ٹونیم۔ اسپیس۔ سواڈ اسپیس۔ ہائڈرڈسٹ۔ لورسپیس۔ جسٹ البول۔ اوڈیپین
 سٹوکیو لید تھریا۔ ہائڈروکیفلس۔ سپائینا بالی۔ فیدا۔ پیلوریسی۔ اشالی۔ ٹیٹرو۔ پیری۔ کارڈیم۔ وغیرہ
 ایسی ریٹر کے ذریعہ خالی کئے جاسکتے اور پھر بعد میں مناسب علاج سے اچھے کئے جاسکتے ہیں۔
 استحصی نوپیا Asthenopia

ضعف چشم بصارت کا امراض کا بیان دیکھو۔

Estrus ایسٹرس نیگٹس انگو عام طور پر کیڑے کہہ دیتے ہیں۔ خواہ کسی حصہ میں ورم ہو اور اسکی حفاظت نہ کی جاوے تو چھوٹے چھوٹے کیڑے جنکو ویسی زبان میں سونڈے بھی کہتے ہیں پرٹھایا کرتے ہیں تاکہ کو اندر ورم ہو کر انکے جوفوں میں اکثر پڑ جاتے ہیں۔ انکی مسلامہٹ سو سخت بے چینی رہتی تاکہ سو بدبو آتی اور تمام چہرہ متورم ہو جاتا ہے۔ بخار ساتھ نہیں ہوتا اسمیں درد ماضی کے ورم میں بھی ایک بڑی پہچان ہے مگر اصل شناخت سونڈوں کا باہر نکلنا اور نظر آ جاتا ہے۔ باقی تمام علامات کیفیت مقدار اور مقام ورم کے مطابق ہوتی ہیں۔

علاج۔ اسکا بے عمدہ علاج صرف سیڈر ہے کہ اگر ناک یا زخموں کے اندر پڑ گئے ہوں تو ٹرنپٹائن یا کاربالک لوشن کی پچکاری سے انکو صاف کیا جاوے۔ اور اگر انٹریوں کے اندر ہوں تو مسہلات اور فاقہ کشی کے بعد محزن گرم ادویہ خاصکر ٹرنپٹائن استعمال کرائی جاوے

Astracantha Longifolia تالکھٹا۔ اسکی جڑور۔
سکن سوزش اور دافع تشنگی ہے۔ ڈراپسی میرقان۔ سوزاک اور وجہ مفاصل میں مفید ہے۔

خزخ ۱/۲ ڈرام سے ۲ ڈرام تک اسکے درخت کی خاک ۱/۲ ڈرام۔
Astragalus Gummifer ایسٹرنجلیس کمفیر
کہتے ہیں۔ استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹریگانٹھ کا بیان دیکھو۔

Astringents ایسٹرنجمنٹس یعنی قابض جالبس ادویہ انکی تفصیل حسب ذیل ہے۔
ایڈائیسی ٹنگ۔ ایڈنیزواک۔ ایڈکاربالک۔ ایڈگیلک ایڈٹامڈر وکلوک وڈالیوٹ۔ ایڈٹائیٹکٹ ایلوٹ
ایڈسلفیورک وڈالیوٹ۔ ایڈٹینگ۔ ایڈکلنپ۔ الکحال آرجینیٹائیٹراس۔ آرگٹ۔ ایو کے لپٹس۔ اکتھیا
الٹس۔ آرٹیکاڈائی۔ اڈکا۔ جامن۔ طوطیا سفید و نیلا۔ رسوت۔ مہیرا کیس۔ تمام نمکھائے سکھ بھسکری۔ وارجینی۔ بارٹیا
ریڈل بسٹارٹا کوٹو کرے نوٹ۔ ہیمایلس۔ ہیمائٹا کسی لم۔ ہیزپلین۔ کائینو۔ کاسی نوکر میریا بیٹی کو ٹرنپٹائن۔
Astigmatism بصارت کا امراض کا بیان دیکھو۔

ایسٹرنجمنٹس
Acid orthophenol ایڈ آرٹھو فینال
Acid Arsenicus ایڈ آرٹسی نیس
Acid osmic ایڈ آسٹک
Acid Oxynaphthoic ایڈ آکسی نیفتھک
Acid Adonidic ایڈ آڈونی ڈک
Acid Agaricinic ایڈ آگری سینک
Acid igasuric ایڈ آگی سورک
Acid Anisic ایڈ آٹالی سک

ایڈ زیعنی جو صاف
کی تاثرات ایک
دوسرے سے
منابت مختلف ہیں۔
یکسی طرح ممکن نہیں
کہ تمام ایڈٹکا
مجموعی بیان صحیح
طور پر نکلا و جزاً

ایڈ اولی اک	Acid Oleic	سب پر حاوی ہو سکتا
ایڈ ایسیٹک	Acid Acetic	اس کے ہم نظر اختصار
ایڈ ایسیٹک ڈی لوت	Acid Acetic Dilute	بیان ایڈز کو مفصلہ
ایڈ بنزوئک	Acid Benzoic	ذیل درجہ صوبہ
ایڈ بورک	Acid Boric	منقسم کر کے انکلیان
ایڈ بورک	Acid Boric	کرتے ہیں۔
ایڈ پائی روگیلک	Acid Pyrogallic	اول ایڈ لٹیفیک
ایڈ پیراسمک	Acid Perosmic	ایڈ ٹائیٹرک
ایڈ پیکریک	Acid Picric	ایڈ ٹائڈر وکلیو
ایڈ ٹارٹارک	Acid Tartaric	ایڈ فاسفورک
ایڈ ٹانک	Acid Tannic	ایڈ ایسیٹک
ایڈ ٹرائی کلور ایسیٹک	Acid Trichloracetic	ایسیٹک ٹم یعنی سرکہ
ایڈ ٹرائی کلور فینک	Acid Trichlorphenic	ایڈ سائیک
ایڈ سائیک	Acid Citric	ایڈ ٹارٹارک
ایڈ سکریٹک	Acid Sclerotic	ایڈ کاربانک
ایڈ سکریٹینک	Acid Sclerotinic	ایڈ کاربانک
ایڈ سلفیورس	Acid Sulphuris	ایڈ کاربانک
ایڈ سلفیورک	Acid Sulphuric	ایڈ کاربانک
ایڈ سلفیورک ڈی لوت	Acid Sulphuric dilute	ایڈ کاربانک
ایڈ سلفیورک آرومائیٹک	Acid Sulphuric Aromatic	ایڈ کاربانک
ایڈ سلفولیٹک	Acid Sulpholinic	ایڈ کاربانک
ایڈ سوزوئک	Acid Sozolic	ایڈ کاربانک
ایڈ سالوئیٹک	Acid Salloylic	ایڈ کاربانک
ایڈ فاسفورک	Acid Phosphoric	ایڈ کاربانک
ایڈ فاسفورک ڈی لوت	Acid Phosphoric dilute	ایڈ کاربانک
ایڈ فلیوورک	Acid Fluoric	ایڈ کاربانک
ایڈ فینک	Acid Phenic	ایڈ کاربانک

بہترین انکوبانی میں ملاکر جلد پر لگانے سے تخمیر ہو کر کھٹک	خ ایک گرین سو گرینک خ ایک بونڈی ۲ بونڈ تک	Acid Carbolic	ایسڈ کاربالک ایسڈ کاربالک لکونی فائیڈ
پیدا ہوتی اور پیر بخار کی حرارت کم ہوتا ہے۔	خ ۱۰ گرین سو گرینک خ ۲۰ گرین سو گرینک	Acid Carbonic	ایسڈ کاربانک
سلفیو ایک ایسڈ ڈائیوٹ اگر اس طریق سے استعمال کیا جاوے تو سہل کے پسینہ کو کم کر دیتا ہے	خ ۱۰ گرین سو گرینک خ ۲۰ گرین سو گرینک	Acid Carbazotic	ایسڈ کاربازیک
راست انکا اثر دین عودہ اور انٹر پوٹر جاذب حابس الدم اور دافع کھا ہوتا ہے اسلئے کھا رہو	خ ۱۰ گرین سو گرینک خ ۲۰ گرین سو گرینک	Acid Cathartic	ایسڈ کٹھارٹک
مثلاً امونیا کارب پٹاسی کارب لکوار پٹاسی وغیرہ کے لیے فادہ بہر کا کام جیتے ہیں۔ بخ کے غود کو تحریک دیکھ	خ ۱۰ گرین سو گرینک خ ۲۰ گرین سو گرینک	Acid Chromic	ایسڈ کراک
لعاب ہن زیادہ پیدا کرتے پیاسہ کی تکلیف دیتے اور خون کی زیادتی	خ ۱۰ گرین سو گرینک خ ۲۰ گرین سو گرینک	Acid Chrysophanic	ایسڈ کرائی سوفینک
	خ ۱۰ گرین سو گرینک خ ۲۰ گرین سو گرینک	Acid Gamphoric	ایسڈ گیمفورک
	خ ۱۰ گرین سو گرینک خ ۲۰ گرین سو گرینک	Acid Gynocardic	ایسڈ گائی نوکارڈک
	خ ۱۰ گرین سو گرینک خ ۲۰ گرین سو گرینک	Acid Gallic	ایسڈ گلیک
	خ ۱۰ گرین سو گرینک خ ۲۰ گرین سو گرینک	Acid Lactic	ایسڈ لیکٹک
	خ ۱۰ گرین سو گرینک خ ۲۰ گرین سو گرینک	Acid Lactic dilute	ایسڈ لیکٹک ڈیلیوٹ
	خ ۱۰ گرین سو گرینک خ ۲۰ گرین سو گرینک	Acid Nitric	ایسڈ نائٹریک
	خ ۱۰ گرین سو گرینک خ ۲۰ گرین سو گرینک	Acid Nitric dilute	ایسڈ نائٹریک ڈیلیوٹ
	خ ۱۰ گرین سو گرینک خ ۲۰ گرین سو گرینک	Acid Nitrohydrochloric dilute	ایسڈ نائٹرو ہائڈروکلورک ڈیلیوٹ
	خ ۱۰ گرین سو گرینک خ ۲۰ گرین سو گرینک	Acid Nitrous	ایسڈ نائٹروس
	خ ۱۰ گرین سو گرینک خ ۲۰ گرین سو گرینک	Acid Hydrobromic dilute	ایسڈ ہائیڈرو برومک ڈیلیوٹ
	خ ۱۰ گرین سو گرینک خ ۲۰ گرین سو گرینک	Acid Hydrocynic dilute	ایسڈ ہائیڈرو سائیک ڈیلیوٹ
	خ ۱۰ گرین سو گرینک خ ۲۰ گرین سو گرینک	Acid Hydrochloric	ایسڈ ہائیڈرو فلیوکلورک
	خ ۱۰ گرین سو گرینک خ ۲۰ گرین سو گرینک	Acid Hydrochloric dilute	ایسڈ ہائیڈرو فلیوکلورک ڈیلیوٹ
	خ ۱۰ گرین سو گرینک خ ۲۰ گرین سو گرینک	Acid Hydruodic	ایسڈ ہائیڈرو می اوڈک
	خ ۱۰ گرین سو گرینک خ ۲۰ گرین سو گرینک		اس کا سیرپ ہلایا جاتا ہے جسکی خوراک نصف ڈرام سے ۲ ڈرام تک

سے معدہ کو تحریک دیکر اکٹھا اور باضمہ کو مدہ دیتے ہیں۔

کاربانک ایسڈ جب جوش کھانے والی صورتوں میں پایا جائے تو معدہ کے انحصار کے نہایت تسکین بخشا اور خراش معدہ اور تشبیان کی حالت میں کمال آرام دیتا ہے۔ ایسڈ نیم میں پھنک کر بوتل کی ترشی کو زیادہ کر دے اور غدد امعاء اور لیبلہ کو تحریک دیکر ان کے عروق باضمہ کا اخراج زیادہ کرتے ہیں۔ ڈیلمیٹ سلفیورک اسان حاد و مزمنہ اور نیز اسہال الدم میں نہایت مفید ہے۔ نائٹرک و نائٹر و ہائڈروکلورک ایسڈ معدہ و مخرج صفرا ہیں۔ خون میں جذب ہو کر کسکے کی پین کو کم کر دیتے ہیں۔ سلفیورک ایسڈ کے استعمال سے خون کی خلیوں میں فاسفیٹ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح گویا کہ یہ قوی خون ہو۔ باقی ایسڈ مثلاً سائٹرک، نازک اور ایسیٹک اینڈ خون میں پھنکے آگے جوں اور کھاراج کے ساتھ مل کر رات بجاتے ہیں۔ جیسے سائٹرک ایسڈ سے سائٹرک آف سوڈیم۔ پوٹاسیم یا امونیم بن جاتا ہے۔ خون سے خارج ہو کر تمام ساختہ بن جاتا اپنا خاص اثر ظاہر کرتے ہیں۔ سلفیورک ایسڈ نہایت عمدہ حامل الدم ہو۔ نائٹرک اور نائٹرک ہائڈروکلورک ایسڈ متعاقب اور داخلی استعمال میں مخرج صفرا ہیں۔

سلفیورک ہائڈروکلورک۔ اور ہائڈروکلورک ایسڈ اخراج پسند کو کم کر دیتے ہیں۔ یہ بات قابل یادداشت ہے کہ چونکہ یہ تمام ایسڈ زسالت بن کر خارج ہوتے ہیں اسلئے پیشاب میں ترشی زیادہ نہیں ہونی پاتی۔ اور انکھار سالٹوں سے گردوں کو تحریک ہو کر ادر میں تائید ہوتی ہے۔

دوم مختلف ایسڈ جو عام تاثیرات سے تشنگی تائید باضمہ قبض وغیرہ سے قریب قریب تثنی ہیں۔
اسلئے ان کا بیان ذیل میں ترتیب وار کیا جاتا ہے۔

ایسڈ آرتھروفینال سلفونک۔ اسپٹال سلفو کابال۔ سوزاک ایسڈ۔ کاربانک وٹیلک ایسڈ کی طرح اینٹی سپٹک ہو مگر ان کی نسبت اپنی تاثیرات میں زیادہ قوی ہے جیسا کہ اس کا نام ہی مشہور پڑتا ہے و یا تیز کاشک نہیں ہے بلکہ کاربانک ایسڈ کی طرح آنکھوں کے اور پیشوں میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

ایسڈ آرنیٹس۔ آرسنک کا بیان دیکھو۔

ایسڈ آٹمک اور پراسمک۔ اس کے اخراجات نہایت تیز خراش کنندہ ہوتے ہیں۔ آگے منہ ناک اور زخروں کے اندر پھنک کر سخت سوزش پیدا کر دیتے ہیں۔ بلکہ آسیم آگے میں نہ نشین ہو کر نظر کو بالکل برباد کر سکتا ہے۔ جلد پر بھی اس کے اخراجات سخت خراش کر کے چھنیار بنو دے کر دیتے ہیں۔ سلفیورک ہائڈروجن کا سنگھانا اس کے دھیرے اخراجات کو نقصانات کا دغیہ کرتا ہے۔ اسلئے جلدی پچکاری اعصابی دردوں مثلاً صداع عرق النساء وغیرہ میں اور نیز مختلف رسولیوں مثلاً سلگوما۔ لغوما۔ سرطان و جنجیروں وغیرہ میں مفید ہے۔ ایک ترکیب استعمال طرح ہے۔ آٹمک ایسڈ ایک حصہ پانی ۶۰ حصہ کلیسیرین ۴۰ حصہ ملکر اس میں سے

پندرہ بیس قطرہ کی جلدی پکڑی کیا وے۔

ایسڈ آکسی مفید واک سیلی سلک ایڈ کی نسبت پانچ حصہ زیادہ انٹی سپٹک اور سکینر پر اور الگو سیاتی کو اور دود وغیرہ میں نہایت مفید ہے۔ پانچ سے تالیف صدی تک کی طاقت کامرہم بنا سکتے ہیں۔

ایسڈ افونی ٹک۔ یہ ایڈ اوونس ورنے لے سوجا مل ہو تا ہے لیکن ابھی تک اسکی کوئی خاص تاثیر ثابت نہیں ہوئی۔

ایسڈ لگے ری سینک۔ اگلی دوی سین کی طرح سل کے تفرق شجینہ میں نہایت مفید ہے۔

سرخ پے گرین سے پے گرین تک۔

ایسڈ انانی سک۔ یہ ایک نیا انٹی سپٹک اور انٹی پائیرٹک ہے۔ اسکی تاثیرات سیلی سلک ایڈ کے مشابہ ہیں۔

ایسڈ اولی اک۔ اولی اک ایڈ کا بیان دیکھو۔

ایسڈ ایسی ٹک۔ عام بیان میں اسکا ذکر ہو چکا۔

ایسڈ بنز واک۔ بنز واک کا بیان دیکھو۔

ایسڈ بورک۔ یہ ایک نہایت عمدہ بے ضرر بے خراش انٹی سپٹک اور ڈول نفیکٹ ہے

بصورت بورک لٹ اور بورک انٹینٹ عام طور پر زخموں کے ڈریس کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے

گلیسرین یا شہد میں ملا کر منہ کے آبلوں خاصکر افقہ میں مفید ہے۔ زیادہ مقدار میں کھلانے سے معدہ

اور امعا میں خراش پیدا کرتا ہے۔ اسکا اندرونی استعمال سوزش مثانہ میں پیشاب کی جلن۔ بدبو اور

خلاط کو کم کر دیتا ہے۔ کان کی سوزش میں جبکہ چھوٹی چھوٹی پینیاں ہو کر بہت پیپ خارج ہوتی ہو نہایت

مفید ثابت ہوا ہے دیکھو اور یا کا بیان۔ سخت پیپ والی آفتیلیا میں آکھ کو پندرہ بیس گرین فی

اونس کے وزن سے خوب صاف کرتا معجزہ کے طور پر ایک ہی دفعہ میں اخراج پیپ غیرہ کو آرام کر دیتا

ہے۔ پھوڑوں پر مفصلہ ذیل نسخہ میں لگانا تمام جلن اور سوزش کو تین چار روز میں دفع کر دیتا ہے

بورک ایڈ ایک ڈرام بنز واک پے گرین۔ ویسلین ۵ ڈرام بکریا۔ امیری تھیلہ بگل گند اور پٹالی گولڈ

بطور سفوف بالوشن یا مرہم مفید ثابت ہو رہے۔ بخہ۔ ناک۔ اور گلو کے متعلق نزلہ اور سوزش میں اسکی غرغہ

نافع ہیں۔ خاصکر اگوٹ پاسی کلوراس اور گلیسرین میں ملا کر استعمال کیا جاوے تو تھرش کے لئے قریباً مخصوص

معلوم ہوتا ہے۔ بیجنوں میں بھی اسکو اکثر شامل کر دیا جاتا ہے۔

ایسڈ پالی ٹرو گیک۔ گیک ایڈ کی طرح حالب الدم ہے۔ ۱۰ سے ۲۰ فیصدی تک مرہم بالوشن اگر ملا لوپ

اپی تھیلیو میٹل سر اور سافٹنر میں مفید ہے۔ ۲۰ فیصدی کا مرہم اپی تھیلیو میٹل زخم پر لگانے سے اس کے

فاسد ذرات کو زائل کر دیتا لیکن صحیح انگور کو خراب نہیں کرتا اسکا ۲ فیصدی کا مل انٹی سپٹک ہے۔ مفصلہ ذیل

نسخہ بالوں کو سیاہ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

پایروگیلک ایڈ ایکٹ رام لیکر پانی ۶ اوڈرام میں حل کرو اور سلونائٹس ایکٹ رام لیکر ۳ اوڈرام پانی میں حل کرو اور پھر ان دونوں کو ملا کر برش کے ساتھ سفید بالوں پر لگاؤ۔

خم پ گریں سے اپ گریں تک۔

ایڈ بر آسمک - دیکھو بیان ایڈ آسمک کا۔

ایڈ پلرگ - اسکا بیرونی استعمال وارش کے طور پر جلد کی حفاظت کرنا اور حصہ مفعول کی

شیرازوں کو سکیر کر اسکا خون کم اور رنگ پھیکا کر دیتا ہے۔ اسلئے جلدی سوزش لمفینجائٹس - اگزیا - روبہ

اری تھما اور اری سی پس میں مفید ہے۔ اری سی پس کے مقام پر سہ سو پہ فی صدی طاقت تک کا

لوشن چھ سات دفعہ روزانہ لگانا اور ساتھ ہی کوئین کی جلدی پچکاسی کرنا نہایت مفید ثابت ہوئی ہیں۔

داخلی استعمال میں پیکر ایڈ دافع بخارات اور صلاح نوبتی ہے۔ دیکھو بیان امونیا پیکر اس کا۔

ایڈ ٹارک - دیکھو حصہ اول کا بیان

ایڈ ٹانک - دیکھو مازو کا بیان۔

ایڈ ٹرائی کلور ایسی ٹمک - کرومک ایڈ کی طرح اینٹی سپٹیک ہے جس مقام پر لگایا جائے اسی جگہ ایک

صاف سفیدی پائل کھرڑ جھاتا ہے۔ جو چار پانچ روز میں خود بخود اتر جاتا ہے۔ فیرنجائٹس اور ٹانائٹس پر

منسوخ ذیل گلو کے اندر لگانا مفید ہے۔

ایوڈین ایک گریں - پٹاسی آیوڈائیڈ گریں پانی ۲۰ قطرہ میں حل کر کے اسمیں گلیرین ۲۰ قطرہ ملا دیا کرو

اور پھر اسمیں تین گریں ایڈ ٹرائی کلور ایسی ٹمک حل کیا جاوے۔ اشن اور موبکو نہر بھی اسکا لگانا مفید ہے

ایڈ ٹرائی کلور فینیک - ٹرائی کلور فینال کا ربالک ایڈ کے مشابہ مگر انکی نسبت قوی تر ہے۔

ایڈ سیلی سلک - بلس البا کا بیان دیکھو۔

ایڈ سائٹرک - دیکھو عام بیان ایڈز کا نمبر (۱) میں۔

ایڈ سکرائی ٹمک - حامل الدم تاثیرات میں لرگ کو مٹا بہو لیکن ہم پر آکا کوئی اثر نہیں خرم پ گریں سے پگریں

ایڈ سلف ایسی لینک - یہ انگ میں سونکلتا ہے اور کارنوٹین کی طرح اسکا اثر زیادہ رحم کو خضلا بہر ہوتا ہے۔

ایڈ سلفیورس - گلیجن کو نباتی اور حیوانی اشیاء سے نکال کر سلفیوک ایڈ میں بد بھانا اور جس مقام پر لگاؤ

ہا وکسجک پر خراش کرتا۔ اور تمام خوردبینی نباتات کو جو شرین پیدا کرتے ہیں مار ڈال کر اینٹی سپٹیک روٹس

اثر پیدا کرتا ہے۔ داوید پودا زعفران اور سفش گلو میں اسکا استعمال کرتے ہیں۔ معدہ میں خضاد ہاضمہ و سوسارینی

اور پنی سلیم پیدا ہوں انکو ملاک کرنے اور ہاضمہ کو درست کرنے کے لئے خوب کار آمد ہے۔

سلفائٹس زیادہ مقدار میں سلفٹ بنکولپے مہل اور مدفع سے حرارت بخار کو کم کرتے ہیں۔ سوڈیم سلفائیٹ

اور سوڈیم ایپوسلفاٹ معدنی بنجر رائڈر وکلوک ایڈیٹور سلفیورس ایڈیٹور سے ملایا کرتے ہیں اسلیو داخلی استعمال کے لئے سلفیورس ایڈیٹور کی بجائے انکو باسانی استعمال کر سکتے ہیں۔

گنٹاب کا دھواں جو خشک سلفیورس ایڈیٹور سے ہے۔ نہایت قوی اور یقینی ڈس انفیکٹنٹ ہے مگروں اور پاجات کا ڈس انفیکٹنٹ کرنا گندہ کی دھوئی سے نہایت آسان ہے۔

ایڈیٹور سلفیورک - دیکھو عام بیان نمبر (۱) میں

ایڈیٹور سلفو لیک اسکے دوسرے نام پولی سالا اور سالا اور سالاوین بھی ہیں آئیوڈو وٹام اور کرائیوٹین بھی ہیں

ایڈیٹور سوزونک - ایڈیٹور فینال سلفونک کا بیان دیکھو۔

ایڈیٹور سیلک - پیکس الکا بیان دیکھو۔

ایڈیٹور فاسفورک - دیکھو بیان نمبر (۱) میں

ایڈیٹور فلو اورک - اسکا دوسرا نام ہائڈرو فلو اورک ایڈیٹور بھی ہے۔ دفتیجیر اور سل میں اسکا اپنے لیٹن

استعمال کیا جاتا ہے بر وکلو سیل میں نہایت مفید ہے۔

سٹر ایڈیٹورک وائلیوٹر ۲ فیصدی طاقت کا ۱۲ ڈرام سے ۶ ڈرام تک۔

ایڈیٹور فینک - ایڈیٹور بالک کا بیان دیکھو۔

ایڈیٹور کار بالک - خارجی استعمال میں اینٹی زائیٹک - اینٹی سیپک - ڈس انفیکٹنٹ اور ڈی اوڈو

ہے۔ تمام آگے نائز و فرمیں یعنی ایڈیٹور مولڈ اور میکٹیر یا کو بہت جلدی سے ہلاک کر دیتا ہے کیمکل ورنیش

یعنی پیسین اور ٹالین وغیرہ کو بھی بے اثر کر دیتا ہے۔ نیز سٹرن سے جو عفونت دار اور متعدی مادہ پیدا

ہوتا ہے اسکو بھی زایل کر دیتا ہے۔ پانچ فیصدی کالوشن اوزاروں اور مقام ماؤف کو اینٹی سیپک

کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اور ۲ فیصدی کا زخم سرجن کے ہاتھ اور اسٹینچ وغیرہ صاف

کرنے کے لئے کار بالک آئیل جو ایک سی۔ ا فیصدی تک کی طاقت کا روغن زیتوں یا سید انجیر میں

ملا کر بنایا جاتا ہے۔ کیمپور اور پروب کی رگڑ و رگڑ کے لئے استعمال کرنے میں مگر اسکا

فصل بہت کمزور بلکہ کالعدم ہو جاتا ہے۔ کار بالک گاڑا سطر سے بناتے ہیں کار بالک ایڈیٹور

حصہ ۲ ریزن ۴ حصہ پیرافین ۴ حصہ انکا ایک کیمپور بنا کر اس سے دو چند وزن میں بلا شوب گاڑ

لیک انجینر کر کے خشک کر سکتے ہیں۔

جس مقام پر خالص کار بالک لگا یا جاوے پہلے پہل کی مقدار خراش کرتا مگر تھوڑی دیر میں اس جگہ

کو سن کر دیتا اور اوکو جلا کر ایک سخت سفید رنگ کھنڈ بنا دیتا ہے۔ عفونت دار زخموں پر اسکا لگانا

مصلح ہے۔ ۲ فیصدی کالوشن زخموں کی دھوئی اور غرغریں استعمال کیا جاتا ہے۔ سخت

افضلہ میں جبکہ پلکیں اور کنجنگ بو بہت ورم کر گئے ہوں ۲ فیصدی کالوشن سی آگے کو بار بار

دھوکہ برابر صاف رکھنا اور ایک گدی اسی لوٹن میں ہر وقت آنکھ پر رکھنا تمام ورم کو ۳۰ گھنٹہ کے اندر رفع کر دیتا ہے۔ براز تھوڑے اور نالیوں کی گند کو ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے بھی اسکا استعمال کیا جاتا ہے۔ کاربائلک ایسڈ کا اپنے لیٹن سل گینگریٹ آف دی لنگ برائلی کچھ شرس اور نیو مونیامین نہایت عمدہ ڈیٹکسٹ اور ڈس انفیکٹ ہے۔ معدے کے نفخ میں جبکہ فساد ہاضمہ کی وجہ سے خراب ہوا میں جمع ہو گئی ہوں اسکے استعمال سے کمال فائدہ ہوتا ہے۔ خون میں آسانی جذب ہر کرت تمام ساختوں میں پہنچتا اور ہر جگہ خرس اور سوزش کی علامات پیدا کر ملے۔ دل کی حرکات پہلے سست اور پھر تیز ہوجاتی ہیں۔ بند پر شیر پہلے زیادہ اور بعد میں کم ہوجاتا ہے۔ دکشی تشنجی حرکات اور آخر کار فاج ظاہر ہوتے ہیں۔ طبی مقدار میں بخار کی حرارت کو جو سوزش مفاصل یا انڈوکارڈائٹس سے ہو کم کر دیتا ہے۔

پیشاب میں خارج ہوتا ہوا انسوسنری ویسا ہی مائل کر دیتا ہے۔ ذیابیطس کو اس سے عارضی آرام ہو جاتا ہے لیکن بعض اوقات اس سے البیومی نیوریا ہو جاتا ہے۔ پسینہ اور تھوک زیادہ خارج ہوتا ہے۔

ایسڈ کاربائلک۔ دیکھو بیان نمبر ۱۸۵ میں۔

ایسڈ کاربیلے زٹک۔ ایسڈ پلرک کا بیان دیکھو۔

ایسڈ کیتھارٹک۔ یہ سنار، ریونڈر جینی اور فرنگیو لارک میں سے حاصل ہوتا ہے بے ذائقہ اور بے ضرر سہل ہے کسی قسم کی خراش اور توڑ پیدا نہیں کرتا آخر ہم گرین سے ۸ گرین تک۔

ایسڈ کرومک۔ یہ نہایت تیز کاٹکٹ آف جیواوریشن ہے خراب رخصوں کے دھونے کے واسطے ۱۰ گرین فی اونس کالوشن کافی ہے۔ دوم درجہ آٹک کر زخموں، پھنسیوں، میوکس ٹیوربرکل و رکائڈی لوما وغیرہ میں نہایت مفید ہے۔

پارہ سے اگر منہ میں سوزش ہو گئی ہو تو اسکا چار پانچ فیصدی کالوشن مقام ماوف پر لگانا دو تین دفعہ میں آرام کر دیتا ہے۔ ہلانی ورم زبان اور گلو میں خاص فائدہ کرتا ہے۔ اپنی تھیلو ما آف دی پینس کو زایل کرنے کے لیے یہ سب سے عمدہ کاٹکٹ ہے۔

ایسڈ کرائی سو فینک۔ کرائی سے روہین کا بیان دیکھو۔

ایسڈ کیمفورک۔ یہ ایک عمدہ بے خراش اینٹی سینیٹک ہے۔ پانچ فیصدی کالوشن زخموں پر لگانے اور نصف فیصدی سے ۲ فیصدی تک کالوشن سوزش ناک، جھگو، زرخرہ وغیرہ میں بطور سپری سٹینال کرنے سے بہت جلد فائدہ ہو جاتا ہے۔ چار فیصدی کامریم اسی میں ملے اور گریما میں مفید ہے۔

ایسڈ کافی نوکاروٹک۔ اس میں تمام تاثیرات چال موگرار و غن کی موجود ہیں مگر اسکے بد ذائقہ اور بد بو سے بری ہے۔ اگر ۵ یا ۱۰ گرین گائے نوکاروٹک ایسڈ فی اونس پولیٹین میں ملا کر لگانا نہایت مفید ہے۔ داخلی استعمال میں اسکی تاثیرات چال موگرار لائل کے مشابہ ہیں۔ آخر اسے ۳ گرین تک۔

ایسڈ لیک - دیکھو بازو کا بیان

ایسڈ لیک - کروپ و دفتیر یا میں بطور سپرے استعمال کرنا فاسد جھلی کو حل کر لیتا ہے۔ داخلی طور پر بطور مدد ہاضمہ اسکا استعمال کر سکتے ہیں۔ سوزشِ شامہ میں مفید ہے۔ دو فیصدی کا حل بچوں کے سبزنگاہ ہال میں خاص فائدہ دیتا ہے۔

دافع تشنگی اور نارخ سرفہرہ۔

ایسڈ ٹائٹشرک - دیکھو عام بین نمبر (۱) میں۔

ایسڈ ٹائٹرو باڈر وکلو رک - نہایت عمدہ مدد ہاضمہ تخریج صفر اور حرکتِ جگر ہے۔ دیکھو عام بیان نمبر (۱) میں

ایسڈ ہائڈرو بروک - برومانڈز کا بیان دیکھو

ایسڈ ہائڈروفلو اورک - ایڈفلو اورک کا بیان دیکھو

ایسڈ ہائڈروکلو رک - دیکھو عام بیان نمبر (۱) میں

ایسڈ ہائڈری اوڈک - ہائڈری اوڈک - اسکی تاثیرات آئیو ڈائیڈ آف پوٹاسیم کے مقابلہ میں - دمہ - سرفہ مزمنہ

ٹائٹرائٹک اور امراضِ میلیریا میں مفید ہے۔ سحر سرب ہائڈری اوڈک ایڈپ سی ڈرام تک۔

ایسرین Eserene کیلے بار بین کا بیان دیکھو

بچہ نوزائیدہ کا احتیاسِ نفس۔

ایفٹشانیوٹورم Acrochordon

دم بند ہونے کی وجہ سے بچہ مردہ معلوم ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی چلا تلبے جس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ سانس

آنا شروع ہو گیا ہے مگر بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا اور بچہ نیم مردہ سا پڑا رہتا ہے اس حالت کو ایفٹشانیوٹورم کہتے ہیں

پہلے درجہ میں چہرہ نیلگوں اور متورم ہوتا ہے ہلکی ہلکی سبکیاں سی لیتا اور قلب کی حرکات ست اور ضعیف ہوتی ہیں

دوسرے درجہ میں بچہ کانگ بھیکا ٹپڑاتا۔ اطراف ڈھیلے پڑ جاتی ہیں۔ بدن ٹھنڈا معلوم ہوتا اور قلب کی حرکات ناقابل

احساس ہو جاتی ہیں۔ اگر جلدی کو سانس کی نیکی تباہ نہ کر لیا جائے۔ تو بچہ ہلاک ہو جاتا ہے۔

علاج - فوراً ناف کو مضبوط لپیچہ کے ساتھ باندھ دیں۔ منہ کا نام لعاب انگشت کو ساتھ صاف کریں اور زخروں میں

ایک ہلکی یا کٹھینہ بنیچا کر ہوائی راستوں کا لعاب چوسکر نکال لیں۔ ایک تولیہ ٹھنڈے پانی میں جھگو کر بچہ کے سینہ پر

آہستہ آہستہ بار بار مایں اور باری باری اسکو گرم اور ٹھنڈے پانی میں بھلا دیں تاکہ خرابی ہو کر دم آنا شروع ہو جا

اگر ان تمام تدابیر میں ناکامی ہے اور نفست قائم نہ ہو تو مصنوعی نفس آنہ مانا چاہیئے۔ یہ یاد رکھنا چاہیئے کہ جب تک

قلب کی حرکات محسوس ہوتی ہیں اسوقت تک زندگی کی امید ہے تمام تدابیر کی تمیل میں یہ احتیاط لازمی ہے

کہ کوئی عمل زیادہ گھبراہٹ اور تیزی کے ساتھ نہ کیا جائے جس سے حرکتِ قلب کی بند ہونے کا اندیشہ ہو۔ چونکہ

بچوں کا احتیاسِ نفس عموماً دماغ میں خون کے پیچھے کی وجہ سے ہوتا ہے اسلئے شروع میں بچہ کو انا کر دینا چاہیئے

تاکہ سرخیاں ہو کر انکی طرف خون خود بخود رواں ہو کر پہنچ جائے اس کو کسی قسم کے ضرر کا اندیشہ نہیں بلکہ کمی قسم کو فائدہ

ہیں اول یہ کہ اٹکا کرنے سے ہوائی راستوں کا لعاب بہکڑھ یا ناک کو راستہ خارج ہو جاتا ہے۔ قہقہہ کہہ کر
دوسری تدبیر عمل میں لاسکتے ہیں نتیجہ یہ کہ دینا کاوا اسٹرنس کا صاف خون دماغ کو پہنچ جاتا ہے چھانسنے
کے پیچھے یوں یاس ہو زیادہ خون پہنچتا ہے جسکی وجہ سے انکو تفسر کی طرف اور حرکت ملتی ہے۔

ایسٹیا نیوٹروم میں شولوز صاحب کا طریقہ تفتیش سب کو بہتر ہے جسکی تشریح حسب ذیل ہے۔
بچہ کی پشت اپنی جانب کر کے ہر دو ہاتھوں کے انگوٹھے اس کے سر پر اور ہر دو انگشت برابر اوکی غلیوں
میں رکھ کر باقی حصہ دست کو پشت پر آٹا ایجاٹیں اور باہتگی بچہ کو اوپر کی طرف مینچیں اس سے سینہ کی بالائی پسلیاں
اور پر کی طرف اٹھیں گی اور زیریں پسلیاں اعضا تکم کے کھینچنے سے نیچے کی طرف مینچیں جس سے سینہ خوب
کشادہ ہو کر اندرونی سانس با فراغت ہو گا پھر ہاتھوں کے ہر پہلے سے بچہ کو بٹھا کر ان کے کی طرف خم دیں
اس سے سینہ کی پسلیاں قریب تر ہو کر سینہ کو دباؤ ملے گی۔ اور نیز شکم کے اعضا پر دباؤ پڑ کر دایا فراہم
اوپر کی جانب اٹھکا گا کیونکہ سینہ پر ہر طرف سے دباؤ پیچ کر برونی سانس آئے گا۔ ساتھ ہی ہوائی راستوں کا نام لگنا
بھی دباؤ سے بخوبی خارج ہو جائیگا اور اس وقت اس سینہ سے دوران خون کی بھی پوری تحریک ہوگی
تفسر مصنوعی کے باقی تمام طریقوں کا ذکر ہم اسٹی فیشل سپریشن میں کر چکے ہیں اس کا بیان دیکھو۔

دیکھو بیان البٹوزو رک کا۔

Aseptol

ایسپٹال

Acetal

ایسیٹال

کی جاتی ہے۔ یہ ایک ڈرام سے ۳ ڈرام تک۔

Acetyl phenyl hydrozen

ایسیٹل فینیل ہائڈروزیلین

سرکہ۔ اس میں ۵ سے ۱۰ حصہ دی ایسیٹک ایسڈ ہوتا ہے۔ اور اسی پر اسکی تاثیرات

Acetum

ایسیٹم

مختصر ہیں۔ دیکھو بیان ایسیٹک ایسڈ کا۔

خبر ایک ڈرام سے ایک اونس تک۔

Aceto tartarate of Aluminum

ایسیٹو تارتارٹ آف الیومینیئم

کاسٹک ڈسولفیکٹ اور اینٹی سپٹک ہے۔ اور زیادہ فیزل ہائی پس در دہائی نائٹس میں سفیدی کا پایا
اور سیلی سلک ایسڈ کی بجائے استعمال کر سکتے ہیں۔

Acetophenoh

ایسیٹو فینان

ہینون کا بیان دیکھو نمبر ۲ سے ۵ قطرہ تک۔

Acetanilide

ایسیٹینی لائیڈ

اینٹی فیبرین کا بیان دیکھو۔

Acidity

ایسیڈٹی

ترشی تھپتھہ جلد چھپھڑوں اور گردوں کے رستہ خارج ہونے
کہتی ہے۔ یہ ترشیاں زیادہ ترجمہ میں ہی ساختوں کے ذوال اور آگنی دلشمن سے بنتی ہیں۔ اگر سائنس دان
آگنی دلشمن کا ل طور پر ہونو محض کار بالک ایسڈ یوریا اور پانی بنیٹا لیکن یہ عمل کبھی کال طور پر نہیں ہوتا بلکہ کمال

بند

Acidity of the Stomac

ایسی ڈیٹا فوی اسٹاک

جب معدہ میں خواہ قدرتی اخراج سے یا غذاؤں میں فاسد تغیرات ہونے سے ترشی زیادہ ہو تو گھار اور پیچ
مثلاً سوئی بانی کارب یا پٹاسی بانی کارب ایک و ڈرام مقدار میں فوراً ترشی کو معتدل کر کے تمام درد اور تور کم
رفع کر دیتے ہیں۔ اگر ان سے آرام نہ ہو تو قے کرا دینی چاہیے۔ ایک ٹو پیسین، ۳ یا ۴ گریں پیپے این دو تین گریں
بھی اکثر تمام تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر کثرت ریاح سے نفع نہ آتا ہو تو کرکوزوٹ کاربالک ایڈروغن
لونگ۔ اور پیرٹ مفید ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جب کسی دوا سے آرام نہیں ہوتا تو معدہ کو ہلکے پورک
لوشن یا کانڈیزفلوئڈ سے دھو ڈالنا فوراً کلی آرام بخشتا ہے۔ جب علامات حادثہ رفع ہو جاویں تو چند روز معدہ
کی تقویت کیلئے مفصلہ ذیل نسخہ مفید ہو گا۔

بسمتھ بانیئراس ھا اگرین یکسو پچسین ھا اگرین ڈوروس پاؤڈر اگرین ایسی تین پڑیہ روزانہ۔

تہوی میگنیشیا کاربوناٹس، اگرین، پے جے این مگرین افیون لہ گرین۔ ایسی تین پڑیہ کھانے کے بعد۔
میدہ کی چیزوں شراب۔ ترشی اور گوشت سی پھر لازم ہے۔ تمام غذا لطیف و خوش اور سرخ اور سفید ہونی چاہئے۔
تشرش کا بیان دیکھو۔

Aplithæ

Aphrodisiacs

Arrow Poison

Aphonia

Echoliids

Ichthium Eleterium

Ectea Racemosa

قلب پر اسکا فضل و جی ٹالس کو مبارک ہے دماغ پر اسکا اثر بطور موم و درخندہ کے ہوتا ہے۔ لحمی ریشوں کو اگر گٹ کی طرح سکیرنی ہو۔ رجم پر اسکا اثر دفع تشنج، مسکن اور مقوی کے طور پر ہوتا ہے۔ مصلح جسم و مرق، مقوی اعصاب و معدہ و درجین۔ واضح رجم بخار اور دفع تشنج ہے۔ وجع مفاصل، در و کمر، عرق النساء، عسر قلت و کثرت طمث میں مفید ہے۔ اگر جلدی بخارات بوقت غایب ہو جائیں تو اس کے استعمال سے پھر نمودار ہو جاتے ہیں۔

خمر غلوٹ اکثر لٹ ۱۰ سے ۲۰ پونڈ تک پھر ۱۵ سے ۶۰ پونڈ۔ سالد اکثر لٹ ۳ سے ۱۰ اگرین۔ سسی ہی فیو جین
یعنی مارگوٹین ایک گرن سے ۶ گرن تک۔

Étropien

Actinomyces

ایکٹروپین Ectropien
ایکٹو نوامائی کوکس Actinamycosis.
پلکوں کے امراض کا بیان دیکھو
یہ ایک قسم کی پھٹنے والی سُل کے

مشابہ درم ہے جو ایک قسم کی نبات کو سرایت کر جانے سے پیدا ہوتی ہے اس نبات کا نام بھی کچھ نونائی کو کہتے ہیں یہ مرض ابتداً گائے بیل کے جیروں اور زبان میں ہوتا ہے جسکی وجہ سے چھوٹی چھوٹی گٹھلیاں اور چھال پیدا ہو کر درم ہو جاتی ہے۔ کبھی سورت کے جیروں اور تھنوں اور پھڑوں کی ٹانگوں میں بھی ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے حیوان سے یہ مادہ انسان کے اندر زخموں یا چھالوں کو رہتہ یا سانس یا خوراک کو رہتہ پہنچ کر ستر کر جاتا ہے۔ تب ایک دیر پا درم ظاہر ہوتی ہے جو پھیلتی جاتی چھوٹی چھوٹی گٹھلیاں بنتی اور چھال لگتے ہیں گٹھلیوں کے اندر سِل کے مشابہ مادہ جمع ہو جاتا ہے۔ جب پھیپھڑوں میں یہ کیرے سرایت کر جاتے ہیں تب بعینہ سِل کی علامت پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک جگہ یہ درم ہو کر دوسری اعضا میں بھی خون کے راستہ اسکا مادہ پہنچ کر دم کو دیتا ہے۔ علاج۔ یہ قطعی طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ یہ مرض متعدی ہو۔ اور بولشی یا گٹھلے کی لمبی جلتے سے انسان کو ہو جاتا ہے پس ان کو اندکی یہ تدابیر ہیں کہ ایسی مرض کی حالت میں مریض مویشی سے پرہیز کرکھا جاوے اور کامل طور پر پاک صاف رہنے میں نہایت احتیاط کیا جاوے۔ اگر کسی جگہ مثلاً پاؤں، جبر یا چہرہ سینہ وغیرہ پر درم یا ناسور ہو کر زرد دانہ خارج ہوئے معلوم ہوں تو گہرا شکاف دیکر تمام خراب ساختوں کو قطع کر کے اور کھرچ کر کامل طور پر دور کر دینا چاہیے۔ اگر ایک ذرہ بھر بھی فاسد مواد رہ جائیگا تو دوبارہ اس مرض کو پیدا کر دیگا۔ کاٹنے اور کھرچنے کے بعد تیزاب سی جلا کر آئیوڈو فاسم گاڑ بھر کر ڈریس کر دینا چاہیے۔

دیکھو کاٹری کا بیان

Actual Cantery

ایکچوئل کاٹری

اگر دیا وہ لمبے ہوں تو قینچی سے کاٹ دیں

ایکروکارڈن

چاہئیں ورنہ کاسٹک پوٹاس یا لائیو ارلیمپائی یا سلور نائٹریٹ سے حسب موقع جلا دیں۔

ایکروڈینا Acrodyna یہ ایک قسم کی سوزش جو ہتھیلیوں اور تلووں میں نمودار ہو کر سخت سوزش دروا اور چھین پیدا کرتی ہے۔ اکثر سرخی، پھنسیاں اور چھالے بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات تمام جسم میں دروا اور چھین ہوتی ہے تین یا سہ ہفتہ کے بعد جلد کیریونی تہ اترتی شروع ہو جاتی ہے اس کے علاج کے اصول یہ ہیں کہ اول اعضائے انہضام کی اصلاح دوم مقامی سوزش اور درم کو بانی پی یا مرہم جست یا آئیوڈین پیٹ وغیرہ سے فرو کرنا۔

ایکرومیگلی Acromegale اس مرض میں جسم کی ہڈیاں بہت بڑی اور بہت موٹی ہو جاتی ہیں۔ خاص کر ہاتھوں اور پاؤں کی ہڈیاں۔ یہ مرض عموماً جوان عورتوں میں چالیس سال کی عمر کے درمیان ظاہر ہوتا ہے۔ حیض کا چھوٹی عمر میں بند ہونا ایک مہربان کی گئی ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس مرض والوں میں بخاریہ غدود سے بڑھ جانا یا چھوٹا ہونا ہوتا ہے اور پٹوای ٹری باڈی میں رسولیاں ہو جاتی ہیں۔ لمبی ہڈیوں اور ہتھیلیوں کے سر اور او بجا رہی ہو وہ طور پر او بھرے ہوئے نظر آتے ہیں چہرہ کی عجیب صورت ہو جاتی ہے نیچے کا جبر اور دانت بڑے بڑے ہوتے اور اوپر کے

دانت اندر کو ہو جاتے ہیں کہیں اور پر کاہڑا اور دانت بھی بڑھ جاتے ہیں مہرے چھوٹے بڑے ہو کر گڑ میں ضم آجاتا ہے۔ ہنگمہ ناک کان تالو اور جھڑ کی ہڈیاں بھی کبھی مٹی ہو جاتی ہیں۔ ان خیرات کی وجہ سے سونگھنے سے اور ذائقہ کی قوت کم ہو جاتی آواز میٹھ جاتی اور کبھی بینائی بھی کم ہو جاتی ہے سانس کھنچ کر آنا اور کٹر اختلاج القلب بھی رہتا ہے پسینہ بکثرت آتا منہ خشک ہوتا اور زبان مٹی پڑ جاتی ہے یہ مرض مدتوں رہتا اور آخر موت کے ساتھ خاتمہ ہوتا ہے۔

علاج۔ دراصل اسکی بد وضعی کی ایک کوفی وجہ دریافت نہیں ہوئی۔ باوجود بے حد مقدار پر ٹاسیم آئیوڈائیڈ وغیرہ کے چہرہ اور پاؤں بڑھتے جلتے ہیں۔ ایکسپلین اسکے در کو رفع کرنے میں مفید ثابت ہوئی۔ مختلف علامات اور ٹیگ ایف کا دفعہ کیسے رہنا عام طاقت اور صحت کو قائم رکھنا۔ بسلیس قدر علاج اسکا کافی ہے۔

ایکسا سٹورس Ecsostosis
ایکس آفٹھمیک گائٹر Exophthalmic Goitre
ایکسٹرا یوٹراین فیٹیشن Extra Uterine Foetation
یہ پانچ طرح سے ہوتا ہے جو ذیل سے صاف ظاہر ہے۔

- (۱) سیویل۔ اسپیں اووم فلاوین ٹیوب کے اندر قائم ہو کر بڑھنا شروع کرتا ہے۔
 - (۲) ایڈامیٹل۔ اسپیں اووم جوف شکم کے اندر قائم ہو جاتا ہے۔
 - (۳) اوویرین۔ اسپیں خاص اووری کے اندر اووم قائم رہتا ہے۔
 - (۴) دو خانہ رحم کے ایک خانہ میں قائم ہو جانا
 - (۵) ہرنیل۔ یعنی کسی ہرنیا کی تھیلی میں ہو چکا اووم کا قائم ہو جانا۔
- رحم سے باہر حمل قرار پانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نرل یا شیخ یا ورم یا رسولی یا خا۔ جی دباؤ کی وجہ سے فلوئین بند ہو کر اووم کا رحم کی طرف آنا دشوار ہو جاتا ہے تب حمل یافتہ اووم یا تو انٹین میں رکا رہتا یا فلوئین ٹیوب میں یا پیٹ کو علم جوف میں گر جاتا ہے۔

ٹیوبل قسم کا خاتمہ اس طرح ہوتا ہے کہ جوں جوں اووم بڑھتا جاتا ہے توں توں لی جتی ہوتی جاتی ہے۔ آخر کار دو تین ماہ تک یہ نالی پھکنے کی بکثرت خارج ہو جاتا ہے اس طرح ورم ہو کر اووم مردہ ہو جاتا ہے۔ کبھی جوف شکم میں کسی جگہ پیوست ہو کر بڑھتا رہتا ہے کبھی براڈ لیگنٹ کی تہوں میں جا قائم ہوتا ہے۔

جب دو خانہ رحم کی ایک خانہ میں اووم قرار پذیر ہوتا ہے۔ اسکا خاتمہ بھی عموماً اسی طرح ہوتا ہے علامات۔ بہتان حیض اور نرم رحم کے متعلق جو علامات حمل ہوئی ہیں وہ سب نمایاں ہوتی مگر شکم ایک جانب

زیادہ بڑھتا ہے حیض کے بند ہونے پرستان کے بڑھنے اور فم رحم کے بند ہو جانے سے قویہ ظاہر ہوتا ہو کر گل
ہے مگر مقدار فرج میں جو انگشت داخل کجاویں تو صم خالی اور اس کے ایک طرف کو بڑا و معلوم ہوتا ہے جب خلونین
پھٹتا ہے تب نہایت ہی شدت کا درد فضا ہو کر مریض نہ ٹال پڑ جاتا ہے اور بعد میں پیری ٹونائٹس
کی علامات شروع ہو جاتی ہیں۔

ایڈامی نل قسم جس جگہ اودم نکلتا ہے اسی جگہ ورم پیدا ہو کر پنے گرد ایک غلاف بنالیتا ہے اسکا انجام کسی
ہوتا ہے اول کہی تو سٹ شروع میں بھٹ جاتی اور کبھی پوری میعاد کے بعد تب خون جاری ہو کر
اودم مردہ ہو جاتا ہے دوا کہی خون کافی نہ پہنچنے کے سبب پہلے ہی اودم مردہ ہو کر خشک ہو جاتا
یا اوہیں چربی پڑ جاتی یا چونہ پڑ کر پتھر سا بن جاتا ہے سیوا م کہی مردہ ہونے کے بعد سٹ جانا اور متعفن مہم
کے سبب حاملہ کی ہلاکت کا موجب ہو جاتا ہے۔ چھارہ کیسی اودم میں پیپڑ کر لٹکا پھوڑا بنا دیتی ہے
جو دیوار شکم یا روده یا فرج یا مثانہ کے اندر منہ کر کے پتھر بنتا ہے۔ ساتھ ہی اودم کے ٹکڑے یا جھپٹے
خارج ہوتے رہتے اسطرحیہ اسکی صفائی ہو کر مریض بچ جاتی ہے اور کبھی کثرت پیپ سوزا ایل
ہو کر مر جاتی ہے۔

ایکسیسی - Ecstasy وجد - حال - یہ ایک ماغی مرض ہو جس میں مریض کا خیال کسی ایک شے کی طرف جما
ہے اور حرکات و سکنات بمعنی طور کے ہو جاتے ہیں عورتوں یا ایسے مردوں میں یہ مرض ظاہر ہوتا ہے کہ تہجد اور
نہد کی زندگی بسر کرتے ہیں جو ان باکرہ یا بیوہ عورتوں میں حیض کے فسادات بھی ساتھ ہو جاتے ہیں بمعنی
نظارہ دکھائی دیتے جو مریض کو از خود رفتہ کر دیتے ہیں بعض اوقات یہ تمام حالت بناوٹی ہوتی ہے دورہ کو وقت ہوش و حواس
زایل ہو جاتے ہیں بعض اوقات کل جسم میں تشنجی حرکات ہوتی ہیں جو مرگی یا اختناق الرحم کے مشابہ ہوتی ہیں۔
کبھی شدت جذبہ کی حالت میں مریض سرلانے یا اوچھلنے کو دے یا نا چنے لگ جاتا ہے۔ فی الحقیقت یہ ہسٹیریا
یعنی اختناق الرحم کا ایک شعبہ ہے۔

علاج - اسکا علاج صرف اسقدر ہے کہ مریض کو سچے بزرگوں و پرار ساؤں کی خدمت میں کھا جاوے
ہسٹیریا کی علامات اور شکایات کا مناسب طور پر علاج کیا جاوے اور جو خاص اسباب
معلوم ہوں انکا ردیہ۔

ایکلیپسیا Eclampsia اس کے اور کنواشن کے اب ایک ہی معنی لئی جاتے ہیں کنواشن کا بیان دیکھو
ایکلیپسیا پرنینٹی Eclampsia of Pregnancy پرنینٹی کے امراض کا بیان دیکھو
ایکلیپسیا Acne مہاسہ کیل نکلتا۔ اگر محض ایک دو پھنسیاں چھو پر نمودار ہوں تو صرف اسقدر کافی
ہے کہ ایک ایڈہیزو پلاسٹریا یا پلاسٹریا کو بیل پلاسٹری ایک کٹرن پھنسی کی برابر کاٹ کر اس پر لگا دی جائے
یا کاسٹک لگا دیا جاوے تو ایک دو روز میں آرام ہو جاوے گا۔ لیکن اگر پھنسیاں نمودار ہوتی ہوں تو داخلی اور خارجی

قواعد حرب فی کل ضروری ہر۔

راہِ داخلہ تندرستی کی کچھ معطلی نہ لگے اور مہلک کی چیزوں سے پرہیز کرانیں حیوانی غذا میں سے سب
مہلک اور شراب میں بھی احتیاط لازماً ہے شروع میں سب مہلک دین اور بعد میں کہ جسم ٹھیک ہو گیا
گندک، آسنک، بروما، زعفران، سنبل، دیوہ، یتیم، کورڈون، و غیرہ معطلی کرانیں معدودہ اسی
جگہ اگر وہ ان کے متعلق کوئی شکایت ہو تو اسی علاج کریں۔

کیوریس کلیمیس *Corus clamus* ہندی میں لگو راجا کہتے ہیں تھوری مقد

پوریا نامی دریا کا ایک بڑی سیل پیدا ہوتا ہے۔
 بھاری میں اسکو گوراوا جاکتے ہیں تھوری مقدار
 میں خوشبودار۔ محرک۔ مخرج ہایح اور مغوی ہے۔ یہ درہ مقدار میں متا ہے۔ بطور قیاس و مخرج استعمال
 کیا جاتا ہے۔ مخرج صفوف و جریگا کہہ سکتے۔ اگر کین تک۔ نو ذرا سرگت ہے۔ بہ ہر ذرا تک۔

<p>میں بھاتیسیا۔ نارنگا کسی مقام پر لگا سے اعصاب حتیٰ یہ اپنا اثر کر کے سنسٹ بہت پیدا کرتا اور اس جگہ کے احساس درد اور حرارت کو کم</p>	<p>Aconitum Ferox Aconitum Napellus Aconitina Aconitia</p>	<p>کیونانی ٹم فیئرکس کیونانیٹیم فی سٹیس کیونیٹینا کیونیشیا۔</p>
---	---	--

لیکونی ٹینیسی اولی ٹم Aconitinae Oleatum

درجہ مفصل میں بطور نمٹ اولی ٹم یا انٹینٹ استعمال کرتے ہیں۔ انکھ کے قریب اسکے استعمال میں
بایت احتیاط لازم ہے۔ ورنہ جذب ہو کر زہر کی علامات پیدا کر سکتا ہے کھلانے سے معدہ بردرد اور
دش ہو کر دل تھلنے لگتا ہے جتنی مقدار میں نبض کی طاقت حرکت اور ٹینشن کو کم جلد کو سرخ اور
سینہ و پیٹاب کی مقدار کو زیادہ کر دیتا ہے۔ زیادہ مقدار میں دینے سے تمام بدن پر سنسناہٹ
نیوٹریوں کا رنگنا اور جھنجھناہٹ وغیرہ مختلف احساس معلوم ہوتے اور آخر کار حسن بنیانی و شوہوانی
ہوش ناسد یا زائل ہو جاتے۔ دوران تنفس سست۔ قوت حرکت ضعیف اور حرارت غریزی کم
ہو جاتے ہیں۔ القصہ ایکونائٹ مضعف دوران تنفس رمعرق۔ مدر اور کم کنندہ حرکت و حس حرکت
ہے اسکے مختلف اقام درد و بخار میں نہایت مفید ہے۔ ایکوٹ ٹائفلائٹس۔ بردنٹائٹس۔ پلیوری
ورم میں درد و بیقراری۔ بخار اور سوزش کو فوراً کم کر دیتا بعض اوقات مرض کو روک بھی دیتا ہے لیکن
العموم اور امراض قلب میں علی الخصوص اسکا استعمال نہایت احتیاط کو ساتھ کرنا چاہیے بہتر یہ ہے کہ ایک
قطرہ اسکے ٹیکر کا پندرہ پندرہ منٹ کو بعد دیا جائے اور اسکے تالیخ پر برابر نظر رکھی جاوے۔ ورنہ

دندان۔ دودھ۔ اختلاج القلب۔ اجماع نافر۔ درج مفصل۔ صدار۔ اور دروہا میں مفید ہے۔ صخر سفوف چٹے۔
 اگرین تک۔ کسٹراکٹ پم گرین سے اگرین تک۔ ٹیکر اونیٹ ایک سو ۵۰ بونڈ تک۔

ایکیشیا گمی **Acacia Gumme** کیکر کا گوند۔ صمغ عربی۔ اسکی تاثیرات ٹریگولنٹھ کو شاہ ہیں۔

اسکا بیان دیکھو۔ اسکا یوسلج ہمیشہ نیا بنا کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ صمغ میوہ پلج اور رام سے ۴ درام تک

ایکیشیا ٹی نوکارس **Acacia Stenocarpuz** اسکے پتوں میں سے ایک

جو ہرٹی نوکار میں نام لکھا ہے۔ جو نہایت عمدہ آستھی تک بی۔ دو فیصدی حل کر کے دو قطرہ ڈالنے آنگھ کو کوبین کیلچر
 بے حس کر دیتا ہے۔ پندرہ منٹ میں تیلی کو پھیلا دیتا ہے۔ تاکہ کے ڈیلہ کی ٹینشن کو کم کرنا اور سلیے کلا کو مایں مفید ہے۔ بطور
 بر لگانے سے بھی مقامی بے حس پیدا کر دیتا ہے۔

ایکیموس **Ecchymosis** اسکا علاج صرف اسقدر ہے کہ مقام مضروب کو گرٹا اور ہوا سے محفوظ رکھا جاوے۔

ایکیوپنچر **Acne puncture** یہ طریق علاج جلدی پچکاریوں۔ ماشوں اور پیسٹروں کو مقابلہ میں سچ

ہو گیا ہے۔ قدیم زمانہ سے اسکو دروہوں میں استعمال کرتے ہیں۔ دروہ کو اور عرق النساء میں بہت مفید ہے۔ طریقہ عمل
 ہر طرح ہے کہ ایک ویار یا زیادہ سونیاں جنکو دستہ لگو ہوئے جوتے ہیں ایک رولچ گہری مقام دروہا صکر عصب
 ماؤف کو مقابل چھو دی جاتی ہیں اور نصف گھنٹہ تک اندر ہی رکھ چھوڑتے ہیں۔ کیونچہ سے یہ بھی مراد ہوتی ہے
 کہ ہانڈ رول گینچیں ہائیڈریڈسٹ آف سی اور وغیرہ میں سونیاں داخل کر دیاویں تاکہ انکا پانی خارج ہوتا ہے۔

ایکزیما **Eczema** چنبل چھا جن۔ اسکا علاج اکثر نہایت وقت طلب ہوتا ہے۔ کوئی دوا اب تک

یقینی اور اعتباری ثابت نہیں ہوئی۔ اصول علاج ہر اطبا کا سخت اختلاف ہے۔ اگر مفصل اسکے علاج پر بحث کی جاوے
 تو ایک علیحدہ جلد بھی کافی نہیں ہو سکتی اور نہ اس تمام بحث کی کچھ عملی فائدہ متصور ہے پس ہم مختصر طور پر ذیل میں اسکے
 علاج کا ذکر کرتے ہیں۔

اول داخلی علاج۔ خوراک سادی اور زود مضہ ہونی چاہیے۔ دودھ جاول برفیہ نمبرشت ٹنڈس۔ گھیا۔

لکڑی کرلیہ۔ تورئی وال ہر قسم کی پیاز۔ وصینا استعمال کر سکتے ہیں۔ گوشت مچھلی شراب۔ ہر قسم کی چینی۔ آچا
 اور تمام تیز مصالح اور غذاؤں میں احتیاط لازم ہے کہ پچھلے بھی نہ کھانے چاہئیں۔

اگر مہرہ۔ معاجز و گردہ وغیرہ کے متعلق کوئی فساد ہو اسکا دفعیہ حب حال کرنا چاہیے۔ اگر زبان میلی ہو تو کبھی بجا
 شام کے وقت بلبل اور صبح کو میکینیشیا سلفاس اور سوڈی ہائی کارب دینا مفید ہو گا۔ اگر رقت وقت خون ہو

تو بل فیری نہایت مفید ہے۔ دفع بے خوالی کے لیے سلفوئیل سب سے بہتر ہے۔ افیون۔ مارفیا۔ اور کلورل اس

مطلب کو لیے نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ ہائیڈو فاسفائٹس۔ فاسفٹس۔ آیوڈائڈز۔ کلورٹ آف پوٹاسیم

آئرس ورسی کو لڑکھیم سلفائڈ۔ ٹریٹائین کو پا پو استعم۔ سرب فیری آیوڈائڈ کا ڈولرائیل۔

آرکسین سکیا۔ ان پمیل علی صبر ہے لیکن اسکی نسبت یہ امر قابلِ دوشت ہے کہ اگر وہ جلد میں رکت نہیں دینا چاہئے

حقد رہے مرض پُرانا پُرکشتی پر آتا ہے اسقہر سنگھیا زیادہ فائدہ کرتا ہے۔
 اگر طبع سخت اور خشک ہوتی ہو تو پانی لوکا پین کی جلدی پکپکاری مفید ہے۔
 بجلی کا کنٹی نو اس کرٹ بھی اکثر حالتوں میں مفید ثابت ہوا ہے۔

دوم خارجی علاج۔ یہ یاد رکھو کہ اگر نیا کے واسطے کوئی دوا مخصوص نہیں ہو۔ ایک دوا جو بعض کو نہایت فائدہ دیتی ہے۔ دوسرے مریض کو سخت نقصان کر دیتی ہے۔ اسوجہ سے اسکے علاج میں سخت حیرت اٹھانی پڑتی ہے اسکے مختلف علاج میں ادویہ مختلف مفید پڑتی ہیں پس تمام کامیابی کا یہی۔ اذہے کہ خیر کیفیت اگر نیا کے ساتھ ساتھ ادویہ بھی بدلتے جائیں۔

اکیوٹ اگر نیا میں بے خراشل ورمسکن ادویہ استعمال کرنی چاہئیں مثلاً (۱) ویس لین۔ لینولین۔ مکھن۔ بالائی گھی۔ روغن بادام۔ روغن زیتون۔ روغن الہی۔ بورک آئینٹ۔ زنک آئینٹ۔ (۲) سادہ لوشن جیسے بورک لوشن۔ لیڈ لوشن۔ یہ لوشن لٹ میں چھو کر لگانے چاہئیں اور لٹ کو برابر تر رکھیں۔

(۳) سفوف چھڑکنا مثلاً اراروٹ۔ ہسمتھ۔ کاربونا۔ بورک ایڈ۔ زنک آکسائیڈ۔ میگنیشیا کاربونا۔ چاک آرد۔ برنج۔ لائی کو پوڈیم۔ انہیں سے فروزہ آیتین چار ملا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر زیادہ ہو تو کافی اور اس کے حساب سے ملا دینا مفید ہوگا۔

(۴) پست یعنی لیٹی کے طور پر ادویہ بنا کر اسکا پک کر دینا۔ انہیں مریموں کی نسبت یہ بہتری ہے کہ جذب کی رطوبتیں اگلی نیچے جمع نہیں ہوتی بلکہ برخلاف مریموں کے انہیں جذب ہوتی جاتی ہیں۔ مثلاً لین۔ (۱) ویس لین۔ (۲) انکس۔ نشاستہ ایکل و انس۔ زنک آکسائیڈ ایکل و انس۔ سیلک ایڈ۔ م گرین۔ (ب) زنک آئینٹ ایکل و انس۔ اکتھیال یا سیلک ایڈ حب انداز۔

کرنک یعنی پرانے اگر نیا میں اول بخراش اور مسکن اور بعد میں سی موئیٹنگ ادویہ استعمال کرنی چاہئیں۔ ال۔ مرکبات پارہ و سکے مختلف صورتوں میں استعمال کی جاتی اور نہایت مفید ثابت ہوئی ہیں۔ سب عمدہ مریم پرانے اگر نیا میں یہ ہے۔

لائکوار کاربونس ڈر جینس ایک ڈرام۔ ہائیڈر جرائی امیوینے ٹا۔ اگرین۔ لینولین ایکل و انس۔ اگر رطوبت زیادہ خارج ہوتی ہو تو اسمیل ایکٹ رام لائکوار پلہائی ملا سکتے ہیں۔ لائکوار کاربونا کی بجائے کری ڈوٹ یا کاربالک اینڈیا نیفٹے لین ملا سکتے ہیں۔ تمام ادویہ اور طریقے اچھے جو اکیوٹ فارم میں بیان ہوا وہ کرنک میں بھی کر سکتے ہیں۔ مفصلہ ذیل مریم لپ اور لوشن وغیرہ بھی مفید ہیں۔

مریم گندک۔ ایک ڈرام فی انکس کا۔ مریم پازوگیلک ایکٹ پ ڈرام فی انکس۔ کرنائی سو فینگ ایڈوہ اگرین فی انکس۔ گلسیرین آف ٹینین ایو کے پشال یا تھائی مال (دھ اگرین فی انکس)۔

رسارسین ایک ڈرام فی اونس۔ آئو ڈوفارم یا آئو ڈول۔ اگرین فی اونس۔ کاسک لوشن ۲۰ گرین فی اونس کا زیادہ تفصیل کے لئے دیکھو بیان مفصلہ ذیل ادویہ کا۔

ایڈ بورک۔ ایڈ کیمفورک۔ ایڈ کرائی سو فینک۔ ایڈ گاسے نوکار ڈک۔ ایڈ فاسفورک۔ ایڈ پیکرک۔
اینتھری روین۔ اینٹی فیرین۔ آرکسٹل۔ ایو کے پٹین۔ اکتینال۔ آئو ڈولڈ آف بیریم۔ آئو ڈوفارم۔ اولیوٹم
ایو منائی۔ اولیوٹم کیڈمیائی۔ اولیوٹم ہائڈر جرائی۔ اولیوٹم نکل۔ اولیوٹم لمبیائی۔ اولیم کیڈ۔ اولیم ڈیلمینی۔
اولیم کال تھیری۔ اولیم سینٹی ٹاس۔ بربرس اکوی فولیم۔ بیٹا نقضال۔ یکس لکویڈ۔ پوٹاسی بائی کروماس
پوٹاسی کنوراس۔ تھیال۔ تھائی مال۔ ہیما سیس ہیری لین۔ ہائڈرکسٹس۔ ہائڈروکونائیل۔ رسارسین
رموس ٹاکس کوڈنڈرن۔ سیلی سین۔ فری پرکلورائڈ کنیل۔ جیبر۔ گلیسنیم لمبیائی۔ سب الیوٹس۔ لینولین
نیفٹھ لین۔ یوسٹی لیگو۔ وینولیا۔ وائی یولا ٹرائی کلر۔

ایلاؤس۔ انٹائیل آبٹرکشن کا بیان دیکھو۔

ایلم۔ پچھکوی۔ خرم ۵۔ اگرین تک۔

ایمبا لزم۔ Embolism جب کوئی ٹھوس چیز بڑی شریانوں کے خون کے ساتھ بھرتی ہوئی کسی
جھوٹی شریان یا عروق شریہ میں رکباتی ہو تو اسکو ایمبا لزم کہتے ہیں۔ اسکی وجوہات حسب ذیل ہوتی ہیں۔
دل وریڈ یا شریان کے کسی حصہ میں ورم ہو کر خون بچھد ہو جانا۔ جب اسطرحے کسی حصہ میں خون بچھد ہو جائے
تو اسکو تھرامبوس کہتے ہیں۔ اس بچھد حصہ کا ٹکڑا ٹوٹ کر خون کے ساتھ چلا جانا اور کسی جھوٹی شریان
یا وریڈ یا کیپیلری میں رکبانا ہے۔

(۲) قلبی کو اثر یوں پر سبب ہونے والیوں کا ٹوٹ کر چلے جانا۔

(۳) کسی رسولی یا ادویہ کا ٹکڑا جو کسی شریان کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔

رج۔ غیر جنس شے کا خون کے اندر داخل ہو جانا۔

جب کسی شریان کا ایمبا لزم ہو جاتا ہے۔ تو اپنے قسم کی علامات و نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ اول جس حصہ یا عضو
میں وہ شریان خون پہنچاتی ہے۔ اسکا خون بند ہو کر فسادات ظاہر ہونے میں۔ مثلاً آنکھ کی شریان اگر ایمبا لزم
ہے۔ نظر فوراً جاتی ہے۔ کان کے شریان کے ایمبا لزم سے شنوائی جاتی ہے۔ دل کے ایمبا لزم سے بیہوشی یا
تشنج یا فالج کی علامات ظاہر ہو جاتیں۔ دماغ کے کسی حصہ یا زہریلے مادہ کا ایمبا لزم ہے تو ورم ہو کر
پپ پڑ جائے اور زہریلی قسم کی سوزش ہو جاوے۔ سیدھام اگر بڑی شریان رک گئی ہے تو خون بند
ہو کر وہ عضو مردار پڑنا شروع ہو سکتا ہے چھاسام اگر کسی جھوٹی شریان کا ایمبا لزم ہو جاوے دوسری شریانوں
کے رستہ کو کافی خون پہنچ سکتا ہے۔ اور اسکا مادہ بعض خیر یا زہریلے نہیں ہو تو کوئی علامت ظاہر
نہیں ہوتی۔ پیچھد مادہ حصہ میں اجتماع خون ہو کر خون خالص ہو جانا اسکو ہیپوریک انفارکشن کہتے ہیں۔

یہ حصہ بعد میں فاسد ہو کر سخت لیشوں میں بدل جاتا ہے یا خشک ہو کر اوس میں چونہ پڑ جاتا ہے۔ یا گلہری کی تھلی بن جاتا ہے۔
 علاج مطابق سبب علامات موجود ہو سکے علاج کرنا چاہیے۔ دیکھو ایملیوپٹیکسی کا بیان
ایمبریالٹومی Embryotomy جب پیدوی بہ وضعی یا رسولیوں کی وجہ سے بچہ کا سامہ پیدا
 ہونا محال ہو جائے تو اسکے ٹکرے کو کے نکلنے کو ایمبریالٹومی کہتے ہیں۔ اسکے دو طریق ہیں ذی کہنی ٹیشن اور
 ایوسریشن یہ تفصیل کے ان طریقوں کا بیان دیکھو۔

ایملی اوپیا Amblyopia اس سے مراد وہ نقص بصارت ہے جو خاص آنکھ کے عصبی
 ریشوں کے متصف۔ ظاہر ہو۔ اسلئے یہ عموماً ایک آنکھ میں ہوتا ہے ظاہراً دیکھنے میں آنکھ بہ طریق صحیح
 و سالم نظر آتی ہے مگر نظر بہت خراب یا بالکل ذلیل ہو جاتی ہے۔

علاج۔ اسکا علاج عام مقویات مثلاً سٹرکینا، آرسنک آئرن کونین اور پابندی اصول حفظ صحت کر
 کرنا چاہیے۔ جڑ پڑی پر پلٹے ریٹین یا رانی کا پلٹر لگانا بعض اوقات مفید ہوتا ہے۔
 ایمپائی ماسینہ کو اندر پیچ جانا۔ احتباس المده فی الصدر۔ دیکھو بیان پلیوریسی کا۔

ایمبی لیا رانی بیز Embelia Ribes برج قبالی۔ بابرنگ۔ بابرنگ کا بیان دیکھو
ایمپائما Empyema پلیوریسی کا بیان دیکھو۔

ایمپوشن Amputation کسی عضو کے قطع کرنے کو ایمپوٹیشن کہتے ہیں بیشتر
 عام ایمپوشن کو بیان علیحدہ علیحدہ طور پر کیا جاوے پہلے ہم عام ضروریات کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔
عام ہدایا۔ (۱) اوپرین شروع کرنے سے پیشتر تمام ضروریات مثلاً اوزار، لوشن، ٹیگس، کاتر
 سوچر، ڈریسنگ۔ اور معاون وغیرہ کو تیار کر لو اپنے اور معاونوں کے ہاتھوں تمام اوزاروں اور معاون
 اوپرین کو کمال طور پر صاف اور اینٹی سپٹک کر لو (۲) چاقو پکڑنے کے دو طریق ہیں اول جیرے کے
 واسطے اسطرح پکڑو کہ دستہ کا سر اینٹیلی کے ساتھ اسکی پشت سبابہ اٹلی کے نیچے اور خود چاقو کا پھل انگوٹھے
 اور باقی انگلیوں کے درمیان خوب مضبوط قائم رہیں اور ایسا معلوم ہو کہ چاقو گو یا کہ انگشت سبابہ کا ایک
 حصہ ہے۔ دوم تراش کے وقت چاقو کو قلم کے طور پر پکڑو۔ (۳) ہمیشہ جیر اپنی طرف دیتے اوکھی اپنی طرف
 سے دور کی جانب مت لیجاؤ۔ (۴) اوپرین کے وقت ہرگز جھکنا نہ چاہیے (۵) میز کے قریب ٹائیوں
 کا ہجوم اور شور و غل نہ ہونے دو۔ اس سے ہماری توجہ پریشان ہونی رہیگی (۶) چیر دیتے وقت پہلے چاقو
 کو عموداً رکھو اور پھر ترچھا کر لو۔ پچے کے اختتام پر پھر چاقو کو عموداً کر لو اس سے یہ مطلب ہو کہ جیرہ سر و پیر
 گاؤ دم نہ ہو جاوے۔

بلحاظ فلیپ کی تین اقسام ہیں اول جلدی فلیپ۔ یہ پوسے گول یا کم و بیشی طور پر
 لیئے جاسکتے ہیں۔ اس لحاظ سے اسکی دو اقسام ہیں سرکلر اور موڈی فائڈ سرکلر دوام ٹرنیز فلیپ

سوام خاص خاص طرح کے فلیپ مثلاً شوپاٹ - ہوا ریشل کی دستکاریوں میں چونکہ انگلی تقبیل
تمثیل ذیل میں کافی طور پر ہو جاوے گی اسلئے عام بیان میں زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں۔

اول پاؤں کی انگلیاں درمیان سے قطع کرنا۔ اس عمل کی شاذ و نادر ہی ضرورت پڑتی ہے۔ ہاتھ

انگلیوں کی طرح اونکواؤ پر سے نیچے کی طرف یا ٹرنس فلکشن سے بطریق فلیپ قطع کر سکتے ہیں۔

دوم پاؤں کی انگلیاں جڑ سے قطع کرنا۔ اس عمل کے لئے ہمیشہ اول طریق اختیار کرنا چاہیئے تاکہ پاؤں

کے تلوؤں میں شکاف دینے کی ضرورت نہ پڑے یا درکھنا چاہیئے کہ جوڑ وصل انگٹ سو قریباً اسقدر قاعده

برہوتاہے کہ جسقدر انگشت کا طول ہے۔ اگر انگوٹھے کے جوڑ سے ایک سیدھا آڑا خط پاؤں پر کھینچا جاوے

تو وہ تمام انگشتاے کے جوڑوں کا رہنا ہو سکتا ہے۔ جبکہ درمیان انگٹ کو قطع کرنا ہو تو ہر دو جانب کی

انگلیوں کو زور سے بذریعہ پٹی یا فیتہ وغیرہ کھینچ کر علیحدہ رکھیں اور نیز خرم دیں تاکہ جوڑ خوب نمایاں ہو جائیں

اور دستکاری کے لئے کافی گنجائش ہو سکے۔ انگوٹھا قطع کرنے میں یہ امر قابل یادداشت ہے کہ

میانارسل یون آف ہی گریٹ تو کار بہت بڑا ہوتا ہے اسلئے اسکے انقطاع میں اکثر غلطی واقع ہو جاتی ہے کہ جلد انداز

سے کم رہ جاتی اور اندمال زخم میں وقت واقع ہوتی ہے۔ اسکے جلدی شکاف میں یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیئے

کہ پہلے سیدھا شکاف تمام جوڑ سے قریباً ایک انچ اوپر شروع کر کے پہلے پور کے نصف تک لیجاویں بعد ازاں

بیضوی شکاف انگوٹھے کے گرد انٹر فیلنجیل جوڑ تک دیں۔

سوم پاؤں کے انگوٹھے کی میانارسل ہڈی کا قطع کرنا۔ اسکے دو طریق ہیں۔

اول طریقہ فلیپ اول اور دوم میانارسل ہڈی کے درمیان اور انکی جڑوں کے پیچھے ڈاڑسم پر چاقو داخل کر

انداز کی جانب وصل پاکو مقابل تک شکاف دیں۔ پھر میانارسل ہڈی کے متوازی تلوے کو اندر داخل کر کے

اسکے ساتھ ساتھ تمام ساختوں کو قطع کریں بعد ازاں اس تمام فلیپ کو ہڈی کے ساتھ ساتھ قطع کر لے اٹھا دیں

ہڈی کھینچ مروڑ کر جوڑ کے رباط وغیرہ باہر کی چاقو کے ساتھ کاٹ ڈالیں اور ہڈی کو علیحدہ کر دیں۔

دوم طریقہ اول میانارسل ہڈی کے قاعدہ کے پیچھے سے ڈاڑسم پر شکاف شروع کر کے وصل پاکو

اور اس جگہ سے بیضوی شکاف انگوٹھے کی پہلے پور کے گرد لیجاویں۔ اندر دنی جانب سے شروع کر کے بیرونی

جانب کی طرف تمام ساختوں کو ہڈی پر سے اٹھاتے جائیں۔ آخر کار ہڈی کو کھینچ مروڑ کر اور رباط قطع کر کے

جوڑ سے علیحدہ کر دیں۔ اس طریق میں یہ بہتر لائیے کہ پاؤں کے تلوے میں زخم نہیں ہوتا۔

چہارم پاؤں کی چھوٹی انگلی کے مٹاؤس کا قطع کرنا۔ اسکے لئے اول طریق موزون ہے۔

یہ طریقہ کل کے پیچھے سے شکاف شروع کر کے چہارم وصل پاکو لیجا کر بیضوی شکاف پہلوؤں کے گرد دیں

بعد ازاں تمام ساختیں ہڈی کے ساتھ ساتھ بیرونی جانب سے شروع کر کے اندر کی طرف اٹھاتے لیجاویں

آخر کار ہڈی کو کھینچ مروڑ کر اور رباط قطع کر کے جوڑ کھول دیں اور ہڈی کو علیحدہ کر دیں۔

پنجم۔ پاؤں درمیان سے قطع کرنا۔ باہر کی طرف میں آف می فختہ مینا مارسل کی ٹیوراسٹی پر اور اندرونی جانب کے مقابل یعنی ٹیکٹینٹیو برکسٹی سے پٹہ اچھڑانے کے دو نقاط قائم کرو اور اسے دو اچھے تک لمبا چیر اٹھا اور انگلیوں کی طرف دیکھ کر تمام ساختیں ہڈیوں تک گہری اٹھا لو بعد ازاں اگر کنسٹرنگک اوپریشن کرنا تو تمام مٹا مارسل ہڈیوں کو خوب زور سے کھینچ اور مروڑ کر اور نسون اور پٹھوں کو چاقو سے کاٹ کر زیریں فلیپ انگلیوں تک لا بناؤ ٹینٹکشن یا ڈسٹیکشن سے کاٹ لو۔ اور اگر ہیز اوپریشن کرنا ہے تو مٹا مارسل ہڈیوں کو بیکس قریب آری سے چیر کر آئینہ سے زیریں فلیپ طیارہ کرو۔

ششم۔ ٹیوراسٹ ایمپوشن۔ اندر کی طرف ٹیکٹیفٹہ ٹیوراسٹی اور باہر کی طرف ایک مقابل یعنی بیرونی کی نوک اور پانچویں مٹا مارسل کی میں کے درمیان دو نقاط قائم کر دو اچھے لمبا چیر اچھے کی طرف دیکھ کر تمام ساختیں ہڈیوں تک گہری اٹھا لو بعد ازاں ہڈیوں کو خوب زور سے کھینچ اور مروڑ کر نسون اور پٹھوں کو قطع کر کے زیریں فلیپ ٹینٹکشن یا ڈسٹیکشن سے کاٹ لو۔

ہفتم۔ ٹخنہ کا ایمپوشن۔ اسکو دو طریقے اوپریشن ہیں۔ اول۔ سائیم صاحب کا۔ اس میں باہر کی طرف بیرونی ٹخنہ کی نوک پر اور اندرونی طرف اسکی مقابل یعنی اندرونی ٹخنہ سے پٹہ اچھے اور بیچہ کی طرف دو نقاط قائم کر کے ایڑی کے گرد قریب نصف اچھے چھپے کو بائل ایک ٹکاف لیجاؤ اور ہیطرح دونوں قاطکو درمیان اور ہر کبھی ٹکاف باؤ اور ایڑی پر سے تمام ساختیں تراشاؤ اور ٹڈوایکلیئر کو بھی کاٹ دو بعد ازاں پاؤں کو کھینچ کر مروڑنے اور نسون و پٹھوں کو چاقو کے ساتھ قطع کرنے سے پاؤں علیحدہ ہو جاوے گا رتب فیو لا اور ٹیمیا کی اتصال سطحوں کو آری سے چیر کر دو رو کر دو واپدیاں ٹکاف صاحب کا اوپریشن اس میں ہر دو ٹخنوں کی نوکوں کے درمیان ٹکاف ملائے جلتے ہیں اور زیریں ٹکاف قریب نصف اچھے اگلی طرف کو بائل کیا جاتا ہے تاکہ اس کیس کی چیری ہوئی سطح میں مطابق ہو جاوے۔

ہشتم۔ ٹانگ کا ایمپوشن۔ اس کے تین طریقے ہیں۔ اول۔ جالے انتخاب پر۔ یہ اوپریشن زانوسے ایک ہاتھ کی جوڑائی کے قریب پنچو کیا جاتا ہے دو نقاط ایک سائے اور ایک پٹھو قائم کر کے ڈھانی اچھے بلے محراب ٹکاف دونوں طرف دے جلتے ہیں تب جلدی ہلالی فلیپ مقام ایمپوشن تک اٹھا کر اس سے نصف اچھے نیچے گوشت میں گول ٹکاف دیتے ہیں۔ بعد ازاں تمام گوشت کھینچ کر مقام ایمپوشن تک ہڈیوں کو صاف کر دیتے ہیں تب انٹر سس ممبرن کو چاقو سے پہلے ایک طرف اور بعد میں دوسری طرف کاٹ کر ہڈیوں کو آری سے چیرتے ہیں۔ یہ خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ فیو لا پہلے کٹے۔

دعا مرٹیل صاحب کا اوپریشن۔ جس مقام پر ایمپوشن کرنا ہو اس جگہ کا معلوم کرو اور ایک نصف کی برابر لمبا چوڑا یعنی مربع فلیپ سامنے کی طرف دو قاطب جائیں پر قائم کر کے اٹھاؤ۔ اور اسے قید چوڑا لیکر اس سے چوتھائی لمبا پٹ کے جانب فلیپ اٹھاؤ اور تمام ساختیں کو ہڈیوں تک فلیپوں میں شامل کر لو۔

عام ایمپوشن تک فلیپ اٹھا کر پہلے انٹر سیس نمبر میں جب قاعدہ بالانکٹ کر بیڑیوں کو آری ہو چیر لو
سوا صر عام طریق جس میں سامنے کا فلیپ لمبا اور پشت کا فلیپ چھوٹا لیا جاتا ہے۔ اس کا عمل
ٹیل صاحب کے مطابق ہو لیکن اس طرح ناپ نہیں لگے جاتے۔
مختص گھٹنے کا ایمپوشن اسکے پانچ طریق ہیں۔

اول کارڈیڈ ایمپوشن۔ اس میں مقصود یہ ہے کہ گھٹنے سے اوپر فیر کے کنٹریکٹس ٹن میں کوٹا ٹانگ کا
ویکاو۔ دونوں فیر کے کنڈائلوں سے اوپر دو نقاط قائم کر کے ایک خمدار شگاف ٹیو برکل ٹی بی تک دو اور
تھام اساتین پیٹلا سے اوپر چھیلے ہوئے فلیپ کو اٹھا لو۔ پھر پچھلا فلیپ سامنے کے فلیپ سے نصف لمبائی
میں ٹرنس فلشن سے کاٹ لو۔ تب فیر کا زبرین سر اصراف کر کے تمام اتصالی سطح آری کی کاٹ کر دور کر دو۔
دوم مگر ٹی جیڈ ایمپوشن۔ یہ تمام اوپر لین کا ڈیم کی طرح ہے۔ صرف فرق اس قدر ہے کہ سامنے کو فلیپ میں
پیٹلا بھی شامل کر لیتے ہیں۔ پس کنڈائلوں کے اوپر دو نقاط قائم کر دو۔ اور ٹیو برکل ٹی بی تک خمدار شگاف
دیکر پیٹلا سمیت سامنا فلیپ اٹھا لو۔ اور پچھلا فلیپ ٹرنس فلشن سے سامنے کی برابر قطع کر دو۔ تب اتصالی
سطح کو نصف کر دو۔ فیر کو آری ہو چیر کر دو۔ ٹیو برکل ٹی بی سے پچھلا فلیپ کو فیر کو مقابل لاکر فلیپ سی دو۔
سوا مگر ٹی سیٹو اک ایمپوشن۔ یہ بعینہ گری صاحب کا اوپر لین ہے۔ صرف فرق اس قدر
ہو کہ فیر اتصالی سطح کے قریب چیرا جاتا ہے۔

چھارم سٹی فن ممتھ ایمپوشن۔ اس میں جوڑے ٹانگ علیحدہ کی جاتی اور فلیپ جانی لگی جاتی
ہیں۔ دو نقاط ایک ٹیڈا کو سب پر یعنی ٹیو برکل ٹی بی سے نصف پانچ اور پر اور دوسرا پالی ٹیل
کے وسط میں قائم کر کے خمدار فلیپ ہر دو جانب قطع کر دو۔ بیرونی فلیپ تین سب سے تین انچ لمبا ہو اور
اندرونی فلیپ اس سے نصف پانچ زیادہ۔ تب ٹانگ کو کھینچ اور مروڑ کر سنوں اور پٹھوں کو ٹانگ ٹانگ لگ کر
پنجم۔ ہالٹ ایمپوشن۔ یہ بعینہ سٹی فن سمیت کی طرح ہے۔ فرق اس قدر ہے کہ اس میں سٹی لوز کا سٹی لیج علیحدہ
نہیں کیے جاتے بلکہ فلیپ میں ہی لے لیتے ہیں۔

دھم گھٹنے کا اکیسرن۔ یہ عمل اب نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی جگہ آرتھرو پلاسٹی کی جاتی ہے۔

نمبر کے ہر ویکنڈ اٹل پر دو نقاط قائم کر کے ایک خمدار شگاف ٹیو برکل ٹی بی کے بالائی سر تک دو اور گینٹ
ٹیڈا کاٹ کر پیٹلا سمیت فلیپ اٹھا لو۔ تب ٹانگ کو کھینچ مروڑ کر سنوں اور پٹھوں کو چاقوں کے دبا کر سی کاٹ دو
اس طرح سے جوڑ کھلیا گیا تب فیر کی اتصالی سطح آری سے چیر کر دور کر دو۔ یہ یاد رکھو کہ یہ چیر اعمودی ہو
اسی طرح سے ٹیڈا کی اتصالی سطح بھی آری سے چیر کر دور کر دو۔ بعد ازاں فیر اور ٹیڈا کی چیری ہوئی
سطحوں کو باہم ملا کر فلیپ کو ٹانگوں سے قائم کر دو۔

آرتھرو پلاسٹی کے لئے کوئی خاص قواعد نہیں ہیں بلکہ جب موقعہ بطرح مناسب ہو دیا ہی کیا جاتا ہے۔

یا زود ہم ران کا ایمپوشن یہ دو طریق سے کیا جاتا ہے۔

اول طریقہ ڈش فکشن۔ اگر بائیں طرف ایمپوشن کرنا ہے تو انیٹریری ریبر ایک سائین سے سٹم انچ نیچے چاقو کی نوک داخل کر کے کیسپول کو کاٹتے ہوئے بڑی کے ساتھ ساتھ اندر کی طرف ایڈکٹر لائٹس کے قریب نکالو۔ اور بخوڑی دور تک نیچو کی طرف یہ فلیپ کاٹتے جاؤ۔ تب ایک معاون خون بند کر کے نیچے لے لے فلیپ کو مضبوط پکڑ لے اور سٹم ۲-۱۱ انچ سے ۵ انچ تک لمبا فلیپ قطع کر لو۔ دوسرا معاون ان کو پکڑ کر کھینچتا اور مروڑتا ہے تاکہ جوڑ کے کھولنے اور لگیمنٹ ٹیریز کے کاٹنے میں دقت واقع نہ ہو۔ تب ایک چاقو غیر کے سر کے پیچھے سے گذار کر کچھلا فلیپ اس قدر لمبا کاٹ لے کہ خیال۔ کھوکھلا فلیپ اندر کی طرف باہر کی نسبت زیادہ لمبے نہ ہو جاوے۔ دائیں طرف کو اوپریشن میں صرف اس قدر فرق ہو کہ چاقو اندر کی طرف سے داخل کر کے انٹی ریبری ریبر ایک سائین سے سٹم انچ نیچے نکال لیتے ہیں اور باقی عمل بعینہ اسی طرح ہے۔

دوسرا طریقہ جاسٹن کا اسٹریچر۔ درمیان اور بالائی ٹلٹ ران کے درمیان ایک گول شکاف جلد میں دیکر دو انچ تک جدا اور فیشیا اٹھا لیتے ہیں اور پھر گول شکاف کو تمام عضلاً وغیرہ کو بڑی تک قطع کر کے تمام شریانوں کو باندھ دیتے ہیں۔ بعد ازاں بیرونی طرف ایک عمودی شکاف بڑی تک گہرا کریٹ مروڑ کا نرس سے ایک انچ اوپر شروع کر کے اس گول شکاف سے ملا دیتے ہیں۔ تب ایک مددگار دان کو پکڑ کر خوب زور سے کھینچتا اور مروڑتا ہے اور جس کی کیسپول اور لگیمنٹ ٹیریز وغیرہ کو کاٹ کر ران کو الگ کر دیتا ہے۔ یہاں اوپریشن پہلے کی نسبت زیادہ آسان اور بے ضرری۔ بیمار کو اس زیادہ صدمہ نہیں پہنچتا

دوازدہم۔ انگشت کا درمیان سے قطع کرنا۔ جس جوڑ پر قطع کرنا ہو اس پر انگلی کو زور دیا جائے پر خم دیکر ایسی سمت میں چاقو سے قطع کر لو کہ گویا دوسری انگلی کو درمیان سے چیر دو گے۔ اس طرح سے جوڑ کھل جائیگا۔ تب ڈش فکشن سے سامنا فلیپ کافی لمبائی کا اس طریق سے کاٹ لو کہ اخیر میں شکاف تیز جانا ہے۔

سینزدہم۔ انگشت کا جڑ سے قطع کرنا اس کے دو طریق ہیں۔

اول طریق۔ ایک مددگار قریب کی انگلیوں کو علیحدہ کیے رکھے پہلے ایک سیدھا چاقو ۱-۱۱ انچ اوپر شروع کر کے جوڑ تک دو پھر وہاں سے انگلی کی جڑ کے گرد شکاف دیتی ہوئے اسی جگہ ختم کر دو جب انگلی کو زور سے کھینچ مروڑ کر انوں اور پٹھوں کو کاٹو اور انگلی کو علیحدہ کر لو۔
دوم طریق۔ فلیپ۔ جس انگشت کو قطع کرنا ہے اس سے باقی تمام انگشت کو معاون کھینچ کر علیحدہ کر کے میٹاکارل بڑی کے سر کے قریب چاقو داخل کر کے وصل انگشت کے مقابل انگشتیں جدا کرنا ایک جانب

مبتلی کی طرف شکاف لیجائیں اور پھر کسی طرح دوسری جانب ہر دو طرف جلد کو انگشت سی اٹھالیں۔
پھر انگشت کو کھینچ کر مروڑ کر جوڑ کے رباط اور نسوں وغیرہ کو قطع کر کے انگشت کو علیحدہ کر لیں۔

چہار دم انگوٹھا جرٹ سے قطع کرنا اسکے بھی دو طریق ہیں

اول طریق ٹرنس فکشن۔ ایک انگڑیا ناف جکا پھل وصل انگشت سے کارپو میٹا کارپل جوڑ تک کے فاصلہ سے قدرے زیادہ لمبا ہو لیکر انگلیٹھے کی جرٹ کے قریب داخل کر کے کارپو میٹا کارپل جوڑ کے قریب نکالو تب نکالو تب انگوٹھے کو کھینچ کر مروڑ کر نسوں اور رباط کو چاقو سے کاٹتے جاؤ اس طرح سے انگوٹھا کارپو میٹا کارپل جوڑ پر قطع ہو جائیگا۔

دوم اول طریق۔ کارپو میٹا کارپل جوڑ کی بیرونی طرف سے شکاف شروع کر کے انگوٹھے کی جرٹ کے گرد ہوتے ہوئے پھر اسی مقام تک شکاف لیجاؤ تب انگوٹھے کو کھینچ کر مروڑ کر اور رباط کو چاقو سے کاٹ کر اوسکو الگ کر لو۔

پانچ دم پہنچا قطع کرنا۔ اسکے دو طریق ہیں۔

اول سائے اور پیچھے کے فلیپ سے بیرونی اور اندرونی سائے لائڈر و سیس پر دو نقاط قائم کر کے سامنا فلیپ محب جس میں مبتلی کا دو تھائی شامل ہو ڈسکشن سے بڑی تک گہرا اٹھا لو۔ بعد ازاں پچھلا فلیپ جو سائے سے چھوٹا ہو گا خواہ ٹرنس فکشن یا ڈسکشن سے قطع کر لو تب ہاتھ کو کھینچ کر مروڑ کر اور رباط و نسوں کو کاٹ کر ہاتھ کو علیحدہ کر لو۔

دوم طریقہ فرائس۔ اس میں دو نقاط وسط جوڑ میں سائے اور پیچھے کی طرف قائم کر کے پہلے بیرونی فلیپ اس طرح کاٹیں کہ سائے کے نقطہ سے شکاف شروع کر کے تھیز اسی رخس کے گرد ہوتے ہوئے پیچھے نقطہ سے جا ملاتے اور پھر یہ فلیپ ٹریوں تک گہرا ڈسکشن کے طور پر قطع کر لیتے ہیں بعد ازاں اندرونی فلیپ دو نقاط کو درمیان سیدھا شکاف دیکر حاصل کرتے ہیں تب ہاتھ کو کھینچ کر مروڑ کر اور رباط و نسوں کو کاٹ کر ہاتھ کو علیحدہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

شانزدہم۔ قطع کلائی۔ اسکو دو مساوی آسنے سائے کی فلیپ قطع کر سکتے ہیں جس مقام پر ٹریوں کو حیر نامی اوس مقام پر کلائی کا قطر معلوم کر کے ہر ایک فلیپ کا طول اسکی برابر رکھیں۔ داہنی کلائی کے لیے سرجن کو بازو کے اوپر کی جانب اور بائیں کے لیے نیچے کی جانب کھڑا ہونا چاہیے حتیٰ الوسع یہ فلیپ طویل اور موڑ رکھے جائیں تاکہ مصنوعی بازو کے لیے کافی طاقت ملے۔ سامنی کا فلیپ ٹرنس فکشن اور پچھلا فلیپ ڈسکشن کے طریق پر اٹھانا چاہیے۔ اس عمل میں نیوٹری انٹ آرٹری کو بچانا چاہیے ورنہ اسکا خون بند کرنا محال ہو جائیگا۔ پہلا انٹراسیس ممبرن کو کاٹ کر مروڑا تو انوں کو برابر اسی سے چیریں کیونکہ الٹا اور ریڈس ٹریاں جسم میں قریب برابر ہیں اگر کوئی عصب نکلا ہو معلوم ہو تو اسکو کھینچ کر قطع کرنا چاہیے تاکہ اسٹپ میں گرفتہ ہو کر

مکلف وہ ہو جائے۔

ہفتہ دہم کہنی کا اکیسرن کہنی پر خوب دوسرے دیکھ چلی طرف ایک باغیٹھی ٹگاف دجو اولیکرے ن پر و سس کی نوک سے دو انچہ اوپر اور دو انچہ نیچے ہے۔ تب دونوں طرف ہڈی تک گہری تمام ساختیں ڈیکشن کے طریق پر اٹھا لو اندرونی جانب الزرہ کا احتیاط لازم ہے۔ ازان بعد اولیکرے ن کو جوڑے کاٹ کر ہیومرل و رینز انٹروڈیٹس کی اتصالی سطح آریسی کاٹ ڈالو وغیرہ وغیرہ۔

ہیز دہم۔ قطع بازو۔ اسکا سب سے عمدہ طریق موٹی فائڈ اول ہیوس مقام پر بازو کا قطع کرنا منظور ہے اس سے دو انچہ نیچے ہر دو جانب ہر دو نقاط قائم کر کے انٹی ریر و پوسٹی ریرٹی ہلالی فلیپ یا نصفانچ لیے قطع کر لو اور تب جلد کو اوپر تک مقام قطع تک اٹھاتے جاؤ۔ ازان بعد ہڈی تک تمام گوشت وغیرہ کو ایک مدور ٹگان سے کاٹ کر اور ہڈی کی سطح صاف کر کے آریسی ہڈی کو کاٹ ڈالو۔

نوز دہم۔ قطع شانہ۔ اسکے چار طریق ہیں۔

اول طریق فرنہو جاؤ ڈن صاحب کا۔ اسکا عمل بعینہ قطع رن کے مشابہ ہی ہیں اسکا بیان دیکھو دوام۔ طریق انڈلٹ صاحب۔ اس میں دو نقاط ایک کو سے کاٹ پر و سس پر اور دوسرا وسط بغل میں قائم کر کے اندرونی اور بیرونی ہلالی سطحی فلیپ پرنے دو انچہ لمبی قطع کرتے ہیں۔ اندرونی فلیپ اٹھاتے ہوئے شریانوں کو باندھتے اور اعصاب کو چھوٹا کرتے ہیں۔ بعد ازان عضلات اور رباط وغیرہ کو کاٹ کر بازو کو جوڑ پے الگ کر دیتے ہیں۔

سوم طریق ٹرنس فکشن۔ اس میں چاقو کی نوک کا سے کاٹ پر و سس سے دو انچہ نیچے داخل کر کے آگرو میں پر و سس کے نیچے اور نیچے کی طرف نکال کر سامنا فلیپ چار انچ لمبا کاٹ لیتے ہیں تب جوڑ کے کیسپول کو کاٹ کر اور ہیومرل کا سر اپنی جگہ سے اٹھا کر پچھلا فلیپ بھی اُستقر لمبا ٹرنس فکشن سے کاٹ لیتے ہیں۔

چھٹا طریق صاحب کا اول طریق۔ اس میں کوریکوٹ پر و سس سے دو انچہ نیچے ٹگاف شروع کر کے بازو کے ساتھ ۳۔۴ انچہ تک لیجاتے ہیں اس میں یہ احتیاط لازم ہے کہ چاقو بائی سوئیل گردن کو گزرا ہوا بائی سپس عضلہ کی نس کو نہ کاٹ ڈالے، تب بازو کو گریوٹھی ٹگاف اسکی اختتام پر دیکر تمام ساختیں ہڈی تک گہری ڈیکٹ کر لیتے اور جوڑ کا غلاف و رباط وغیرہ کاٹ کر بازو کو الگ کر لیتے ہیں۔ اندرونی طرف ڈیکٹ کرتے وقت شریانوں کو با احتیاط باندھ دینا چاہیے۔

ہفتم۔ عضو تناسل کا قطع کرنا۔ بہ دو طریق ہیں جزئی یا کلی۔

اول کلی قطع کرنا۔ یہ گول صاحب کا ایجویشن کہلاتا ہے مریض کو لتھاؤمی کی وضع پر لٹا کر یوریتھر کو اندر کشیدہ یا ساؤنڈ پاس کر کے تب عضو تناسل کو اوپر کی طرف اٹھا کر فوطوں کو ہر دو طرف بچھ کر

عضو کی جڑ کے گرد جلدی ٹنگاف دیکر وسطی عمودی خط میں مقدمہ تک ٹنگاف لیجاؤ پھر کارپور ایوریو لکھو
پہلے کھریک علیحدہ کر لویا ریس کے اتصال کے قریب پہلا انگوٹھ لکچر کر کے قینچی سے قطع کر دو۔ کارپس پنجم
کو ڈاکٹر اور فاسپس کے ذریعہ کارپور ایوریو نوڑاسے علیحدہ کر کے ٹرائی انگوٹھ لکھو۔ سو پہلے انچہ آگ کاٹ لو۔
اب یوریتھر کو جلد کے ساتھ سوچ کر کے باقی تمام زخم کو سیدو۔

دوم جزئی انقطاع پہلے یوریتھر این کیتھیٹر پاس کر کے جڑ کے قریب عضو کو خوب ور سے باندھنا
چاہیے تاکہ دستکاری کے وقت زیادہ خون خارج نہ ہونے پاو۔ دوم انقطاع کے مقام پر دو
نقاط قائم کر کے دو ہلالی جلدی فلیپ ہر دو جانب پہلے انچہ لمبہ قطع کرو۔ سوم یوریتھر آگواڈر لکھو اور فاسپس
کے ذریعہ سے کارپور ایوریو نوڑاسے علیحدہ کر کے مقام انقطاع سے نصف انچ زیادہ کاٹ لو چہام
جائی انقطاع پر کارپور ایوریو نوڑا کو کاٹ کر کیتھیٹر نکال لو اور اوکو ساتھ خشفہ اور عضو وغیرہ علیحدہ کر دو۔
پنجم تمام شریانون کا جریان کامل طور پر بند کرو۔ ششم یوریتھر این زمین سطح کے قریب قینچی سے ٹنگاف

دیکر جلد کے ساتھ سوچ کر دو۔ سہم ایسک کیوشن آؤت کرنا بخسی کرنا۔ کاسٹیشن مریض کو لٹھا ٹومی
بست و تخم۔ ایمپوشن آف دی سکر وٹم۔ ایسک کیوشن آؤت کرنا بخسی کرنا۔ کاسٹیشن مریض کو لٹھا ٹومی
وضع میں لٹکا فوط کی جانب مائوف کو پکڑ کر کھینچو اور ایک سیدھا ٹنگاف جلد اور خشفہ کاٹنا ہوا اکسیر مل
اڈامی مل۔ ٹنگ و نصف انچ نیچے شروع کر کے فوط کے قاعدہ تک لیجاؤ اگر ضرورت ہو تو سیولی کا ویکیاسر
کو بھی کاٹ دینا چاہیے۔ بعد ازاں بیضہ کو کیر فوط سے باہر نکالو اور سپرے ٹنگ کارڈ کو اکسیر اڈامی مل
ٹنگ کو قریب لکچر کر کے قینچی سے قطع کر دو۔ سطر سے گویا کہ بیضہ مائوف ٹنگ ہو جائیگا تب سپرے ٹنگ کارڈ
کی شریانون بینی کر یا ٹنگ سپرے ٹنگ اور واس ٹویفرنس والی کو باندھ کر زخم میں ٹانگے لگا دو۔
بست دوم۔ اسٹریپشن آف دی ٹنگ۔ یعنی انقطاع زبان۔ اس کے چھ طریق ہیں۔

اول ولایت ہینڈ صاحب کا طریقہ۔ ایک لمبی قینچی دیکر باڈی کے قریب اسکو تمام تعلقا
کو کاٹ دیتے اور تمام شریانون کو لکچر کر دیتے ہیں۔ اس اور پریشن سے پشیر لیرنگا ٹومی اور لنگوال آرٹری
کا لکچر کرنا ضروری ہے۔

دوم گیلونیک الکرے زیور سے قطع کرنا۔

سوام۔ قطع کنندہ اوزاروں سے جزا یا کلیتہا کاٹ ڈالنا۔

چھادام۔ اس سے موڈ صاحب کا طریقہ۔

پنجم۔ زیرین جبر سے کو نیچے ٹنگاف دیکر سب میگزنی لری ریچین مین کو نکالنا۔

ششم۔ جبکہ زبان زیرین جبر سے کو ساتھ پوسٹ ہو گئی ہو تو وسطی ٹنگاف سے نکالنا۔

بست سوم۔ اسٹریپشن آف دی اور جا۔ ٹنگ اسفل کا انقطاع عموماً اس کے ایک نصف حصہ کا انقطاع کیا جاتا ہے۔

جانب ماؤف کی دونوں ان ایزروانت نکال دو اور زیرین لب کو درمیان سے قطع کر کے دلیرا ایک شکاف
جبر سے کے زیرین کنارہ کے ساتھ ساتھ کان کے لایہوں تک لیجاؤ لیسن نیشل زور پر اور ظنیہ کا احتیاط
رکھو یہ کٹنے نہ پائیں۔ معاون فوراً خون کو بزرگرتلے سے فیشیل آرٹری کے دونوں سرے فوراً لپیچ کر دو
یا سپرولیز فار سپیس سے پکڑ لو تیف فار سپیس اور کند او زار کو ساتھ کھینچ کھینچ کر تمام ساختیں جبر سے
پنچو سے اوپر کی طرف انصاف اور جب میوکس ممبرین ظاہر ہو تو صاف طور پر اسکو جڑے کے ساتھ کاٹ
ڈالو۔ بعد ازاں جبر سے کو سمی سس کے قریب آرے سے چیر کر اور بون فار سپیس ہکاٹ کر ایس ماتھیس
پکڑو اور خوب دس کو کھینچ کر ڈاکٹر نول و رباط کو کاٹتے جاؤ اس طرح کٹنا مل اپنے جور سے الگ ہو کر
جبر علیحدہ ہو جاوے گا۔

بست و چھارم اسٹریٹری فی سی پی پر مکرلا۔ یہ کٹنے بالائی جب سے کا انقطاع۔

اس اوپر لین سی پیشتر لبرنگا ٹومی کر لینی چاہیے تاکہ خون سے حبس دم کا اندیشہ نہ ہے اور کلورافارم گرن
کے سورخ کے رہتہ دیا سکے پہلے ایک شکاف ناک کی دیوار کو ساتھ ساتھ آرٹ کر انفریو ریکل تک دو
اور اس جگہ سے نیکاف آرٹ کے زیرین کنارہ کے ساتھ ساتھ اسٹریٹری فی سی پی پر مکرلا لیجاؤ معاون
دباؤ سے خون بند کرتا ہے۔ بعد ازاں مخہ کھول کر جانب ماؤف کی ہر دو انسانی زرنکال ڈالو سا فوٹ پلیٹ
اور میوکس ممبرین کو وسطی خط میں قطع کر بالائی لب کو بھی اس خط میں کتر دو اور ایک فلگسا ماؤف جانب کر
نقصے میں گذار کر ہڈی کو کاٹو پھر سپیریور لائیزل پر و سس اور میلر پر و سس کو پکڑو بعد دیگر ہی آرے سے چیدو
بعد ازاں بون فار سپیس لیکر جبر سے کو استخوانی پیوندوں سے علیحدہ کرو اور تمام ساختیں دسکو اوپر سے کھینچ کر
اسکو الگ کر لو۔

ایضی سیما پلمانی۔ پیپٹریٹ کا ایضی سیما۔ اس مرض میں شش کو مامونٹاں اور دریائی ساختوں سطح کو
نیچے زائد ہوا بھری رہتی ہے۔ اس طرح اسکی دو قسمیں ہیں اول وہی کو لو جس میں پیپٹریٹ کو مامونٹاں کے مامونٹاں خلتے
کشادہ ہو جاتے اور اون کے درمیانی پردے گل کر بہت تو خلتے ایک بن جاتے ہیں۔ دوم انڈر لا بولر جس میں
پیپٹریٹ کے نیچے بالائی اور کے درمیان سیلو لٹھوں میں ہوا بھری جاتی ہے۔

اسباب ۱۲۰، اسباب متصلہ را، سرفرمز منہ۔ دم۔ ہر قسم کی پرانی کھانسی بوجہ اٹھانا۔ باسک
اور ترم بجانا۔ پھاڑ پر چڑھنا۔ حمل یا پاخانہ کے وقت زور سے کچنا۔ ان تمام حالتوں میں یہ ہوتا ہے کہ پیپٹریٹ کو
ہوا زور کر کے پھلاتی ہے جبکی وجہ سے بعض خانہ تو اس قدر زیادہ تنجالتے ہیں کہ پھر سکو کر اصلی حالت
پر نہیں آسکتی۔ اور بعض پھٹ جاتے ہیں (۲) زائد وصلوں یا سختی کی وجہ سے اندرونی سانس کی ساری ہوا خارج
ہونا اس طرح اندرونی سانس کے ساتھ ہوا داخل تو ہوتی رہتی ہے مگر پیپٹریٹ کو کھنکھانے یا زائد وصلوں
کی وجہ سے بیرونی سانس کے ساتھ پورے طور پر خارج نہیں ہوتی اور ماسم ہوا سے بھرے رہ جاتی ہیں

اور روز بروز بھوتے چلے جاتے ہیں۔

ب، اسباب ہیچیک۔ سینہ کا زیادہ کثادہ ہونا پسلیوں کا زیادہ بڑا اور اون کی مروں کا سخت ہو جانا پھیپھڑوں میں پرانا اجملع خون اور سوزش رہنا۔ پشت میں کسی کو یہ مرض ہونا زیادہ موٹا اور نفرت خانج کا ہونا۔ بچپن میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے۔

علامات۔ متفرق اور متبہہ ہوتی ہیں۔ جبکی تفصیل حسب ذیل ہے ہمیشہ خفیف دکشی رہنے کی وجہ سے خون کو پوری ہوا نہیں ملتی اسلئے ناقص ہو جاتا ہے پھیپھڑوں میں خون کی رکاوٹ رہنے کی وجہ سے قلب کا دھنسا جانا کثادہ اور موٹا ہو کر رانی کپڑے گرجی ٹیشن ہو جاتی ہے۔ اسوجہ سے وریدیں عموماً پور رہتی اور مختلف اعضا میں خون جمع رہتا ہے جو سستقلے برائیکل کنارے ورم اور براکائیٹس کا موجب بنتا ہے۔ سائوف جانب کا سینہ بڑھ جاتا کسی خاص مقام پر اوہا معلوم ہوتا ہے۔ سانس آہستہ آہستہ اور کھینچا آتا ہے بھوک نہ پھیپھڑے کی داند زیادہ گنار والی اور صاف معلوم ہوتی ہے۔ سانس کی آواز کمزور اور کھردری ہو جاتی اور زیادہ وسعت میں سنائی دیتی ہے بیرونی سانس کی آواز طولانی ہو جاتی ہے مختلف قسم کی خشک اور تراوازیں یعنی سائوریل و سبسیٹ راکائی اور رالز سنائی دیتی ہیں۔

انشرا لولر ایمفی سیما میں بعض اوقات کوئی بلبہ پھٹ کر سینہ کے جوف میں ہوا بھر جاتی ہے اور کبھی یہ ہوا جلد کے نیچے آکر تمام جسم کو پھلا دیتی ہے تب اسکو ایمفی سیما جنرل کہتے ہیں جبکا بیان آگے آتا ہے۔

علاج۔ بموجب اسباب حالات مریض کے اسکے علاج کو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔
اول۔ حفظ ماتقدم چونکہ اس مرض کے اسباب اکثر حسب ذیل ہوتے ہیں، انوجوانوں میں کثرت جمائی کی یک دفعہ بے اعتدالی، سرفہ کہنہ۔ دمہ۔ ہونینگ کف وغیرہ امراض کے اثنا میں اسکا ابتدا ہو کر بعد میں اسکی طرف لا پر دانی سہی ہے۔ اسلئے ان اسباب کو مد نظر رکھ کر انکی مطابق حفظ ماتقدم کی کوشش کرنی چاہیے یعنی نوجوانوں میں اعتدال کرنا چاہیئے، امراض دمہ۔ ہونینگ کف۔ کرائک بلیکائیٹس وغیرہ کو اثنا میں ایمفی سیما کا خیال رکھنا اور ان امراض سے آرام ملنے کے بعد ورزش جسمانی کی تدریج اجازت دینا چاہیئے۔

دوم۔ سرفہ کہنہ۔ دمہ۔ ہونینگ کف وغیرہ امراض جو ایمفی سیما کا باعث ہیں انکا علاج حسب قاعدہ کرنا۔ ان امراض کی موجودگی میں یہ کوشش کرنی چاہیئے کہ بلغم رقیق اور کم لیس ہو کر آسانی خارج ہوتا ہے۔ کھانسی اور تنخی در دون میں تخفیف ہو جائے لیس یہ مدعا مخرج بلغم اور دافع تشنج ادویہ سے بخوبی حاصل ہو سکتا ہے۔ پونا سیم آؤڈائیٹا ہونیوٹا کاربوناٹس۔ سلائکس امیکا اس مطلب کو یے مفید ہیں۔ پونا سیم آؤڈائیٹا خاصکر مفید ہے کیونکہ یہ بلغم کو رقیق اور بے لیس کر کے خارج کرنا اور صوکس ممبرن پر اکثر ٹیوا اور تمام لٹیکس پر محرک اثر پیدا کرتا ہے۔

سوام - خاص یعنی سب کا علاج جب برا نکالیں۔ دوسرے ہونگ کف وغیرہ آرام ملے ہو اس وقت اس کا خاص علاج کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ عام حفظ صحت تدابیر کی پابندی بقوی اور لطیف غذائیں بقوی ادویہ مثلاً مکمل امیکا آرسنک اور فولاد کا استعمال مفید ہیں۔ آرسنک اور پوپائیم آپوڈائیڈ خاص کر فائدہ کرتے ہیں۔ ٹائورس سائوشن دوتین ہونڈی مقدار میں باقاعدہ مدت تک استعمال کرنا چاہیے۔ رفع دکشی کے نیچے عام دارغ تشج و مخرج بلغم ادویہ جیگا مفصل بیان دوسرے ذکر میں ہوگا (انتاشہ تعالیٰ) استعمال کر سکتے ہیں۔ حالت مزمنہ میں اکثر قریب کمزور اور کٹا وہ ہو کر تپلا ہو جاتا ہے اس کے لیے مغویات قلب مثلاً دجی ٹالس سٹر و فتمس کیفین۔ ایڈونی ٹوین۔ سپارٹین اور سترن استعمال کر سکتے ہیں۔ گائیبی کی ہوئی ہواؤں سے علاج کرنا نہایت مفید ثابت ہوا ہے۔ اس کی ترکیب حسب ذیل ہیں۔

(۱) ایسی ہوائیں جو معمول سے پہلے حصہ زیادہ گاڑی کر دی گئی ہو دم اندر کھینچنا تاکہ گلیجن باؤاٹ اندر پیچھے اور

پچھلے ہی ہوائیں دم باہر نکالنا جو معمول سے پہلے حصہ کم گاڑی کر دی گئی ہو تاکہ کار بائک لیڈ وغیرہ باؤاٹ خارج ہو

(۲) مریض کو دوتین گھنٹہ روزانہ ایسے کمرہ میں بٹھلانا جس کی ہوا باکر معمول سے پہلے اسواگنی وزنی کر دی گئی ہو۔

ایفنی سیما جنرل یعنی جلدی ایفنی سیما۔ جلد کے نیچے ہوا بھر کر کل جسم کا بھول جانا۔ یہ حالت اکثر بھیچڑوں پر

کسی نوکدار چیز یا شکستہ پیل کے چھبنے سے پیدا ہوتی ہے کہ یہی انشرا بلور ایفنی سیما میں کسی بلبیلہ کے پھٹنے سے۔

الغرض جب کسی طرح سے بھیچڑے میں سورخ ہو جائے تو اس کی ہوا اندر ونی سانس کے ساتھ خارج ہو کر جلد کے

نیچے چلی جاتی ہے کہ یہ ونی سانس کے وقت بھیچڑوں میں نہیں جاسکتی کیونکہ قدرتی لچک سے بھیچڑ کے وقت

اونکاسو راج بند ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے ہر ایک سانس کے ساتھ جلد کے نیچے زیادہ ہوا پیچتی رہتی ہے یہاں تک

کہ کل جلد ہوا سے بھول جاتی خاص کر وہ مقامات جہاں جلد دیہلی ہے جیسا کہ چہرہ گردن اور فوطوں کی اون کی جلد

بہت ہی بھول جاتی ہے۔ وہاں سے بلبیلہ پھوٹنے کی آواز سنائی دیتی ایک جگہ کی ہوا دوسری جگہ پھرتی رہتی اور

ٹھوکنے سے گیلے ڈھول کی سی آواز سنائی دیتی ہے چند نشوں میں ہی یہ ہوا ونی ورم کل جسم پر پھیل جاتی ہے

چہرہ کے نقش و نگار ماسے جاتے۔ آنکھیں بھولی ہوئی ہلکوں کے اندر چھپ جاتی اور عضو تناسل اور فوط

بھول کر بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی زخرو یا انشری یار وہ میں بھی سورخ ہو جانے سے ایفنی سیما جاتا

ہے کہ یہ کسی چوٹے کی پچکے تھن سے جو راج پیدا ہوتی ہیں وہ بھی جلد کو بھلا دیتی ہیں بھیچڑوں کی ہوا چونکہ

صاف ہوتی ہے وہ کچھ ضرر نہیں پہنچاتی اور جلدی جذب ہو جاتی ہے لیکن اگر زیادہ مقدار میں خارج ہوئی

ہے تو دم بند ہو کر مریض فوراً ہلاک ہو سکتا ہے تعفی ہواؤں سے جلد کے نیچے کا خون سرٹنا شروع ہو جاتا ہے۔

علاج - اگر خفیف ہو تو کسی علاج کی ضرورت نہیں خود بخود تمام ہوا جذب ہو جاتی ہے لیکن اگر زیادہ ہے جس کے

دوسرے اعضا کو فعل میں خلل واقع ہوتا ہے تو اس کا علاج مفصل ذیل تدابیر سے کرنا چاہیے۔

(۱) مقام ماؤف پر پٹی سے دیا و قائم رکھنا۔

ایم حسین

(۲) باریک ٹرو کاروں کے ذریعہ نہایت ایٹمی سپٹک طور پر ہوائیں خارج کر دینا۔

ایمیشیا Amnesia دیکھو بیان افزیا کا۔

ایمیٹکس Emetics یعنی قے اور ادویہ۔ ابرس پر کئے ٹوریں، ایڈکرائی سو فینک گل بابونہ ٹارٹار ایٹیک۔ اپومارینا۔ سپٹی سین۔ ٹرائی اوینا۔ بیج مار تخم المناس۔ کای لانا۔ کنڈیورنگو۔ کنولیر پفلورز۔ نیلا طوطیا۔ ڈلفی نیم سیفی سیکریا۔ امی ٹین۔ اسی تھرا فلین۔ ایوپے ٹوریم پرفوئیے نم سب سلفیٹ آف مرکری۔ پلی کاک۔ آئرڈین۔ جو گلیٹنڈین پاسی بائی کروماس سینگوئی نار یا سلا سینکدائی۔ دیسی نمک۔ تاکو۔ ویکورم سفید ٹیلا قے اور ادویہ عموماً چار اغراض سے استعمال کی جاتی ہیں۔ اول اس غرض سے کہ عمدہ میں جو غیر ہضم موجود ہو اسکو خارج کر دیا جاوے۔ دوم اگر کوئی زہر کھایا گیا ہو تو اسکو دفعہ کیا جاوے۔ سوم اخراج صفر کے لئے۔ اگر غلبہ صفر ہو تو اسہمال کی نسبت قے کرانا زیادہ مفید ہوتا ہے کیونکہ قے کرہستہ صفر فوراً خارج ہو جاتا مگر امعا کرہستہ اسکے جذب ہو نیکا اندیشہ ہوتا ہے۔ اخراج صفر کے ساتھ بہت سے زہر مثلاً زہر بخارات وغیرہ جو جگر چین ہوں خارج ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات محض قے کرانے سے بخار فرو ہو کر قے ہو جاتا ہے گویا قے کرنا ہی کوئین کا کام دیتا ہے چہاں دم حلق جھجھہ زرخور اور ہوائی نالیوں سے بلغم وغیرہ خارج کرنے کے لیے مثلاً کروپ و مقصیر۔ برانکائیٹس۔ اور دمہ میں قے کرانا بعض اوقات نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔

ایمیٹین Emetine ایک قے اور ایلیکٹک ہے جو ابی کو کواناسو حاصل ہوتا ہے۔ ابی کو کوانا کا بیان دیکھو۔

ایمیٹیا Emetia خمر بھور و معرق و مخسج بلغم۔ گرین سی۔ گرین نمک۔

بطور مقلی۔ گرین سے۔ گرین نمک۔

ایمیٹس Emetis قے۔ دیکھو بیان قے کا۔

ایمیٹیسٹا۔ اشارہ سے بات کہنے کی قوت نہ ہنا۔ دیکھو بیان افے زیا کا۔

ایمیٹو ریا۔ جیض بند رہنا۔ دیکھو بیان احتباس الطمث کا۔

ایمیٹو ریا ایلی پیر Ebmetia Ribies بائیرنگ۔ برنج قبالی مخرج ریا ح

اور قابل کرم ہے۔ قے اور بد ہضمی کہ نہیں مفید ٹیپے م کے لیے بطور تحصیل تک نہایت مفید ثابت ہوئے ہیں وجہ مفاصل میں بھی بکثرت استعمال کیے جاتے ہیں خمر۔ تخم بائیرنگ ایک ڈرام سے دم ڈرام تک فلوئڈ اکسٹراکٹ ایک ڈرام سے دم ڈرام تک۔

ایمیٹو ریا ایلی پیر Emmenogages درجہ اول ادویہ۔ ایڈکرائی موزا۔ الیٹس

انجلیکا۔ آر باروائی ٹی۔ عارضہ زہر نشاہر۔ ہیٹنگ۔ سہاگہ۔ برائی اوینا عصاہ ریوندہ تیلتی ٹکسی۔ گل بابونہ۔

دال چینی۔ کوکا۔ جنظل۔ کادس فلورڈا۔ کباب چینی۔ ڈیسانا۔ ارگٹ مرکبات فولاد۔ بنولہ۔ بیج کپاس۔

کھانکھانہ۔ آوڈائیڈ آف مرکری۔ بنقی۔ بن آگائیڈ آف مینگینز۔ عس۔ دامیکا۔ پاپا۔ فاسفرس۔ پٹاسی۔ پیمائیڈ

جٹاسی آیوڈائیڈ۔ پرنیکٹ آف پٹاش۔ پلی ٹلاروٹا سیٹینا سیلیٹ آف سوڈیم سینٹوین۔ ٹرپٹائین۔
درے ٹیم۔ زینٹھا کسی لم بنگوی ناربا۔

این افروڈی سی اکنس Anaphrodisiaos ادویہ قاطع باد یا مضعف یا
کھاری ادویہ۔ سرہ اور اسکے مرکبات۔ بروڈائیڈز کا فور۔ مونو برومیٹ آف کیمفر کا بچی کو۔ کونائیم۔ وچی ٹالس
لے شیریم۔ ہایو سائیس۔ پلی ٹلاروٹا برومیٹ آف ہایوسین۔ آیوڈائیڈز۔ اپی کاک۔ تبا کو سوڈیم سیلی

سلیٹ۔ ریو۔
اینٹ ایڈز Antacids یہ کھار ادویہ کا دوسرا نام ہے۔ الکیلینز کا بیان دیکھو۔
اینٹ ایڈز Autemesis یعنی رافغ قے۔ ادویہ قے کا بیان دیکھو۔
اینٹرک فینور۔ تپ محرقہ۔ دیکھو بیان ٹائیفائیڈ فیر کا۔

اینتوزوا Entezoa۔ اس سے مراد وہ تمام حیوانات ہیں جو جسم انسانی کے اندر خواہ عمدہ
یا انتڑیوں میں یا کسی اور عضو یا ساخت میں جگہ کر لیتے ہیں مثلاً انٹائنل ورمز ایڈرس۔ فانی لیریا۔ وغیرہ۔
اینٹ ہائیڈرائٹس Anthydrotics یعنی پینے کے روکنے والی ادویہ۔ ایڈ ایڈی ٹیک۔
ایڈ لگے ری سینک۔ ایڈ سلفیو رک۔ ایڈ ٹینک۔ اگوری سین۔ اٹرومین۔ ایسیرین۔ ارگوٹین۔ بیلادونا
پکروٹاکسین۔ پوٹاسی ٹیلیورٹ۔ پوٹیش ٹلارپائی روڈین۔ جیبورنڈی۔ ڈیو پوائی شیاڈنک آکسائیڈ سلفوٹیل
فیری پکلو رائڈ فیری سلفاس۔ کوٹو۔ پنچ کرلی۔ کیو پرائی ایسی ٹاس۔ لاگ۔ وڈ ہیمیا میلز۔ ہیمو اٹروپیز
ہائڈروبروماس۔ مونگ نان۔

اینٹی ارین۔ Antiarin یہ ایک زہریلے جوہر اینٹی ارین ٹاکسی کیمرائیس سے نکالا جاتا اور
جزایر مشرقی ہند میں تیروں کو زہر آب کرنے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔

اینٹی پائی ریٹکس Antipyretics دافع بیمار ادویہ۔ اینٹی پائیرین۔ اینٹی فیرین۔
الکمال۔ ایڈ ٹائی سک۔ اینٹی تھرمین۔ ایسی ڈوسپرین۔ آفیا کسی لین۔ بینرے فی لائیڈ۔ پائریڈین۔
پائی پیری نال۔ ریسا رین۔ تھیلین۔ ٹرائی میتھل۔ سیلی سلینٹس۔ سوڈی بنٹراس۔ سوڈی
سلفو کاربولاس۔ سوڈی کرے ڈوئی ٹاس فو سیٹین۔ فینیل پوری تھین۔ کیے رین۔ کرے ڈوٹ۔ تھرمی ٹیز
مونو بروم ایسی ٹینی لائیڈ۔ ہائیڈرے سے ٹین۔ ہائیڈروکی نان۔

اینٹی پائیرین Antipyrin اسکے دوسرے نام این جی سین اور ڈائی میتھل آکسی ٹائی
زین فینو ڈون۔ اور فینیل ڈائی میتھل پیرازولون ہیں۔ یہ نہایت عمدہ اینٹی پائیرٹک۔ انفوڈامین۔ اینٹی پائیرین
ہیمو سے ٹیک لیکو فینونج۔ اور اینٹی پائیرٹک ہے۔ اقبال بھانسی حالت میں ہاگ رین فینوڈاک
گھنٹہ گھنٹہ بعد دو تین غوراک تک دیکھتے ہیں۔ حرارت ایک گھنٹہ بعد تدریج کم ہوتی شروع ہو کر عموماً

پانچ گھنٹہ تک اسکا اثر رہتا ہے۔ یہ بھی ٹنٹ، ٹانی فائیڈ، رہیو ٹیک، مکارلیٹ، مسرام، نیو مونیٹا، بیو برکلوکس، براٹکائیس، پلیوریسی، انفلو اینز او غیرہ بخارات میں بطور اینٹی پائریٹک اسکو استعمال کر سکتے ہیں۔

دوسرے ہر قسم کے درد مثلاً صدمہ، عرق النساء، ڈولبرو، انٹرکاسٹل نیورلیجیا، لمبوگو، پلور وینیا،
قویج، انجاسٹا، پکٹورس، دوم، غصہ، طمث، کلاک، وغیرہ میں نہایت مفید ہے۔ سخت اور دیرپا درد کی حالت میں، اگر دین
فی خوراک کو حساب سے ایک یا ایک گھنٹہ بعد تین خوراک تک استعمال کرنا اور بعد میں چھ چھ گھنٹہ بعد یقیناً فائدہ
بخشتا ہے۔ اینٹی فیبرین بھی ہر قسم کے درد میں تخفیف کرتی ہے لیکن اسکا اثر اینٹی پیٹرین کی طرح دیر پا نہیں رہتا
اینٹی پیٹرین کی جلدی پچاسی مار فی ایک طرح درد کو فوراً آرام دیتی ہے۔ تیس گزین انٹی پیٹرین پانچ چھ انٹر
پانی میں حل کر کے حقہ کرنا درد کو آرام دیتا لیکن حرکات جسم میں کوئی خلل نہیں ڈالتا۔ جلدی پچکاری اور
داخلی استعمال بھی درد و بعد زہ میں نہایت مفید ہے۔

و اصلی احتمال بھی در و ما بعد زہ میں ہدایت مفید ہے۔
چونکہ بہرہ نقلیہ کیس کو بھی کم کرتی اور درد کو آرام دیتی ہے۔ اسلئے کوریامرگی بہو پنگ کف۔ لو کو موٹا راٹیکسی وغیرہ
میں ہدایت مفید ہے۔

سوم۔ وجع مفاصل حاد میں سوزش مفاصل اور بخار کو آرام دینے کے لیے اینٹی پائیرن اعلیٰ درجہ پر مفید ثابت ہوئی ہے۔ پندرہ گھنٹہ خوراک میں چار چار گھنٹہ بعد استعمال کرنے سے ایک دو روز میں تمام ورم اور درد رفع ہو سکتا ہے۔ بعد ازاں کم مقدار میں اسکو جاری رکھنا چاہیے تاکہ مرض عود نہ کرنے پاوی۔ اکیوٹ گاؤٹ میں بھی اسبطر خ مفید ہے۔ پہلے وجع مفاصل کے ہر قسم کے در میں خواہ مفاصل میں ہو یا عضلات یا اعصاب یا اندرونی اعضا میں اسکا دانی اور جلدی استعمال نہایت مفید ہے۔

یا عصاب یا اندرونی اعصاب اس کا داری اور بکری استعمال یہاں سید ہے۔
 چھ آدم۔ ہر قسم کے اندرونی و بیرونی جربان کو خواہ کسی عضو یا حصہ جسم میں ہو بند کرتی ہے۔ نفث الدم رعا
 قے الدم۔ بول الدم وغیرہ میں پانچ کوں اینٹی پائیرین پانچ پانچ گھنٹہ بعد دینے سے اکثر آرام ہو جاتا ہے۔
 پار فیصدی لوشن سوزخوں کا خون بند ہو سکتا ہو۔ اسی حساب سے کھولتے پانی میں حل کر کے سگھا نا نفث الدم
 کو آرام دیتا ہو۔

پنجم۔ جب دودھ کا اخراج بند کرنا منظور ہو تو آٹھ گرین خوراک میں چار چار گھنٹہ بعد انیشی پائیرین کھلانا ایک ورور
میں ہی دودھ کو بند کر دیتا اور آئندہ کے لئے روک رکھتا ہے۔ اور کسی قسم کا نقصان نہیں ہونے پاتا۔
ششم۔ انیشی پائیرٹریک۔ اوڈائیں۔ انیشی ریہوٹریک یہیو سے ٹکا ورلیٹکی فیوج فائیووں کو علاوہ مفصلہ
ذرا اراض میں ہی انیشی پائیرین نہایت مفید ثابت ہوئی ہے۔

ذیل امراض میں بھی ایسی ہی بات مفید ثابت ہوئی ہے۔
 ۱۔ سسی سکینس جہاں پر حوا ہونے سے پیشتر اگرین خوراک میں استعمال کرنا سی سکینس کو روکا جائے (ب) فیا سیر
 ان سپی دس میں نہایت مفید ہے اور شکوے فیا بیس میں بھی شروع حالت میں جبکہ اخراج شکر کم ہو اور اگر
 زیادہ ہوئی ہو مفید ہے (ج) قططیر البول۔ لیٹر جس سڑائی فوس اور رگ تہی میں۔

مفصلہ ذیل حالتوں میں اسکا استعمال نہایت احتیاط سے کرنا چاہیے۔ ایام حریض میں عام ضعف میں امراض معاویہ اور
تنفس دوران جگر و گردہ میں چھچک خسر بکالیت فیو نوغیر دیگر سپیدی فک فیو ر زمین برائش فیو نوغیر مونیہ اور
برا نکلو نیو مونیہ میں۔

طریقہ استعمال - عام خوراک ۵ لے۔ ۳ گرین تک ہو۔ جلدی پچکاری کو لے ۵ گرین اینٹی پائیرین^{۱۵} قطرہ پانی میں ملا کر اس میں ۵ لے۔ ۳ قطرہ تک استعمال کر سکتے ہیں لیکن خالص اینٹی پائیرین کی جلدی پچکاری کے وقت تیز درواور صدر معلوم ہوتا ہے اسلئے ایک گرین کو کمین مذکورہ بالا حل میں ملا کر اُس انداز سے استعمال کرنا بہتر ہے۔

اسی انداز سے استعمال کرنا بہتر ہے۔
 نائٹریک ایسڈ کے ساتھ مل کر ایک بزم مرکب بنجاتا ہے جو ضرر ناک ہے اس لیے اسپرٹ آف نائٹریک ایسڈ کے ساتھ
 اسکو مرگز استعمال نہ کرنا چاہیے۔ مقابلہ کو لیے فینٹین کا بیان دیکھو۔

اس کو ہر استعمال نہ کرنا چاہیے۔ مہذبہ دیکے پیمین کا بیان دیکھو۔
اینٹی سپریاڈکس Antiperiodics یعنی وہ ادویہ جو نوبتی امراض کو روکتی ہیں۔ الکونائی عظمیٰ فلم
 الٹونیا کسٹرنٹا الٹونیا کالیس۔ ایپال۔ اسی تھروفلم۔ ایو کے لپٹس۔ آئیوڈین۔ میسین سلفاس۔ بونڈیو
 سلا پارٹھین۔ پرائیمرین۔ پیاز۔ ٹیلیاٹائی فو لیا جیلیسی میم۔ رسار سین۔ سیڈرن۔ سرسیس۔ ورجی ٹیکا۔ شے نیا۔
 سنکونا سیلیکس۔ نائی گرا۔ سیرا سالوایا۔ سنکھیا۔ ستر کاس کا لویا۔ قہوہ۔ کونین۔ کیروا الباکلیو۔ ڈنڈرن انرما
 کاکولس۔ کارڈیولس۔ کازس فلو ریڈا۔ گیرا۔ گرڈلیا کے روزا۔ کارڈیناگی فرا۔ گندبک۔ لنٹی نین۔ لہسن۔ میگنولیا
 گلکا۔ مرچ سیاہ۔ نارکونین۔ مہلی بورس۔ نائی گرا۔ پٹی نین۔ ہلارہ اینٹی ڈس۔ ہانڈرسٹن۔ ریڈا آئی کیو لیا۔ پیرا
اینٹی تھرمین Antithermine ایک نو ایجا دانیٹی پائیرٹیک وایو لیکن چونکہ اسکے کھلانے سے
 معدہ میں درد ہو جاتا ہے اس واسطے اسکا استعمال عام نہیں ہوا۔ سخرہ گرین۔

اینٹی ڈوٹ Antidote فادرزبر-زبر کامارگ-دیکھو سیان زبر کا۔

Antisialagogues ایسٹھی سالی ایلو گاک
 Antispasmodics اینٹی سپازموڈکس

ڈائيوٹ۔ ایجنٹر۔ ایمیم شانی وا۔ ایل ٹرائی بر ومانڈ ایونٹس کم۔ امونیا۔ اجوائن۔ امونیا ویلیرے ناس
ال ٹائیٹرٹ۔ ال ویلیرے لیس۔ اینی لین۔ آر سیٹی ٹائیٹر اس ایکلی پیاس ٹیو برکلوزا۔ اثر چین۔ اپولس
اولی نیچم۔ اوپولو ناکس بنزرواین پسرمنٹ۔ خالی مال۔ رینجائن۔ ٹین۔ ٹرمین پلیسی ٹلا۔ جیبورنڈی حبث
کے مرکبات مثلاً زنک برومانڈ۔ زنک ویلیرے ناس اور زنک آکسائیڈ جیفرسونیا۔ دہتورہ طبعی نیم
ڈایوسکوریا۔ روزمری۔ رسارسین۔ ریو سائیبری پیڈیم بکوٹیلیا سپرٹ ایونیا ابرویشنگ۔
سپرٹ ایونیافیتنا۔ شانی ریکس سنبل سمپلو کارب۔ سپرمنٹ۔ فیری ویلیرے ناس

کیجوٹ آئل۔ کافور۔ کیلنڈولا۔ آئی سی۔ لیس۔ گاجانک۔ ٹاننا۔ الیوانا۔ سرس۔ جی۔ نیگا۔ کیس۔ نوپاڈ۔ کلور۔ ایل۔ ڈی۔ لار۔ کلور۔ ل۔ سائی۔ اہناڈ۔ اس۔ کلور۔ فارم۔ کوکے۔ این۔ کالن۔ سافیا۔ کونیا۔ کری۔ زوٹ۔ کروکس۔ کیو۔ پر۔ ٹی۔ آئی۔ مونا۔ کیو۔ رار۔ گیلے۔ نم۔ کیلو۔ این۔ البی۔ لیونڈولا۔ لیونڈوس۔ لوبلی۔ لیا۔ لائی۔ کوپاڈ۔ مصطکی۔ سیلی۔ سافینیل۔ منتھال۔ منتھی۔ لال۔ سلیو۔ رشک۔ طین۔ ویلیرین۔ وائی۔ برنم۔ پروم۔ ہیر۔ ملکنم۔ ہایو۔ سائیس۔ ہینگ۔

ایٹنی سکاربیوٹکس **Antiecorbutice** یعنی ادویہ مسکروی۔ قریباً تمام تازہ پھل مسکروی میں نافذ ہیں۔ سیب۔ کیسیلیو۔ لیا۔ اوڈوریا۔ ایو۔ پے۔ ٹراپانیا۔ ہارس۔ ریڈش۔ لیون۔ آنہ۔ لائی۔ کوپری۔ کن۔ ایکولیٹا۔ رنگترو۔ ساسافرس۔ مینی۔ انٹیپٹر۔ فائیڈولیکا۔ ریو۔ یس۔ کریسپس۔ سی۔ جین۔ بیکیا۔ آئی۔ سنٹی۔ لسن۔

ایٹنی سیپٹال **Anticeptol** اسکا دوسرا نام آبوڈوسلفٹ آف سٹیکوین ہے۔ اپنی تاثیرات میں ابوڈو فارم کے مشابہ ہے۔

ایٹنی سیپٹکس **Antesepitics** یعنی دافع شرن ادویہ۔ تمام حیوانی یا نباتی اشیاء پر گھنے اور سڑنے کی خاص وجہ ہارک خور یعنی نباتات یا حیوانات یا کیمیائی خمیر ہوتی ہیں۔ پس جو ادویہ ان شرن مادوں کو خصل کر دین، وہ ایٹنی سیپٹک کہلاتی ہیں اور جو ادویہ انکو ہلاک کر دیں اور بقدر حصہ کلک اور شرن فاسد ہو گیا ہے اسکو زہریلے اثر کو بھی ادریں وہ ڈس انفیکٹ کہلاتی ہیں زمانہ حال کی جراحی کی تمام کامیابی اور بچہ ترقی ایٹنی سیپٹک اور ڈس انفیکٹ ادویہ کو سہا ہے پر ہے انکی مختصر فہرست ذیل میں دی جاتی ہے۔

تفصیل کے لئے ان ادویہ کا بیان دیکھو۔

آکٹمال۔ اینتیم۔ ایسی۔ ٹوٹارٹریٹ آف الیومی۔ نم۔ آئیڈانائی۔ سک۔ آئیڈنیزواک۔ آئیڈبولک۔ آئیڈکف۔ آئیڈکاربالک۔ آئیڈکروک۔ آئیڈہائیڈروکلوک۔ آئیڈہائیڈروفلو اورک۔ آئیڈٹائیڈک۔ آئیڈٹائیڈ۔ گینگ۔ آئیڈسفیورس۔ آئیڈسیلیسلک۔ آئیڈڈرائی۔ کلورایسی۔ ٹاک۔ آئیڈپیڈو۔ او۔ میری۔ ناس۔ الیکٹریٹ۔ آئیڈمینائی۔ ایسی۔ ٹاس۔ اینٹی۔ سیپین۔ اینٹی۔ سیپٹال۔ الیپٹال۔ الیرین۔ ایو۔ کے۔ پیٹر۔ آئل۔ ایو۔ کو۔ لیپٹال۔ ایوجینیا۔ چکن۔ آکٹمال۔ آبوڈانڈ آف کیلیم۔ آبوڈین۔ ٹرائی۔ کلورائڈ۔ ایوڈو فارم۔ آبوڈول۔ آبوڈین۔ اولیم۔ گال۔ تھری۔ اولیم۔ منتھی۔ اولیم۔ ہائی۔ نائی۔ پومی۔ لیونس۔ بالسم۔ آف۔ ٹو۔ لو۔ بالسم۔ آف۔ پیر۔ وہیپی۔ ٹین۔ بیٹا۔ منتھال۔ بیٹال۔ ہنزوائن۔ بور۔ وگلیر۔ انڈ۔ بور۔ فوس۔ ٹال۔ پکس۔ لکویڈا۔ پیر۔ ونال۔ پوٹامی۔ کلوسس۔ پوٹی۔ گے۔ اگری۔ پوٹامی۔ پرمینگناس۔ پوٹامی۔ سلفاس۔ تھیو۔ کیف۔ تھیو۔ منتھال۔ تھائی۔ مال۔ تھائی۔ موٹیٹ۔ آف۔ سوڈا۔ تاکو۔ ٹرائی۔ برو۔ موٹیٹال۔ ٹرائی۔ کلوروفینال۔ ڈس۔ انفیکٹال۔ رسارمین۔ زنک۔ کلورائڈ۔ زنکائی۔ سیلی۔ سلاس۔ زنکائی۔ سلفو۔ کاربو۔ لاس۔ سیکرین۔ سال۔ الیمیر۔ سیلال۔ سیٹی۔ ٹاس۔ آئل۔ سیٹی۔ ٹاس۔ فلو۔ سوڈا۔ آبوڈول۔ سوڈی۔ ہنزوائس۔ سوڈی۔ کلوری۔ ٹی۔ لاگوار۔ سوڈی۔ کلورائڈ۔ میری۔ ویشیا۔ منتھی۔ سوڈی۔ فلو۔ سوڈی۔ سلاس۔ سوڈی۔ سلفو۔ کاربو۔ لاس۔ سوڈی۔ سلفو۔ ہنزوائس۔ سوڈی۔ ہائی۔ پوٹاس۔ کاکس۔ کلوری۔ ٹیٹال۔

کلوڈین۔ کلوروفارم۔ کافی کرے زوٹ۔ کرویلین۔ گلیسیرین۔ کائینولین۔ نارٹریٹ۔ کونین۔ سلفاس۔ کونین۔ سیلی
 سلاس۔ گل۔ بابونہ۔ لالی۔ کوپری۔ کن۔ ایکیولیٹا۔ نیتھال۔ مولوبروم۔ ایسی ٹینی۔ لائڈ۔ مرکورک۔ سائیڈ۔ مرکورک۔ کلوڈین
 نیفٹھیلین۔ سیلی۔ نین۔ لائڈ۔ راجائی۔ آکوٹائیڈ۔ لائڈ۔ راسٹین۔ لائڈ۔ روکانی۔ نان۔ ہائی۔ ڈرجن۔ پراکسائیڈ۔ لائڈ۔ راجائی
 ایٹھی سپین **Antiseptine** اسکا دوسرا نام پیرامونوبروم ایسی ٹینی لائڈ ہے۔ یہ ایک نباتی عمدہ
 ایٹھی سپینک ہے۔ اس میں بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں کسید طبعی نہیں ہوتی۔ زخموں پر لگانے سے ایک قسم کی چمکدار
 جھلی بن کر زخم بہت جلدی اچھے ہو جاتے ہیں۔ ۵۰ گرین کی خوراک میں کھانے سے سس کے بخار کو کم کرتی۔ تیریا فیس
 اور ٹائیفائیڈ بخار کو بھی کم کرتی ہے۔ ایٹھی پائیرین اور ایٹھی فیبرین کی طرح دافع اوجاع بھی ہے۔ نیو مونیامیں کھلائی
 سے عام ضعف اور زرد رنگ ہو جاتا ہے۔ بواسیر اور شکاف مقعد میں اسکا مقامی استعمال مفید ہے۔

ایٹھی فلو جیکس **Antiphlogistics** اس سے مراد وہ تمام ادویہ یا تدابیر ہیں
 جو ورم اور اسکی علامات حرارت۔ سوزش اور بخار وغیرہ کو تارفع ہوں۔ پہلے میں سہلات۔ مدرات۔ معرقات۔
 مضعف قلب۔ دوران خون۔ بلغمیک ٹھی۔ مونسٹ۔ الٹے۔ ٹوز وغیرہ ادویات اور فونٹے۔ شن۔ مینی۔ سکیشن۔ نیچنگ
 کانڈراری ٹیشن وغیرہ تدابیر شامل ہیں۔ چونکہ یہ لفظ اس قدر وسیع معنی رکھتا ہے۔ اس لیے کسی جنس۔ دوا کی نسبت یہ
 ظاہر کرنا کہ ایٹھی فلو جیکس ہی قرار پائے معنی بات ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آیا یہ خاص دوا علاج
 دافع ورم ہے۔

ایٹھی فلیکشن **Antiflexion** رحم کا گردن کو قریب ہی کی طرف کو خم کھانا ایٹھی
 فلیکشن کہلاتا ہے۔ رحم کے امراض کا بیان دیکھو۔
 ایٹھی فیبرین **Antifebrine** اس کے دوسرے نام ایسی ٹینی لائڈ۔ فیئل ایٹ۔ لائڈ ہیں۔ یہ ایک نباتی عمدہ
 ایٹھی پائیرینک اور جنرل سڈیٹو ہے۔ ایٹھی پائیرینک تاثیرات میں ایٹھی پائیرین اور فیبرین کی نسبت زیادہ قوی اور
 سریع الاثر لیکن انٹیجیک تاثیرات میں ایٹھی پائیرین کی نسبت کمزور ہے۔ ہر قسم کو درد خراش اور سوزش میں خواہ
 جلد میں ہو یا اعصاب احتشاء عضلات مفاصل اور اعضا میں مفید ہے۔ جو بخوابی کو درد دیا خراش کی وجہ سے ہو اسکو
 رفع کرتی ہے۔

ایٹھی پائیرین کی طرح دافع تشنج اور امراض مگی لم العیوان اور اختناق الرحم میں مفید ہے۔
 ۲۰ گرین فی اونس سلیپن میں ملا کر خراجا استعمال کرنے سے دردناک خنجر و درد اور سوزش کو کم کر دیتی ہے۔
 سوئے س میں پارہ کیمرکات کے ساتھ استعمال کرنے سے نہایت مفید ثابت ہوئی ہے۔
 ٹائیفائیڈ بخار میں استعمال کرنے سے بخار کم کرنے کے علاوہ ڈیپریم ٹریٹس اور بخوابی کو بھی آرام دیتی اور تھکان زیادہ
 کرتی ہے۔ پلویسی اور روح مفاصل میں جذب طبیعت کے تحریک دیتی ہے۔ سر اور چہرہ کی اسی ہی پلوس میں درد اور
 بخار کو رفع کرتی اور سس میں دافع بخار تاثیرات کو علاوہ جرمی ساڈھی فائدہ کرتی ہے۔ بخارات کو کم کرنے میں

اسکو انہی پائیرین کوبین ہسٹیلین اور کیرین پر یہ ترجیح ہے کہ یہ نظام اعصابی کے ذریعہ حرارت کم کرتی لیکن اعصابی مرکزوں ول اور گردوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔

ضعیف اور انہک بیماریوں میں اسکا استعمال حیاطی طاسی کرنا چاہیے۔ اکثر اس سے عام ضعف اور زرد رنگ ہوتا ہے۔ اسکی خوراک ۸ سے ۱۲ گرین تک ہر ایک دن میں ۳ گرین سے زیادہ ندینی چاہیے۔ عورتوں کو لیے پانچ چھ گرین فی خوراک کو حساب سے استعمال کرنا بہتر ہے۔ مقابلہ کے لیے قنٹین کا بیان دیکھو۔

ایٹلی منی Antimony

لاکوار ایٹلی منیم کلورائیڈم
ایٹلی منیم اکسائیڈم Antimonium
پلوس ایٹلی منیم لوس جیمیر پاؤڈر۔

خرائے ۴ گرین تک۔

ایٹلی منیم ٹارٹریٹم Antimonium Tartaratum بطور عرق ۱ گرین سے ۱/۲ گرین تک۔
ٹارٹار ایٹلیٹک۔

وانیم ایٹلی منیم لوس۔ ایونڈ سے ۴۰ یوٹنک عرق ہے۔ اور ۲ ڈرام سے ۱۰ ڈرام تک فی آور۔

ایٹلی منیم سلفیڈریم Antimonium Sulphuratum خرائے ۱ گرین سے ۱/۲ گرین تک۔

لاکوار ایٹلی منیم کلورائیڈ۔ خارجی استعمال میں اسکو رانک ہو گا۔ ہر گاہے گاہے خراب ساختوں کو جلانے کو لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹارٹار ایٹلیٹک خارجی استعمال میں خراش کر کے چھوٹی چھوٹی پھنسیاں اٹھا دیتا اور بطور کاؤنڈراری ٹنٹ امراض مفصل و شش و حشائی دماغ وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ داخلی استعمال میں بھی ٹارٹار ایٹلیٹک معدہ اور امعاء میں خراش کرتا ہے۔ اسلئے ایک سو گرین تک کی خوراک میں بہت سریع الاثر مفعول ہے اور ساتھ ہی سخت ضعف اور فشیان بھی پیدا کرتا ہے۔ اگر انڈیکس طور پر استعمال کیا جائے تب بھی بذریعہ خون اثر کر کے فوالاتا ہے۔ اسکا ڈاؤنٹر کچھ تو خاص معدہ پر خراش ہو کر اوپر کچھ مرکز تک پہنچ کر ہوتا ہے۔ ایو مارڈیک کم اور اپلی کے کو اناسے زیادہ سریع الاثر مفعول ہے۔ اسلئے اخراج ذہن کے لیے ایو مارڈیک بہتر ہے۔ سخت ضعف کی حالت میں بھی اس سے فو کرانی نہ چاہیے۔ مدت تک قلیل مقدار میں بھی استعمال کرنے سے خراش معدہ فشیان، ضعف اشتہا، ہمال، درد وغیرہ کی شکایات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ خون پر اسکا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ خون سے خارج ہو کر تمام اعضا اور ساختوں میں پہنچا نہیں دیر پا اثر پیدا کرتا ہے۔ سنکھیا اور فاسفس کی طرح مختلف ساختوں کو چربی میں بدل ڈالنا فعل کسی فوٹن کو کم کرتا اور ٹالیٹر و فوٹن مدہ زیادہ بناتا ہے۔ ایو جیو سو فوٹن اور برانی جلدی امراض میں مفید ہے۔ دوران خون کو کچھ معدہ کچھ خود قلب کو اعصاب و عضلات پر کچھ شرباؤن پر اثر کر کے بہت تخفیف کرتا ہے۔ اسلئے ایک قوی ضعف و دانی ہے۔ اس طرح سے مضغ متفصیل ہی نظام عصبی کو بھی سست اور ضعیف کرتا ہے یعنی کچھ بوجھ دوران وغیرہ اور کچھ براہ رست اثر کر کے ضعف پیدا کرتا چنانچہ اسکا استعمال سے سستی غنودگی اور عام ضعف بکثرت ظاہر ہوتے ہیں۔ ایو جیو سو کو ذیل میں ان ایو وغیرہ میں جو خراش اور گھبراہٹ دماغ سے پیدا ہوں

استعمال کرتے ہیں عضلات پر مبنی اسکا اثر ضعف درد اور تشنج ہوتا ہے۔ وقت پیدائش جب سختی فم کم ہو جیسا کہ ہوا سکو استعمال کرتے ہیں آخر کار بتدریج میوکن جھلیوں کو بہتہ خارج ہوتا ہوا مقام میں خراش پیدا کرنا ہی اسلئے جگر سے خارج ہوتا ہوا کو لگا لگا اثر معدہ و خارج ہوتا ہوا ایسٹیک اثر گردوں و خارج ہوتا ہوا ڈیورٹیک اثر پیچھے و خارج ہوتا ہوا لکھیک اثر اور جلد و خارج ہوتا ہوا ڈیورٹیک اثر پیدا کرتا ہے غرضیکہ ایٹمی ہنی اپنی شروع تا اثرات میں ضعف و سکن و دوران و تنفس و اعصاب عضلات وغیرہ ہے۔ آکسی وٹن کو کم کرنا ٹائٹروجن مادوں کے اخراج کو زیادہ عام نشوونما میں کمی اور زوال میں زیادتی کرتا ہے۔ ہر طرح سے گویا کہ نہایت عمدہ ایٹمی فلو جیک ایٹمی پائیرٹیک و جرنل سڈیو ہے اور تمام سخت بیماریوں مختلف اعضا اور ساختوں کے فطرتی توازن جبکہ تغیراتی اور گھبراہٹ زیادہ ہو نہایت مفید ہے۔ اور آخر کا مفعی۔ مخرج صفراء درد معرق مخرج لیغ وغیرہ تا اثرات ظاہر کرتا ہے اسلئے اکیوٹ۔ برانکائٹس۔ پلیموری رلیز نچائٹس۔ آرٹھرائٹس۔ پیریاڈائٹس۔ پیری ہائیٹس۔ اکیوٹ ہیپو کونڈریم۔ پیری ٹونائٹس۔ لمفائٹس وغیرہ امراض میں جبکہ مریض قوی اور توانا ہو نہایت مفید ہے۔ مقابلہ کے لئے اپی کے کوانا۔ اپومارینا۔ آرٹھرائٹس اور فاسفرس کا بیان دیکھو۔

ایٹمی ورشن Anteversion رحم کا اپنے اصل مقام سے سامنے کی طرف گرنے والا ایٹمی کہلاتا ہے۔ رحم کے امراض کا بیان دیکھو۔
ایمبولیوسائٹس Angeoleucytis لمفائٹس کا بیان دیکھو۔
اینڈارٹرائٹس Endarthritis شریانوں کو اندرونی غلاف کی سوزش کو اینڈارٹرائٹس کہتے ہیں اسلئے دو اقسام ہیں ایک اینڈارٹرائٹس دُفرائٹس یعنی اتھیروما۔ دوم سفلیٹک اینڈارٹرائٹس۔ اسکا علاج حسب اسباب اور حالت مریض کرنا چاہیئے دیکھو بیان شریانوں کے امراض کا۔

ایندرمک Endermic اس سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے ادویہ بذریعہ جلد اندر پہنچائی جاتی ہیں چونکہ چند ادویہ کو سہولتاً نام ادویہ سالم جلد پر لگانے سے کچھ اثر نہیں کر سکتی اسلئے جلد کو کھسک کر یا آبلہ اٹھا کر کچی جلد پر دوائیں لگانے کا رواج جاری ہوا تھا لیکن اب جلدی پچکاریوں کو مقابلہ میں یہ رواج کالعدم ہو گیا ہے۔ اب محض خاص خاص مجبوریوں یا ضرورت کی وقت یہ عمل کیا جاتا ہے مثلاً اگر مریض ہرگز سونے کا جلد میں داخل کرنا منظور نہ کرے یا جبکہ پہلے کا ونڈرائیٹس کی غرض سے آبلہ اٹھا کر بعد میں کوئی دوا لگانی ہو اس طریق سے ماریفانعموما اور کوئین اور شکرینا شاذ و نادر استعمال کی جاتی ہیں کچی جلد کرنے کے بعد ادویہ بطور سفوف یا مرہم استعمال کر سکتے ہیں۔

ایندوسروئیٹس Endocervicitis رحم کے امراض کا بیان دیکھو۔
ایندوکارڈائٹس Endocarditis ب کے امراض کا بیان دیکھو۔
ایندومیٹرائٹس Endometritis رحم کے امراض کا بیان دیکھو۔

اینڈیرا انرمس **Andera Inermis** اس کو دوسرے نام جھڑی انڑا اور کیچ بارک ٹری بھی ہیں۔ اسکی چھال انتیجھٹنک و فیبری میوچ ہے فزبی کو کم کرتی اور سائیکل ایڈک کے ساتھ اس مطلب کو لیے بکثرت استعمال کیجاتی ہے۔ زیادہ مقدار میں مٹی پھل اور مخدر ہو دھم سفوف ۳ سے ۴ گریں تک۔

اینڈیکانڈروما **Enchondroma** ایسی سولی کو جو کارسینیج یعنی مری ہڈیوں کی مٹی ہو انڈیکانڈروما کہتے ہیں جراحی عمل سے نکالنا ہی اسکا علاج ہے۔

اینکفالائٹس **Encephallitis** ورم دماغ۔ دماغ کے امراض کا بیان دیکھو۔

اینکفالوائڈ **Encephaloid** یہ ایک قسم کا نرم کنسر یعنی سرطان ہوتا ہے اور اسے جو جی اسکا اینکفالوائڈ ہے۔ اگر ممکن ہو تو جراحی عمل سے اسکا بالکل قطع کر دینا ہی علاج ہے۔

اینکفالوسیل **Encephalocoele** دماغ کی کو پھری میں سوراخ ہو کر اپنے غلافوں سمیت باہر نکلا نکلتے ہوئے کہلاتا ہے بعض اوقات پیدائشی ہوتا ہے اور بعض اوقات اتفاقی۔ سری برم کا بیان دیکھو۔

اینکلوکوسس **Anchyllosis** جوڑوں کا سخت ہو جانا اینکلوکوس کہلاتا ہے اسکے دو قسم ہیں۔ فائبرس اور بونی۔ فائبرس میں ایسی قدر حرکت باقی رہتی ہے لیکن بونی میں بالکل نہیں۔ اسکا علاج سولے جراحی عملوں کے اور کچھ نہیں۔ جراحی عمل تین مطالب سے کیا جاسکتا ہے۔

اول۔ اگر ممکن ہو مریض کو بیہوش کر کے زائد دیشوں وغیرہ کو جو حرکت کو مانع ہیں توڑ دیا جاوے تاکہ او ف جوڑ میں حرکت قائم ہو سکے۔

دو۔ اگر او ف جوڑ میں کسی طرح حرکت کا بحال کرنا ممکن نہ ہو تو اس جوڑ کو ٹانگہ ایسی وضع پر ملا دیا جاوے کہ عضو او ف کا رآمد ہو سکے مثلاً اگر گھٹنے خدرا جڑ گیا ہے تو جراحی عمل سے ایک فائر کی شکل کا ٹانگہ جوڑ کی ہڈیوں سے ٹانگہ لگا کر ٹانگہ کو مستقیم حالت میں رکھ دیا جاوے تاکہ ٹانگہ گھٹنے پر سے سیدھی جڑ کر قرار میں کارآمد ہو سکے۔

سوم۔ اگر عضو او ف نہایت دبلا اور ناکارہ ہو گیا ہو تو اسکا مفایدہ بوجہ دور کرنے کی غرض سے لیمپوشن کر دیا جاوے تاکہ مفایدہ بوجہ کی دقت سے بچا جاوے اور مصنوعی ٹانگہ وغیرہ لگائی جاسکے۔

اینالجیشیا **Analgesia** اس درد معدوم ہونے کو اینالجیشیا کہتے ہیں جس کے امراض کا بیان دیکھو۔

اینیل فیچرلا **Anal. Fistula** ناسور مقعد۔ { سوکیم کے امراض کا بیان دیکھو۔

اینیل فشر **Anal Fissure** شکافی مقعد۔

این ہائڈراکٹس **Anhidrotias** سینہ بند کن نیوالی ادویہ اور تداویر کو اینہائڈراکٹس کہتے ہیں

الکھال مقامی تخیر کیمات میں دارکٹ ایڈسلفیورک ٹو ایلیوٹ لیٹ سیلی سلک تمام جسم ضعات جبکہ الکھال قیق حل کر کے جلد پر لگایا جاوے تو ایڈسلفیورک ٹو ایلیوٹ لیٹ سیلی سلک نرنک لگاتا ہے۔

اینوریا **Anuria** احتباس البول کا بیان دیکھو۔

ایلو سرشین Euceration سینہ یا شکم کے اعضا کا کال دینا۔ عسر الوادات کو وقت جبکہ بچہ کا سائل پیدا ہونا نامکمل ہو جاوے اور گردن پر کوئی اوڑار قائم نہ ہو سکے اس حالت میں یہ کچھ کش عمل اختیار کیا جاتا ہے۔ اس طریق یہ ہے کہ سینہ میں سوراخ کر کے سینہ اور شکم کے اعضا کو کچل کر کال دیتے ہیں۔ بعد ازاں اندر ہی اندر پیچی کے ساتھ ریڑھ کو کاٹ دیتے اور ایک تیز کباب اندر کی طرف پھنسا کر کچھ کو باہر کھینچ لیتے ہیں۔ یا کاندھک باہر کی طرف پھنسا کر یہ عمل کرتے ہیں دیکھو بیان امیر برائٹی کا۔

ایوفارسیا پیلولی فرا۔ *uphorbia pilulifera*۔
 اور اسٹرین آسٹاویڈ بھی ہیں۔ یہ ہوائی نالیوں کو لیے اعلیٰ درجہ کا تاناکا و درافق تشنج سے جو دکشی کہ دمہ یا
 ایف پی سیما یا پرانی کھانسی کی وجہ سے ہواوسکی لیے ایک نہایت بیش قیمت دوا ہے دمہ کی نوبت میں اعلیٰ درجہ پرغیرتہ ہو جا
 خ سفوف نبات ہ سے اگرین تاک فلوئڈا کسر اکٹ ۱۰ ابوند سے ۳۰ بوند تک ۔
 خشک اکسر اکٹ ایک گرین سے ۴ گرین تک بکھر ابوند سے ۴۰ بوند تک ۔

ایوکی لیٹس راسٹر اٹا۔ Eucalyptus Rostrata اس کا سرخ گوند طب میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ گوند مضبوطی کی ساتھ جھلیوں پر چکر دیر پا قابض اثر پیدا کرتا ہے مختلف اقسام اسہال و پیش ز منہ میں مفید ہو
نکسیر بول الدم نزف الدم اسہال الدم وغیرہ میں بطور یحکا سی استعمال کرنا مفید ہے حجر ہوی اگر ن تک
ایوکی لیٹس گلما بیولس Eucalaptis glabulus ایوکی لیٹس گلما بیولس ایوکی لیٹس گلما بیولس
اس کے پتے مقوی محرک دارق شنج نافع بخار اور امشی سپیک میں اسلے مفصل ذیل امراض میں بکثرت
استعمال کئے جاتے ہیں۔

(۱) امراض شش مثلاً برونکائیتس بہونیک کف نگارین بل استھما نزلہ و زکام اور نینا وغیرہ میں بطور انفیوژن و اینٹی لیشن
(۲) ڈیفنہیر میں اسکی بھانپ گلو میں پہنچانا۔

(۳) مجھری پیشاب و نشانہ کی سوزش میں۔

دھم مقامی طور پر دھن اور گلو کے زخموں اور نیز خراب جلدی زخموں میں

۵۔ ابو نذر سے ۶۰ بونڈ تک۔ ٹیکچر $\frac{1}{4}$ ۔ ڈرام سے ۲ ڈرام تک۔

ایونی مس اثر و فینتص *EnmusAtrophanthus*
ایونی مین *Eunymine*

اثر وقتی کہ جمال پر ہے نکالا حاقا ہے۔

مقوی ملیں۔۔۔ مخزن لجم مخزن صفرا عمر کعدہ و سیرا اس ہی چونکہ یہ تیز بہل نہیں ہو ایسے ہاتھ

کوئی تکلیف پہل دینا ضروری ہوتا ہے۔ غلبہ صفرا بہ مضمی قبض۔ استقا اور کورخصی میں مفید ہے پسین اور کیکرا سیکرڈ کے ساتھ ملنے سے اسکی تاثیرات کو بہت مدد ملتی ہے۔

باب لکباء الموحدا

بارنگ۔ ایسی لیاریائی نیز۔ برنج قبالی۔ مخزج ریح مقوی معدہ۔ قاتل کرم امعا۔ اور اینٹی سپیٹیک ہے۔ نفخ معدہ مضمی۔ مرج مفاصل اور جلدی امراض میں مفید ٹیپٹرم دکو و دانہ کرلیے نہایت عمدہ قاتل ہے معمولی طور پر مریض کو ایک دو روز فاقہ کر کر صبح کے وقت اسکا سفوف ایک ڈرام سے ۴ ڈرام تک خوراک میں استعمال کریں۔ لیکن چونکہ یہ خود سہل نہیں ہے اسلئے اسکے کھلانے سے تین چار گھنٹہ بعد کسٹرائل دینا ضروری ہے تاکہ ہلاک شدہ ٹیپ ورم خارج ہو جاوے و خیم سفوف ایک ڈرام سے چار ڈرام تک۔

بابونہ۔ اینٹی سسٹمی نوبلی لس کا بیان دیکھو۔

بارتھ۔ ضل۔ ایلوشن کا بیان دیکھو۔

باجرا۔ غذا کا بیان دیکھو۔

بادام۔ آمڈخ آمڈکچر۔ اونس سے ایک اونس تک۔

بادیان۔ سوف کا بیان دیکھو۔

بادیان خطائی۔ سوف کا بیان دیکھو۔

باربری Barberry بربریس و لکیرس بربریس لانی سیم۔ اسکی لکڑی کا نام دار ہلد اور لکڑی کا نام رسوت ہے اس میں ایک جوہر نکلتا ہے جسکا نام بربرینا یا بربرین ہے۔

اسکے ورقت کی چھال اور چوب اسٹرنجٹ مفرح نافع امراض نوبتی مقوی۔ اینٹی سیک اور معرق ہے۔ کثرت الطقت امراض صفراوی۔ یرقان، سہال و پشیش میں مفید ہے اسکا پھل بھی مخزج صفرا۔ ٹانگ اور اسٹرنجٹ ہے اسواسطے اسکا عرق کسیرتو اسیر نفث الدم، نزف الدم اور بول لدم وغیرہ جریان خون بخارات صفراوی۔ ویسٹلنٹ میں مفید ہے۔ بربرین بترٹانک و لاتی پیریاڈک ہے۔ رسوت۔ کوکل اسٹرنجٹ۔ ٹانگ بیٹیو اینٹی سیک اور لکڑی ٹو ہے۔ پشکری اور افیون کے ساتھ ملا کر آشوب چشم میں نہایت مفید ہے۔ پھوڑ و غیر ذی میں حل کر کے لگا ما مفید ہوتا ہے۔ خمر سفوف چھال ۱۰ سے ۲۰ گرین تک۔ فلوئڈ کسٹرائٹ ۲۰ بوند سے ۶۰ بوند تک۔ بربرین فاسفاس ایک گون سے ۴ گرین تک۔ بربرین اینڈروکلوراس۔ بربرین فاسفاس ایک گون سے ۴ گرین تک۔

بارنیز بیک Barney's Bag یہ ایک ننکی شکل بڑی کی تبدیل ہوتی ہے جسکے سنے کاندر کپتھیر داخل کر کے ہوا سے پھلا سکتی ہیں کپتھیر کے ذریعہ اسکو گردن رحم میں داخل کر کے دھونکنی کے ساتھ جو ہے پھلا دیتی ہیں۔ یہ عمل مصنوعی ولادت یا اسقاط حمل کے لئے کام آتا ہے۔ کھاتے نیز جبکہ پیدائش کو وقت سروکس کیوجہ

سے کشادہ نہ ہو تو بار نیز بیک کو ذریعہ کشادہ کر سکتے ہیں

باک بھرنڈا۔ جیسٹروپاکر کس۔ کرکس پرگنس۔ قرک نٹ۔ پر جنگ نٹ۔ اسکا وودھ حابس الدم اور قاتل کرم جلدی ہوا لیے نزل الدم اور خارش دادہ وغیرہ امراض جلدی میں مفید ہے اسکے تخم تیز مسبن مٹی۔ اور قاتل کرم امعا ہیں۔ اسکے پتوں کی پولس اخراج بشیر زیادہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے بخم روغن باک بھرنڈا ۳ بوند سے ۵ بوند تک۔

بال توڑ۔ بھوڑا۔ ذنب۔ دیکھو بیان ذنب کا۔

بالڈنس Baldness الوپے شیا۔ گنج کا بیان دیکھو۔

بالچھڑ۔ جناسی سنبل ہندی۔ بالچھڑ خوشبودار محرک بخرج بلغم۔ دافع تشنج مقوی اعصاب۔ در حیفٹ در بول ہے۔ اطباء قدیم اسکو مرگی۔ عشتہ۔ اختناق الرحم اور تنجی امراض میں استعمال کرتے رہے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ دلیہ میں کا عمدہ قائم مقام ہے خمر سفوف بالچھڑ گرین سے ۴۰ گرین تک بیکچر ۱/۲ نصف ۴ سی ڈرام تک۔

بالسم آف پیرو Balsalm of Peru خمر ۱۰ سے ۵۰ بوند تک۔ ۲ بالسم آف پیرو

بالسم آف تولو Balsalm of Tolu خمر ۱۰ سے ۲۰ بوند تک۔ بنزواک ایڈسنوٹک

بالسم ڈیپروکارپائی Balsalm Dipterocarpi البڈ اور یزن

بالسم کوپائیوا Balsalm Gopaiva خمر ۱/۲ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔ ہوتے میں اسٹیلے

اولیم کوپائیوا ۱۵ سے ۲۰ بوند تک۔ ۲۰ سی ڈرام نصفی خون۔ خارجی استعمال

بالسم گرجن Balsalm Gurjun خمر ۱/۲ سی ڈرام تک خمر بلغم۔ میں انٹی میٹک۔

ڈس انفلیکٹ واسکو لریٹی مولٹ اور زوائن سڈیو ہی۔ زخموں بید سور کرانک اگنوما خارش و رسک و نیز میں

مفید ہے۔ داخلی استعمال میں دیگر لطیف روغنوں کی طرح خمر بلع معدہ اور امعا ہی۔

کو انک براکائیٹس میں نہایت عمدہ اینٹی سپٹک اور ڈس انفلیکٹ خمر بلغم ہے تفصیل کیلئے دیکھو بیان

نیز واین سائی ریکس اور آئل ٹریٹنٹین کا۔

بالسم آف تولو۔ اپنی تاثیرات میں بعینہ بالسم آف پیرو کو مشابہ ہے لیکن محض اخلی طور پر کف کسچر میں استعمال کیا جاتا ہے

بالسم آف پیرو کی نسبت زیادہ خوشگوار ہے۔

بالسم ڈیپروکارپائی یا **بالسم گرجن** یا **اولیم ڈیپروکارپائی** یا **گرجن** آئل اپنی تاثیرات میں بالسم کوپائیوا کو مشابہ ہے لیکن

اسکے ضرر وں میں خارش معدہ و امعا جلدی اجزات وغیرہ دوسری ہو تمام حالتوں میں بالسم کوپائیوا کی جگہ اسکو

استعمال کر سکتے ہیں دیکھو ذیل میں بالسم کوپائیوا کا بیان خمر ۲۰ سے ۶۰ بوند تک بطور نصفی خون اور ۱/۲ ڈرام

۲ ڈرام تک بطور خمر بلغم۔

بالسم کوپائیوا یا **کوپائیوا**۔ یہ ایک نہایت تیز اہد مزہ اولیو ریزن ہی معدہ میں پہنچتی ہی حرارت خراب و کار

اور سوزش پیدا کرتا ہے زیادہ مقدار میں یا دیرینہ استعمال میں اس سے بدضمی، غشیان اور اسہال ہو جاتے ہیں
ایسے سوزش معدہ و امحاک کی حالت میں اسکو استعمال نہ کرنا چاہیئے خون سے گذر کر پیشاب پسینہ اور دم کو ساتھ
خارج ہونا ہو اگر دوں جلد اور ہوا کی نالیوں پر پٹی مولٹ اور اینٹی سیپک اثر پیدا کرنا ہی پیشاب جلدی
اور زیادہ مقدار میں آنے لگتا اور بعض اوقات گردوں میں کھجبین ہو کر قلیل المقدار اور خون آمیز ہو جاتا ہے۔
اور کمر میں درد معلوم ہونے لگتا ہے۔ تمام پیشاب کی نالیوں یو سے ریشانہ اور یو سے تھرا پر پٹی مولٹ اور
ڈس انفیکشنڈ اثر پیدا ہوتا ہر اکائی پر بھی ایسا ہی اثر ہو کر اخراج بلغم میں تائید ہوتی اور جلد پر میزبل کی زخا
ابحزات نمودار ہو جاتے ہیں بطور مدد اسکو کارڈیک اور سپرٹک ڈرائیسی میں استعمال کرتے ہیں لیکن برائیس فزیز
میں اس سے احتیاط لازم ہے ریشانہ اور بھری پیشاب کی سوزش مزمنہ خاص کر سوزاک میں جبکہ ورم اور درد و غیر
کم ہو گئی ہوں بالسم کو پائیا نہایت مفید ہے لیکن عورتوں کے سوزاک اور ویکائی نانی ٹس کو چندان فائیت
نہیں کرتا چونکہ سانس کی ہوا میں اس سے سخت بدبو ہو جاتی ہے۔ ایسے امراض تنفس میں اسکو استعمال کیا جاتا ہے۔
فالٹا تمام ادویہ ریزنوں کو میو سلج اور سرپ یا لانگو اور پٹاسی ملکر استعمال کرنا بہتر ہوتا ہے
بالنگو۔ مفرح۔ مقوی قلب۔ نافخ حقائق و خوش اسہال موی ہر خمر ایک ڈرام سے ۴ ڈرام تک۔
بانجھین۔ عفر۔ دیکھو بیان سیری لٹی کا۔

سہاگہ کا بیان دیکھو۔	Biborate of Sodium	بائی بوریت آف سوڈیم
وائی سلفائیڈ کاربن کا بیان دیکھو۔	Bisulphide of Carbon	بائی سلفائیڈ آف کاربن
کونین کا بیان دیکھو۔	Bisulphate of Quinine	بائی سلفیٹ آف کونین
سوڈیم کا بیان دیکھو۔	Bicarbonate of Sodium	بائی کاربونیٹ آف سوڈیم
پوٹاشیم کا بیان دیکھو۔	Bichromate of Potassium	بائی کرومیٹ آف پوٹاشیم
اسکا ورس نام والی	Bichloride of Methvlene	بائی کلورائیڈ آف میتھی لین
ہال آکس	Bile Ox	ہال آکس
کر کے پسینہ الگ کر دینا اور خود بے اثر ہو جانا ہی یہ ایک تلخ مقوی معدہ اور مخرج صفر اخیال کیا جاتا ہے۔		
بایلز	Boils	بایلز
بیاچی	Bibachi	بیاچی
بیول کا گوند۔		بیول کا گوند۔
بیر و بارک	Beberu Bark	بیر و بارک
بیریا	Beberia	بیریا

بیسرین سلفاس Beberine Sulphas | خوشبودار تلخ ادویہ کی طرح اینٹی سپٹک اور
اینٹی پارائٹک اور اینٹی پیریڈاک بھی ہے۔ بھرین اگزین سے اگرین نمک۔

بھوری - Bitori تھیلی دار رسولی - ویکھو بیان سٹکار۔

بٹر فلائی وید Butter Fly weed بیوری روٹ رکاکل روٹ۔ البکلی پائیں سوچو فرلا
اسکی جڑ و اف تشنج محجج ریا ح۔ مدر معرق، ملین اور قدرے ٹانگہ ہر سیرس جھلیوں کی مصلح کرتی بیوری
قوی لچ اور پچیس میں مفید ہے۔ بیوری میں اگر بار بار دیکھا تو خوب پسینہ آکر آہم ہو جاتا ہے بخار زدہ و نزلہ
سرفہ۔ اعتباس الحث فضل اور سرخ جگر میں مفید ہے ختم سفوف۔ سے بکترین نمک۔ البکلی پائی وین
بک سی پانچ گزین تک۔

Butter Nut جڑواں سائی شیریا کا بیان نہ کیجیو۔

مشہور - نظم - سرور و کجویان زخم کا۔

شہرِ الحلق۔ حلق کے زخم فیہ خلیل السرزہ بیان دیکھو۔

نورینمی۔ تاک کہ زخموں کا بیان دیجیو۔

بنحو رحمہ رحمہ کے زخم رحمہ کے امراض کا بیان دیکھو۔

بسم الله الرحمن الرحيم

یہ سب سے پہلی کتاب ہے۔

مکہ مکرمہ کی طرف - آواز نہ نکالو۔ اور فزائے کار ادا نہ کیجیو۔

کچھ اور غنا بھی اس غنا کا

پہلوں میں عدا۔ دیکھو بیان غنا کا۔

بجارت - لیبرل فیوز کا بیان دینے کے لئے

حرف الف - اوزینا کا بیان دیکھو۔

دیکھو بیان ڈسپیکا۔

برازیلیئن کوکا۔ Brazilian Cocoa گے ناہو بیان و کیمبو۔

azelian Holly برازيلين هولى

ronchitis

Bronchorrhoea

برونکیٹائس
Bronchitis

۳) کراٹک برائے کھائی میں ۴) کروڑیں برائے کھائی میں ۵) براؤنچی لگنے میں صبح ہوائی تالیق کا کسا و چلانا

اقوال۔ اکیوٹ برائیاں لاش میں سینے کے اندر چلے، ہر گرم ہڈی اثر اور کرانہ ری معلوم ہوئی۔

یہ سب کچھ دیکھ کر میں نے سوچا کہ میں نے کیا کیا ہے۔

عموماً خفیف سردی کے ساتھ شروع میں بخار ہو جاتا اور کھانسی بار بار اٹھتی ہے۔ بلغم جھاک دار سفید خارج ہوتا ہے جو پہلے رقیق اور بعد میں غلیظ ہو جاتا ہے۔ سانس میں دقت معلوم ہوتی اور ضعف بہت طاری ہو جاتا ہے۔ دکشی اور ضعف کی وجہ سے دماغ میں اجتماع خون ہو کر کبھی کبھی ہڈیاں اور تشنج بھی ہو جاتے ہیں۔ کھانسی تھوٹے تھوٹے وقفہ سے اوجھتی ہے۔ بلغم میں کبھی خون کی سرخی بھی آ جاتی ہے۔ یہ تو معمولی کیوٹ برائگیٹس کا حال ہے واجب سوزش چھوٹی ہوائی نالیوں سے بڑھ کر خوردبینی نالیوں میں پہنچ جاتی ہے تب دکشی نہایت ہی شدید ہو جاتی۔ بلغم بہت بڑی تکلیف اور درد کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ بے چینی، خوف اور بخار زیادہ ہو جاتے ہیں۔ شدت دکشی ضعف بخار اور بچینی سے مریض نہایت مضطرب ہو کر نڈھال پڑ جاتا ہے۔

سانس جلدی جلدی اور دقت کے ساتھ آتا۔ ٹھوکنے سے سینہ بعض بعض جگہ اجتماع بلغم سے ٹھوس معلوم ہوتا اور بعض حصوں میں نالیوں کی کشادگی کی وجہ سے زیادہ صاف سانس کی آوازیں کھروری اور کرخت ہو جاتی ہیں۔ بہت قسم کی زور خشک، ازین چھوٹی اور بڑی سنائی دیتی ہیں جو تنگ نالیوں اور رطوبت کو اندر ہونے کے گزر سے پیدا ہوتی ہیں۔

اسباب ۱۔ اخراش کنندہ ہوائوں یا ذرات کا سانس کے ساتھ اندر چلے جانا مثلاً تعفن خیر ہوائیں اور گرد و غبار وغیرہ (۲) فسادات خون مثلاً قبض احتباس البول احتباس الطمث ٹائیفوس ٹائیفائڈ فیوریمونیک کف میزائز۔ آتشک۔ ہیپوٹرم وغیرہ (۳) وبائی طور پر انتقالوازا کے ساتھ ہو جاتی ہے (۴) بچپن یا ضعیف عمر۔ رت عادات مرطوب مقام۔ گرد و غبار میں کام کرنا وغیرہ بطور سبب بعیدہ عمل کرتے ہیں۔ انجام۔ یہ مرض جو انہیں زیادہ ہلکے ہوئے اور تین ہفتہ تک ہوتا ہے دکشی کی شدت ہڈیاں اور تشنج خرابا ہوتے ہیں۔ کبھی اسکے بعد نیو مونیایا ایفیسیا یا سبب بھی ہو جاتے ہیں۔

دوا مکرر آتشک برائگیٹس۔ اس کی دہی علامات میں جو اکیواٹ برائگیٹس میں بیان کی گئیں گرا اسکی نسبت خفیف ہوتی ہیں۔ بلغم غلیظ جاہوا اور بدبودار نکلتا ہے اور کسی قدر سبزی مائل ہوتا ہے اسکی تین اقسام میں دوا معمولی کر ایک برائگیٹس۔ جسکا بیان کیا جا چکا۔

(۴) خشک برائگیٹس۔ اس میں خشک کھانسی اور دکشی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ (۵) برائگیٹس۔ اس میں بلغم نہایت کثرت سے خارج ہوتا ہے نہایت کم ایک دن رات میں تین چار سیر کر قریب خارج ہو جاتا ہے جو بہت رقیق ہوتا اور ایں نظر آتا ہے گویا کہ انڈے کی سفیدی اور پانی ملا دیئے گئے ہیں۔ کھانسی دورہ کے ساتھ اٹھتی ہے یہ حالت عموماً بوڑھوں یا ایسے اشخاص میں ہوتی ہے جو کسی قلبی مرض میں مبتلا ہوں۔ برائگیٹس کا تین بہت مشکل سے علاج پذیر ہوتا ہے۔ عموماً اسکے بعد ایفیسیا یا برائگیٹس یا سبب یا پھیپھڑوں کا کوئی پس نہ جاتے ہیں۔

سیو مکرر ولس برائگیٹس۔ اس میں ریشہ دار بلغم خارج ہوتا ہے کھانسی اور دکشی کو دور ہوتے

میں کبھی کبھی خون بھی کھانسی کے ساتھ خارج ہوتا ہے بعض نالیوں ریشوں سے اٹ کر لجاتی اور جب قدر حصہ شش میں اسکی شاخیں پہنچتی ہیں وہ حصہ یکبار پر جاتا ہے یا اس میں لمبی سا ہو جاتا ہے۔ بجا کبھی ہو جاتا ہے اور کبھی نہیں ایک دفعہ شروع ہو کر بعد میں برسوں تک جاری رہتی ہے مگر کبھی کبھی تخفیف ضرور ہو جاتی ہے۔

بچھٹا۔ برائے کھانسی۔ ہوائی نالیوں کا کشادہ ہو جانا۔ یہ مرض عموماً بڑے بڑے برائے کھانسی سے پہلے ہوتا ہے۔ بعد شروع ہوتا ہے اس میں بلغم کثرت خارج ہوتا اور اس میں سخت بد بو آتی ہے۔ بھوکے سے نعلیوں کی آواز سے سننے سے نکلتی ہے۔ سانس ایسے زور کا سنا دیتا ہے جیسا کہ بچھٹائیوں میں سے ہوا گذر رہی ہے۔ کلام کی آواز پر برا کافونی اور پیکشوری لو کی سنائی دیتی ہے۔

حفظ صاقت۔ بچوں۔ نوجوانوں۔ بوڑھوں وضعیفوں کو جو بلغمی مزاج کو ہوں تغیرات و سم سرد اور مرطوب ہواؤں ترش چینیوں اور پچاؤں مرطوب غذاؤں اور گرد و غبار وغیرہ کا احتیاط رکھنا چاہیے ہمیشہ تمام جسم کی پرورش اور طاقت کی طرف خاص توجہ رکھیں۔ سردیانی سے حمام نکریں۔ شربت چوند۔ روغن ہابی۔ فولاد وغیرہ عقویات کا استعمال گاہے گاہے کرتے رہیں۔ موسم سرما میں جبکہ بارش ہو کر ہو سخت سرد اور مرطوب ہو جاوے تو ایک مناسب گرمی میں محدود رہیں۔

علاج۔ احوال ایکوٹ ڈیفی برائے کھانسی۔ مریض کو گرم کپڑے پہنا کر ایک مناسب مکان میں سرد اور مرطوب ہواؤں سے محفوظ رکھیں۔ غذائیں رقیق سیرج ہضم اور سادی کھلائیں۔ مثلاً ساگو دانہ دودھ اور سوڈا واٹر آتش جو۔ ولیدہ جریہ بخنی۔ ہیشہ نیم شربت۔ دال مونگ کا پانی وغیرہ شروع میں جبکہ خشک کھانسی کی وجہ سے دکھائی اور تکلیف زیادہ ہوتی ہو بار بار ایمینک کی برابر دوسری کوئی دوا مفید نہیں ہے۔ پوناسیم آیوڈائیڈ مارینا کو دیا یا ایون کو ساتھ ملا کر استعمال کرتے سے کھانسی میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ مگر اخراج بلغم زیادہ ہو کر نالیوں کے درم کو آرام ہو جاتا ہے۔ تخفیف برائے کھانسی میں مفصلہ ذیل نسخہ بوقت شب بلا کر صبح کو ایک نمکین سہل دیدنا دو ایک ہی روز میں عموماً کھلی آرام کر دیتا ہے۔ خیم دو ورس پاؤڈر گرین۔ پیچر نائٹرو سالی ایک ڈرام لایکو ارامونیا ایسی ششیں ۲ ڈرام کو اکفر ڈیڑھ اونس۔

اگر بخار زیادہ ہو تو مفصلہ ذیل نسخہ نہایت مفید ہوگا۔

نیکٹر کو نائٹ ۴ پونڈ وائٹ اینٹی پوسٹ ۲ ڈرام لایکو ارامونیا ایسی ششیں ایک اونس کو اکفر اونس۔
 ان میں سے ایک اونس تین تین گھنٹہ بعد پالتے رہیں اگر قبض کی شکایت نہ ہو تو اس میں لایکو ارامونیا ایسی ششیں ۵ پونڈ فی خوراک ملا سکتے ہیں۔ جب خشکی۔ دکھائی اور بخار کی تکالیف رفع ہو جاوے تب لایٹ منی اور اگونائٹ کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ محرک بلغم اور مثلاً امونیا کاربوناٹس۔ سینکلا۔ سلا۔ سرب۔ آف ٹولو۔ کفر۔ نو شادر وغیرہ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر مضعف زیادہ ہو تو مضعف ادویہ یعنی انٹی منی۔ اگونائٹ وغیرہ سے پرہیز رکھیں بلکہ امونیا کاربوناٹس۔ نو شادر۔ سلا۔ سینکلا۔ پوناسیم آیوڈائیڈ۔ کوئین۔ سرب۔ آف ٹولو اور کافور وغیرہ استعمال کریں۔

گروہ کی ہوا کو پانی کی بجائے تر کھنا نہایت مفید ہے۔ خارجہ سینہ کو بالائی حصہ پر نٹ آؤڈین، بیکچر آؤڈین وغیرہ لپ کرنا یا گرم پولیس الکانامی مفید ہیں۔

دوم۔ ایکوٹ کمپری براکائیٹس اسکے علاج کے لیے مفصلہ ذیل اصول میں را، براکائی جملی کی سوچن کو کم کرنا (۲)، اگرچہ گارہاد فیل المقدار ہوا و سکورق کرنا (۳)، اگرچہ کم تر بہت کم سخت کوشی ہوئی ہو اسکی کمی کی کوشش کرنا (۴)، اخراج بلغم کی تداریک کرنا (۵)، مسکن ادویہ کا استعمال کرنا کہ براکائی کی خراش و سوزش کم ہو کر زائد کھانسی میں کمی ہو۔ (۶)۔ کھینچ کر خون کی تادیک کرنا کہ اتھار خون ہو کر کھینچن ہو مونیہ اور ڈوائی لے میٹن آف دی رائٹ ہارٹ نہ ہو تو زیادہ (۷)۔ بار اور عام ضعف کو لیے عام تداریک کرنا۔

آن اصول کی تعمیل میں مریض کی حالت عموماً درجہ مرض کا خیال رکھنا بھی نہایت ضروری ہے۔

پس اگر مریض جوان اور قوی ہو تو مفصلہ ذیل تداریک و علاج حسب موقعہ کریں۔

کم۔ سکی ہوا کو پانی کی بجائے سرد تر اور گرم رکھیں۔ فی پانٹ پانی میں ۲ قطرہ پانی نال کر ملانا اینٹی سیک اور سٹی مولٹ فائدہ بخشتہ گا۔ مینو بیم کو اوپرچھ سات جو نکلیں اور نچھ پر ہر دو کو ہلا کے درمیان گلاس لگا دیں اگر سینہ دیکشتی ہو تو فصلیں۔ پولیس جاکٹ کا لگانا بھی مفید ہے۔ ادویات میں ٹارٹار ایٹک سب سے عمدہ ہے اس کو معرفات اور درات کو ساتھ جیسا کہ آرڈنری براکائیٹس میں بیان ہوا استعمال کرنا چاہیے شروع میں ضرورت ہو رات کی وقت کیلوں یا بلبل دیکر صبح کی وقت تکلیفیں سہل مثلاً امیکٹیا سلفاس یا سوڈی سلفاس وغیرہ دیں۔ افیون کو استعمال میں نہایت احتیاط لازم ہے بچوں اور بوڑھوں کو ہرگز نہ دینی چاہیے خواب دیر دیر کے استعمال میں بھی احتیاط چاہیے کیونکہ فینہ کی حالتیں بلغم زیادہ جمع ہو کر سخت دکنی پیدا کر سکتا ہے۔ ایکٹ فم میں ڈیز گھٹنے سے زیادہ نیند کا انا اٹھیشہ ناگ ہے۔

اگر مریض خورد سال ہو تو افیون اور منوم ادویہ ہرگز استعمال نہ کریں بشرط میں ٹارٹار ایٹک میں درج بلغم کثیر انحصار اور پیپ کو رنگ ہو مادی اسکا استعمال بند کر کے سٹی مولٹ اسپیکٹورٹس مثلاً سیلگا۔ سلا۔ امونیہ کاربونا سپرٹ کلورافام وغیرہ استعمال کریں۔

اگر مریض بہن سال اور ضعیف ہو تو شروع سے ہی سٹی مولٹ اسپیکٹورٹ دین مثلاً امونیہ کاربونا ۵ گزین وائیم ای کاک۔ ایوڈ ٹیکچر سکونا، ایوڈ کو اکلوروفارمی ایکل وٹل ایسی پانچ چھ خوراک وزانہ اگر مریض رانا جو کو بلغم کاڑھا اور پیپ دار ہو گیا ہو تو مفصلہ ذیل نسخہ بہتر ہے۔ چاسی آیوڈائڈ ۵ گزین امونیہ کلورائیڈ ۵ گزین امونیہ کاربونا ۵ گزین سوڈی بائی کارب ۵ گزین ٹیکچر سیلگا، ایوڈ کو اکلوروفارمی ایکل وٹل ایسی پانچ چھ خوراک وزانہ۔ پرائی براکائیٹس میں پوٹاسیم آیوڈائڈ اور امونیہ کلورائیڈ سب سے عمدہ ادویہ ہیں۔

سخت دکنی کی حالت میں جبکہ مخرج بلغم ادویہ کافی نہ خیال کیا سکیں تو فوراً پوٹاسیم ایٹک کے کوٹا وغیرہ سے کو ادینی چاہیے چھوٹے بچوں کو فوراً گرم پانی میں تھلانے سے بھی آرام مل سکتا ہے۔

اگر بیمار مسلسل یا متواتر ہوتا ہو تو مفصلہ ذیل نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ لاکوآر آئینی کیس ۲۰ بونڈ ایونیوٹا کاربونیاس ۲۰ گرین، ٹینکچر سیگما سپرٹ کلورافارم ۲۰ بونڈ سپرٹ کلورافارم ۲۰ بونڈ کو ایکٹوٹس۔

کوئین ٹینکچر سیگما سپرٹ کلورافارم اور ٹینکچر وائیکا بھی ملا کر دیکتے ہیں کہن سال مریضوں میں اگر ضعف قلب کی وجہ سے غشی کا اندیشہ ہو تو ٹینکچر ڈی ٹیس، سپرٹ ایجر اور ایونیوٹا کاربونیاس ملا کر دینا مفید ہوگا جبکہ کھانسی خشک اور دکشی تشنجی ہو تو ٹینکچر لوبی یا ایجر اور ایونیوٹا کاربونیاس ۲۰ گرین لاکوآر مارفا۔ ہائیڈروکلورس۔ ایونڈنی خوراک ملا کر دینا چاہیئے۔ ایسی حالت میں دافع تشنج اور مخرج بلغم ادویہ کا سنگھانا بھی نہایت مفید ہے۔ دیکھو انہی لینتھر کا بیان مریض کی کرڈٹ بار بار بدلتی رہنا نہایت ضروری ہے ورنہ پھیپھڑوں میں مائی پوسٹیکل نمجیج کا اندیشہ ہوتا ہے۔

سومر کرانک برائگی ٹس۔ اسکا علاج مفصلہ ذیل اصول پر کیا جاتا ہے۔
۱۔ کوئی خراش کسندہ سبب جو براکائٹس کا باعث معلوم ہوا اسکو رفع کرنا مثلاً اگر مریض گرد و خمار کی جگہ رہتا ہو اسکو کسی صاف جگہ میں لیجا کر ۲۰ زائد کھانسی کو سکنا ادویہ کو کم کرنا (۳) کمزور شدہ نالیوں کو طاقت دینا (۴) براخیل میوکس ممبرین کی خراب شدہ حالت کی اصلاح کرنا (۵) جو خراب بلغم وغیرہ ہوا کی نالیوں میں جمع ہو رہا ہے اسکو خارج کرنا۔ (۶) اگر بلغم شکر کرتھن ہو گیا ہو اسکی عفونت کو رفع کرنا۔ (۷) اگر کوئی دوسرا مرض مثلاً اسکرافلٹس، کاؤٹ۔ رہیومیوزم وغیرہ اسکا سبب ہو اسکا علاج کرنا۔
آن اصول کی تفصیل کے لیے مفصلہ ذیل ادویہ اور تدابیر ہیں۔

مریض کو مرطوب اور غبار آلود ہواؤں سے محفوظ رکھنا گرم لباس پہنانا۔
سوڈی بائی کارب۔ اگرین نوٹادہ ۲۰ گرین سپرٹ کلورافارم ۲۰ بونڈ اسٹرکٹ ہائیڈرو سائس ۲۰ گرین پانی۔
اونس ملا کر چار چائیکھنڈ بعد پلانا بلغم کو رقیق کر کے خارج کرنا اور خراش کم کر کے کھانسی کو تسکین دینا ہے۔
ٹارٹار ایٹیک پلے گرین مارفا پلے گرین اسٹرکٹ ہائیڈرو سائس ۲۰ گرین۔ اسکی ایک گولی بنا کر سوڑ وقت دینا خراش اور کھانسی کو کم اخراج بلغم زیادہ اور براخیل میوکس ممبرین کی اصلاح کریگا۔
اگر مرض تقرس موجود ہو تو آؤڈائیڈز زیادہ مفید ہونگی۔

چھکامہ۔ براکوریہ۔ یعنی کرانک براکائٹس جس میں بلغم بے حد خارج ہوتا ہو اسکی علاج میں کوپائیوا ٹرینٹائن۔ ٹرپین نال ٹرپین۔ ٹیری مین۔ ٹار۔ کرے ڈوٹ۔ منتھال۔ بالسم آف پیرو۔ بالسم آف ٹولو۔ بنزوائن۔ سیٹوکرین۔ امونائے کم۔ سلا وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ انہیں سے ٹرینٹائن۔ ٹیری مین۔ ٹار۔ کرے ڈوٹ۔ منتھال بطور اپنے لینٹن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ان ادویات کو داخلی طور پر جب ذیل استعمال کر سکتے ہیں۔
کوپائیوا ٹرینٹائن۔ کرے ڈوٹ۔ ٹار۔ ٹرپین۔ سیٹوکرین۔ بالسم پیرو۔ ڈوٹو کو کم ایشیا میں ملا کر سپرٹ کلورافارم اور گلیسرین کو ساتھ دیکتے ہیں۔ بنزوائن کے لیے مکچر بنزوائن کو نہایت عمدہ صورت ہے۔
ان سب کو لیمونٹ کمپیبول یا سفوف ملشی و گوئد کے ساتھ گولیاں بنا کر بھی دیکتی ہیں۔

پنجم متعفن براکائیسٹ یعنی جبکہ بلغم سرکہ متعفن ہو جاوے ایسی حالت میں معمولی علاج کے علاوہ ٹرنپٹائن کرکے زوٹ ٹارکس کاربالک ایسڈ سینیٹال آئیل۔ مرٹال۔ ایو کے پش آئیل وغیرہ کا انہیں لیشن نہایت ضروری ہو۔ عام طاق کی طرف بھی خاص توجہ چاہیے۔ کرے زوٹ اور کاڈور آئیل ملا کر دنیا لاغری کی حالت میں نہایت مفید ہے۔

مفصلہ ذیل نسخوں سے حسب حالت مریض استعمال کریں (۱) امونیا کاربوناتس ۵ گریں ٹینکچرکس امیکا ۱۰ ابوند ٹینکچر سنگونا ۲۰ بوند سپرٹ کلورافارم ۲۰ بوند انفیوزن سینگا ایک ایک اونس (دب) ٹینکچر فری پرکلورائڈ ابوند۔ لائکو رسٹریکٹا ابوند سپرٹ کلورافارم ۲۰ بوند آوا ایک اونس (ج) امونیا کاربوناتس ۵ گریں سوڈی بائی کارب۔ اگرین ٹینکچر کفر کو ۵ ابوند سپرٹ کلورافارم ۲۰ بوند انفیوزن سینگا ایک ایک اونس۔

آئین اور نیز تمام مسکن ادویہ کا استعمال نہایت احتیاط سے کرنا چاہیے۔ گھاسے گلہ سے تو کرنا بھی مفید ہے۔ کیونکہ اس سے جھج شدہ بلغم خارج ہو جاتا اور پھیپھڑوں پر دباؤ ہٹتا ہے۔

اپی کے کوٹا و این تین حصہ نیگرم پانی میں ملا کر بطور سپرے سنگنا نہایت مفید ثابت ہوا ہے۔

آخر ج بلغم کی تائید میں مصنوعی طریق سے خارجی دم کے وقت ٹکم اور سینہ پر دباؤ دنیا ضعیف ہوا۔ وغیرہ اور تعفن بلغم کو روکتا ہے۔ پس سخت لاغری یعنی عینیں روزانہ یہ تدابیر ضرور کرنی چاہئیں۔

خارج سینہ کی بالائی حصہ پر لینٹ ٹرنپٹائن لینٹ ٹیری یعنی ایسی ٹی کم لینٹ اکوڈین لینٹ کر وٹن لینٹیم اینٹی سٹیم ٹارکس ٹم وغیرہ بطور کا وٹری اری ٹیشن استعمال کرنا اکثر حالتوں میں مفید ہیں۔

یور وپ میں کرانک براکائیسٹ کا علاج خاص خاص ہوائی تدابیر کی بھی کیا جاتا ہے جسکا اصول یہ ہے کہ معمول سے زیادہ گاڑھی ہو اسانس کو ساتھ اندر پہنچائی جاوے اور رقیق تر ہو اس میں بیرونی سانس دلوایا جاوے۔ یا اسکی برسر عمل کرایا جاوے۔ اس اصول پر خاص آلات اور مکانات بنائے گئے ہیں چونکہ ہندوستان میں ابھی انکار و لاج نہیں ہوا اسلئے زیادہ تفصیل کی ضرورت معلوم نہیں ہوتی بعض چشمہ اس قسم کو ہیں کہ آسجگہ رہنا اور ان چشموں کا پانی غسل یا پینے میں استعمال کرنا نہایت مفید ہے۔

برائگی ایکٹیو سس۔ اسکا علاج ان اصول پر مبنی ہے۔ اول عام طاقت اور جسم کو کاڈور آئیل مالٹ اکریکٹ اور۔ ہائی پوفاسفائیٹ وغیرہ مقویات سے ترقی دینا دوم اصلاح متعلقہ سہ ضروری کی طرف توجہ کرنا۔ سوم کرانک براکائیسٹ کا علاج کرنا۔

ایوٹائیڈ آف پوٹاشیم اور کرے زوٹ اس میں خاص کر مفید ہیں۔ اگر براکائی پیل کر لیس کے طور پر ٹنگی ہوں تو اس حالت میں خارج میم کے لیے دو طریق ہیں اقال اگر ایسے غار سلط اور زیرین کنارہ کو قریب ہوں تو علاج آسٹ کی طرح باہر سے تنگاف و کٹرینج کا ایسا انتظام کر دینا چاہیے کہ پپ بخوبی خارج ہوتی ہے۔ دوسرا اگر ایسی غار چھوٹے چھوٹے اور بہت سی ہوں تو اوکھا کھونا مناسب نہیں ہے ایسی حالت میں مریض کو اکثر اوقات ایسے طریق سے انارٹا نا چاہیے کہ نہ بہت بچا اور سینہ پر کافی دباؤ قائم ہے۔ اس طریق سے بھی پیپ

بخوبی جاری ہوتی رہتی۔

معمولی حالتوں کے لیے کرائک برائیس کا بیان دیکھو۔

برائیس ڈیزیز - Bright's Disease اس سے مراد گردہ کی ساخت میں کوئی ایسا فساد واقعہ ہو جاتا ہے جس میں استقلال اور البیومی نوری یا ساتھ ہوں مگر یہ علامات لازمی نہیں ہیں۔ اسکی اقسام

حب ذیل ہیں۔

(۲)۔ اکیوٹ۔ یعنی حاد

(ب) کرائک مزمنہ۔

اول پیریکائی سے ٹس یا ٹیل نیفرائی ٹس۔ نالیوں کی سوزش۔

اقول ٹیوبل یا کٹائل یا ڈسکے می ٹو۔ یا پیریکائی سے ٹس نیفرائی ٹس یعنی پیشاب کی نالیوں کی سوزش۔

دو امراض ٹیٹیل یا سرائک یا گرنیول نیفرائی ٹس۔ نالیوں کے درمیانی ریشوں کی سوزش۔

دوام کلیہ رولر نیفرائی ٹس۔

سبب عام انٹرسٹی شیل نفرائی ٹس نالیوں کی درمیانی ریشوں کی سوزش۔

مقام فیٹی کڈنی۔ گردہ میں جربنی پڑ جانا۔

چھکا کڈنی البیومی نائڈ کڈنی۔ پیچہم۔ مرکب اقام۔

(۲) اکیوٹ برائیس ڈیزیز۔ اسکی ابتداء عموماً اس طرح ہوتی ہے کہ سردی اور لرزہ ہو کر کل جسم میں درد ہوتا

جی متلا تلا اور قے ہوتی ہے اس کے بعد کل جسم بانی سے پھول بھانا شلوم اور دیگر جو فوں میں بانی پڑ جاتا۔ چہرہ کا

رنگ پھیکا ہو جاتا ہے چہرہ اور پلکیں پھول کر آنکھیں جھپ جاتی اور نقش نگار جاتے رہتے ہیں۔ اکثر ساتھ

ہی کھانسی بلانکائی ٹس نیو مونا۔ اینڈو کارڈائی ٹس اور پیوریسی بھی ساتھ ہی ہو جاتے ہیں۔ گردہ کو مقام پر

درد محسوس ہوتا ہے جو دبانے سے زیادہ ہوتا ہے پیشاب بار بار آتا جسکی رنگت گہری لونی سرخی

اور سیاہی مائل ہوتی ہے۔ وزن مخصوص ۱۰۲۵ سے ۱۰۴۰ تک ہوتا ہے پکانے سے گہرا البیومن کا پھٹ

کثرت ہو جاتا ہے۔ اگر پیشاب کو دیر تک ایک نلکی میں رکھا یا جاوی تو اس میں خون کے ذرات گردہ کا اپنی تسلیم

ریشہ اور پیت سوکاسٹ پیچو پیچہ جاتے ہیں بنض سخت اور پرعلتی ہے قلب کی آوازیں دہری ہو جاتی

اور بایاں بطن القلب بڑھ جاتا ہے۔ اس مرض سے پورے طور پر صحت یاب ہو سکی یہ علامات ہیں کہ

استقائے اور تھج وغیرہ بالکل صاف ہو جائیں۔ پیشاب صاف اور کثرت ہو جاتا ہے۔ البیومن اچھا

کاسٹ جاتے رہیں۔ جلد کا فعل صحیح ہو جاوی۔ اس میں نیو مونا ایڈیا گلائس یوریمیا مائٹری اور

گینگرین کا ساتھ ہونا سخت ہلک ہو عموماً مایہ عوارضات اس مرض میں موت کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔

اسباب (۱) اسباب بعیدہ۔ جوان عمر وراثت غلیظ عادات کثرت شراب۔

دس اسباب قریبیکہ۔ سردی اور نمی دھنسا پونچنا۔ بخارات مخصوصہ مثلاً دفتیر۔ اور جن مفاصل

سکارٹ فیورنسرہ مائیفیل اور ٹائیفائیڈ فیور جیک سے ہنسہ کا دھبہ سو م کے حل ۷ جلدی امراض جو ایک

کثیر حصہ جلد کو بیکار کر دیں۔ تیز گرم ادویات کثرت سے کھانا مثلاً تیلنی کھی۔ کاربانک ایسڈ سیلینس پشامیں وغیرہ۔
ب۔ اگر ایک برائیس ڈیزیز (یعنی عامہ) کیوٹ قسم کا نتیجہ ہوتا اور کبھی اونہیں اسباب سے جو کیوٹ میں بیان کیے گئے۔ ابتداء ہو جاتا ہے۔ کل جسم کا استقامت جو فوں میں تبدل سے پانی پڑ جاتا پیشاب گہری رنگت کا تھوری مقدار میں بار۔ آنا پیشاب میں البیومن اور کاسٹ خارج ہونا شرانوں کا سخت اور بایں بطن القلب کا بڑا ہو جانا تکم اور سیک کی جو فوں اور فوٹوں میں پانی پڑ جانا سانس کھینچا آنا وغیرہ۔ تمام علامات کیوٹ فارم خفیف طور پر ظاہر ہوتی ہیں پیشاب تھوری مقدار میں اور زیادہ وزن مخصوص کا آتا ہے اس میں البیومن بکثرت ہوتا اور پانی تھیلیل۔ گرنیول۔ ہائے لائن بلڈ اور فیٹی کاسٹ مکتی ہیں چہرہ پیللا پھولا ہوا اور پھیکا ہو جاتا ہے۔ تمام جسم پانی سے چھو جاتا اور تکم اور دیگر جو فوں میں پانی بھر جاتا ہے۔ یوریا ہونیکا اندیشہ رہتا ہے معدہ کا استقامت ہو کر ہی بتلاتا اور ہاضمہ خراب رہتا ہے۔
 ڈاگرنیولر کٹنی۔ اس میں گردہ سکرچھوٹا ہوتا اور سطح کھردری دانہ دار ہو جاتی ہے۔ رنگ سرخی یا زردی پائل ہو جاتی۔ گردہ کا غلاف چمک جاتا۔ پیشاب کثرت سے خارج ہوتا اس میں کاسٹ کم موجود ہوتی ہیں۔ سانس ہی باریک رنگ بھی نکلتا ہے۔ رنگت میں صاف اور وزن مخصوص میں ہلکا ہوتا ہے۔ البیومن بھی قابل تائید کم ہوتا ہے۔ استقامت عام نہیں ہوتا۔ جلد خشک اور کھردری ہوتی ہے چہرہ پھیکا اور مرجھا یا ہوا نقاہت اور سستی غالب ہوتی ہاضمہ خراب رہتا ہے۔

(۳) فیٹی کٹنی۔ گردہ میں چربی پڑنا اس میں گردہ پیللا اور نرم ہو جاتا ہے۔ البیومن کبھی موجود ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہائے لائن اور گرنیولر کاسٹ پیشاب میں خارج ہوتے ہیں استقامت نہیں ہوتا۔ یوریا کی علامات بھی شاذ و نادر ہوتی ہیں اس کے اسباب اور عام علامات وہی ہوتی ہیں جو البیومی نائڈ ڈیزیز میں بیان کئے گئے
 (۴) وکیٹیلار ڈیزیز البیومی نائڈ کٹنی علامات اور اسام سنگہ مثلاً بکثرت خفیف ہوتی ہیں اس کے لئے وکیٹیلو البیومی نائڈ ڈیزیز کا بیان۔

(۵) مرکب اقسام میں استیاب اور علامات ملے جلے ہوتے ہیں۔

کیوٹ اور کرانک کا علاج مختلف طور پر ہے پس فیل میں ہر دو صورتوں کا علاج علیحدہ علیحدہ بیان کرتے ہیں۔
علاج۔ اوّل۔ ایکیوٹ برائیس ڈیزیز۔ اس کے علاج کے لئے تین اصول ہیں۔ (۱) اگر گردہ کو درم کو مقامی پلٹوں۔ چونک۔ گلاس۔ رانی۔ آیوڈین وغیرہ کا وٹھاری ٹش سے تحلیل کرنا۔ (۲) بذریعہ سوخت اور سہلات کو استفرغ گردہ کی کمی پوری کرنا۔ (۳) جو سخت علامات پیدا ہوں ان کا خاص طور پر علاج کرتے رہنا۔ ان اصول کی تعمیل کے لئے حسب فیل تدابیر ہیں۔

جب گردہ کے مقام پر درد ہو کر لرزہ بھار سلسل بول وغیرہ ابتدائی علامات اس مرض کی معلوم ہوں تو فوراً مریض کو گرم کمبلوں میں لپیٹ کر بستر پر لٹا دیں اور ایک خوراک محرق و مدد ادویہ کی پلاویں۔ غذائیں دقیق مثلاً دووہ۔ آش جو۔ دہی کا پانی۔ سوڈا واٹر۔ لیمو نیڈ بافر اٹھاتے رہیں تاکہ پیشاب بافر اٹھا خارج ہو کر گردہ کے فضلات کو دور ہوتا ہے۔ دودھ اس مرض میں نہایت عمدہ غذا ہے۔ کیونکہ یہ بے خراس اور

بے ضرر اور کثیر النفع اور قلیل المضلالت ہے۔ اگر خالص صمغ نہ ہو تو سوڈا وائر یا آتش جو یا خالص پانی
 حسبِ پند ملا کر ملا دیں۔ گردہ کے مقام پر دس سبتیس جو نکھیں لگو اگر گرم گرم السی کی پولس لگا دیں اور
 اسکو بار بار بدلتے رہیں۔ اگر خون کا لانا مناسب معلوم نہ ہو تو خشک گلاس ہی کافی ہو سکتے ہیں۔ اگر
 مناسب ہو تو ہاٹ وائر یا تھریاٹ ایر یا تھریاٹ ویت پیک کرنے کو بعد پانی کو کا پین کی جلدی
 پچکاری کریں اور مرض کو برابر گرم کمبلیوں میں ملفوف رکھیں اس سے خوب پینہ آئنگا۔ پانی کو کا پین
 سے اکثر غشیان و غشی کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں پس اسکو ہمیشہ قلب کو امتحان کے بعد نہایت
 قلیل مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ اگر زیادہ پینہ آنے سے مرض کو ضعف اور بے چینی زیادہ ہو جاوے تو فوراً
 مناسب میوٹس دینا چاہیے مثلاً گرم چائے یا تھوہ یا قہے دم یا رائی پانی میں ملا کر یا سپرٹ امونیا یا رڈ
 ایک ڈرام۔ سپرٹ ایٹھرائٹر و سائی نصف ڈرام لائکووار امونیا ایسی ٹینس ڈا لمبوٹ ۳ ڈرام الکو کسٹر
 ڈیڑھ اونس۔ یہ ادویہ ملا کر دو تین خوراک تک حسبِ موقعہ استعمال کریں۔ اگر بخار شروع سے زیادہ
 ہو تو ٹیکہ کو نائٹ بھی اسیں ملا سکتے ہیں۔

دوسرے تیسرے روز میگنیشیا یا سوڈا سلفاس دو تین ڈرام دینے میں تاکہ امعا صاف رہیں اور
 یزبانی کا اخراج بھی اس طریق سے بخوبی ہوتا ہے۔

شروع میں کوئی خراش کنندہ مدرات استعمال نہ کرنے چاہئیں۔ کیونکہ اس سے زیادہ پین اور سوزش
 نقصان ہو گا بلکہ سادہ پانی۔ دودھ سوڈا وائر پری کفایت کریں۔ انکو زیادہ مقدار میں پالنے سے خود بخود
 پیشاب با فراط خارج ہو کر پیشاب کی نالیوں کو دھوتا جائیگا اور کسی قسم کی تکلیف گردوں کو اٹھانی نہیں
 پڑے گی۔ لیکن جب ایک وقت حالت رفع ہو کر گردوں کا فعل کمزور اور دورانِ خون سست ہو جائیں اس
 حالت میں دجی ٹالس کی تین ستر فٹنس وغیرہ مدرات جو مقوی قلب و محرک دوران ہیں زیادہ مفید ہوتی
 ہیں۔ اگر خون رقیق ہو گیا ہو تو لکے ساتھ مرکبات فولاد مثلاً ڈایا لائز و آئرن یا سچر شیل وغیرہ ملا سکتے ہیں
 اٹلے برائیش دوزخ میں نہایت مختلف عوارضات پیدا ہو جاتے ہیں چنانچہ انہیں سے بھی غشیان
 استقامت پوریا اور یوریک کنولشنز اینجیا اور کارڈیک ڈالنی سے پیشین قابلِ توجہ ہیں۔

قے میں بہت سائبر لیادہ خارج ہوتا ہے ایسے فوراً لکے روکنی کی کوشش کریں۔ بلکہ جب زیادہ
 تکلیف ہو اسوقت بستمہ ہائڈروسائیک ایسڈ۔ رائی کا پلستر وغیرہ عام تدابیر سے اسکا علاج کریں۔
 اگر پانی تنگ یا سینہ یا نالوں اور باہوں میں بہت جمع ہو گیا ہو تو معمولی طور پر پٹرکا راو کینولا سے
 یا گاف دیکر نکال سکتے ہیں خیف حالت میں مدرات معرفات۔ اور مسلمات کا استعمال کافی ہے۔

اگر یوریک علامات مثلاً غنودگی تشخ صدام۔ امتلا وغیرہ ظاہر ہوں تو فوراً ایک قلیل المقدار تیز مسهل مثلاً
 پلو آر ٹرینی کو نصف گریں یا گریں تک کھلا کر کوئی مسهل حقنہ بھی کریں اور بعد ازاں حرقات ادویہ

تدابیر سے خوب پیہ جاری کریں۔ ایسی حالت میں پانی کو کارپین کی چھکاری نہایت مفید ہو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فساد جلدی کی وجہ سے پسینہ میں محض پانی خارج ہو کر پیشاب کو کثیف اجزا خون میں جمع رہ جاتے ہیں۔ اس طرح گو یا کہ خون زیادہ کثیف ہو جاتا اور یوریمیا کی تکالیف بڑھ جاتی ہیں ایسی حالت میں مسہلات کی طرف زیادہ زور دینا چاہیے۔ تیشج کا علاج معمولی طور پر کلورافارم، پٹاسی برومائیڈ اور کلورل ہائیڈریٹ وغیرہ سے کرنا چاہیے۔ امراض خون و قلب کا علاج معمولی طور پر مقویات قلب خون سے کرنا چاہیے۔

جب بیمار رو بہ صحت ہونے لگے اس وقت ہوائے نہایت احتیاط لازم ہے۔ مدت تک غذاؤ حیوانی اور شراب سے پرہیز رکھائیں۔ دودھ سب سے عمدہ غذا ہے۔ چائی اور کافی کے سوا کوئی عھکات نہ دیں تازہ خوشگوار زود ہضم حل مثلاً الگور سیب، ناشپاتی، راس، بیری وغیرہ دیکھتے ہیں۔

دوا۔ کوئیک ہوائس ڈیزیز۔ اوک کرائک پیرنگائی میٹس نفرائی ٹس۔ اس کے علان ج کے لئو بعینہ وہی اصول اور تدابیر ہیں جو ایکویوٹ برائیسٹریز میں بیان ہوئی۔ جسکو مختصر طور پر ہم چند الفاظ میں یاد دلاتے ہیں۔

۱۔ لباس گرم سرد اور مطلوب ہو اوس سے بچاؤ۔

۲۔ غذاؤں رفیق خاص کر دودھ۔ آتش جو۔ ہی کا پانی۔ بالائی تازہ خوشگوار چل سا گو دانہ ذیل روٹی۔

گاہے گاہے چاول اور پھلی لیکن گوشت، سوپا و پختی وغیرہ سے خواہ کسی صورت میں ہوں احتراز لازم ہے کیونکہ حیوانی غذاؤں میں خراش کرتی اور خون میں نہ مٹی غیر ہضم نائیر و جنس مائع جمع کر دیتی ہیں۔ مسہلات اور معرقات سے کمی پیشاب کو پورا کرتے رہیں اور سادہ مدرات مثلاً ڈائروٹین کیضین وغیرہ بوقت ضرورت دیں۔ انیمیا اور ضعف قلب کی حالت میں ٹنگی ڈیجی ٹالس اور ٹنگی فری پر کلورائیڈ نہایت مفید ہیں۔ ہاٹ باتھ کبھی کبھی کرتے رہنا نہایت مفید ہو جو عوارضات انتائی مرض میں ہوں انکا علاج معمولی طور پر کرتے ہیں مفصلہ ذیل نسخہ اکثر البیون کو بہت جلد کم دیتے اور بعض اوقات نہایت مفید ثابت ہوئی ہیں پس انکو حسب موقع استعمال کریں۔

۱۔ سوڈی آلوڈائیڈ اگرین سوڈی فاسفیٹ، ۳ گرین سوڈی کلورائیڈ، ۹ گرین پانی حبہ ورت جہیں یہ ادویہ حل ہو جاویں مقدار کو خالص پانی یا دو دھ میں ملا کر روزانہ چھ بار کر کے ختم کر دینا چاہیے۔ البیومی نوز یا کو خاص فائدہ کرتا ہے۔

۲۔ پہلے روز اگرین ٹک تین دفعہ دن میں خواہ کھانے سے ایک گھنٹہ پیشتر یا بعد کھلاویں دوسرے روز ۲ گرین تین دفعہ کر کے تیسرے روز ۳ گرین چارم روز ۴ گرین اور پچھم روز ۵ گرین تین بار دن میں ملا کر دیں۔ بعد ازاں ۵ گرین کی مقدار میں ہی تین دفعہ روزانہ دیتی ہیں۔ یہ بہت جلد البیومی کو کم اور اخراج پیشاب کو زیادہ کر دیتا ہے۔

(۳) کرو زسلیٹ گرین ٹنکچر سکونا، بوند کو ایک لونس پہلی ایسی ایک خوراک چار چار گھنٹہ بعد دینا شروع اور بعد ازاں دود و گھٹہ بعد اس ہی بہت جلدی البیومن اور استقام اور ادار با فراط ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تمام علامات روہ دور ہو کر مرض رو بصحت ہو جاتا ہے۔

سوامہ۔ کرائٹ انٹسٹینیل نیفرائٹس۔ اسکا علاج حسب ذیل ہے۔
 اولہر قسم کی شراب اور دیگر مشیات ہی پر سب کرائیں۔ غذا میں دودھ سب سے زیادہ مفید ہے۔ تندی طور پر روٹی تازہ میوہ دیکھا کھجے۔ کافی۔ اور کوکاس بھی دیکھتے ہیں۔ کھار پانی مثلاً سوڈا واٹر وغیرہ با فراط دیتے ہیں۔ علیات مسہلات سی امعا کا ہمیشہ استفراغ کرتے ہیں۔ ادویات میں پوٹاسیم آیوڈائیڈ اور کیلومل نہایت مفید ثابت ہوئی ہیں۔ خاص کر فٹلس اور گاؤٹ کی حالت میں سکوراڈ آف گولڈہ آگرین کی خوراک میں تین دفعہ روزانہ دینا بھی مفید ہے۔ آریٹرل ٹینشن کم کرنے کے لیے پوٹاسیم آیوڈائیڈ۔ اور سوڈیم آیوڈائیڈ مفید ہیں۔ نائٹرو گلیسرین بھی اس مطلب کے لیے استعمال کیجاتی ہے۔ معوقات ادویہ اور تداویر جی ہمیشہ کرتے ہیں۔

ضعف قلب و رانیسمیا کے لیے آئرن اور وچی ٹالس ملا کر دینا نہایت مفید ہیں۔ سرکینا اسکے ساتھ ملا کر قلب کو ادبی تقویت دیگا۔

اگر یوریمیا کی علامات پیدا ہوں تو اسکا علاج فوراً تیز مسہلات و معوقات سادہ مدرات ہی کرنا چاہیے۔ رفع تشنج کے لیے کلوروفورم کلورل ہائیڈریٹ۔ نائٹرو گلیسرین۔ ال نائٹریٹ اور برومانڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ صدماء بخونالی اور ہڈیان کے لیے کلورل ہائیڈریٹ اور پوٹاسیم برومانڈ استعمال کرنا مفید ہے۔ لیکن افیون اور مارفینا دینا سخت اندیشہ ناک ہے۔

فیملی کڈنی اور البیومیٹکڈنی کا علاج سپرہیر جیسو کڈنی ٹنکچریشن اور البیومیٹکڈنیٹیز کا۔ پس انکیاریان دیکھو۔

بربرس اریسٹاٹا Berberis Aristata
 کی چھال اور لکڑی میں سے ایک بربرینا اور بربرینا نام نکلتا ہے۔

بربرس ایکوی فولیوم Berberis Aquefolium
 پہاڑی الگور بھی ہے۔ یہ ایک نہایت قوی مسخ خون اور مقوی ہے۔

بربرس رپنس Berberis Repens

بربرس ولگاریس Berberis vulgaris

بربرین Berberine
بربرینا Berberina

خمر اسو گرین تک	Berberinae Sulphas	بربرینی سلفاس
خمر ۲ گرین تک	Berberinae Phosphas	بربرینی فاسفاس
خمر ۲ گرین تک	Berberinae Hydrochloras	بربرینی ہائیڈروکلوراس
	Berberia	بربریا

خنازیر سرطان۔ اور آتشک کہ مادہ کو صاف خارج کرویتا اور پرانے جلدی امراض میں مفید ہو۔ جب جلد خشک اور کڑخت ہو کر آپس کھڑنڈ جیسے شروع ہو جائیں جلد کو ملائم صاف اور خوش نما کرنے میں اسکی برابر کوئی دوا نہیں ہو۔ آتشک کے دھوم اور سوم درجوں میں نہایت عجیب اثر دکھاتا ہو جن مریضوں میں پارہ اور پوٹاسیم آیوڈائیڈ سے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اسے اپنا کمال دکھایا ہے پرانی بیماریوں کے بعد جبکہ جسم نہایت لاغر اور تمام اعضا کو فعل فاسد ہو جانے میں عجیب کالیت کے ساتھ بہت جلد طاقت بختا اور تمام فاسد اعضا اور غدود کو صلاحیت پر لاتا ہے مہل در مہل معرق مقوی شمع و دماغ و اعصاب و جملہ اعضا ہے اور اعلیٰ درجہ کا مصفی و مصلح خون ہے تجزیوں اور انالار جڈ پر اسٹ کے لیے بیظیر دوا ہے خوں آگ سفوف چھال اسے ۲ گرین تک۔ فلوئیڈ اکثرٹ ۱۰ سے ۳۰ بوند تک۔ پچھلے ۷ بوند تک۔ سالڈ اکثرٹ ۲ سے ۶ گرین تک۔ سرپ ایک ڈرام سے ۶ ڈرام تک۔

بربرین سینس۔ بربرینس لائی سیل اور بربرینس وگورس کی تاثیرات بربرین پر منحصر ہیں۔ باربرین اور ہائیڈر بربرین کا بیان دیکھو۔

برڈاک Burdock یہ ایک نہایت عمدہ مصلح خون ملین در مہل معرق مقوی محدہ ہے۔ پانے امراض جلدی سکرافولارہ ریوے نرم تقرس۔ آتشک اور سنگ گردہ و مثانہ میں مفید ہے اسکی تخم مقوی خون تلخ اور مہل میں اور پرانے امراض جلدی خاص کر سورائوس میں نہایت مفید۔ خارجہ برڈاک کی جڑ کا جو شانہ رنگ کو فائدہ بخشتا ہے۔ خمر تخم کا فلوئیڈ اکثرٹ بطور مقوی ۱۰ سے ۳۰ بوند تک اور بطور مصفی خون ۲۰ سے ۶۰ بوند تک۔ خمر برڈاک کا فلوئیڈ اکثرٹ ۱۰ ڈرام سے ۲ ڈرام تک۔

برص { جلدی امراض کا بیان دیکھو۔

برص الظفر۔ سفیدی

برگد۔ جڑ۔ بروٹا۔ بڑ کا بیان دیکھو۔

برگدی توج۔ خارجی استعمال میں جلد پر اسکا سٹی ہولٹ اثر ہوتا ہے اور پلاسٹرون کو کتاب میں استعمال کجائی ہے۔ برنج قبالی۔ یہ بابرنگ کا دوسرا نام ہے۔

برنگ بٹش Burning Bush یونی سائز و فیتیس کا دوسرا نام ہے۔ اسکا بیان دیکھو۔

بروز Bruise رگڑ۔ اسکا علاج جینا بریزن کے طور پر ہے۔ مگر دم ساتھ ہو تو بورک پولش زیادہ مفید



بر و مو فارم Bromofarm

Bromhidrosis

Bromin

برومین -

خارجی استعمال میں برومین تیز اثری ٹنٹ اور اس کے رائگ ہی۔ فم رحم کے سرطان میں اسکا استعمال کیا جاتا ہے۔ برومائڈز سالم جلد پر کوئی اثر نہیں کرتے۔ برومائڈ آف سوڈیم، پوٹاشیم اور امونیم عام طور پر استعمال کئے جاتے ہیں۔ معد اور امعاء پر انکا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ خون سے خارج ہو کر تمام اعضا پر ممکن اور مضف اثر پیدا کرتے ہیں۔ تمام اعضاء اور سطحوں کے نیلیکس اسی نے بلٹی کو کچھ تو نسری نر وزیر اور کچھ داغی مرکزوں پر محذرا اثر پیدا کر کے کم کر دیتے ہیں ساتھ ہی اعصاب حرکت اور عضلات پر بھی ممکن اور مضف اثر ہوتا ہے۔

داغی گلبہ اسٹ کی حالت میں بطور مسکن اور منوم کام کرتے اور مائٹڈ لیریم ٹرینیں بخارات، محنت و ترو و در و اور نفرس کی بخوبی میں مفید ہیں۔ مرگی کے علاج میں مخصوص شہائے جاتے ہیں۔ دیکھو الی لیسپی کا بیان۔ علاوہ برین کوریا، ہسٹیریا، کرازام الصبیاں، تکالیف حصر الطمث، ہونیک کف، سی سکینس، قوہ لبح صداع، بچکی وغیرہ دردناک اور شخی امراض میں بھی استعمال کئے جاتے ہیں۔ ریشش اور قلب پر بھی انکا مضف اور مسکن اثر ہو کر دمہ بچکی، ہونیک کف و اختلاج القلب لیرخس سٹرائڈ و لم میں اسے اہرام ملتا ہے۔

اثر کار برومائڈز جلد گردہ پستان، اور میوکس جھلیوں کے رستے برومین میں بدل کر خارج ہوتے ہوئے مقامی خراش پیدا کرتے ہیں۔ اسلئے اس کے زیادہ استعمال کو اکثر سرخی چشم اور جلدی پھنسیاں نمودار ہو جاتی ہیں۔ شیر خواہ بچوں کو بذریعہ درودھا اسکا اثر پہنچ جاتا ہے۔ ایک ڈائیڈر و بروک میں برومائڈ آف پوٹاشیم کی تمام تاثیرات موجود ہیں لیکن کم درجہ پراسکو محض کونین کا ضرر رفع کرنے کو لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب عام بیان کے بعد ہم ذیل میں دیگر برومائڈز ترتیب وار بیان کرتے ہیں۔

برومائڈ آف آرسنک - آرسنک کا بیان دیکھو۔

برومائڈ آف اتھیل - اتھیل برومائڈ کا بیان دیکھو۔

برومائڈ آف امونیم } دیکھو عام بیان جو اوپر کیا گیا۔

برومائڈ آف زنک - مرگی اور خراش او ویرین میں نہایت مفید ہے۔

برومائڈ آف گولڈر اسمیں برومزم کی علامات بہت کم ہوتی ہیں۔

برومائڈ آف سوڈیم - دیکھو عام بیان۔ یہ برومائڈ آف پوٹاشیم کی نسبت کم مضف ہے۔

برومائڈ آف کونین - اس میں کونین اور برومائڈ کی تاثیرات جمع ہیں۔ دیکھو کونین کا بیان۔

برومائڈ آف پتھیم - یہ نہایت قوی منوم ہے و در نفرس کے درد اور بخوبی میں خاص کر مفید۔

لائکوار گینیشیا برومائڈ اعصاب امراض میں نہایت عمدہ مسکن ہے۔

برومزم - اس سے مراد وہ نقصانات ہیں جو برومائڈز کے مسلسل اور زیادہ مقدار میں مدت تک استعمال کرنے سے

ظاہر ہو جاتے ہیں بعض اشخاص کو اسکی برواشت بہت کم ہوتی ہے۔ اور بعض کو زیادہ۔ برومزم کی علامات مختصر احب ذیل ہیں۔

اَوَّل۔ دماغی و نچاخی علامات۔ کثرت نوم و غنودگی۔ بطلان حافظہ و ذہن۔ عام ضعف و نقاہت۔ رشتہ و لگائی۔ گتھارا اور تحریریں بہت مہوار اور غلطیاں ہونا۔ ضعف باہ۔ نامردی۔

دوئم۔ شش و قلب کے متعلق۔ نبض سست و ضعیف اور نرم۔ رنگ پھیکا اور نیلگون۔ پرانا ڈکام و فشر بریکو یا غیر نسو۔ جلد اور غدود کے متعلق۔ جلد پر پھنسی اور آبلہ کو طور پر انجرات نمودار ہو جانا اور بعض وقت ذیل بہت نکلتا۔ تمام غدود میں خشکی اور ضعف بعض اوقات برومزم کی وجہ سے خراش ہو کر سوزش کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ مثلاً غدود کا برص جانا۔ معدہ میں خراش ہو کر بد ہضمی۔ نفخ اور زکام کی تالیف ہونا۔ پانی سوزش امعاء و اسہال وغیرہ۔ آنکھوں میں سرخی۔ منہ میں آبلہ جریان الاذن وغیرہ۔

چونکہ برومزم کا استعمال نہایت عام ہے اسلئے ان نقصانات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیئے اور جب یہ نقصانات ظاہر ہوں تو فوراً انکا استعمال بند کر کے بذریعہ معرقات و مدرات و سہلات جسم سے خارج کرنا چاہیئے۔

برومزم۔ یہ برومزم کا دوسرا نام ہے۔ اسکا بیان شروع میں کیا گیا۔
بروموفارم۔ یہ برومزم کی طرح نرم و پیرسٹ نہیں بلکہ برعکس انکے محرک ہی ہونیک کف میں نہایت مفید ثابت ہوا ہے۔ دو تین ہفتہ میں انکے استعمال سے آرام ہو جاتا ہے۔

طریق استعمال و خوراک تین چار ہفتہ کے بچے کے لئے کو ایک قطرہ تین چار دفعہ روزانہ ایک ڈرام پانچ سال کے تین چار سال کے بچے کے لئے ۲ قطرہ تین چار دفعہ روزانہ دو ڈرام پانچ سال کے چھ سال کے بچے کے لئے چھ سات قطرہ تین چار دفعہ روزانہ دو ڈرام پانی میں ملا کر برومی ڈروسس سپینہ کے امراض کا بیان دیکھو۔

برومزم اس کا بیان برومزم میں کیا گیا۔
Braidism یہ میناٹزم کا دوسرا نام ہے اسکا بیان دیکھو۔

برٹ۔ برگد۔ بروٹا۔ اسکا دودھ محل ریح۔ رادع اور لم۔ اسٹرنٹ۔ محرک باہ اور دفع بواسیر و جریان رقت منی۔ اور کثرت احتلام کے لئے مفید ہے ضماؤ اچھوڑوں کو جلدی بھرتا اور اورام کو تحلیل کرتا ہے۔
سٹر شیر برگد ۱۲ اونڈر سے ۶۰ اونڈر تک۔ بواسیر کے لئے ایک ڈرام سے تین ڈرام تک کی خوراک میں دینا چاہیئے۔
سہا سہ۔ جو نری کا بیان دیکھو۔

بند۔ ہونگا مفرح اور قابض اور مقوی اعصاب قلب معدہ اور دل فنگ کردہ و شامہ ہی۔ و سو اس جنون خفا
صرع۔ ضعف معدہ۔ فساد اشتہا اور ہضم کی بواسیر و جریان خون میں مفید ہے سٹر ۵۰ لائن سو ایک ڈرام تک۔
بسکچر۔ مدر۔ مخزن صفراء و فاشج بسکچر اوجاع و مخزج ریح اور مدر بول و حیض و شیر ہے۔ اسلئے اشتہاد

یرقان - خون مردود - وجع مفاصل - ذات الحجب - تقطیر البول وغیرہ میں مفید ہے۔ خمر پے ایک ڈرام سے تین ڈرام تک - تخم نصف ڈرام سے ایک ڈرام تک -

بسمتہ آکسائیڈ Bismuth Oxidum خ ۵ سے ۱۰ گرین تک -

بسمتہ آکسی آئیوڈائیڈ Bismuth Oxyiodide خ ۵ سے ۱۰ گرین تک -

بسمتہ اولیٹ Bismuth Oleate

بسمتہ ایٹ امونی سائیٹراس Bismuth Et Ammonii Citras خ ۱۰ سے ۲۰ گرین تک

بسمتہ ایونی مین Bismuth Et Buonymine

بسمتہ سائیٹراس Bismuth Citras ح ۲ سے ۵ گرین تک -

بسمتہ سب آئیوڈائیڈ Bismuth Subiodide

بسمتہ سب بنزوایٹ Bismuth Sub Benzoate

بسمتہ سب نائٹریٹ Bismuth Subnitrate خ ۵ سے ۱۰ گرین تک

بسمتہ سالیسیلیٹ Bismuth Salicylate

بسمتہ کاربونات Bismuth Barbonate خ ۵ سے ۲۰ گرین تک -

بسمتہ نائٹریٹ Bismuth Nitrate

لائیکو البسمتہ ایٹ امونی سائیٹراس ۱۰ ڈرام سے ایک ڈرام تک -

حسب دستور پہلے بسمتہ کے ساتھ کواہم طور پر بیان کرتے ہیں - اس قبل میں بسمتہ ایٹ امونی سائیٹراس بسمتہ

بسمتہ سائیٹراس بسمتہ سب نائٹریٹ شامل ہیں -

خارجی استعمال میں بسمتہ سب نائٹریٹ کو مل سٹے ٹو اور پشٹ ہی یعنی جس مقام پر لگایا جاوے اسکو تسکینی

شک کرتا ہے اسلئے اگر زیادہ تر درد کام - اور زیادہ سوزاک - سفیدی زبان - یونش - رحم وغیرہ میں مقامی طور پر

اسکو کثرت استعمال کرتے ہیں - کھلاڑی سے بھی معدہ اور امعاء کی سطح پر اسکا سکون اور جاذب اثر ہوتا ہے اسلئے

معدہ کو کام زخم خراش اور نفو وغیرہ میں نہایت مفید ہے - فیون یا ڈورس یا مودر وغیرہ کے ساتھ ملا کر دینا نہض

اور سرطان معدہ کی تھ اور معدہ میں کسی طرح کھٹکے - بد ہضمی کی حالت میں کھار اور مثلاً سوڈی بالی کارب

وغیرہ اسکو ساتھ ملا سکتے ہیں - بچوں اور ناتوانوں کے اسہال میں نہایت بیش قیمت و دوا ہے - اگر اسہال کثرت

ہوں تو ڈورس یا مودر کے ساتھ ملا کر دینا نہایت مفید ہے خون اور اعصابی یا اسکا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا -

بسمتہ آکسائیڈ ایٹ امونی سائیٹراس میں بسمتہ سب نائٹریٹ کے مشابہ ہے -

بسمتہ آکسی آئیوڈائیڈ بسمتہ سب آئیوڈائیڈ - یہ تمام تاثیرات میں آئیوڈو قاسم کی مشابہ ہے لیکن اسکی بد بو یا کھوس

میں دوا صرف ایک حصہ ملاں بطور کھکاری استعمال کرنا مفید ہے معدہ اور امعاء کی خرابی اسکا دوا علی استعمال

فائدہ کرنا سے بچہ ۵ سے اگرین تک۔

بہتہ اولیٹ۔ اگر یا اور تر زخموں وغیرہ کے لئے اسکا خارجی استعمال کیا جاتا ہے۔

بہتہ ایٹامونی سائٹراس۔ یہ بہتہ سب نائٹراس اور بہتہ آگسٹ کے خلاف معدہ سے خون میں پنچا کر نکال دینا ہے۔
کی طرح مختلف ساختوں اور اعضا کو چربی میں بدل دالتا ہے۔

بہتہ ایٹایونی مین۔ اس میں بہتہ اور ایونی مین کی تاثیرات جمع ہیں۔

بہتہ سائٹراس۔ یہ بہتہ ایٹامونی سائٹراس کا بیان دیکھو۔

بہتہ سب آیوڈائیڈ۔ بہتہ آگسٹ آیوڈائیڈ کا بیان دیکھو۔

بہتہ سب بنزوائٹ۔ یہ ایک خفیف کاسٹک اور اینٹی سڈک ہے۔ آیوڈوفارم اور تیزابوں کی جگہ اسکو استعمال کر
ہیں۔ سافٹ شینکر میں مفید ہے۔

بہتہ سب نائٹریٹ اسکابیان شروع میں کیا گیا۔

بہتہ سیلی سلٹ۔ یہ اسٹریٹ اور اینٹی میڈیک ہے اسلئے اسکا ہالٹاؤنڈ ٹیو ریکل وغیرہ میں بہتہ سب نائٹریٹ کی نسبت
زیادہ مفید ہے بچہ ۵ گرین سے اگرین تک۔

بش برننگ Bush Burning۔ ایوانائی مسل ٹروٹھس کا دوسرا نام ہے۔ اسکابیان دیکھو۔

بش سٹنک Bush Stink۔ رہوس ایر وینک کا بیان دیکھو۔

بش سکنک Bush Skink۔

بشپش ویڈ Bishop's Weed۔ یہ اجوائن کا لکڑی نام ہے۔ اجوائن کا بیان دیکھو۔

بصار کے نقصانات۔ بصارت کے نقصانات ہمارے مراد اسجگر پر وہ نقصانات ہیں جو محض
ڈیڈ اور اسکی رطوبات کی قطع و رفع میں فرق ہو جانے کی وجہ سے ظاہر ہوں اور ظاہر کوئی فساد انکی ساخت میں نظر نہ آتا
یہ عموماً چار قسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) مانی اوپالینی قریب نظری (۲) مانی پریٹروپا۔ (۳) پسی اوپالینی بعید نظری
(۴) اسکلے نزم۔

ذیل میں اسکا مختصر بیان موعلاج درج کیا جاتا ہے
اول مانی اوپالینی قریب نظری۔ یہ پیدائشی ہوتا ہے اور کبھی بغیر پیدائشی۔ اس میں دو کچھ صاف طور پر نظر
قریب کی نظر خاصی ہوتی ہے۔ جن حروف کو ایک صحیح نظر شخص میں نیٹ ہو سالی پڑ سکتا ہے اور کو قریب نظری
والا دس یا پانچ یا چار فٹ ہی پڑ سکتا ہے اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ذیل کا افقی قطر معمولی بڑا اور عمودی قطر
چھوٹا ہو جاتا ہے یا انسر کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ یہ مرض تعلیم یافتوں اور مہذب قوموں میں کثرت سے ظاہر
ہوتا ہے کبھی پیدائشی اور کبھی موروثی ہوتا ہے۔ سادہ مانی اوپالینی سال کی عمر کے بعد خود بخود مٹ جاتا ہے۔
جون جون عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے یہ نقص عموماً مٹ جاتا ہے اور بڑے بڑے میں ظروحات صحت پر آ جاتی ہے۔ اسلئے

ڈاکٹروں کا یہ قول ہو کہ مائی اوپیا کوئی مرض نہیں۔ مگر ایک قسم کا پروگریسیو ٹربو والامائی اوپیا ہوتا ہے جو بہت جلدی بڑھتا جاتا اور آخر کار مریض کو نابینا کر دیتا ہے جب اس قسم کا مائی اوپیا ہو تو مریض کو ہر قسم کے نظری کام سے منع کر دینا اور قطعی آرام کی تاکید کریں۔

مناسب عینک کا تجویز کرنا ہر قسم کے نقص بصارت کو لیے ہوا ضروری امر ہے ورنہ ہمیشہ آنکھ پر زور پڑ کر یہ امراض بڑھتے رہتے اور طرح طرح کی دماغی تکالیف کا باعث ہوتے ہیں۔

مائی اوپیا کے واسطے عینک تجویز کرنے کے قواعد حسب ذیل ہیں۔
مریض کے سامنے حروف ثابث جو اس امتحان کے واسطے تجویز کردہ ہیں ۲۴ قوت کے فاصلہ پر لگا کر مریض سے وہ حرف پڑھوائیں۔ پہلے علیحدہ علیحدہ ہر ایک آنکھ سے پڑھوا کر معلوم کریں کہ دونوں آنکھوں کی نظر کیساں ہو یا کم و بیش پس اگر کیساں نظر ثابت ہو تو دونوں آنکھوں پر ایک ہی طاقت کر شیشہ لگا کر مریض سے حروف پڑھواتے جائیں پہلے کم سے کم طاقت کر شیشہ لگا دیں بعد میں حسب ضرورت زیادہ طاقت کرتے جائیں جس عینک سے مریض تمام حروف کو آسانی پڑھ سکے وہی اسکی آنکھ کے لیے موزوں ہو مگر مائی اوپیا میں کم از کم طاقت کی ایسی عینک تجویز کرنی چاہیے جس سے مریض تمام باریک حروف کو آسانی پڑھ سکے بعض حالتوں میں تمام باریک حروف کا کسی عینک کو ساتھ بڑھنا ممکن نہیں ہوتا ایسی حالت میں کم سے کم طاقت کی وہ عینک تجویز کرنی چاہیے جو قریب قریب زیادہ طاقت کی برابر دکھلا سکے۔

اگر مریض بارہ انچ کے فاصلہ سے باریک حروف کو بلا امداد عینک آسانی نہ پڑھ سکے تو ایک عینک لکھنی پڑے گی کے لیے علیحدہ تجویز کرنی چاہیے۔ قریب نظری کی عینک بعید نظری سے عموماً نصف طاقت کی ہوتی ہے مریضوں کا اکثر یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری قریب کی نظر اچھی ہو اور ہم آسانی باریک ہر باریک حروف کو پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ خیال اگلو ہو گا کہ بڑھتے نقصان پہنچاتا ہے جو زائد محنت آنکھ کو بلا امداد عینک لکھنی پڑھنے میں برداشت کرنی پڑتی ہے وہ آنکھ کو کچھ نہیں معلوم ہوتی لیکن دراصل نظر کو سخت نقصان پہنچاتی ہے انتخاب عینک میں یہ امر بھی نہایت توجہ کو قابل ہے کہ اسیا کا جسم معمول کو کم نظر نہ کئے ورنہ ہمیشہ آنکھ پر زور پڑ کر مکان اور صداع لاحق ہونے لگیں گی۔

قریب نظروالوں کو کسی جبک کو کوئی باریک کام نہ کرنا چاہیو۔ سدھم اور ہر قسم کی مصنوعی روشنی میں لکھنا یا پڑھنا یا اور قسم کا باریک کام کرنا سخت مضر ہے۔ کام کرتے کرتے جب مکان معلوم ہو تو فوراً آنکھ کو تھوڑے عرصہ کے واسطے آرام دینا ضروری ہوتا ہے۔ مصنوعی روشنیوں میں سایہ دار موم تیلی کی روشنی سب سے کم مضر ہے۔

دوسرا مائی پرنسویا یہ مرض مائی اوپیا کے عین خلاف ہے اس میں دور کی نظر خاصی ہوتی ہے لیکن ہندل روشنی میں باریک چیزیں نظر نہیں آتی اور تجویزی ڈاکٹر شیشے سے مکان اور دور دور معلوم ہونے شروع ہو جاتے

ہیں۔ اگر دور کی چیزیں بھی باسانی نظر نہیں آتی بلکہ اون کو کچھ میں زور خرق کرنا پڑتا ہو۔

یہ قریب نظری کا خلاف ہے یعنی آئین افقی قطر چھوٹا اور عمودی قطر بڑا ہو جاتا ہے۔ دور کی چیزیں نزدیک نظر آتی ہیں اسکی مفصل ذیل اقام ہیں۔

(۱) کلی جسمیں مرض قویہ ایک حروف کو دیکھ سکتا ہو اور دور کی چیزوں کو صاف طور پر۔

(۲) اضافی جسمیں مرض قریب کی چیزوں کو دیکھنے کو واسطے ڈیل کو اسقدر پھیرتا ہے جتنے کہ دور کی چیز کو دیکھنے میں مثلاً ۱۲ انچ کو فاصلہ پر پڑنے کے واسطے اسقدر زور لگاتا ہے جیسا کہ ۱۲ انچ کی واسطے۔

(۳) ضعیف جسمیں مرض قریب کی چیزوں کو باسانی دیکھ سکتا ہے۔ اور ویسا ہی دور کی چیز کو گوردر تک لکھنے پڑھنے یا دور کا نظارہ دیکھنے سے تھکا ہوا ہوتا ہے۔

اسکا علاج سوائے مناسب عینک کو اور کچھ نہیں۔ ہائی پرمیوپیائی عینک تجویز کرنے کے قواعد حسب ذیل ہیں۔

مرض کو نہونہ کے حروف سے ہیں فٹ کو فاصلہ پر کھڑا کر کے ہر ایک آنکھ سے علیحدہ علیحدہ حروف پڑھائیں۔

اگر دونوں آنکھوں کی نظر یکساں ثابت ہو تو دونوں آنکھوں کے ایک ہی طاقت کو شیشہ لگا کر امتحان کریں۔

پہلے کم سے کم طاقت کے شیشوں سے شروع کر کے بتدریج انکی طاقت بڑھاتے جائیں۔ اور آخر کار زیادہ سے زیادہ طاقت

کا شیشہ چھونٹنے کے حروف کو نہایت آسانی اور عمدگی کے ساتھ دکھانے سے تجویز کریں۔ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ مانی اوپیا

میں کم سے کم طاقت کا کارآمد شیشہ تجویز کیا جاتا ہے اور ہائی پرمیوپیائی کو خلاف یہ یادہ و زیادہ طاقت کا بلکہ

بہتر یہ ہے کہ پہلے یہ دریافت کریں کہ معمول حالت میں کس طاقت کا شیشہ نظر اعلیٰ درجہ پر لچا جاتا ہو۔ اس

دہ درجہ ہائی پرمیوپیائی کا جو بفعل ہے معلوم ہو جائیگا۔ بعد ازاں اس درجہ میں سے چلی پھیلا کر دریافت کریں۔ کہ

اس آئین میں کس طاقت کا شیشہ نظر کو اعلیٰ درجہ پر لچا جاتا ہے۔ اس کو اصل درجہ ہائی پرمیوپیائی کا معلوم

ہو جائیگا۔ اصل درجہ میں سے اگر درجہ بالفعل منفی کیا جائے تو درجہ بالقوائی ظاہر ہو جائیگا۔ ایسا شیشہ تجویز

کریں جو کل درجہ بالفعل اور تھائی درجہ بالقوائی کو رفع کرے۔ مثال کے طور پر فرض کرو کہ درجہ بالفعل +۴ ہے

ہے اور اصل درجہ جوائیوین ڈالنے کے بعد معلوم ہو سکے کہ +۷ ہے پس درجہ بالقوائی +۳ ہوگا۔

ایسے عینک مفصل ذیل طاقت کی تجویز کرنی چاہیئے۔ درجہ بالفعل یعنی +۴ + ۳ = (درجہ بالقوائی یعنی +۳)

= (۱ + ۲) + ۵ = ۵ + ۵ پس ۵ درجہ کے محدث شیشوں کی عینک تجویز کریں۔

اگر دونوں آنکھوں کی بصارت میں کچھ تفاوت ہو تو پہلے ایک آنکھ کو پردہ سے بند کر کے دوسری آنکھ کو

لئے قواعد بالا کو مطابق شیشہ تجویز کریں۔ بعد ازاں اسے طرح پہلی آنکھ کے لیے تجویز کر سکتے ہیں۔

سوم۔ برسیسی اوپیا۔ بعید نظری۔ یہ نقص عمر بچا چالیس سال کی عمر کے بعد ہر ایک شخص کی نظر میں واقع ہو جاتا ہے

مگر جاکوچین سے مانی اوپیا ہو وہ اس سے ششے ہوتے ہیں بلکہ نو عمر لڑکا اشخاص کی نظر چالیس سال کے بعد صحت کی طرف

دستی کرتی ہے بعید نظری میں مرض چھوٹی چیزوں کو قریب سے دیکھ سکتا۔ لکھنے پڑھنے اور قریب سے بدیک کام

کے وقت ایشیا ویدنی کو فاصلہ پر کر کے دیکھتا ہے۔ اسکا اعلان بھی سولے عینک کو اور کچھ نہیں ہے۔ اس نقص میں عینک تجویز کرنے کے لیے حسب ذیل قواعد ہیں۔

۱۔ ایک حرف مریض کی آنکھ سے ۱۳ انچ کو فاصلہ پر رکھ کر اس سے پڑھو یا اس اگر نہ پڑ سکے تو کم از کم ۱۴ انچ پر لگا کر دیکھیں اگر اس سے بھی پڑ سکے تو زیادہ زیادہ طاقتوں کے شیشہ لگاتے جائیں آخر کار کم از کم طاقت کا وہ شیشہ تجویز کریں جو ایک حرف کو اس فاصلہ سے باسانی دکھلا سکے۔

چھٹا ضرر ضعف بصارت۔ اسکو اگر مریض میں استیجی نوچیا کہتی ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ عینک سے لکھنی پڑھنی یا اور کوئی نظر کا کام کرتے نہاں ہو جائے اسکی وجوہات عموماً مائی پریشر و یا یا ضعف عضلات ہوتے ہیں۔

پنجم استیجی نزم نقص سمتی۔ اسکی تین قسمیں ہیں۔ ۱۔ ایک سمت نظر اپنی دو دوسریں مائی اوپک مائی پریشر و یا ۲۔ ایک سمت سے کم درجہ کا مائی اوپیا یا مائی پریشر و یا اور دوسریں یا ۳۔ ایک سمت میں مائی اوپک نہ ہو میں مائی پریشر و یا پری قسم کو پہلے دو سے کو کیپلر کی فریمیری کو کہا جائے کہ وہ میں سے نقص کی طرح معلوم ہو تو اس طرح کہ عینک سے مائی اوپک کی طرح معلوم ہو جائے گا کہ کس سمت کو خط کو آسانی اور عینک کے ساتھ پڑ سکے اور کس سمت کو خطوط کو نہیں با ایک سمت میں کس قسم کا نقص ہے اور دوسری میں کس قسم کا۔ حقاً ایک مدور کاغذ پر مرکز سے محیط کی جانب بہت سے خطوط کھینچ کر پڑھو یا اس سے سمت کی نظر کا حال بخوبی معلوم ہو جائے گا یہی مدور و ہات کو ٹکے کے ایک قطر میں لایا جائے گا فیکر آنکھ پر لگا دیں اور اس پتہ کو مختلف سمت میں کرتے پھیل و مریض سے نمونہ کو حروف ساتھ ساتھ پڑھو یا اس میں کسی سمت میں متعین شیوں کی مدور سے اوکسی سمت میں محب کی مدور اوکسی سمت میں بلا کسی قسم کی امداد کے ان حروف کو پڑھ سکے یا مختلف سمتوں میں ایک ہی قسم کا نقص مختلف درجہ کا ثابت ہو گا پس ہر سمت کے لیے قواعد عامہ کو مطابق علیحدہ نمبر دریافت کر کر مرکب عیشوں کی عینک تجویز کریں جو مختلف سمتوں کی عینک کی ضرورتوں کی مطابق مختلف درجہ پر مقرر اور اور محب ہو۔

بطان الذوق۔ فاد ذائقہ۔ ذائقہ کے امراض کا بیان و کچھ۔

بعید نظری۔ بصارت کے نقصانات کا بیان دیکھو۔

نقص العین۔ نوٹو نوید چمک لگنا روشنی کی برداشت نہ ہونا۔

بکاین کے رتج۔ صناد محل اور ام رسکن اوجاع۔ اور جاذب طوبات ہیں۔ داخلی طور پر مخرج صفرا و بلغم و صفی خون ہیں۔ صخر نصف ڈرام سے دو ڈرام تک۔

کو Buchu اسکا نسل پیرا اگوستا ہے اسکا بیان دیکھو نکلین سہلات عینک کے لیے اسکا انفیوزن ایک عمدہ ذریعہ ہے مگر کو ایک ڈرام سے دو ڈرام تک۔ انفیوزن کو ایک انس سے ۴ انس تک۔

بلاڈونا Belladonna اسکی تاثیرات ادرین بر صخر میں ادرین کا بیان دیکھو۔ صخر اکڑاٹ بلاڈونا ایک گرین و ایک گرین تک۔ نکلین بلاڈونا و سہلات عینک کے لیے اسکا انفیوزن ایک عمدہ ذریعہ ہے مگر کو ایک ڈرام سے دو ڈرام تک۔ انفیوزن کو ایک انس سے ۴ انس تک۔

بلاؤنا الکھانک پگرمین پگرمین تک

بلاؤنڈنٹیل Blind Nettle آرٹی کا ماچو الیمیم وائٹ آرک انجیل آرٹی کا ماچو گیان کھو۔

لمبر پریٹیس Bullar Paralysis اس کے دوسرے نام ہائی وٹرڈنگ لیٹرل

سکے روس اور گلاسویلیو لیٹرل پریٹیس میں۔ یہیں لیون بنان اور خبرہ کا فالج ہو جاتا ہے اس لیے کہ انہیں گلاسویلیو لیٹرل پریٹیس کی شریعتیں دوران اور در دوسرے کرتے ہوئی اور کہیں در دہو جاتا ہے۔ یہ کاکا کہیں دست اور تکلیف ہوتی۔ زبان کی حرکت بند ہو جاتی اور نگلنا دشوار ہو جاتا ہے سانس جلدی جلدی اور چھینک آتا ہے نبض تیز کمزور اور بیا عدم ہو جاتی چہرہ اور آنکھوں کے عضلات بھی مسترخ ہو جاتا۔ مرنہ حالت میں زبان نالو طلق اور پلکوں کے عضلات مسترخ ہو کر بولنا بند کہنا پیا حال پلین گری ہوی بہتہ تھوک سے بھر اہوار ہوتا ہے۔ سوت کا وقوع دکشی یا نصف یا قلبی خلل سے ہوتا ہے۔

بہی تو مرض دماغ کے اس حصہ میں جریان خون یا ایسا لازم یا تھراپوس ہو کر وقتاً ہو جاتا ہے جس کا نام ڈلا بلا گٹا اور پوس ہے مگر عموماً ابتدا میں ہوتا اس کا تھراپی عضلات بہت تلو اور مٹیل پڑ جاتے ہیں مرنہ حالت میں ڈلا میں درم ہو کر آخر کار نرم پڑ جاتا اور قطرات خون خارج شدہ نظر آتے ہیں موٹا سیلر ز رفتہ رفتہ زایل ہو جاتے اور سکڑ جاتے ہیں اعصابی ذرات اور ریشوں میں یہی خرابی شروع ہو کر فیل نیو موگاسٹرک سائیکلر اکیسیری اور ہائی پوگلاسل اعصاب کے مرکوز کو مبتلا کر لیتی ہے۔ بعد میں یہی خرابی اعصاب کی جڑوں اور پھر خود اعصاب میں پھیلتی جاتی ہے اور اسی طرح نخاع تک پہنچ سکتی ہے۔

یہ مرض مفصلہ ذیل امراض سے مشابہ ہو زبان کا فالج چہرہ کا دوطرفہ فالج یعنی دوطرفہ لقوہ۔ مجنون کا عام فالج اور ڈفٹھیہ یا کا فالج۔

علامہ ج۔ آرنگ اور سترکینا کا مدت تک استعمال کرنا اس میں مفید ہو لے۔ اگر آتشک موجود ہے تو بارہ اور نام ڈفٹھیہ وغیرہ کا استعمال ضروری ہے۔ جب اس کے ساتھ پاسک پیرا لیمیا بھی ہو تو استقلال کے ساتھ باقاعدہ ہیشہ مالش کرنی چاہیے۔ عام غذا اور پوریشن کی طرف خاص توجہ رکھیں اکثر حالتوں میں یہ مرض لاعلاج ثابت ہوا ہے۔ بلنجیہ زخموں کا بیان دیکھو۔

بلڈ ٹانک Blood خون کا بیان دیکھو۔

بلڈ ٹانک Blood Tonic مقوی خون۔ اس سے مراد وہ ادویہ ہیں جو خون کی کارپسلی کی کمی کو پورا کریں یا اس کی پلازما اور تھیلیوں کا جرم بنیں۔ دیکھو خون کا بیان۔


بلڈ روٹ Blood Root سینٹو نار یا کیناڈنس کا دوسرا نام ہے۔ اس کا بیان دیکھو۔

بلڈ فلور Blood Flower ایک سبب کراسا ویکا۔ اس کی جڑابی کے کو ان کی طرح توڑ دے اس میں سے ایک جوڑ سبب کی طرح نام نکلتا ہے جو بیٹن کی طرح تیز رفتی ہے۔ فاقہ کے بعد نکلتا نام ہے۔

اور قاتل کرم اسماء ہے۔ یہ خن فلونڈا کسٹرکٹ ایک ڈرام سے دو ڈرام تک۔

بلش **Bilster** آبلہ چھالہ بھینچولا اگر ایک دو چھالہ ہوں تو انکا علاج صرف اسقدر ہی کہ سوئی کے ساتھ سوراخ کر کے اسکی رطوبت نکال دیا و۔ اور بعد میں جب جھلی پھینک کچی سطح رہ جائے اسپر بے خراش جا ذبات بطور سفوف یا سرم وغیرہ لگاتے ہیں مثلاً ذنک کسانڈ بورک ایڈ اور نشاستہ ملا کر یا بستہ اور نشاستہ یا بورک انٹسٹینک وغیرہ مصنوعی طور پر مقامی ورم اور ذخیرہ رطوبت کو تحلیل کرنے کی غرض سے ایسا اسٹرم کنٹینر کے ساتھ آبلہ اٹھا کر جائیں۔ انکا علاج بھی بعد میں اسطرح ہے اگر آبلہ کسی دوسرے مرض کی وجہ سے تمام جسم پر بکثرت نمودار ہوتے ہوں تو اس مرض کا علاج کرنا چاہیے اور تمام جسم کی طاقت مقویات اور عمدہ غذاؤں سے قائم رکھیں۔

بلش **Bilharzia Haematoria** یہ ایک قسم کا باریک حیوان ہے جو پورل کی اور مثانہ کی ویدہ دل میں جگہ کر لیتا ہے تب پیشاب خون آمیز خارج ہوتا اور خور و دین کو ذریعہ سے اسکے او دم پیشاب میں بھی نظر آتے ہیں۔ یہ مرض مصر اور افریقہ کے دیگر ملکوں میں بکثرت ہوتا ہے۔ اسکا نر بڑا ہوتا اور مادہ بہت تلی اور نازک ہوتی ہے۔ نر کے پیٹ میں ایک لمبی کھالی ہوتی ہے۔ جماع کے وقت مادہ اس کھالی میں چمٹ جاتی ہے۔ لگے لگے اندھے طول میں لپے اچھے ہوتے ہیں شکل میں بیضوی ہوتے مگر ایک طرف نوک نکلی ہوئی ہوتی ہے دیکھو تصاویر ذیل۔



علاج۔ اسکا علاج مدرات و سومات قاتل کرم او ویسے سر اسر فضول اور مضبوطی ہے لیکن ایسے مدرات جو مسکن سوزش مثانہ ہوں بیشک مفید ہوتے ہیں۔ در حقیقت اسکا علاج محض اسقدر ہی کہ مرض کی طاقت کو عام مقویات غذائی و دوائی و دناست و زرشح و حمام وغیرہ سے ترقی دیا ورنہ نازک طبیعت خود اسکے مقابلہ کے لیے طیارہ کو انکی طرفت کرے۔ شر و عین مریض کو چاہی مرض ہی و دوسری جگہ لیجانا نہایت مناسب ضروری ہو۔

بلش **Bladder ache**۔ فکس و سی کو کوس کا بیان دیکھو۔

اسہال صفراوی - اسہال کا بیان دیکھو

Biliary Diarrhæa

بلییری ڈیاریا

فولج صفراوی

Biliary Colic

بلییری کالک

اجتماع صفراوی

Biliary Congestion

بلییری کونجسٹن

سنگ صفراوی

Biliary Calculi

بلییری کیلکولائی

سنگ صفراوی

Biliary Lithiasis

بلییری لیٹھیائیسس

غلطہ صفرا

Biliousness

بلیس نیس

سنگ صفراوی یا صفراوی پتھریاں - ان کی تشریح حسب ذیل ہے -

صفراوی پتھریاں مفصلہ ذیل طریقوں سے بن سکتی ہیں

(۱) صفرا کے بجمد ہونے سے کوئی ریزہ بن کر اس کے اوپر تہیں جمی چلی جائیں -

(۲) صفرا میں کوئی شے مثل کو لیسٹرن وغیرہ معمول سے زیادہ خارج ہو کر اس کے ٹچٹ کی کنکریاں بن جائیں -

(۳) صفرا میں سوڈا کم ہونے اور ترشیاں و چونہ زائد ہونے سے ٹچٹ بیٹھ کر پتھریاں بن جائیں -

(۴) جسے ہوئے بلغم یا ریشوں یا اپنی تخلیم پر صفراوی تہیں جمی شروع ہو جائیں -

(۵) کوئی غیر جنس شے مثل تخم یا کوئی کرم انٹریوں سے پتہ کے اندر چلی جاوی اور اوپر صفراوی تہیں جگر پتھری بن جائے -

ان کی وجوہات حسب ذیل ہوتی ہیں - ست عادات حیوانی غذاؤں اور شراب کا کثرت سے استعمال

- دائمی قبض - چونہ کی آمیزش کا پانی مدتوں پینا - امراض جگر مرارہ کی سوزش -

پتھریوں کی کیفیت - مقام عموماً مرارہ کے اندر ہوتی ہیں کہیں جگر اور صفراوی نالیوں میں بھی ہو جاتی ہیں

تعداد میں دس ہیں کہیں سینکڑوں اور ہزاروں ہوتی ہیں - تمامت میں چنے کو دانہ کی برابر کہیں بادام کی

برابر اور کہیں اس سے بھی بڑی ہو جاتی ہیں - شکل میں عموماً مدور کہیں گوشہ دار اور کہیں خاردار رنگت

میں زرد و سبزی مائل محسوس کرنے سے چکنی صابون سی معلوم ہوتی ہیں - آبسانی ٹوٹ جانی اور کاؤ

سے کچھ جاتی ہیں - نازی کنکریاں پانی میں ڈوب جاتی گھڑک پیرتی رہتی ہیں - اگر درمیان سے کاٹ کر دیکھا

جاوی تو ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے جس پر تہیں جمتی جاتی ہیں اس کی ترکیب میں صفراوی رنگ قد سے چونہ

یگنیشیا سوڈا اور پوٹاش کے نمک اور کو لیسٹرن شامل ہوتے ہیں کہیں ریگ بھی خارج ہوتا ہے - جہیں

زیادہ تر صفراوی رنگ اور کو لیسٹرن ہوتے ہیں -

نتائج - ماول مقامی خراش سے ورم پیدا کر کے پھوڑا اور زخم بنا دیتی ہیں - خواہ جگر میں ہوں یا مرارہ یا نالیوں

دوہہ اگر نالی میں ہوں تو صفرا کا اخراج رک کر رقان ہو جاتا ہے

سواء - انٹریوں میں جمع ہو کر سخت مدہ بنا سکتی ہیں - جس کی وجہ سے انٹری کی دیوہ - نفخ - پھوڑا

اور سورخ ہو کر پیری ٹوٹائی ٹس ہو سکتا ہے۔ یا انٹری ٹکڑے چھبھڑے بن سکتی ہیں۔ دیکھو بیان انسٹائی نل افسد کشن کا۔

چھٹا نم۔ جب کوئی کنکری مراد سے ٹکڑے صفراوی نالی میں آتی ہو تو سخت درد ہوتا ہو کہ مریض ٹوٹا ٹپٹاپٹ کو دبانا اور چلاتا ہے یہ درد پھر تباہو یا پھارتا ہو یا بھارتا ہو یا سورخ کرتا ہو معلوم ہوتا ہو بعض اوقات اس درد کی ایسی شدت ہوتی ہے کہ مریض کو غش آجاتا اور سخت ضعف ہو کر ہلاک ہو سکتا ہے کہیں بہت ہی خفیف ہوتا ہے۔ درد کی شدت پھری کی قامت اور شکل پر منحصر ہے چھوٹی صاف گول کنکری باسانی لکھجاتی ہے مگر گوشہ دار یا خار دار یا بڑی کنکری سخت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ خار دار میں یرقان کم ہوتا ہے۔ اور مدد میں زیادہ ہوتا ہے گویا کہ درد اور یرقان لازمی علامات نہیں ہیں۔

علاج۔ چونکہ پیری کالک محض سنگ صفراوی کی ایک علامت ہے اسلئے اسکا بیان بلیری لتھی ایسرس کے ضمن میں کیا جاتا ہے۔ اس مرض کا علاج دو حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے اول دورہ قونج دوم زمانہ وقفہ میں حفظ ماقدم کے طور پر علاج۔

اول دورہ قونج کا علاج۔ اسکے علاج کے دو مطلب ہیں ایک تو درد وغیرہ کی تکلیف کو رفع کرنا دوم اگر پھری ویرنگ صفراوی نالی میں آئی ہے تو اسکے اخراج کی تدابیر کرنا۔

جب پھری پتہ میں ہی ٹکڑا بل ٹکٹ صفراوی نالی میں پہنچتی ہو تو سخت درد ہوتا ہو اور اس تکلیف کو جب ہی نالی کو کمی ریشہ اور بھی سکڑ کر اسکے اخراج کو راج ہو تو میں بہترین طریق علاج یہ ہے کہ فوراً مارفیا اور اٹروپا کی جلدی بچکاری کریں تاکہ درد کو آرام ہو اور ساتھ ہی مارفیا اور اٹروپا کی وجہ سے نالی کا تشنج بھی رفع ہو جاوے اٹروپن کا ایک یہ بھی بڑا فائدہ ہے کہ مارفیا جو اخراج صفرا کو بند اور قبض کرتا ہے اسکے اس فعل کو جبر دیتا ہے لیکن اسکو مختل اور دافع تشنج فعل میں اسکا مدد ہے۔ داخلی طور پر فوراً سوڈا و سلی سلاس پندرہ میں گرین اور سوڈا الیکٹرام آدھ سیر پچھتہ تیز گرم پانی میں حل کر کے گرم پلا دیں اس سے ایک تو صفرا رقیق اور زیادہ مقدار میں خارج ہوگا۔ دوم اس سے اندرونی سینک پنچر درد اور تشنج کو آرام لیا گا۔ اگر ایک دفعہ پیو سے فے ہو جاوے تو دوبارہ سہارہ بھی پلاٹیں حتی کہ پورا آرام مل جائے سخت درد کی حالت میں فوراً کلو و فام سنگھانا دافع درد تشنج ہے پندرہ پندرہ منٹ کو بعد کلو و فام وارٹا ایک ونس خوراک میں پلانا بھی مفید ہے فانیون پنچر پلاؤ ونا ڈوڈ و سائیک ایڈ اور پھر کلو و فام ملا کر حسب اندازہ و حالت مریض دیکھتے ہیں خارجی طور پر سینک نیلیا پولیس لگا بھی مفید ہیں۔

دورہ کے وقت اولاً ٹیل یعنی روغن زیتون چھ اونس فوراً پلاؤ ونا اکثر درد کو فوراً آرام دیتا اور پھری کو خارج کر دیتا ہے اور اگر شروع علامات دورہ میں ایک ونس گھنٹہ گھنٹہ بعد پلا یا جاوے تو دورہ کو روک بھی دیتا ہے۔

گلین بن نصف ٹونس ہوا ایک انس کی خوراک میں دورہ کی وقت میں پلانٹ مفید ثابت ہوا اور زمانہ وقفہ میں ایک دو ڈرام روزانہ پلانٹ دورہ کو روکتا ہے۔ دفعہ در دفعہ ایٹمی پائیرین اور ٹنچر جیسی میم علیحدہ آزمائے گئے اور مفید ثابت ہوئی اگر کمزوری زیادہ ہوا غشی کی علامات نمایاں ہو جائیں تو ٹریٹمنٹ اینتھرا اور امونیا ملکر دینا مفید ہیں۔ گرم پانی میں بٹھانے کے کرانا اور ٹریٹمنٹ کا حقہ صابون اور ٹیگرم پانی کے ساتھ کرنا بھی اکثر مفید پڑتا ہے۔
دوم زمانہ وقفہ مین حفظ ماکتد مکی تدابیر۔ اس وقفہ کے زمانہ میں ایسی ادویہ استعمال کرنی چاہئیں جو صفر کو رقیق اور زیادہ خارج کریں مثلاً کیلول۔ الوائیٹل کیسٹرائیل۔ پوڈوفین ایونی مین۔ آئریڈین۔ سوڈیم سیلیٹ۔ سوڈی بائی کلس۔ سوڈیم سلفو کاربولیٹ۔ سوڈیم بنزوائٹ وغیرہ کھاری پانی کا بکثرت استعمال کرنا صفر بہت زیادہ ختم میں خارج کرتا اور نیز اسکو رقیق رکھتا ہے۔ غذا میں سبز ترکاری اور تازہ میوہ جات کا زیادہ استعمال رکھیں شکر نشاستہ گوشت مچھلی بھینہ۔ روغن وغیرہ حیوانی غذائیں با احتیاط استعمال کرنی لازم ہیں۔ باقی روغن خاص کر آلوئیٹل اور کسٹرائیل اس میں مفید ہیں۔ حیوانی روغنوں کی نسبت یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اُن سے کو لیسرین بنکر صفر اوی نکلیاں اور زیادہ بنتی ہیں لیکن اس اعتراض کے لئے کافی وجوہات نہیں ہیں۔

ہاتھ کے دباؤ اور مالش سے پتھریوں کا پتہ میں سے نکالنا پہلے دستور تھا لیکن اس میں سخت اندیشہ ہے جب نکر یاں پتہ میں ہوتی ہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی لیکن جب بائل ایکٹ میں پہنچتی ہیں تب ہی ٹو لیمچ وغیرہ کی شکایت پیدا ہوتی ہے پس اسوجہ سے یہ عمل متروک ہو گیا ہے۔

مفصلہ ذیل حالتوں میں جراحی عمل ضروری ہوتا ہے۔
 (۱) جب کہ پتھری نالی میں اٹک کر سخت درد اور تکلیف پیدا کرے اور ادویات بیرونی اور اندرونی وغیرہ سے آرام کی صورت نہ ہو بلکہ پتہ میں پانی بھر کر چھوٹا جائے۔

(۲) جب کہ پتہ میں بڑا پتھر بکر ہمیشہ درہ کرتا ہے۔
 (۳) جبکہ پتھری نالی میں پسند کر سخت یرقان پیدا کرے جو کسی طرح دواؤں سے اچھا نہ ہونے پائے۔
 (۴) جبکہ پتہ میں یا اس کے قریب پھوٹا بننے لگا تھا ہوں۔

(۵) جب کہ پتھریوں کے خراش کیوجہ سے پیری ٹوائٹس کی علامات شروع ہو جائیں۔
 جب جراحی اور پٹیشن کی ضرورت ہو تو مفصلہ ذیل وپرشینوں میں سو حسب موقعہ کر سکتے ہیں۔

(۱) ایک لمبی باریک سوئی داخل کر کے پتھریوں کا تشخیص کرنا بہت سودمند ہے کیوجہ سے یہ وپرشین متروک کر کے بجائے اس کے عمل کیا جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا گھائی دیو ائٹت سے معلوم کر سکتے ہیں۔

(۲) اگر پانی بھر کر بہت پھول گیا ہو اسکو باریک ٹروکار اور کیٹولاس سے خالی کر لیجئے اس میں نہایت اینٹی ہوئیاری کرنی چاہیے۔ غل بھی اندیشہ سے خالی نہیں اور اس کو حسن عارضی نام کتاب ہے

۳) کوئی سٹائومی یعنی گال بلڈ میں شکاف پہنچا کر تجھریاں نکال لینا۔ اس میں بہت کامیابی ثابت ہوئی ہے
خاص کر جب یرقان کم ہو۔

۴) کوئی تھوڑی سی یعنی تھری کو اندر ہی اندر چھوڑ کر تپہ یا نالی میں ہو نکال لینا۔

۵) کوئی سس ٹیکٹومی یعنی تمام گال بلڈ کو نکال لینا یہ اوپریشن کوئی سٹائومی کی نسبت زیادہ آسان اور

۶) کوئی سٹائوٹریٹومی یعنی گال بلڈ اور انٹری کے درمیان مصنوعی نالی قائم کر دینا یہ اوپریشن آسانی
میں کیا جاتا ہے جبکہ نالی میں کوئی لاعلاج روک لاق ہو کر یرقان رہتا ہو۔

عمل کوئی سٹائومی کا طریق حب ذیل ہے۔ دہانے ریکٹس عضلہ کے بیرونی کنارہ کو قریب اور کٹل سرج
ایک دو انچ نیچے ایک شکاف دو ڈوہائی انچ لمبا دو تب تمام خون کو بند کر اور ایک اگلی زخم میں داخل کر کے گال بلڈ

کو معلوم کر دو اور اسپیرٹر کے ساتھ جو کچھ کہ تپہ میں موجود ہو نکال لو پھر نیچے کو زخم سے باہر کھینچ کر اور
اس میں شکاف دیکر تھری وغیرہ سے اسکو صاف کر کے دیوار شکم کے ساتھ بند کر اگر تھری دیوار کو ساتھ چسپی

ہوئی ہو تو اسکو انگلیوں یا فار سپس سے پھوڑ کر نکال لو اور جو ذرات اندر باقی رہیں انکو گرم لوشن سے دھو ڈالو
بعد ازاں ایک ڈرنیج ٹیوب (جو زخم سے کیتھرائز ہے) لگا کر ڈریس کر دو جب تمام رطوبت بند

ہو جاوے ٹیوب کو نکال لو اور زخم کا منہ آپ ہی آپ بند ہونے دو۔
بلیس کی خیمچن مینڈیک کھینچن دیکھو بیان جگر کے امراض کا۔

بلیس غلبہ صفرا۔ چونکہ البی حالتوں میں پیدا ہوتا ہے کہ مقوی غذائیں (خاص کر مرغی) اور گوشت شراب بکثرت
استعمال کیجاویں اور ریاضت وغیرہ بالکل نہ ہو ایسی حالت میں صفرا زیادہ ضرورت سے پیدا ہو کر معدہ اور انٹریوں

میں بیکار پڑا رہتا اور خراش کر کے متلی۔ تو اسہال۔ صدام صفراوی۔ بچینی و جوالی سخت پیاس۔ عدم اشتہا
نفرت از طعام وغیرہ علامات پیدا کرتا ہے۔ اور اسہال کا ہونا گویا کہ زائد صفرا کا قدرتی دفعیہ ہے۔ پس اسکو علاج

میں شروع میں قے کرانیں اور چونکہ قے سے اسہال کی نسبت بچینی اور نقامت زیادہ پیدا ہوتی ہے اسلئے بعد میں زائد
صفرا کی صفائی مہلات کر کے رہیں۔ اور قے کر کوئی تدا بیر کریں پس بلیس میں کو علاج کو لئے مفصلہ ذیل تدابیر ہیں

اول شروع میں نمک پانی یا رائی یا زنگ سلفیٹ یا جو شانہ بابونیا یا اسلیک وغیرہ سے قے کر اگر معدہ کو مقام
اور قضا کر دین پر رائی کا پلستر لگاویں میگنیشیا سلفاس کی حقنہ کریں قے بند ہونے سے ایک دو گھنٹہ بعد

داخلی طور پر بھی میگنیشیا سلفاس چار ڈرام۔ سو ڈرام ایک ڈرام۔ دواؤں پانی میں حل کر کے پلاویں۔ اگر قے
بند نہ ہو تو سہتھ۔ ہائی ڈرو سائیک ایڈ سپرٹ کلوروفارم جب انداز پانی میں ملا کر شکم میں دے کر

پلاویں۔ سوتے وقت ایک گولی جیس کیلول آگرین اور ایک سکرٹ ریجائی آگرین ہو چند روز تک کھاتے
رہیں۔ اگر ممکن ہو سکریٹ کو کھلی ہو اس سے اور ورزش کی تمہائیں کریں۔ اگر جو ضعف مرض اس قابل ہو
تو روزانہ گرم پانی میں غسل دینا بھی عمدہ صحت محل فضلات ہو کر زیادتی صخر کو فائدہ دیتا ہے۔ اس مرض سے

آرام ہونے کے بعد بھی چند روز تک عام مقویات و ملیحات کا استعمال کرائیں تاکہ اس مرض کا عود نہ ہو فی پلو۔
بلیک آکسائیڈ آف منگنیز Black Oxide of Manganese
 اس کا تیز مسکن معدہ مد رجیض و مقوی خون اور قوی اینٹی سپٹک ہے۔ احتباس الطمث۔ پائیروسس گیسٹرو۔
 آتشک جلدی امراض میں مفید ہے۔ اینیمیا میں منگنیز والی آکسائیڈ ایک گرین۔ فی ری سلفاس ٹیپ گرین فی گولی
 ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ یرقان میں منگنیز والی آکسائیڈ گرین۔ پوڈوفیلین ٹیپ گرین آکس گال گرین کی
 گولیاں بنا کر دینا مفید ہیں۔ سحر سے۔ اگرین تک۔

بلیک ایلڈر Black Alder
 رہمن فرنیگولا کا بیان دیکھو۔
بلیک بریری Black Berry
 مقوی رملق۔ حابس اور قابض ہے۔ اسہان بخش اور قاتل
 میں مفید۔ سحر سفوف پنج۔ اگرین سی۔ اگرین تک۔
بلیک چیری Black Cherry
 پرونس درجیا ناکا بیان دیکھو۔
بلیک روٹ Black Root
 پینٹڈ اور جی نیکا کا بیان دیکھو۔

بلیک سنیک روٹ Black Snake Root
 ایک ایسی موزا کا بیان دیکھو۔
بلیک کوہوش Black Cohosh
 ایضاً
بلیک ہا Black Haw
 والی برنم پرونی تو لیم کا بیان دیکھو۔
بلیک ہنی Black Honey
 ابو کے پیش کا دوسرا نام ہے۔
بلیک ہیلی بور Black Hellet ore
 ہیلی بورم نانی گرم کا بیان دیکھو۔
بلیک والٹ Black Walnut
 جوگ لانس نائیگرا کا بیان دیکھو۔

بلیک ولو Black Willow
 بالچھر کا بیان دیکھو۔
بلی فرائیس Blepharitis
 عینہ نار سائی۔ خارش مژگان۔ شروع میں سٹرن آئٹ منٹ
 ایک حصہ تین چار حصہ ویلیس میں ملا کر سوتے وقت لگاتے ہیں یا بلو آئٹ منٹ اگرین سی ۶ اگرین فی اوٹر
 کی طاقت کا جب چھوٹی چھوٹی پھنسیاں مژگان کی جڑ میں نمودار ہوں تو بالوں کو الٹا کر انکی جڑ میں کاٹک
 لگا دیں اور اگر پھنسیاں خشک ہو کر کھرنڈ بنتے ہوں تو ان کھرنڈوں کو نیم گرم پانی سے جس میں سوڈا اور وڈرام فی پا
 کے حساب سے حل کیا ہو خوب صاف کریں اور صاف کرنے کے بعد دودھ روزانہ بلو آئٹ منٹ لگایا کریں۔ اگر
 اس سے آرام نہ ہو تو کاٹک لوشن ایک ڈرام فی اونس کا پلوں کے گنٹے پر لگاتے ہیں اس کے بعد
 بلو آئٹ منٹ استعمال کرتے ہیں۔

بلی فرائیس Biphosphasim
 یعنی بلکوں کا بڑا اختیار بار بار دینا ضروری نہ ہونا۔
 اس کا علاج مطابق سبب کرنا چاہیے یعنی اگر آئینی کو لیس عضلہ کے گسی جسی عصب میں خارش ہو کر تھکنی ہو

پیدا ہوتی ہوں تو مقام خراش معلوم کر کے جو حد تو چشم کے ارد گرد باؤ دینے سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اس جگہ پر یا تو مار فیا اور اثر دین کی جلدی پکاری کریں۔ یا ایک خفیف تنگاف دیگر کاشک لگاویں اگر اسکی وجہ سرخی چشم یا سرخ دانے ہوں تو اسکا حسب قاعدہ علاج کریں۔ اور اگر کوئی دماغی سبب ہو تو مسکن دماغ اور وافع تشج اور یہ مثلاً پوٹاشیم برومائڈ، کلورل ہائیڈریٹ اور افیون وغیرہ کا استعمال کریں۔

بلی لوٹن - مقوی قلب و دماغ و معدہ۔ رافع و سوسپنس منفقان کا بوس غشی خمر ۲ ڈرام سے ۶ ڈرام تک۔
شہوت کلی، سخت شدت کو ساتھ بھوک لگنا۔

Boleemia

بلیمیہ

Blenorrhagie Arthritis

یہ گونریل کی بیماری ہے

کا دوسرا نام ہے اسکا علاج گویا کہ سوزاک و ریح مفاصل کا علاج ہے۔
پس انکا بیان دیکھو۔

Blenorhagia

بلینورجیا

Blenorea

بلینوریا

اسکے اصل جنسی میکس جھلی پر سے زیادہ رطوبت خارج ہونا ہے مثلاً ناک، آنکھ، منہ، مجری پشیا، اندام نہانی وغیرہ

سے لیکن غلط عام طور پر اسکے معنی سوزاک یعنی گونریا کہلنے جاتے ہیں پس دیکھو بیان آنکھ سوزاک کا۔
آنکھ وری کولر کا بیان دیکھو۔

Blue flag

بلیو فلیگ

Blue cohosh

بلیو کوہوش

کالونی کم قیضاک ٹرائڈس کا بیان دیکھو۔
ایس کے لپٹس گلابیوس کا بیان دیکھو۔

Blue Gum tree

بلیو گمشری

بن آکسائیڈ آف نیٹروجن **Binoxids of Nitrogen** اس گاس کا سنگھنا ہیضہ کے لئے نہایت قوی روک نہایت ہوا ہے تجربہ کو طور پر اگر مردہ حیوان کی کسی ساخت یا رطوبت میں یہ گاس پہنچائی جاوے تو وہ بال متض نہیں ہوتی۔

بن آلیوڈائیڈ آف نیری **Binioidide of Mercury** بالی ڈراجم کا بیان دیکھو

بنانا روٹ **Banana Root** اسکے درخت کا نام موسی سبی اینٹیم ہے نہایت عمدہ مصفی

خون، نارفع خنار ویرورالکوسل (گلہ) شراب کی بیوی کو اسکا خیساندہ پلانا فوراً دور کر دیتا ہے یہ خمر فلوڈا کسٹراکٹ اسے ۳۰ یونٹ تک۔

بنزوالتروپین **Benzoyltropine** جس مقام پر لگایا جاوے کو کین کی طرح چھپی پیدا کرتا ہے

بنزوآل آرٹھو سلفونک ایماز **Benzoyl-Ortho-Sulphonic Imiaz**

بنزوایٹ آف آیرن **Benzoate of Iron** یہ فولاو کا نیگٹوہی خنار میں خاصکر

مخفد سے خمر ۱۰ سے ۵۰ گرن تک۔

بنزوائک ایسڈ	Benzoic Acid	خارجی استعمال میں
بنزوائٹ آف امونیا	Benzoate of Ammonia	بنزوائن اور اسکی نمکیات
بنزوائٹ آف سوڈیم	Benzoate of Sodium	اینٹی سپٹک دفع عفو
بنزوائٹ آف لیٹھیم	Benzoate of Lithium	اور سی مولٹ میں اسکا
بنزوائن	Benzoin	کونڈنسنس چکر خراب بدبودار

زخموں پر لگانا عفو کو دور کرتا ہے اور فاسطیخ کو اصلاح پر لاتا ہے۔ بنزوائن اور بنزوائک ایسڈ کے سوگھنوں سے خوب چھینکائیں آتیں اور کھانسی بھی اٹھتی ہے۔ کمپونڈ ٹینک آف بنزوائن بطور سپرے کے سوگھنا پرانی سوزش کلیہ و زخموں میں مفید ہے۔ خون میں ہنجر بنزوائن اور بنزوائک ایسڈ کی تبدیلی مہیورک ایسڈ میں ہو جاتی ہے۔ اور گردوں کی راستہ مہیورک ایسڈ اور سینک ایسڈ خارج ہو جاتے ہیں۔ گردوں، جلد، شش، ہوائی نالیوں اور غدود کے راستہ خارج ہوتے ہوئے مقامی سوزش و درد معرق، مخرج، بلیغم اثر پیدا کرتے ہیں۔ اور اربول کے ساتھ تمام پیشاب کی نالیوں اور مثانہ اور مجری پیشاب پر اینٹی سپٹک اثر بھی کرتے ہیں۔ اسلئے اسلئے سوزاک، گلیٹ اور سوزش مثانہ، ریگ مثانہ (جو پیشاب کو کھارہ ہو چکی وجہ سے میٹھا ہو) مفید ہے۔ پیشاب کو ترشی پر لا کر فاسٹیک ریگ کو حل کر دیتے ہیں۔ اخراج بلیغم کے ساتھ بدبو کو بھی دور کرتے ہیں۔ اسلئے پرانی سرفہ اور گنگرین آف ڈی لنک براؤن کی آکٹوس میں مفید ہیں۔ ان امراض میں ٹینک بنزوائن کو ٹینک کیمف کو ٹینکچر اور پانی ایوینے ٹا اور باسٹم آف ٹولو او پیر کی صورت میں نہایت فائدہ کرتے ہیں۔ بنزوائن دفع بخار بھی ہے۔

بنزوائٹ آف امونیا اور بنزوائٹ آف سوڈیم کی یہی تاثیرات ہیں جو بنزوائن اور بنزوائک ایسڈ میں بیان ہوئیں۔ بنزوائٹ آف لیٹھیم ریگ گردہ و مثانہ میں خاصکہ مفید ہے۔

بنزوائک ایسڈ کی خوراک ۱۰ گریں سے ۵۰ گریں تک بنزوائٹ آف امونیا کی خوراک ۱۰ گریں سے ۵۰ گریں تک بنزوائٹ آف سوڈیم کی خوراک ۱۰ گریں سے ۳۰ گریں تک بنزوائٹ آف لیٹھیم کی خوراک ۱۰ گریں سے ۲۰ گریں تک کمپونڈ ٹینکچر آف بنزوائن ۱۰ ڈرام سے ۲ ڈرام تک

بنزول Benzol: ایک لطیف سائل جیر کوٹھار میں سے نکالی جاتی ہے۔ ہونٹک کف میں اخراج بلیغم اور تشنجی کھانسی کو کم کرتی ہے۔ گلیسرین آئل منتقی اور شربت شہتوت میں ملا کر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ختمہ ایک قطرہ سے بلخ قطرہ تک

بنزونی لائیڈ Benzanelide: اینٹی فیرین کی طرح دوران خون کو سست اور پسیدہ خوب لاکر حرارت کو کم کر دیتی ہے۔ اس تاثیر میں اینٹی فیرین کی نسبت زیادہ تدریج الاثر اور فیرینو خمر میں بلخ قطرہ تک

بنفشہ۔ مہل صفرا سکن قلب۔ دافع تشنگی۔ نافع اور امہے۔ سرفہ۔ درد گردہ۔ ذات الحجب وذات الریہ اور حیات حارہ میں مفید ہے۔ خر ۵ ماشہ سے ایک تولہ تک۔

بنولا۔ جب القطن پنبہ دانہ۔ اسکا مغز پید شیر۔ ملین سینہ و شکم۔ دافع تشنگ اور نافع ضیق النفس و ربوہی۔ خر ایک درام سے ایک اونس تک۔

بن یون۔ Eunion اس سے مراد اُس برس کی ورم ہے جو انگوٹھے کی جڑ کے نیچے واقع ہے کبھی ورم ہو کر ایک نئی تھیلی بن جاتی ہے اسے ہی بن یون کہتے ہیں۔

علاج۔ اسکے علاج میں سب سے مقدم یہ امر ہے کہ دباؤ اور رگڑ کا دفعہ کریں اور انگوٹھے کو مناسب ایسرواؤکی اصلی وضع پر قائم رکھیں۔ جتنا کشادہ یا جالی دار ایسا تجویز کریں کہ اس رسولی پر کسی قسم کا دباؤ نہ پڑے۔ انگوٹھے کو سٹنگنگ پلاسٹر اور رٹرنکی نلکیوں کے ذریعہ اصلی وضع پر قائم کر سکتے ہیں۔ ٹینچر آؤ بون یا انٹسٹ ایوڈین یا آیوڈائنڈ آف لڈ انٹسٹ کچھ مدت تک لگانا اس رسولی کو کم کر سکتا ہے۔ اگر ورم ہو گئی ہو تو سٹنگ دینا اور انٹی سیپٹک پوٹشین باندھنا ضروری ہے بعض اوقات وی ریٹنگ لوشن لگانا نہایت مفید ثابت ہوتا ہے اگر پٹریجائی ڈسٹگاف دیکر صاف کریں اور بعد میں ڈسینجیٹیوہ داخل کر کے انٹی سیپٹک رینگ لگائی دیں اگر بن یون چھوٹا ہو تو اسے ارد گرد صحیح جلد کو کسی پلاسٹر یا کلوڈین یا کسی مرہم سے محفوظ کر کے خاص رسولی کو خالص کاربائلک ایسڈ یا کر ائمکریسڈ یا سلور نائٹریٹ یا ایسڈ نائٹریٹ آف مرکری یا زنک کلورائیڈ یا سلفوک ایسڈ سے جلا سکتے ہیں۔ اگر ایک دفعہ جلائے میں پوری کامیابی حاصل نہ ہو تو تین تین روز کے وقفے سے چند بار متواتر ایسا ہی کرنا چاہیے۔

اگر مفصلہ یا لاتنایہ سے صورت آرام پیدانہ ہو تو مفصلہ ذیل جراحی عمل اختیار کر سکتے ہیں۔ مثلاً ٹارسل ہڈی کا سطح کر کے کال ڈالنا۔ یہ عمل اس وقت کرنا چاہیے جبکہ پیپ پڑ کر ہڈی کا بہت سا حصہ مردا پڑنا شروع ہو گیا ہو اس پر لیشن کے لئے بہتر طریق یہ ہے کہ پہلی اور دوسری ٹارسل ہڈیوں کو درمیان پشت پاپریٹگاف دیا جا کر بیرونی طرف کو اسکا سر کا لاجائے تاکہ زخم کا اسکار پاؤں کو اندرونی کنارہ یا تلوے میں نہ واقع ہو۔

بوا اسیر۔ موکو تیر ایڈر۔ پالانز پالیکر کا بیان دیکھو۔

بوا اسیر الحسم۔ رحم کے امراض کا بیان دیکھو۔

بوائی۔ ہاتھ پاؤں کا پٹ جانا۔ دیکھو بیان جدید ہینڈز کا۔

بوراکس Borax سہاگہ بانی بوریت آف سوڈیم سوڈیم بانی بوریت کا بیان دیکھو۔

بورک ایسڈ Boric Acid سہاگہ کا تیراب ایسڈ بورک میں اسکا بیان کیا گیا۔

بورنیو کمفر Berneo-Camphor ایک قسم کا ناقص مرہم کا کافر ہے جو مقام بورنیو سے

حاصل ہوتا ہے۔ دیکھو بیان کا فوریکہ۔

بوروفینال Borophenol : ایک عمدہ اینٹی سپیٹک مرکب بوراکس اور کاربالک ایسڈ کے ملنے سے بنتا ہے۔ اسکا استعمال بعینہ کاربالک ایسڈ کی طرح ہے۔

بوریت آف امونیا Borate of Ammonia : امونیا بوراس کا بیان دیکھو
بوریت آف کوئی نائیڈین Borate of Quinidin : موسی بخارات میں کوئی نائیڈین سفید۔ اسکے تین گرین کوئین سلفاس دو گرین کی برابر ہیں۔

بوکس وڈ Box Wood : ڈاک وڈ۔ فلورنگ کارنل۔ کارنس فلورڈ۔ اسکی چھال قدری اسٹریٹ محرک مقوی معدہ۔ اینٹی سپیٹک اور دافع امراض نفی ہے بعض حالتوں میں کوئین کی نسبت بھی زیادہ قوی ثابت ہوئی ہے۔ اگر سکوٹا یا کوئین میں بعض کمیوں سے مرض اسکو باطینان تمام استعمال کر سکتے ہیں بخارات موسی نافذ سیلان الرحم قلت طمث اسہال اور خیمہ میں نہایت مفید ہے خم سفوف چھال ۵ اگرین سے ۶۰ گرین تک فلورڈ اکثر لٹ۔ اسے ۶۰ یونڈ تک۔ سالڈ اکثر لٹ ۵ سے ۶۰ گرین تک۔ کارنن ۲ سے ۵ گرین تک۔

بول آرمینیئن Bole Armenian : ہندوستان میں اسکو گیسو مٹی کہتے ہیں اس میں سلیکیٹ آف ایمونیا اور آکسائیڈ آف آئرن ہوتے ہیں۔
بول ریڈ Bole Red
بول روبرا Bole Rubra

مقامی استعمال میں درد اور سوزش کو کم کرتی ہے۔ ورم بیضہ۔ دل۔ دبیلہ ورم مفصل وغیرہ میں گیسو مٹی میں استعمال کرنا فوراً درد کو کم اور ورم کو آہستہ کی رفع کرتا ہے۔ امینورزم پر اسکا عجیب اثر یہ ہوتا ہے کہ فوراً اسکی تڑپ اور درد کو دور کر کے باہمی اسکو کم کرنا جاتا ہے۔ مریض ان ہسٹیکو لٹنخ۔ درد معدہ و اسہال کو کم کر لپ کرنے سے فائدہ بخشتا ہے۔

بول الدم۔ پیٹاب خون بھیے ٹوریا کا بیان دیکھو۔
بولڈو آفریکینس Boldoa Fragrans : اس درخت کے پتے اور پھل میوہ میں
بولڈو این Boldoin : کے لئے مقوی اور محرک ہیں اسکی پٹرائے

بولڈین Boldine : اسہال گیسو کٹار بلینو جیہ سوزاک کٹار آف دی بلیڈر و کام سورمزاج کبدر صعب البکد میں مفید ہیں۔ دیگر ادویہ کو ساتھ آتنگ میں بھی مفید ثابت ہوئی ہیں اسکے پوئیں سے ایک جوہر بولڈین یا بولڈو این نام نکلتا ہے جو نہایت عمدہ اور بضرر منوم جو خم بولڈین ایک سو ۶۰ گرین تک سفوف برگ ۵ سے ۶۰ گرین تک پیچڑا سے ۳۰ یونڈ تک۔ فلورڈ اکثر لٹ اسے ۴ یونڈ تک۔

بول روبرا Bole Rubra

۷

Bole Red

بول ریڈ - یعنی رات کو سوتے ہوئے بستر پر پٹیاب کر دینا یہ مرض اکثر بچوں کو لاحق ہوتا ہے اسکی وجہ عموماً اخراج دندان یا کرم امعا ہوتے ہیں پس انکا علاج حسب حالت کرنا مقدم ہے اگر مثانہ میں پتھری یا سنگریزوں کیوجہ سے خراش ہو تو انکا حسب قاعدہ علاج کرنا ضروری ہے اگر کمزوری مثانہ ہو تو مقویات فولاد و کس و امیر کا و سکناات مثانہ مثل سیلا ڈونا۔ ہا یوسائیس وغیرہ استعمال کرنے چاہئیں۔

خانہ ابلیس اسکی
تخم کا پوست

Bonduc

Bonducella Guilandina

بونڈک - بونڈ بوسیلہ گالی لینڈینا - دافع امراض لوبتی ہے جو تھیدہ بخاریں خاصکر مفید ہے اسہیں سے ایک جو ہر گالی لینڈینا نام لگا لگایا ہے خمر پوست تخم کا سفوف اسے ۵ اگرین تک ریباہ چرخ کر ساتھ ملا کر اسکو استعمال کرتے ہیں۔

بون سیٹ Bonset - اسکے دوسرے نام غور وورٹ اور یوپے ٹوریم پر فوٹے ٹم ہیں۔

پس یوپے ٹوریم پر فوٹے ٹم کا بیان دیکھو۔

بھجواچی - سورلیا کو ریلینویا - بیاچی - بواچی اسکے بیج ملین - قاتل کرم محرک اور مصلح خون ہوتے ہیں جلدی امراض مثلاً جذام سورے اسے بہق وغیرہ میں اسکا داخلی اور خارجی استعمال مفید ہے۔

خمر سفوف تخم ۵ گین سے ۵ اگرین تک - ٹنگچر ۱/۲ ڈرام سے ۲ ڈرام تک۔

بہق - رنگ ورم کا بیان دیکھو۔

بھگندر - ناسور المفعدہ ریٹم کے امراض کا بیان دیکھو۔

بھلا نوان - خارجی استعمال میں جلد پر زخم و الدیتا و سخت سوزش پیدا کرتا ہے بطور مرہم استعمال کرنا محل او ملطف اور جلدی ہے۔ داخلی استعمال میں مقوی اعصاب و دماغ نافہ فابج و یقوہ رعشہ لیشیان - اختلاج سیل الجول اور ضعف باہنہ تخم یا محل بھلا نوان ۱/۲ ڈرام سے ایک ڈرام تک بخراخروٹ یا اسکہ یا رومن زر و کافی مقدار میں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں

بھمن - سرخ بھیجی مقوی دل و دماغ سمین بدن رمولدنہی مقوی دل - محل ریاح و بلغم مفتت رنگ مثانہ دافع یرقان و خفقان خمر ایک ڈرام سے ۳ ڈرام تک۔

بھنگ - دیکھو بیان کیسے بس اندیکا کا۔

بھنگرہ - مخرج بلغم محرک باہ - ناف صلابت طحال و جذام ہے۔ اسکی غرغہ امراض میں دندان میں مفید ہے۔

بھشیر - قابض ملطف نافہ اہمال مزین مقوی جعدہ آتھناہ سیل صفر اور مقوی چشم و دماغ ہے۔

خمر ۲ ڈرام سے ۴ ڈرام تک۔

بھی دانہ - قابض - دافع خشونت خلق و جربان جیفن ہے و سرفہ عطش حرارت صفہ و خشکی آتش سوزش زبان

دبان - قرعہ امحا اور پچپس میں مفید ہر خمر ۲ ماشہ سے ۹ ماشہ تک -
بھیننگاپن - احوال - سکواٹ - دیکھو بیان شریبمس کا -
بیاض - سفیدی خیم بھولا - لیو کوا - قرینہ کے امراض کا بیان دیکھو -

بی بیرے Bayberry - مائی ریکاسیریفرا کینڈل پیری قناری - اسکی چھال مصفی خون
حاجس الدم جاذب - مخرج ریاح معرق اور مقوی اعضاء و تخلع و دماغ ہے - بعضی اسہال معرہ خچشیں
اور رابول - سکرانیولا - سوزک - گلیٹ - اور زکام میں مفید ہر بطور سوار استعمال کرنے میں ایک عمدہ عطس ہے
سے غصوک زیادہ کر کے درد و نڈان کو آرام دیتی ہے - اسکے پھل کو جوش دینے سے ایک قسم کا موم حاصل ہوتا ہے جو مرموں میں
استعمال کیا جاتا ہے خمر پوست پنج گلے سے ۳۰ سے ۶۰ گرین تک - فلوئڈ گٹرکٹ ۵ سے ۱۵ بوند تک - سیرین
ایک سو ۵ گرین تک -

بیٹی سین Baptisine - اس درخت کو مارس فلانی وینا اور
بیٹی شیاٹنگٹوریا - Baptista tinctoria - ابھی کہتی ہیں - اسکی چھال مصفی خون
ملین - محرک - درجین اور لینی سینک ہے - زیادہ مقدار میں تیر سہل اور مفی ہے - احتباس الطت ماشہ - سرخ باد
سکارلیٹ - ٹانیفاید سکرانیولا - و فحیر یا گنگرین وغیرہ امراض میں بوجہ مقوی اور اینٹی سینک ہونے کو مفید پڑتی ہے
خارجام ہر قسم کے خمر میں مفید ہے خمر فلوئڈ گٹرکٹ ۵ سے ۱۵ بوند تک بیٹی سین لے ۵ گرین تک -

بیٹال Betol - سیلی سیٹ آف بیٹانیف تھا ل تیر خمر ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک -
بیٹانیف تھا ل Beta Naphthal - خمر ۳ گرین سے ۵ گرین تک
بیٹانیف تھا ل سلفائیڈ Beta Naphthal Sulphide - خمر ۲ گرین سے ۵ گرین تک
بیٹانیف تھا ل گمیفیر Beta Naphthal Camphor - اسکا خراجی استعمال کیا جاتا ہے قوی اینٹی سینک
وٹس انفیکٹ ہے

بیٹانیف تھا ل - یہ ایک بضر - قوی اینٹی سینک - جرمی ساڈ اور ڈی اوڈورنٹ ہے بعض امراض معدہ و امعا مثلاً
گیشرک ڈال ٹیشن - نفخ سینک اسہال - پرانی پچپس - ٹانیفاید شیور کو لڈا یا ریا وغیرہ میں مفید ہے ویسوی
میں ہوزن بستہ سی سلاس - اور گینیشیا کو ساتھ مار دیتے ہیں بطور اینٹی لین پرانی سوزش ناک - گلو زغرہ -
برا کائی اور شش میں فایدہ کرتا ہے - اسکا اندرونی استعمال و فحیر یا سکارلیٹ - طیر یا اور ماشہ میں بھی مفید ثابت ہوا
مانڈا - ۱ سے ۳ گرین فی اونس کی طاقت کا مہرہ استعمال کرنا خاش - داود دیتی رنگ ورم - اگر یا - بیدو دار خمر -
برومی ڈو کس - بفل گندولیس - سائٹ ٹینکرمورای - سین - ٹیٹا فادوسا - پیڈی کوس (جون پڑاٹا)
وغیرہ امراض جلدی میں مفید ہے -
اورم اور سوزش کی حالت میں اسکو زنگ یا لڈ کے ساتھ لکڑی استعمال کر سکتے ہیں -

بیٹاں وجہ مفصل۔ ورم مثانہ۔ سوزش معامیں خاصہ مفید ہے۔ ایک حصہ بیٹاں چار حصہ کوکابٹر میں ملا کر بطور بوجی یا سلائی استعمال کرنا سوزش میں نہایت مفید ثابت ہوا ہے۔

بیٹا و لکیرس Beta Vulgaris } گارڈن بیٹ۔ کامن بیٹ چقدر۔ اسکی بڑ میں سر
بیٹس کامن Beets Common } ایک جو بیٹن نام حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی پر انکی تاثیرات مخصوص
بیٹس گارڈن Beet's Garden } بیٹن ایک نہایت عمدہ سہل اور مدد دہیض ہے۔

خبر بیٹن ۲ سے ۴ گرین تک۔

چقدر کا خوب گاڑا جو شانہ بنا کر ایک قرح بھر کر پی لینا عمدہ سہل ہے۔ اسکے اسہال میں کوئی تیج و خراش نہیں ہوتی اور بعد میں قبض بھی نہیں ہوتا۔

بیٹل نٹ Beetle Nut سپاری ایریکا کا بیان دیکھو۔

تیج کا سنی۔ اصل الہند۔ بادر بول مصفی خون۔ مطہ۔ دافع بخارات کہنہ و ورم و اوجاع مفصل و تھقیق و سپر و تیج اطراف و نفخ مسکن جدت صفرا و خون خمر ایکڑ رام سے ۲ ڈرام تک جوش اندہ بنا کر۔

تیج مر جان۔ بڈ مفرح۔ قابض نطفہ خفقان۔ ورم سپر و صرع و اسہال دموی و بولواسیر و قروح امعاء و نفث الیم و ذرو سنطار یا خمر ۱ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

بہ خوالی۔ سہر۔ دیکھو بیان انسا میں لگا۔

بید مشک۔ مفرح و مقوی دل و دماغ و باہر مسکن عطش و نافع در دوسرے خمر عرق بید مشک نصف انس و بید سٹرا Bed Straw سچ و ڈوگز اس گیلیم ایسے رین۔ مصلح سہل مفرح اور مدد دہی ہستقا حبس البول

امراض جلد و سکوی سورسے لیسر اگر یا میں نافع خمر صفوف بید سٹرا ایک ڈرام سے ۲ ڈرام تک۔ فلوڈ اکٹر ایک ڈرام سے ۲ ڈرام تک۔

بیرانما Barosma بکو کا بیان دیکھو۔

بیربیری Bearberry بوی اسی۔ آرکٹاسٹا فالا لاس بوی اسی کا بیان دیکھو۔ بیرن کنس Barrenness عقم یا بچہ ہونا۔ اولاد نہ ہونا یا بیٹریٹی کا بیان دیکھو۔

بیری بیری۔ اس مرض میں جسم کے جو فوں۔ نرم ساختوں اور اعضا میں پانی پڑ جاتا ہے خون رقیق اور پھیکا پڑ جاتا اور عضلات وغیرہ پھیکا نرم اور ڈھیلے ہو کر فاسد ہو جاتے ہیں گردہ بھی بڑے ہو کر پھیکے اور

نرم ہو جاتی ہیں اس طرح سے انیما بہت جلدی ترقی کرتا اور مرض بہت جلد لاغر و ضعیف ہوتا جاتا ہے۔ تمام جسم بھاری کمزور۔ دردناک و سخت رہتا ہے۔ رفاقت اور دلگاہی جاتی ہے دل کے مقام پر پوجہ رہتا اور

انکی حرکات بقاعدہ اور کمزور ہو جاتی ہیں۔ اکثر و بیشتر کالکا رہتا ہے نبض تیز کمزور اور بقاعدہ رہتی ہے جلد خشک کرخت اور گرم بہتی پیشاب گاڑا تھوڑی مقدار میں آتا اگر البیض و صاف ہوتا ہے جسم کا استقامت ہونا اور جلد

نیچے خون جا بجا خارج ہو کر سرخ نشان ہو جاتے ہیں کبھی انسٹرٹھن خون خلیج ہو کر بازو ساتھ خارج ہوتا ہے چہرہ پھولا ہوا اور داس اور گھبراہٹ ہوتا ہے۔ غنودگی ضعف اور سستی ہر وقت غالب ہوتی ہیں۔ اشتہا ندارد وغیرہ حالت تھ اور قبض دائمیگراضعف یا غشی یا ایما لازم یا تھربوسس سو مرض ہلاک ہو جاتا ہے خفیف اور مزمنہ حالت میں کبھی صحت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ مرض جزائر لکنا و میا پان میں ہوتا ہے۔ اسکی وجوہات حسب ذیل ہیں۔ بیان لکینی ہیں۔ (۱) گرم ملک (۲) آب ہوا کی خرابی (۳) طوبہ میں (۴) ہوا کی حرارت اور رطوبت میں تغیرات جلد جلد ہونا (۵) جسمانی تھکان اور ضعف (۶) عمدہ غذا کا عسر (۷) آمادہ (۸) میلیریا کی کثرت (۹) امراض مزمنہ۔

علاج۔ اصلاح غذا و عادات کریں۔ سوء القنیہ کے لئے مدرات و محرقات کا استعمال کرائیں۔ ضعف کلمقابلہ مقویات و محرکات سو کریں۔ خاص اوویہ جو اس میں مفید بیان کی گئی ہیں حسب ذیل ہیں۔
مرکبات فولاد و رنٹینائن۔ اگر کوئین۔ بیلادونا اور کچلہ۔ ورد کے لئے افیون اور دیگر عوارضات کا علاج عام اصول کے مطابق کریں۔

بیریم کلورائیڈ Barium Chloride خراہ گرین سے مگرین تک۔ اسکی تاثیرات بعضی طور پر معلوم نہیں ہوتی۔ پہلو اسکو امراض اعصابی و خضار میں استعمال کرتے تھے۔ اعصاب پر اثر ہو کر اس سے اسہال اور رار اور تشنجی حرکات شروع ہو جاتی ہیں۔

بیسٹر ڈالی کووانا Bastard Ipecacuanha ایسکی پس کر اساوکیا۔ بلند فلورڈ اپی کووانا کی طرح تھے اور ہوا۔ اس میں سے ایسکی پین نام ایک جو ہر گھٹنا ہو۔ جو اپنی تاثیرات میں ای بیٹن کے مشابہ ہو۔ فاقہ کرانے کے بعد کھانا قابل کرم امعاء ہے خمر فلورڈ اکثر ایک ڈرام سے ۲ ڈرام تک
بیسٹی ڈوز ڈیزیز Basedose Disease اسکا دوسرا نام اس فحشیاک گاہے ٹہرے گا ٹھکایا دیکھو۔ بیضہ۔ دوسرے کیفیلجیا ہیڈ ایک۔ دیکھو میان صداع کا۔

ایک ایک Back ache درد کر لیے کو کا بیان دیکھو۔

بایکرو Baycuru یہ نباتی اشیاء میں سے ایک نہایت قوی اسٹرنجٹ ہے۔ کیٹے کو اور کالی نوکر بجائے اسکو تمام امراض میں استعمال کر سکتے ہیں۔ لیو کو ریا۔ آبلہ دہن و گلو میں خاص کر مفید ہے خمر بن کر کرنا ہے۔ اگرین تک۔ فلورڈ اکثر ۵ ہونے سے ۲۰ ہونے تک ٹنگچر اسے ۶۰ ہونے تک۔

سیکن۔ غذا کا بیان دیکھو۔

بیلانائٹس Balanitis سوزش جلد خشفہ و غفوت نال کے امراض کا بیان دیکھو۔
بیلز پریلیس Bell's Paralysis فیشل پرے کی سس لقوہ فیشل پرے کی سس کا بیان دیکھو۔
بیل گرنی۔ بل گری۔ بل۔ تازہ بیل خوشگوار مضر اور تھانیں ہوا اسہال و پیش میں مفید خشک حالتیں

چند اہم فیض نہیں رہتا یہ اکثر الٹی بلی کوڈ ایک ڈرام سے ۲ ڈرام تک ۔

بیلی نولیوسٹھائیس Balanoposthitis عضو تناسل کو امراض کا بیان دیکھو۔

سمانی ٹیکس سارسا پر پلا سمانی ٹیکس ٹھیکار۔ **Bamboo Bryer Root** تیمبور اشر روٹ

عشہ امریکہ۔ مصفی خون، معرق اور محک، ہر اول اور دوم درجہ آتشک، سکر ایفولا۔ وجع مفاصل اور مختلف جلدی امراض میں مفید ہے۔ نیم غلو، بٹاکسٹراکٹ، ۳۰ سے ۶۰ پونڈ تک۔ سالڈ آکسٹراکٹ، ہارین سی، اگرین تک۔ سمائی لین ۲ سے ۵ گریں تک۔

بیمبو برائے کرکیاؤں کا
Bamboo Briar compound اس نشیں بہانہ کو دوسرے

بیولو Bubo بدء۔ اولاء۔ بیوب کے عام معنی ہیں کسی غدود کا متورم ہونا مگر اصطلاحی طور پر اس سے مراد کبج ران کے غدود ہوتے ہیں۔

انکی مفصلہ ذیل اقسام ہیں۔
 اول۔ سہل سو بوجہ۔ مفصلہ ذیل جو بات سہل ہو سکتی ہے۔ اعضا کمال کی رگڑ یا رخم یا شقاق یا بھنی بھوٹے مجرئی
 اور خفگی سوزش سی کیسی شخص کثرت جماع یا جلق یا کثرت شہوت سی ہی ہو جاتی ہے الغرض ایک یا زیادہ غدد و سوجن
 دردناک ہو جاتے اور چلنے پھرنے میں تکلیف معلوم ہوتی ہے۔ اکثر تو یہ خود بخود تحلیل ہو جانے میں مگر سخت حالتوں
 میں ایسا ہوتا ہے کہ پیپ پڑ کر پیچھے تھوٹھ کرتی جاتی ہے اور آخر کار بہت سی ناسور بنا کر یا ہر جھوٹ اتنی ہی سطر
 کبھی تو ایک ہی پھوڑا ہوتا ہے اور کبھی زیادہ ہو جانے میں کبھی بہت سی غدد و پھول کر خراب ہو جانے ہیں۔
 یہ خاص کر ایسے اشخاص میں ہوتا ہے جو پہلے سے آتشک یا خنازیر میں مبتلا ہوں۔

یہ حاصل کر لیتے اسخاص میں ہونا ہے جو چھپنے سے اسٹ یا سار پیر میں جھکا ہوا ہو۔
دوہرے سی فک بیو بو ۱۰، سافٹ ٹینکر کی بیو بو یہ فی الحقیقت ایک وسیع ٹینکر ہوتا ہے جو اصل ٹینکر کا مادہ عروق جاذبہ کو راستہ پہنچ جانے سے بربتا ہے اسلئے اسکا تمام مواد سخت متحدی زیر لہ اور نہایت زور سے پھیلنے والا ہوتا ہے کہیں اس قسم کی بیو بو سطح پر بھی بجاتی ہے کہ پھر معمولی بیو بو ہو کر اس میں زخم ہو جائے اور پھر سافٹ ٹینکر کا زہر اس کی سطح پر مریض کی بے احتیاطی سے لگ جاوے۔ عموماً یہ بیو بو ایک طرفہ ہوتی کہیں دو طرفہ بھی ہو جاتی ہے۔ شروع میں درمیان غدد و گرد و دیر درم ہو کر پھوٹا بجاتا ہے۔ پھر جرب اس میں سافٹ ٹینکر کا مادہ اندرونی یا بیرونی طور پر اکتا ہے تو نہایت سرعت کر ساتھ پھیلنا شروع کرتا اور اندر ہی اندر چار طرف ساختوں کو کھاتا جاتا ہے جلد کا غدد کی طرح تلی پڑ جاتی ہے تب کئی جگہ سولہ ہو کر تھپ وریج ماسو ہو جاتی ہیں یہ حالت کہیں ہفتوں کہیں مہینوں کو بھی برسوں رہتی ہے جلد کے کنارے موٹے ہو کر باہر کو پٹے جلتے اور غار میں انگوٹہ بنا شروع ہوتا ہے کہیں اسکا مواد ساختوں کو کھاتا ہوا سائپ کی طرح کے زخم بنا دیتا ہے ٹیکم یا ران یا سیون کی طرف زخم بنا کر نہایت ہی مہیب صورت پیدا کر دیتا ہے اس حال

نے جی دینا کہتے ہیں۔ اس زخم کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کبھی الیگٹرف و اچھا ہوتا اور دوسرے طرف بڑھتا جاتا ہے یہی حالت برسوں رکتی ہے چونکہ ساف ٹینک کی بیوٹل نہایت تیزی اور سرعت کے ساتھ پھیلکتی ہے اسلئے ہنگامہ نامہ اور ونٹ بیوٹل سے جسکے معنے ہیں تیزی سے پھیلنے والی بیوٹل..... اسکی یہی پہچان ہے کہ تیزی سے پھیلکتی جاتی اور رقیق پانی کی طرح کی سیب خارج ہوتی ہے۔ (ب) آئٹک کی بیوٹل ہمیشہ سخت اور بے درد ہوتی ہے۔ درم اور پیپ کی آئٹک کبھی نہیں ہونے پاتے عموماً دو طرفہ درد بڑے گولیوں کی طرح سے جلد کے نیچے معلوم ہوتے ہیں چونکہ ان میں درد تو رہتا ہے اور درد ہوتی ہے اور بادام کے برابر موٹی موکر رہ جاتی ہیں اور بہت سی غدد و گولیوں کی طرح معلوم ہوا کرتے ہیں جو کبھی باہر مل بھی جاتی ہیں اسلئے انکے نام انڈولینٹ بیوٹل اور ٹیٹل بیوٹل بھی ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی اور دوا کے نسبت ان میں درم ہو کر پیپ بھی بڑھایا کرتی ہے۔ اسکی بعد فوجی دنیا کی صورت بھی ہو جاتی ہے۔ مگر عموماً آئٹک کی بیوٹل میں چار ہفتہ کے بعد خود بخود تحلیل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر مریض میں خنازیری مادہ ہو تو یہ ہمیشہ کے واسطے پھولی رہتی ہے۔

علاج اسکے علاج میں سب سے مقدم یہ امر ہے کہ اگر کوئی زخم ناگوار یا عضو تنال پر موجود ہو تو اس کا علاج کیا جائے شروع درم میں جبکہ پیپ نہیں بڑھی تو دیر کا سٹک لوشن (ہم گرین فی اوٹس کا) آؤڈ..... و فینال (دیکھو) ایک حصہ کارباک ایسڈ، صمغ ملاکر سٹریک ایٹھریل سالیٹون آف انڈوین۔ ایوے پریٹنگ لوشن یا گرم پوٹشیم لگانے سے بہت جلد آرام ہو سکتا ہے لیکن اگر پیپ بڑھی ہو تو فوراً شکاف دیکر بعد میں گرم پوٹشیم لگانی رہیں اور اب بعد کے زخم کا معمولی طور علاج کریں خفیف حالتوں میں ٹینچ آؤڈین بار بار بیوٹل لگانا کافی ہے۔ رانی سیاہ باریک پسپ ہوئی ایک حصہ صابون چار پانچ حصہ صمغ ملاکر یا ایک گمل پر پھیلا کر لگانا شروع درم میں نہایت مفید پڑتا ہے نیز دیکھو بیان اولما۔

بیوٹل کلورل ہائیڈراس Butyl-Glchoral Hydras کرڈن کلورل۔

خبرہ گرین وہ اگرین رنگ اسکی تاثیرات اور افعال قریب قریب کلورل ہائیڈریٹ و مشابہ ہیں فرق صرف مقدار ہی کہ یہ کلورل ہائیڈریٹ کی نسبت خواب آور تاثیر نہیں کمزور طبی الاثر اور ناقابل اعتبار ہول پر اس کو کلورل کی نسبت کم منفع ہوتا ہے پس عام بیوٹل کی جگہ اس کلورل ہائیڈریٹ بہتر ہے لیکن اگر قلب کمزور ہو تو بیوٹل کلورل بیوٹل پر انجین بفت عصب ماغی کو عجیب کرتا ہے۔ اسلئے دو چہرہ مختلف مقامات میں نہایت مفید ہے۔ درد و زلاں۔ درد اطراف و عصب و اعصاب میں جی اسکو استعمال کرتے ہیں ہونیک کف میں مخصوص تھا کہ کھانسی ہو بیوٹل کلورل اور بیوٹل کلورل میں اکثر مفید پڑتی ہے۔

باب بائے فائرسی

پاپا Papa انکے دوسرے نام انابہندی میلن ٹری پاپا لائل اور کیرکایا پاپا ہیں۔ اسکے کچے پھلوں کا

پاپا این Papain عرق نہایت عمدہ مقوی لاشعرا و دافع سراج سے سپین تر زیادہ وسیع
پاپا یوٹین Papayotin الاثر اور اس کے برخلاف ترشی کھار اور اس کے اثر میں بڑا اثر کرتا ہے۔
اسوجے سے عمدہ اور ماحیات اسکا اثر برابر قلم بہت سیدھا پیل سے پکڑے میں کی موجودگی میں اس کے فعل بواور قوت
ہوتی ہے۔ روغنی اشیاء کو ساتھ لاکر انکے تحلیل کو آسان کر دیتا ہے اس کے بیج خراج ریا ح اور مدحیف و مخرج
شیر میں۔ درد گردہ سو بھنی تخمہ۔ فنج عمدہ۔ اسہال مزمنہ سرطان عمدہ۔ ضحف جگر اسہال اطفال میں نہایت
مفید ثابت ہوا ہے۔ بخامی استعمال میں محلل اور ام بلطف اور اینٹی سپٹک ہے۔ اور مفصلہ ذیل امراض میں مفید۔

(۱) دفعہ پیریا کروپ۔ ورم کھو۔ انڈا جڈ ٹالسٹیز میں ۵ سے ۲۰ فیصدی کا حل گلیسرین میں۔

(۲) جلدی امراض مثلاً اگزیا۔ سورائے سس۔ انٹن۔ مسختی جلد وغیرہ میں۔

(۳) حریان الاذن (اوریٹا) میں اسکا پانچ فیصدی کا حل ورم اور اخراج پر کچے بہت جلدی آرام دیتا ہے۔
(۵) خارجہ غدد اور چھوٹی رسولیوں کو تحلیل کر دیتا ہے۔

خرپا این یا پاپا یوٹین ایک گرین سے گرین تک عرق پاپا ۲۰ پوند سے ۶۰ پوند تک۔
پاپا ایرا Pao-Pereire اسکی چھال میں سے ایک الیکٹرانڈ پیرازین نام نکلتا ہے جو اپنی تاثیرات
میں کوئین کو مشابہ ہے۔ پیرازین کا بیان دیکھو۔

پائس کروکیمبر Pott's Curvature سہائل کیریز۔ اس مرض کی حقیقت یہ ہے
کہ پشت کو مہرہ اور اوکھی درمیانی مری میں ورم ہو کر انگور پیدا ہو جاتا ہے جو اصلی ساختہ کو کھاتا جاتا اور
پشت میں خم پڑتا جاتا ہے یہ زائد انگور کبھی تو جذب ہو جاتا ہے اور کبھی اس میں چونہ پڑ کر یا بڈی بن کر مہرہ باہم جڑ
جاتے ہیں۔ یہ ایک صورت صحت یابی کی ہے کبھی یہ انگور گلتا شروع ہو کر پ پڑ جاتی اور بڑا پھوڑا بن جاتا ہے۔
جو گردن یا پشت میں کھلتا یا اساتوں کو کھاتا ہوا ران یا ٹانگ میں کھلتا یا نہی بڈیوں کو کھچے علیحدہ ہو کر ناسو
کے راستہ خارج ہوتے ہیں۔

مفروض علامات اس مرض کی یہ ہیں کہ مقام عدم پردہ ہوتا۔ مریض اپنی کمر کو سیدھا کرتے ہوئے رکھتا ہے۔ خفیف
حکوت اور پیچ میں سخت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ورم زیادہ ہو کر باہر سے بھی معلوم اور محسوس ہو سکتا ہے۔ مریض میں
کو اوٹھلے رکھتا اور نہایت احتیاط کے ساتھ اٹھ کر چلتا ہے بعد میں انگور پیدا ہو جاتا ہے اور وقت اپنی سہارا
سے کھڑا ہونا محال ہو جاتا ہے بلکہ دیوار یا میز یا کرسی کے سہارے کھڑا ہوتا اور لکڑی کے سہارے سے قدم اٹھاتا ہے
یا جھک کر گھٹنوں پر یا تھک جا کر چلتا ہے۔ اگر چونہ یا بڈی پڑ کر انگور مضبوط ہو جاوے تو سوجھ بھینے کے واسطے کٹا ہو جاتا ہے
یہ مرض خاندیری مزاج کے بچوں کو ہوتا ہے جو ان عمر میں بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے عموماً اسکی ابتدا جوٹ لگنے سے
ہوتی ہے۔ زیادہ تر بچے کے واسطے اس میں مہرہ اور ناسو و بطن اطفال کو مریض ہوتا ہے خاص شخاع بدو یا و پڑی
یا سپائی فل منجائی ٹس ہو جاتے سے مختلف عصبانی تکلیف بھی ساتھ ہو جاتی ہیں۔

علاج۔ اس مرض کے علاج میں سب سے مقدم اصول یہ ہے کہ ماؤف حصہ نخل کو کھلی یا آرام دیا جاوے تاکہ حرکت اور رگڑ کو جو ہیورم زیادہ نہیں ہونے پائے اور فقرات ماؤف کا استخوانی اتصال کامل طور پر ہو جاوے۔ اس اصول کی عمل کے لئے مفصل ذیل تدابیر ہیں۔

اول شروع مرض میں جبکہ مقامی درد اور ضعف قتا۔ وغیرہ علامات سے زوال نخل تشخیص ہو تو فوراً مریض کو سخت بستر پر چت لٹاویں اور ہر قسم کی حرکت سے منع کر دیں مقامی درد کا علاج لٹنٹ آئیوڈین لٹنٹ کلورافارم۔ سٹیپزم بیلادونا پلاسٹریک وغیرہ سے کیے رہیں پچھلے اٹھانے والے دینے اور سین لگانے سے احتراز لازم ہو کہ انسی زخم ہو کر زیادہ نقصان کا احتمال ہے۔

دو۔ ہاٹسٹریکٹ جبکہ علامات مادی رفیع ہو کر علامات مزمنہ شروع ہو جاویں اور فقرات کا کچھ حصہ زایل ہو جاوے اس وقت مصنوعی طور پر بالائی حصہ نخل کو سہارا دینا ضروری ہو جاتا ہے ایسی حالت میں مقام اور حالت کیمریز کے مطابق پیرس پلاسٹریک لگانے کی تجویز کرنی چاہیے اس کے سہارے پر مریض چل پھر سکتا ہے اور اس کی عام صحت قائم رہ سکتی ہے اس کے لگانے سے پیشتر مریض کو کمر بزر..... لپے لے لٹس پر لٹکا کر مقام معده اور استخوانی او بجا رول پر صاف روئی یا فلایلین کی گدیاں سٹکن سے قائم کر لینی چاہئیں معده کے مقام پر روئی لکھنے کا یہ مطلب ہے کہ پلاسٹریک ہونے کے بعد اس کو کمال یوترو ہیں تب اسے جگہ جگہ رہ جاتا ہے اور معده پر کھلنے یا پینے کے بعد دباؤ ہونے نہیں پاتا۔

سوی۔ ہر بور و پلاسٹریک فیٹ جاکٹ اس میں یہ خوبی ہے کہ گٹا پرچہ کی طرح اس کو بار بار بٹسانی اور اتار سکتا اور پھر لٹکے ہیں لیکن اس کی فیکٹی اور سختی پیرس پلاسٹریک برابر نہیں ہوتی۔ پس یہ اسی حالت میں مفید ہے جبکہ ایک دو مہینہ پیرس پلاسٹریک لگائے کے بعد ہڈیوں میں اتصال ہو گیا ہو۔ نیز لاغراور ہلکے رگوں میں بھی یہ مفید ہو سکتا ہے۔

دوسرا اصول اس مرض کے علاج میں یہ ہے کہ مریض کی عام طاقت کو متھوی غذاؤں۔ عمدہ آب و ہوا وغیرہ ہائی۔ ہائیو فاسفائٹس اور مرکبات فولاد وغیرہ سے ترقی دیا جاوے مناسب گاڑی یا پاکی میں لٹا کر مریض کو کھلی ہوا میں سیر کرانا چاہیے۔

تیسرا اصول یہ ہے کہ اگر اس مرض کا کوئی خاص سبب مثل آتش و سکرافیل معلوم ہو گا کھام ہو گا کیونکہ طاق کرنا چاہیے۔

پارانیستھسیا Par Anæsthesia۔ جس کے امراض کا بیان دیکھو۔

پارالڈیسی صائیڈ Paraldehyde۔ یہ ایک خاص منوم ہے کھول دیا ڈیٹھ کر بظاہر قلب کو کمزور نہیں کرتا پس قلبی بخالی میں مفید ہے۔ اس کی بہت جلد عادت ہو جاتی ہے۔

پارتنیم نیم ہٹرو فیلٹس Parthenium Heterophilus۔ اس کے امراض کا بیان دیکھو۔

پارتنی مین - Parthenine - آج پارتنی نیم سٹروفلکس کے درخت سے حاصل ہوتا ہے۔
نوبتی دردوں اور بخاروں میں مفید ہے۔ خ اگرین سے مرگین تک۔

پارچریشن امیتھیشیا - Parturition Anaesthesia - تسہیل و لاتہ درد کا بیادھجو

پارچریشن اکلیمپسیا - Parturition Eclampsia - حمل اور زچہ کی امراض کا بیان دیکھو

پارسلو کفر - Parsley-Camphor - اپنی بال کا بیان دیکھو۔
خفیف فالج - بریلی سس کا بیان دیکھو۔ Palsy

پالیس - Polypus - یعنی وہ رسولیاں جنکی جڑ لمبی اور تیلی

پالیس ریٹائی - Polypus Recti - ہوتی ہے۔ انکا علاج صرف ایقہ ہو گا اگر

پالیس نسی - Polypus Nasi - جراحی فریج کے اندر ہوں تو انکو وسکاری

پالیس یوٹرائی - Polypus Uteri - کر کے نکال دیا جاوے یعنی اگر انکی جڑ تک

فارسیس پنچ کے تو نارشن ٹارپس سے پکڑ کر اوس کو خوب بل دیں۔
بعد از ان چاقو یا پیچھے سے کاٹ کر یا تیراب یا کاٹری سے جلا کر پالیس کو نکال لیں۔

ناک کی پولی پالی میں بھی اصول علاج ہے۔ اگر سامنے کی طرف سے انگشت یا مچھنی یا تار جڑ تک پنچ کے تو اسی طرف

نکلنے کی کوشش کریں ورنہ فیکس کی طرف سے اگر رسولیاں سترہ رٹی ہوں کہ ناک کو اندر سے دخل سکین تو ایسی

حالت میں یہ مناسب ہو کہ بالائی لب کو وسطی خط سے ایک جانب قطع کر کے سپٹم تیرائی کے ساتھ ساتھ شگاف لہجائیں۔ اور

بزرگ و ناف پھنکی کو جھپکا کر خارج رسولی کی کوشش کریں۔ اگر اب بھی کشا دی کافی نہ ہو تو ناک کی ٹہیوں کو بھی ایک طرف سے علیحدہ

کر کے سوراخ کو اور زیادہ وسیع کر لیں۔ اب ایک انگشت گلو میں سے اور ایک سامنی طرف سے داخل کر کے تمام متقف۔ نوک

اور دیوار ناک کو کامل طور پر مٹولیں۔ اور جس جس جگہ رسولی کی جڑ معلوم ہو اسکو ناخن سے کھر کھر علیحدہ کریں۔ سب آسا اور مفید طریق

کوئی بھی علاج ناک کی رسولیوں میں قابل اطمینان ثابت نہیں ہوا۔ چھوٹی چھوٹی اجڑائی پالی میں کہ روک ایڈیا نامٹرک ایڈ

آزما سکتے ہیں۔ ٹینک ایڈ پھنکی سیلی سلک ایڈ کا بطور سوا۔ استعمال کرنا مفید بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ہماری سائے میں ان

ادویہ کی اس سے زیادہ وقت نہیں ہو کہ انکو جراحی دستکاری کے بعد بطور نائید استعمال کیا جاوے۔
پالیس نکٹائی کا علاج انہیں اصول پر ہے۔

پالیس یوٹرائی کا بھی یہی طرح علاج کیا جاتا ہے۔ فم رحم کشادہ کرنے کے لیے بائزرنگ۔ یا بی ماریائٹ استعمال کر سکتے ہیں۔

اسمیں واسو قابل یا دوخت ہیں۔ اول یہ کہ رحم کی پالی پالی کو ہر گھنٹہ نہ چاہیے۔ کیونکہ پالیس کو کھینچنے سے رحم کی اندرونی

سطح کھینچ کر باہر آتی ہے۔ دوم اگر پالیس کو رسولی کی جڑ لمبی نہ ہو تو رحم کی دیوار کو کٹ جلانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پس ایسی رسولیوں

کے قطع کرنے میں نہایت احتیاط چاہیے۔
پالیس سالو - Polysolve - سالوین ایڈ سلفو لینک کا بیان دیکھو۔

گائے ناکا بیان دیکھو۔

Pollinea Sorbilis

پالینیا ساربلیس

پانی یوریا Pyeluria ڈایابی تیز انسپی ٹیس۔ زیادہ سطر بے شکر کثرت بول سلسل البول۔ زیادہ ٹیس کا بیان دیکھو۔

Pyæmia

پانی ایما

اسکے علاج میں تدابیر حفظ ماقدم سے جو کچھ کامیابی حاصل ہو سکتی ہو وہ ہرگز ہرگز مرض کو زور پکڑنے کے بعد کسی علاج سے حاصل نہیں ہو سکتی پس جب پانی ایما کی علامات شروع ہوں تو فوراً اسکا سبب معلوم کریں اور اسکی مطابق علاج شروع کریں یعنی اگر کوئی خراب زخم ہوئے تو اسے نکالیں اور اگر کسی غیر موجودہ قوی ایمنی سپیک لوشن ہو زخم کو دہوین اور اگر گہری جگہ میں پپ ہو تو کافی کثافت دیکر ڈریج ٹیوب داخل کریں تاکہ تمام کال طور پر خارج ہوتے ہیں۔ اور اس ڈریج ٹیوب کو رستہ تمام نکال کر خوب اندر سے ایمنی سپیک لوشنوں کو ساتھ دیتے رہیں اگر تمام ورم سے اوپر خود بخود اسی طرح ہو جائیں تو انکو نکال دیں اگر فلیس ٹیس ہو گیا ہو تو اس دریدہ کو دو رنگ ٹیکٹ کر کے قطع کر دیں تاکہ زہریلہ مادہ کا اوپر جانا بند ہو جاوے۔

خدا میں قیق باقراط دیتے رہیں ایسی حالت میں شراب و ردودہ ملا کر کثرت پینا نہایت مفید ہے مرض کو نہایت تسخیر اور بہادری مکان میں رکھیں کسی قسم کا جو ماسور و شورش لگے کرے میں نہ ہوئے ذہن۔ ایمنی سپیک لوشن یا اجزات کے نام مکان اور کپڑے کو برابر ایمنی سپیک لوشن مفید ہو سکتا ہے۔ ادویات میں کوئین مرکبات فولاد کلورائیڈ آف پوٹاش سب سے زیادہ قابل اعتبار ہیں انکو زیادہ مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔

مرج سیاہ لفظل گردہ مرج سیاہ کا بیان دیکھو۔

Piper Nigrum

پانی پرنالی گرم

Pyrodine ایسی ٹل فینیل ہائڈرے زین۔ یہ ایک نہایت قوی دافع بخار اور مسکن درد دوا ہے ایمنی پائیرین۔ ایمنی فیرین اور فینٹین کی نسبت زیادہ مرجع الاثر ہے لیکن جسم میں ہونے پر جلدی

فاسد ہوجاتی اور زہریلی علامات پیدا کرتی ہے اسلئے اسکا استعمال نہایت احتیاط سے خاص خاص نازک حالتوں میں ہی کرنا مناسب ہوگی بل کو بخار و لیسین میں خاص کر مفید ہے ایک دفعہ کھلائی کو بعد پانچ بجے روز تک برابر اسکا اثر نہا ہے۔

خراگین سے ہاگین تک۔

پانی روکسی لین Pyroxylene گن کاش۔ یہ روئی کلورین کے بنا نہیں استعمال کی جاتی ہے

Pyrogalol

پائیروگال

{ ایسڈ پانی روگال کا بیان دیکھو۔
Pyrogalllic Acid پائیروگالک ایسڈ

پانی رولا Pyrolla اسکے دوسرے نام پرنس پائین پی اسپورا۔ ایسی لیڈ و نٹر گرین ہیں۔ کھلائی کا۔

پانی ریتھری رائڈکس Pyrethre Radix بیلی ٹری روٹ۔ منجمد رکھنے سے مرجع کی تیز

معلوم ہوا کہ عموماً بہت خارج ہوتا ہے اسلئے خشک جھوٹی اسکو ملائے ہیں۔ تاکہ انکی کڑھکی کم معلوم ہو۔

پانی ریوین Pyridine یہ ایک لطیف عرق مرض ورم میں نہایت مفید ثابت ہوا ہے۔ ہاضمہ

ہر قطرہ تک ایک پیٹ ہر ڈاکٹر کسی جھوٹے کمرے میں رکھیں اور مریض ان ورم کو میں میں اس کمرے میں تین دفعہ روزانہ

بجائیں۔ اسکے انحراف خود بخود اڈرناک میں پہنچو اور شدت دکھائی وغیرہ کو معادور کر دیتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے آٹھ دس روز میں کلی آرام ہو سکتا ہے۔ آیوڈین اور پوٹاسیم آیوڈائیڈ جو دمہ کا اصل اور یقینی علاج ہیں انکے استعمال کے بعد جب آیوڈزم کی علامات شروع ہو جائیں تو پائیریڈین کا استعمال کرنا چاہیے۔

پائیرنس فود Poisonous food یعنی زہریلی غذائیں۔ غذا کا بیان دیکھو
پائی لائٹس Pyelitis گردہ کے امراض کا بیان دیکھو۔

پالینز Piles بواسیر موٹے میمبرٹڈز۔ اسکی حقیقت یہ ہے کہ دہری کی اندرونی سطح یا کناروں کی رگیں پھول کر ادبھر جاتی ہیں۔ جسے لمبی کبھی خون بھی خارج ہوتا رہتا ہے مگر خون کا آنا لازمی علامت نہیں ہے پھولی ہوئی رگوں کے اندر خون کی نہیں جھجائی ساتھ ہی وریدوں کی دیواریں اور انریورٹو بھی بڑھ کر موٹے ہو جاتے ہیں۔ اگر پرانے سوکھ کر چیر کر دکھیا جاوے تو اندر سے اسفنج کے مشابہ مسام دار ساخت نظر آتی ہے جس میں سے خون کچھرتا رہتا ہے۔ لحاظ جگہ کے بواسیر تین قسم کی ہوتی ہے۔ اندرونی بیرونی اور درمیانی۔ اندرونی موٹکوں سے خون جاری ہوتا رہتا ہے مگر یہ دردناک نہیں ہوتے بعض گول بعض لمبے بعض چپے اور بعض او بھرے ہوئے ہوتے ہیں بعضوں کی جڑ پھیلی ہوئی اور بعض کی تنگ گردن کی طرح ہوتی ہے۔ انکی سطح پر میوٹس جلی اور اندر پھولی ہوئی ورید ہوتی یا بہت سی رگوں کا جال ہوتا ہے۔ جقدر او بھار زیادہ ہو اسقدر خون زیادہ جاری ہوتا ہے بیرونی ہمیشہ اندرونی موٹکوں کے بعد ہوتے ہیں۔ ان سے خون خارج نہیں ہوتا مگر در دلت ہوا کرتا ہے۔

درمیانی موٹکے دردناک بھی ہوتے ہیں۔ اور اون کی اندرونی سطح سے خون ہی خارج ہوتا رہتا ہے۔

اسباب ۱، اسباب بعیدہ۔ دیر کے گرد بہت سی تھوٹھی جگہ جہیں باریک وریدوں کا جال ہو جو کچھ تو انفریمینٹس وریدیں اور کچھ انٹرئل ایک ورید میں ملتا ہے جہاں وریدوں کو دوران خون میں کمی سے رکاوٹ ہو جاوے تو تھوٹھ کی وجہ سے دہری وریدیں پھولنی شروع ہو جاتی ہیں۔ سست عادات۔ زیادہ پیسے رہنا جوان عمر شراب اور مصالکے جات کی کثرت بھی اسباب بعیدہ ہیں سے ہیں۔

(۲) اسباب قریبہ اول مقامی خراش مثلاً چلو نہ یا زخم یا ناسور کی وجہ سے دو مرتبہ مسلات مثل صبر لونڈ چینی اور دیگر گرم چیزوں کا استعمال سیو مپوئل وریدوں پر امراض گجگوار سولیوں کی وجہ سے دباؤ رہنا چھلکام دایمی قبض۔ علامات۔ بیرونی موٹکوں میں درد شدت ہوتا ہے جہیں اور کبھی بھی اکثر تہی ہو یا صکر روائی حاجت کو کھد رنگ عموماً جلد کے مشابہ یا خیف نیلک پر رہتی ہے۔ اندرونی موٹکوں میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قعد کے اندر کوئی غیر شے موجود ہے جن چین اور کبھی اکثر ہے جو متفرغ کے بعد زیادہ ہو جاتی ہے۔ رفع حاجت کو وقت سخت درد معوم ہوتا ہے جبکہ وجہ سے مرض عموماً پاتھانہ بند رکھتا چاہتا ہے۔ مگر جقدر دیر پا جس ہوتا ہے اسقدر پاتھانہ سخت ہو کر اور زیاں تکلیف دہ ہو جاتا ہے جو موٹکوں کو اور بڑا بنا دیتے جو مکی پیدا کر دیتا ہے اس طرح بواسیر کو جس سے اکثر قبض ہوتا ہے اور قبض سے بواسیر بڑھتی ہے گو یا کہ قبض باعث بواسیر ہو جاتا ہے اور

یو اسیر باعث قبض خون کبھی قطرات میں پاخانے کے بعد نکلتا ہے۔ اوکھنسی ہارے کے گرد لگا ہوا ہوتا ہے کہ یہی اس کثرت سے خارج ہوتا ہے کہ کشتی ناک کی نوبت پر پہنچ جاتی ہے ہمیشہ کے اخراج خون سے مریض کمزور اور ذہلا ہوتا جاتا ہے۔ رنگ پھیکا اور بے آب پڑ جاتا ہے۔ دھڑکن کی دہر سے نفاق المشرقہ لیا اسیر شعلہ و زخون المشرقہ کی اکثر ہو جاتے ہیں کہ یہی اندرونی موہکی باہر نکلا گھٹناتے اور خون بند ہو کر پہلے متورم ہو جاتے پھر مردار پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔

انجام اول شروع میں علاج مناسب تحلیل ہو کر رفس ہو سکتی ہیں قوم ورم ہو کر انجا و خون ہو جاتا اسکے بعد تحلیل ہو سکتی ہیں یا پیپ پڑ کر چھوٹے بن جاتے ہیں یا چون پڑ کر نکلیاں بن جاتی ہیں سسوام پیپ پڑ کر اچھا ہو جاتا یا ناسور رہ جاتا ہے چھانام مردار پڑ کر چھ جاتا ہے۔ یہ اسطر سے ہوتا ہے کہ کوئی موہکا باہر نکلا گھٹناتا پھر اسکا دوران بند ہو کر مردار پڑ جاتا ہے۔ تشخیص مفصلہ ذیل امراض سے اسکا اشتباہ ہو سکتا ہے (۱) خروج المشرقہ (۲) مفعد کے پالی پس (۳) اپنی تھیلیو (۴) کنڈی لوبا۔

علامات تشخیصی خبیل میں۔

خروج المشرقہ۔ ملاحظہ کرنے اور ٹٹولنے سے کوئی اوجھا محسوس نہیں ہو سکتا۔ پالی پس۔ یہ ایک قسم کی رسولی ہے جسکی چڑھ علیحدہ ہوتی اور یہ عموماً ایک ہوتی ہے۔ اس سے جریان خون کم ہوتا ہے اپنی تھیلیو ماسخت ہوتا اور ارد گرد کی ساختوں کو بھی سخت کرتا جاتا اور سرعت کو ساتھ بڑھتا ہے۔ کنڈی لوبا نرم اور چھپے ہوتے اور ساتھ ہی دوسرے مقامات یعنی فوطوں سیون۔ اندام اور چوڑوں پر بھی ہوتے ہیں۔ یو اسیر کا خون تازہ صاف غیر منجمد ہوتا ہے۔ پاخانہ کو بار لگا ہوا ہوتا یا قطرات میں بعد از انتقال نکلتا ہے مگر جو خون انشروں کے بالائی حصہ سے خارج ہو وہ تازہ از صاف نہیں ہوتا بلکہ جاہو اور سیاہ ہو جاتا ہے یا یوراز کے ساتھ گند ہوا ہوتا ہے..... یا اس کے جسے ہو چھوٹے بڑے ٹکڑے خارج ہوتے ہیں۔

علاج۔ اسکے علاج کو ہم تین حصوں پر منقسم کر سکتے ہیں۔

اول تدابیر حفظ ما تقدم۔ شروع مرض میں جبکہ مریض کو شکایت خف جريان خون کی ہو اسوقت علاج کی کوشش کرنا نہایت مفید ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے مریض کی عادات اشت و بر خاست کی اصلاح کریں زیادہ میٹھے رہنا یا ایک جگہ بار بار کھڑے رہنا ہر دو صورتیں یو اسیر کے لئے مضر ہیں۔ کھلی ہوا میں کافی گیرگشت اور ورزش کرائیں۔

دوم اصلاح غذا۔ شراب اور زیادتی تیز مصالحہ۔ پھار و چینی سے پرہیز کرنا چاہئے۔ دودھ گھی روغن مہی روغن زیتون وغیرہ بے خواہش اور قبض کشا غذائیں با فراطیتے نہیں۔ پاؤں اور ٹانگوں کو گرم رکھیں اگر قبض رہتا ہو تو اسکا علاج مناسب تدابیر سے کرتے ہیں رد کچھ قبض کا بیان بہ کنفیکشن آف بلیکے پیر کا

از مستقیم کی وید وں پر سنی موٹ اور ٹانگ ہو کر زواید بواسیری کو فائدہ بخشتا ہو۔ آٹھ دس دنوں میں خنڈ کی پانی کی مقعد میں بچکا۔ یہ کرنا نہایت مفید ہو سہ جگری کی حالت میں عینات کا گاہے گاہے استعمال کرنا ضروری ہے اگر پانچا نہ کو ساتھ ہو کہ یا بھولی ہو لیکن باہر خارج ہو جائیں تو انکو ہمیشہ اگلی کے ساتھ اندر کر دینا چاہیے۔ ورنہ انٹرل سفکٹ کے دباؤ سے انہیں سخت نرم فلیمائی ٹس۔ تھراپوسٹ گنگرین وغیرہ امراض ہو سکتی ہیں۔

سیاہ مچ کو پائیوا سنا کی گندہک کیسٹر ایل گلیسٹر۔ تارپین ہیمامیلس ارگٹ۔ کباب چینی ملٹھی خضیا نذہ
بیٹ روٹ ہٹوں ٹاکس کو ڈڈرن۔ اینٹی سپین۔ ایکیو ہوکاسٹ سرخ مچ کیسے راسیکر ڈاکالمن سونیا۔
گلیسٹر ہولاسینا۔ ہانڈسٹس ہانڈر کو ٹائل سینولین۔ جے بھل۔ انہ منتھال کچلہ فائی ٹولیکا۔ السی۔ اتار
راسمین برمنس فرنگولائٹلیجا۔ ونولیا۔ یربا سنا۔ کرم آف ٹارٹار وغیرہ برونی اور اندرونی استعمال میں
جبال کو جاتے ہیں لیکن مولف کا اندرونی علاج پر چنداں اعتبار نہیں تفصیل کیلئے ان ادویہ کا بیان دیکھو۔

سوام۔ مقامی علاج مختلف ادویہ بطور پککاری یا سپازمیری دیتی یا سرمہ استعمال کجاتی ہیں۔ انکی مختصر تفصیل

(الف) چمکایان (الف) چار پانچ چھٹا تک ٹھنڈے پانی کی روزانہ دو دفعہ چکاری کرنا۔ میوے مہربن کو ضعف کو دور کرنا عروق کو کثیر تار تقویت دینا قبض اور مروڑ کو رفع خون کو بند اور خارش کو دور کرنا اور آخر کار کلی آرام بخشا ہے۔

(ب) میزی لین نصف اونس خالص یا ہونٹن پانی میں ملا کر۔

(ب) سبزی لین نصف اونس خالص یا ہونک پانی میں ملا کر۔
(ج) ٹینک ایسڈ ۲ گرین سلفیٹ آف آئرن ۱۰ اگرین ٹینکچر سیٹل ایڈیٹام ۲ ٹینکچر جیالین ۴ ڈرام ہچکری ۴۰ گری
ٹینکچر باڈر اسٹس ۴ ڈرام انہیں سو کوئی ایک شے تین اونس پانی میں ملا کر مقعد کے اندر پہنچانا۔ استعمال
(د) سچاڑی ٹری جینی تہی بنا کر مقعد کے اندر رکھنا مفصلہ بالا دو میں سے کسی ایک کو آہل تھپو برو ماس ملا کر بطور تہی

کر سکتے ہیں۔ کرائی سی زمین ایک گرین - آؤڈو فارم ہے۔ گرین - اسٹرکٹ بلاڈونا ہے گرین - اٹل ٹھیو بوروما۔
گرین گلیسرین جب ضرورت ان سب کو ملا کر ایک نئی بنائیں اور معدن میں سکھیں۔ بیان کیا گیا کہ اس سی اندر
مو کو کی تین چار روز میں کلی آرام ہو جاتا ہے تمام درد اور خون مند اور سوکھا خشک ہو کر گرہ پڑے ہیں۔

دوسرے مرحلے آف آپریشن (۳) گرین فی انٹرکال (ڈائلیوٹیشن) اینٹ (دو تین حصہ) ویسلین ایک حصہ، لڈائٹ کال ٹائیڈ اوپیم اینٹ، بیرونی موٹوں کو وسطیٰ مفصلہ ذیل مرحلہ نہایت مفید بیان کیا گیا ہے۔

کرائی سے روپے ۱۲ اگرین۔ ابو ڈو فارم ۲۲ اگرین۔ کسٹراکٹ بلا ڈوفا ۹ اگرین۔ ویسلین ۲۲ گرام۔

پہلے کو نکو کار بالک، لوشن سے خوب دھوا کر صاف اور خشک گرین بعد میں یہ سرم لگائیں۔
سفوف مانڈو ایک حصہ ایدکار بالک ایک حصہ الکشر الٹارکٹ ۱۰ حصہ الکشر الٹ کسٹرونیائی ۲۵ حصہ الکشر
ہیامیلز ایک حصہ آئیل آف ناراضف حصہ پیرا کینیٹ ۲۰ حصہ

(رم) خاص ہو کہوں کے اندر جلدی بچکاری کو ساتھ دو یہ بینہ (الف) دائرہ جوا صاحب غصہ فین

~~_____~~

اس طریق سے دوسو مرصنا پھر استعمال کیا اور ہر ایک میں کامیابی حاصل ہوئی۔ ایڈیٹنگ ایک حصہ ایڈ کار بالکل جسم الکحل ۲ حصہ گلیسرین ۱ حصہ ہر ایک موہو کے اندر علیحدہ علیحدہ پیکاری کرتے سے چند روز میں ہی ہو چکا خشک ہو کر جو جام (دب) ایڈ کار بالکل اور اسٹرکٹ آرٹ لکچر سا وی وزن لیکر اسکے پانچ دس قطرہ بذریعہ پیکاری اندر پینچا تو آٹھ سات روز کے بعد اگر ضرورت ہو دوبارہ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر فین صاحب لکھتے ہیں کہ یہ طریقہ جراحی عملوں کی نسبت بڑے تکلیف اور آئی برابر کامیاب ہے۔

اگر موہو نہیں درم ہو جائے تو اسکا علاج چونک سینک۔ پوٹیس دیلا ڈونا۔ گلیسرین۔ ایونین غیر لکچر وغیرہ تدابیر سے کریں حقتہ سے مستقیم کو صاف کریں اور نیکین سہلات کو ذریعہ براؤ کو نرم رکھیں۔ یہ اگر درد بہت سخت ہو تو اسکا علاج بھی پوٹیس۔ سینک یا برف کو ساتھ کرنا چاہیے۔ درم خوردہ اور درد موہو نہ پھر مخدرات مثل کوکین۔ مارفین۔ ہیلا ڈونا۔ کلورل کلوروفارم۔ اکونائٹ۔ تبا کو یہاں سے باؤسار آؤ ڈوفارم کار بالکل کرے زوت وغیرہ ادویہ سے درمیں کچھ تخفیف نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ درم موہوں کی تناؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پس اسکا علاج یہی ہے کہ چونک لکچر سینک جیسے برف کی پیکاری یا دیوں سے اجتماع خون اور تناؤ پالا کر کو کم کیا جاویں جب درم اور تناؤ کم ہو جائے اسوقت کو نایم کے برابر کوئی دوا سرخ الاثر نہیں ہے۔

درم خوردہ موہوں کو ہرگز باندھنا یا کاٹنا چاہیے۔ اگر موہو درد اور بڑے شروع ہو جائیں تو انہیں برابر لگانی چاہئیں۔ اگر موہو کے اندر خون بکھر رہا ہو تو اسکو نکال دیکر کالڈینا چاہیے۔

سوم جراحی علاج (۱) نائٹرک ایڈ یا سٹرکٹ نائٹرک آف مرکری سے جلا دینا۔ بیرونی موہوں کے لئے یہ عمدہ تدبیر ہے لیکن صحیح جلد کو تیزاؤں کے اثر سے بچانا چاہیے اور موہو کی بھی محض ایک خط میں تیزاب لگا دینا کافی ہے۔ اندرونی موہو نہ پھر بذریعہ کیش سپیکولم تیزاب لگاسکتے ہیں اور بعض اوقات اس کی کامیابی ہی ہوتی ہے (۲) وارخ دینا۔ یہ بھی بیرونی موہوں کے لئے زیادہ مناسب ہے۔

(۳) قینچنی چاقو کے ساتھ قطع کر دینا۔ یہ طریقہ بھی بیرونی موہوں کے لئے قابل عمل ہے کیونکہ اگر اندرونی موہوں کو قطع کر دیا جائے تو اسقدر خون خلیج ہو کہ اسکا بند کرنا محال ہو جاوے۔

(۴) اندرونی موہوں کے لئے مناسب عمل جراحی باندھنا ہے۔ اور پش ہوائیک و زیتیر مرص کو کیش لکچر اور اور پش ہوائین گھنٹہ پیشتر صابون اور پانی کے حقتہ کریں تاکہ مستقیم بالکل صاف ہو جاویں اور آسترے کے ساتھ پیری نیم کے تمام بال بھی صاف کر دیں۔ اور پش کے وقت مرص کو کلوروفارم بہوش کر کے لتھاؤمی کی وضع پر لکچر شروع کریں۔ پہلے پے کو کم یا ہر دو انگلیٹھوں کے ساتھ زور کو خوب فراخ کریں تاکہ تمام موہو باہر نکل آئیں تب ایک موہو کو رنگ فارپن یا ہیراٹیل کلیپ کے ساتھ پکڑ کر اسکی ارد گرد قینچی کے ساتھ میو کس مہرن کو کاٹ کر نالی بنا دیں۔ اور مرص کو کلیپ کے ساتھ

بزرگ تمام کمر باندھیں جس قدر زور کے ساتھ کھینچا باندھا جائیگا اس قدر بعد میں تکلیف کم ہونگی اور موہکا جلدی مرد ہو کر گر پڑے گا۔ اس طرح سے تمام موہکوں کو یکے بعد دیگرے باندھتے جاویں اگر کوئی موہکا چھٹا ہو جو معمولی طور پر بند نہ کئے تو اس کی جڑ میں سے سوئی کے ساتھ آہ پارہاں قبل لکچر لکچا کر درمیان سے قطع کریں۔ ایک دہاگہ سے ایک طرف اور دوسرے سے دوسرے طرف خوب کھینچا باندھ دیں اس طرح باندھنے کی لکچر پھیل نہیں سکتا اگر کوئی بیرونی موہکا موجود ہو تو اس کو قینچی سے قطع کر دیں بعد میں تمام بندھے ہوئے موہکوں کو مری - یا بورک یا کار بالک لوشن وغیرہ سے خوب ہو کر اوڑھنا کر کے مار فیا۔ پس انڈیڑی نصف گرین فی سپانڈیڑی، مفعہ کے اندر رکھ کر انڈی سینگ ورینگ رکھ کر انڈی بٹنچ باندھ دیں تین چار روز تک بعد اور پشش مریض کو کھجور اور پیچ پالتے رہیں تاکہ درد نہ ہونے پاوی اور قبض سے غذا نہایت قلیل اور رقیق دیتے رہیں۔ تین چار روز کے بعد میسر ایل پلاوین تاکہ براہ خارج ہو جائے۔ اور اس کے بعد مناسب ایسیر سے براہ کو رقیق رکھیں تاکہ سختی براہ کی تکلیف نہ ہو اور موہک خام خارج نہ ہو جاویں۔

(۵) دہاگہ مہر صاحب کا اور پشش اسکا مدعا یہ کہ مفعہ کو خوب کشادہ کر کے تمام ماؤف جھلی کو موہکوں سے اوڑھنا دیکھ کر کے اٹھالیں اور بعد ازاں میو کس مبرین کے کنارہ کو کھینچ کر جلد کے ساتھ سی دین اس کے بعد دوبارہ بو اسیر ہوئے نہیں پاتی۔ یہ اور پشش نہایت شکل اور خوفناک ہے۔

(۶) ایلنگھ صاحب کا اور پشش۔ اسکا طریق یہ ہے کہ ایک مضبوط سکر کو کلیپ کے ساتھ موہک کو جڑ سے پکڑ لیں۔ اور خوب زور کے ساتھ پیچ کس کر موہک کو کاٹ دیں تین چار دن تک کو دباؤ سے ہی خون بند ہو جاتا اور بعد میں آرام ہی جلدی ہو جاتا ہے۔

(۷) کلیپ اور کاٹری کے ساتھ اور پشش بعض کی رائے میں یہ طریق باندھنے کی نسبت بھی بہتر ہے معمولی طور پر مفعہ کو پھیلا کر اور فارہس کے ساتھ موہک کو کھینچا اس کی جڑ پر کلیپ لگاتے اور تب پاؤ کے ساتھ قطع کر کے ایکچول یا گیلومونک یا پیکلی نینز کاٹری کے ساتھ جڑ تک اس کو جلا دیتے ہیں۔ بعد ازاں کلیپ کو نکال لیتے اور اگر خون جاری ہو تو دوبارہ کاٹری لگا کر اس کو بند کر دیتے ہیں۔

آن اور پششوں کے بعد مریض کو کم سے کم ایک ہفتہ چار پانی پر آرام سے ٹا رکھیں حرکت سے محروم ہو کر اسیر کا اندیشہ سے اور نیز بڑی اندیشہ ہو کہ موہک ٹوٹ کر خام جھڑ جاویں۔

پالی لوک آبسٹکشن
پالی لوک انجمپی شینس
پالی لوکارین پیچی
پالی لوکارین
پالی لوکارین نائٹراس

Pyloric Obstruction
Pyloric Incompetency
Pilocarpus Pennatifolium
Pilocarpine
Pilocarpine Nitras

دیکھو بیان گیسٹرک انڈی شین کا
جیو رڈی

پانی لوکارین ہائڈروکلوراس Pilocarpine Hydrochloras

اسکے پتوں میں دو جوہر پانی لوکارین اور جیویرین نام ہوتے ہیں۔

جیویرین کے پتہ کرکچیکٹا نیو پراگٹا و جادیں تو بلی سکرکٹ نظر خراب ہو جاتی ہے اور یہ اثر کم گھنٹہ تک رہتا ہے کھلانے سے غشیانہ اثر آدھ گھنٹہ کی علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ بخون و خلیج ہو کر تمام ساختوں اور اعضا میں پہنچتا اور اپنا خاص اثر ظاہر کرنے میں تھوکر اور پسینہ باظراف خارج ہوتے نظر خراب و درد اور ان خون ضعیف ہو جاتا ہے یہ اثر چھ گھنٹہ رکھتا ہے۔ میں سخت ضعف و غنودگی باقی رہ جاتی ہے۔ کثرت تھوکر پسینہ مکررون اور اعصاب کو آخری سروں کو متحرک ہو کر ظاہر ہوتی ہے۔ قریباً چھ سات گھنٹہ کے بعد پسینہ اس کثرت سے آنا شروع ہو جاتا ہے کہ تمام بستر تیز اور وزن جسم کم ہو جاتا ہے تحلیل عضلات زیادہ ہوتی اور یوریا تھوکر اور پسینہ میں خارج ہوتا ہے۔

جیویرین کے پرانے استعمال سے بال زیادہ بڑھتے بلغم زیادہ خارج ہوتا۔ دودھ۔ اشک۔ ریم گوش اور براہی مقدار میں زیادہ ہو جاتے ہیں حیض پر اسکا ظاہر کچھ آخر..... معلوم نہیں ہوتا پیشاب پہلے پہل قدرے زیادہ لیکن کثرت پسینہ بعد کم ہو جاتا ہے تنفس پر راہ راست اسکا کوئی اثر نہیں ہوتا حرکات قلب اور نبض پہلے قوی اور تیز ہوجاتے ہیں لیکن بعد کم ضعیف اور سست عروق کشادہ ہو جاتے۔ بلڈ پریشر پہلے کم پھر زیادہ لیکن آخر کم ہو جاتا ہے اسلئے پہلے چہرہ سرخ حرارت قدرے زیادہ ہو جاتی لیکن پسینہ کے بعد حرارت کم ہو جاتی ہے اور سرخی زردی میں بدل جاتی ہے۔

مفصلہ ذیل امراض میں اسکا استعمال مفید ثابت ہوا ہے۔

(۱) یوریک کوما۔ کنولوشن صداع۔ بھولائی۔ وغیرہ کالیف جو اکثر رائٹس ڈیزیز سکارلیٹ فیور جمل وغیرہ حالتوں میں ظاہر ہو جاتی ہیں انہیں مفید ہے کیونکہ اس سے یوریا اور پانی ہر دو بکثرت خارج ہو جاتے ہیں۔

(۲) وبائی ابجرات۔ دھنیاں۔ اشل چیک۔ میلز سکارلیٹ فیور وغیرہ میں جبکہ دھنیاں اچھی طرح نمودار نہ ہوں یا نمودار ہوئے وقت غائب ہو جادیں جس وجہ سے سخت دماغی کالیف پیدا ہوں ایسی حالتوں میں یہ ابجرات کو فوراً باہر نکال کر جان بچا دیتی ہے۔

(۳) اسیومی نوریا اور استسقا میں جبکہ کالیف مرض گردہ کے سبب ہوں نہایت مفید ہے خاص کر جبکہ تمام بدن وقتاً طوب و سر فر ہو گئے سے ورم کراکتا ہے اسکا استعمال طلسم کے طور پر بہت جلدی تمام ورم کو دور کر دیتا ہے اگر ایسے امرونی استعمال سے غشیانہ اور فتنے کی علامات ظاہر ہوں تو پانی لوکارین دیکھو پہلے گرین ٹک ، بطور جلدی پیکاری استعمال کر کے ہیں۔ وبائی بخارات مثل سکارلیٹ چھپک۔ ٹائیفس وغیرہ کو اسیومی نوریا بھی نہایت مفید ہے۔

(۴) امراض تنفس مثلاً ہونگ کف۔ نزلہ۔ زکام۔ سرفہ۔ ذات الحجب۔ ذات الرہ۔ پیوریونیومونیا۔ ورم لیمفائیٹس۔ ورم سیکس۔ اسکا شروع سے متواتر تھوڑی تھوڑی مقدار میں استعمال کرنا مرض کو روک دیتا اور اکثر بہت جلد کلی قوام بنتا ہے۔ (۵) بجلدی امراض میں جو فساد پسینہ کی وجہ سے ہوں۔ مثل پردہ ایکو۔ سوئے۔ س۔ پردہ رانیٹس۔ ارنی کیریا۔

پانی لوکارپین یا ڈیروکٹورس میں مفید ہے۔

(۷) شروع ورج مفصل میں۔ جادو کے طور پر فوراً مرض کو آرام دیتی اور زیرانی سوزش میں مفید ہے

(۸) بچوں کے زکام۔ نزلہ۔ بخار۔ برکائیٹس۔ اور نیومونیا میں نہایت مفید ہے۔

(۹) دوحصہ الہی اور ایک حصہ بگ جیبو رنڈی ملا کر بطور پوٹیس استعمال کرنا بیوزیمپس کچھڑالی۔ ورم پستان۔ ورم مفصل وٹلو۔ ذیل۔ دبیلہ وغیرہ میں نرم گوشت جلدی تحلیل کر دیتا ہے اور پیپٹو سے روکتا ہے۔

(۱۰) گچ میں اسکا داخلی اور خارجی استعمال مفید ہے۔ خارجی استعمال کے لیے ایک حصہ سفوف جیبو رنڈی کا ایک حصہ

سپرٹ اور پانی میں بھگو دیں اور بعد میں اسکو چھان کر ایک حصہ گلیسرین یا کسٹریل اس میں ڈاکر لپ کریں مگر ضرورت ہے

اسکو حسب پسند خوشبودار بنالین۔ ساتھ ہی داخلی طور پر فلوڈاکسٹک جیبو رنڈی کا استعمال کرتے رہیں۔

(۱۱) سخت ہچک میں بھی مفید ثابت ہوتی ہے۔ دفعہ اخیر یا گلائی کو سوریا تمارا اور شراب کی تابانی اور وٹاروفی

میں بعض اوقات نہایت مفید ثابت ہوئی ہے

اگر قلب ضعیف ہو تو جیبو رنڈی کا استعمال نہایت احتیاط سے کرنا چاہیے کیونکہ اسکے دینے کے بعد تمام جلدی عروق

سے پانی بکثرت خارج ہوتا ہے ایسے یہ ضروری ہوتا ہے کہ قلب کافی زور اور سرعت کو ساتھ حرکت کرتا رہے تاکہ خالی شدہ

عروق خون سے برابر بھرتی جائیں۔ ضعف قلب کی حالت میں سٹی مولٹ اوویہ کے ساتھ اسکو استعمال کرنا چاہیو

بزمشش کے اجتماع خون اور ایڈیا میں۔ ایام حمل میں اور امراض معدہ و معامین اسکو استعمال نہ کرنا چاہیے۔

(۱۲) ٹھوڑی مقدار میں جس کو پسینہ اور خشک زیادہ خارج نہ ہو خراج شیر کو تحریک دیتی ہے اس فائدہ کے لیے اسکو

داخلی اور خارجی طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔

(۱۳) اری ہی پلس پراسکالپ نہایت مفید ثابت ہوا ہے۔

(۱۴) پانی لوکارپین کا مقامی استعمال پانی کو اریڈین کی طرح سکیر دیتا ہے۔ یہ اثر اسکی جلدی ہچکاری سے بھی

ظاہر ہوتا ہے

(۱۵) کزانہ ورج مفصل اور یرقان میں بھی پانی لوکارپین نہایت مفید ثابت ہوئی ہے۔

پانی لوکارپین کا اثر خدو و پسینہ و لعاب میں و پستان پر اور نیز پٹلی و باریک عروق پر اور ڈیریم میں ٹرچین کو

بالکل خلاف ہے۔ اسکو استعمار سیریشی اٹروپین کا کھلانا یا جلدی ہچکاری کرنا اسکی تاخیرات کا مانع ہوتا ہے۔

اگر جیبو رنڈی یا پانی لوکارپین کے بعد سخت ضعف اور نقابت طاری ہو جاوے تو اسکا دفعہ محرک اوویہ مثلاً

اسونیا۔ اتھیر کافی پچاے وغیرہ سے کرنا چاہیے۔ اور اگر کثرت پسینہ و خشک کو کم کرنا منظور ہو تو سیلا ڈونا یا اسٹیر

استعمال کر سکتے ہیں۔

طریق استعمال و خوراک۔ جیبو رنڈی ہمیشہ خالی پیٹ پر کھلانی چاہیے اور اس کے بعد میں جب تنگی

غالب ہو تو نہایت کم مقدار میں برف میل و خشک اندر نگلنے سے منع کریں۔ اس احتیاط سے غشیان اور

قے کی علامات نہ ہونے پاؤنگی لیکن اگر پانی نوکا سپین کی جلدی پچکاری کرنی ہو تو کھانے کے بعد کرنی چاہیے تاکہ ضعف غالب نہ ہو جاوے۔

خمر۔ بزرگ جیو رنڈی سفوف کردہ ۵ گرین سے ۶۰ گرین تک۔ فلوڈ اکسٹراکٹ۔ ابوند سے ۶۰ بونڈ تک۔ سالڈ اکسٹراکٹ ۴ گرین سے۔ اگرین تک۔ انفیوزن جیو رنڈی ایک اونس سے ۱۲ اونس تک۔ ٹنگر جیو رنڈی ۱۴ بونڈ سے ۶۰ بونڈ تک۔ پانی نوکا سپین ۱۲ گرین سے ۶۰ گرین تک۔ پانی نوکا سپین ہانڈرو کھڑا اس با پانی نوکا سپین نائٹراس ۱۲ گرین سے ۶۰ گرین تک۔ جلدی پچکاری کے لیے پانی نوکا سپین نائٹراس یا ہانڈرو کھڑا اس ۱۲ گرین سے ۶۰ گرین تک استعمال کر سکتے ہیں۔

پانی نوکا سپینس Pyelo-nephritis گردہ کے امراض کا بیان دیکھو۔

پانی لی سیوٹیم Pilo Sibotium پنکھا و جیسی سیوٹیم بیر و میٹر پنکھا و ایک مشہور قابض اور

حالب الدم و دوا ہے۔ زرف لدم میں زخم پر چھڑکنے سے فوراً خون بند ہو جاتا ہے۔

پانی منٹو Pimento اسکی تاثیرات بعینہ لوگ اور دیگر خوشبو و تصاحب کثرت پرین نکا بیان دیکھو۔

پانی نال Pinol سیوی لین ایلیم پانی نی پیو می لپونس کا بیان دیکھو۔

پانی نال اکسٹراکٹ Pinol extract مقامی استعمال سے جائے ماؤف کو طاقت بخشتا و در دمنہ

کورف کر کے فاسد ساختہ کو صحت کی طرف لائے۔ اسلئے لقرس۔ و ج صفاصل۔ و در عضلات۔ ذات الجنب۔

و در عرق النساء۔ صدلج بیجوالی میسکو و غیرہ امراض میں بطور مرہم لینیت۔ پلاسٹریا با تھ کے کثرت استعمال کیا

جاتا ہے خفیف مدر اور مسکن در در و د و شامہ سی۔ اسلئے پانی لائٹس۔ سٹائٹس اور گلیٹ میں مضید ہو۔

خمر ایک ڈرام پانی میں ملا کر

پانی نی سلویسٹرس Pmi Sylvestris ایلیم پانی نی سلویسٹرس کا بیان دیکھو۔

پائیو پیریو Pao Pereiro اس درخت کی چھال میں سے ایک جوہر پیریو نام حاصل ہوتا ہو۔

او کا بیان دیکھو۔

پائیو سینکس Pyeo-Saipinx فلوئین ٹوب کے امراض کا بیان دیکھو۔

پائیو نیفروسس Pyeo Nephrosis گردہ کے امراض کا بیان دیکھو۔

پیرونیل Piperonal ایٹی سیٹک ایٹی پائٹیک ہر خمر ۵ اگرین سے ۶۰ گرین تک۔

پیسو PIPsio لیے فلا ای لیٹا۔ پرنیسر پائین۔ ایسی لینڈ و زگرین۔ پانی رولا۔

تیل کی فلا ای لیٹا کا بیان دیکھو۔

تیلی کا پھیل جانا۔ دیکھو بیان ڈرے س کا

تیلی کا سکرٹ جانا۔ دیکھو بیان لوسس کا

پٹاسا سلفیوٹا	Potassa sulphurata	یہ کھلایا نہیں جاتا۔	کاسٹک پوٹاش
پٹاسا کاسٹیکا	Potassa Caustica	یہ کھلایا نہیں جاتا۔	یعنی پٹاسا کاسٹیکا۔
پٹاسی آیوڈائیڈ	Potassæ Iodide	خ ۵ سے ۲۰ گریں تک	خارجی استعمال میں تیز
پٹاسی ایسی ٹاس	Potassæ Acetas	خ ۱۰ سے ۲۰ گریں تک	اری ٹریٹ اور کاسٹک
پٹاسی بانی کارب	Potassæ carb	خ ۵ سے ۲۰ گریں تک	خارجی استعمال میں تیز
الکوار پٹاسی افرے سنس۔		خ ۵ سے ۲۰ گریں تک	خارجی استعمال میں تیز
الکوار پٹاسی۔		خ ۵ سے ۲۰ گریں تک	خارجی استعمال میں تیز
پٹاسی بانی کروماتس	Potassii Bichromas	یہ کھلایا نہیں جاتا	کروماتس پٹاسی
پٹاسی برومائیڈ	Potassæ Bromide	خ ۵ گریں سے ۲۰ گریں تک	ساختہ ملکر لینی تیزی کو
پٹاسی پرمنگاناس	Potassii Permanganas	خ ۵ گریں سے ۲۰ گریں تک	معتدل کر دیتا اسلئے
پٹاسی ٹارٹراس	Potassii Tartaras	خ نصف ڈرام	اگر کوئی تیزاب جلد پر
پٹاسی ٹارٹراس ایسڈ	Potassii Tartaras Acide	خ ۲۰ گریں سے ۲۰ گریں	گر پڑا ہو تو لالگو اڑیٹا
پٹاسی ٹیلیوٹس	Potassii Telluras	خ ۵ گریں سے ۲۰ گریں	یا پٹاسی کاربونیٹس
پٹاسی سائٹراس	Potassii Citras	خ ۵ گریں سے ۲۰ گریں	وغیرہ اسکی تیزی
پٹاسی سلفاس	Potassii Sulphas	خ ۵ گریں سے ۲۰ گریں	کوبہ اثر کر سکتے ہیں
پٹاسی سوزو آیوڈول	Potassii Sozoiodol	خ ۵ گریں سے ۲۰ گریں	کاربونیٹ آف پوٹاش
پٹاسی کاربونیٹس	Potassii Carbonas	خ ۵ گریں سے ۲۰ گریں	پانی میں حل کر کر بطور
پٹاسی کلوراس	Potassii Chloras	خ ۵ گریں سے ۲۰ گریں	ٹکڑا استعمال کرنا وضع
پٹاسی نائٹراس	Potassii Nitras	خ ۵ گریں سے ۲۰ گریں	مفاصل اور تقرس کو

ملکر پوٹاش کا نرم صابون بناتا ہے۔

طبی مقصد اس میں دینے سے معدہ کے غدود کو تحریک دیکر بائروکلوک ایسڈ زیادہ خارج کرتے اور اعصاب معدہ کو تنگین بخشتوں میں اسلئے بدھنی اور درد معدہ میں خاص کر وجہ مفاصل تقرس یا سنگریزہ کی وجہ سے مفید ہیں۔ اگر ہضمی کی وجہ سے غذا معدہ میں تضییع ہو کر کڑھس ہو جائے یا اتفاقاً کوئی ترشی معدہ میں بکثرت ہو اور اسکے مقصدل کرنے کے لیے پوٹاشیم کا کوئی کمزور نمک درکار ہو تو کاربونیٹ استعمال سے یہ اندیشہ ہوتا ہو کہ کاربانیٹ ایسڈ گیس کثرت خارج ہو کر سخت نفخ کرے اسلئے ایسی حالتیں کاربونیٹ کی بجائے لالگو اڑیٹا پٹاسی بہتر ہے۔

ٹائریک ایسڈ اور سلفیٹ آف پوٹاش زیادہ مقدار میں مہل اور مد بھی ہیں۔

خون میں جذب ہو کر پوٹاش کے مرکبات و قوسم کا اثر پیدا کرتے ہیں اول تو یہ کہ پلازما، دام، الدم، کے کھارپن زیادہ کر دیتے اور اگر کوئی ترشی انہیں موجود ہو تو ان کے ساتھ ملا کر سکوئیوٹرل و محلول کر دیتے ہیں اسلئے وچ مفصل اور تقریب میں مفید ہیں۔ ان امراض کے ٹیکٹک ایسڈ اور پوٹاش کے ساتھ ملا کر انکو خون سے خارج کر دیتے ہیں۔ قوسم خون کی تھیلیوں کی تعداد زیادہ کرتے اور تقویت بخشتی ہیں۔ اسلئے فیبرم ہارٹس، ٹم ایک عمدہ قوی خون ہو۔ اعصاب، عضلات اور قلب کا کچھ استعمال سے ضعف ہوتا ہے اسلئے مدت تک انکا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے خاص کر مرض گردہ میں۔ کیونکہ بیماری گردہ کی حالت میں انکا اخراج بخوبی نہ ہو کر علامات ضعف اور زیادہ ہو جاتا ہے۔

آخر کار پوٹاسیم کے نمک بہت جلد گردوں کے راستہ خارج ہو جاتے اور کس قدر جلد راجعاً واپس پستان اور شش کو رہتہ بھی گردوں کو رہتہ خارج ہوتے ہوئے پیشاب کی نالیوں کو تنجیب دیکر پیشاب زیادہ خارج کرتے ہیں۔ اس طرح ایسی ٹیٹ ایسڈ ٹائریٹ سائیرٹ۔ ٹائریٹ کاربونیٹ۔ بانی کاربونیٹ اور سلفیٹ آف پوٹاش بخیرا ش مدرات میں اور مستقل کلیہ میں پوریا اور پانی کا اخراج کر کے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ استسقا قوی ہیں انکو وچی ٹاس اور سکوپیچم وغیرہ کیساتھ استعمال کرنا بہتر ہے۔

ٹائریٹ آف پوٹاش بھی قوی مدر ہے لیکن اس میں اور دیگر پوٹاسیم کی مدرات میں یہ فرق ہے کہ یہ گردہ میں کس قدر سوزش پیدا کر کے خون کا رجحان اس طرف کر دیتا ہے۔ سنگ مثانہ گردہ رہے ہوئے مدرات میں یہ سالٹ بکثرت استعمال کیئے جاتے ہیں۔

سائیرٹ اور ٹائریٹ آف پوٹاش تو قدرے معرق بھی ہیں لیکن دیگر سالٹوں میں یہ خاصیت معلوم نہیں ہوتی۔ شش کو رہتہ خارج ہونے سے ہضم کو کثیر المقدار اور ترقی کر دیتی ہیں۔ آئیوڈائیڈ آف پوٹاسیم اس مطلب کیلئے خاص کر مفید ہے۔ امعاء اسکا اثر خفیف مہل کے طور پر ہوتا ہے اس عام بیان نے بعد ذیل میں مختصر طور پر علیحدہ علیحدہ مدرات کا ترتیب وار بیان کرتے ہیں۔

پٹاسی سلفیٹ کا بیان دیکھو۔

پٹاسی کاسٹک کا شک کو طور پر استعمال ہونا ہو۔

پٹاسی آئیوڈائیڈ، آئیوڈائیڈ آف پوٹاسیم کا بیان دیکھو۔

پٹاسی ایسی ٹاس۔ وافر ترشی مقوی عمدہ۔ معدل خون۔ مدر قدری معرق۔ مخرج بلغم و صفراء۔ زیادہ مقدار میں مہل ہے۔

پٹاسی بانی کادوب۔ وافر ترشی مقوی عمدہ۔ معدل خون۔ مدر قدری معرق۔ مخرج بلغم و صفراء ہے۔

پٹاسی بانی کروم اسلید و بیٹریل استعمال نہیں ہوتا کیونکہ فی طور پر کرومک ایسڈ اور سوڈی ویکلر ٹاس کو نہیں استعمال ہوتا ہے۔

پٹاسی برومائیڈ، برومائیڈ آف پوٹاش کا بیان دیکھو۔

پٹاسی پرنیکس ٹاس۔ پرنیکسٹ آف پوٹاش کا بیان دیکھو۔

پٹاسی ٹائریٹس۔ وافر ترشی عمدہ، مقوی عمدہ، معدل خون۔ قوی مدر قدری معرق۔ مخرج بلغم و صفراء

پٹاسی ٹائریٹس

زیادہ مقدار میں سہل۔ نارفع بطنی۔ وج مفاصل۔ نفرس۔ استسقاء قلبی و مثانہ و سنگ مثانہ و گردہ۔ ڈیجیٹل
اڈونی ڈین اور سکوپے ریم کے ساتھ قلبی استسقا میں بھی مفید ہیں۔

پٹاسی سلیوولس۔ ایک تھانی گرین روزانہ کی خوراک میں سل کے پسینہ کو روکتی ہے۔ اس کے استعمال سے تنفس میں لیس کی بو
ہو جاتی اور کچھ دنوں کے بعد ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔

پٹاسی سائٹراس۔ دافع ترشی معدہ معدل خون۔ مدر معرق۔ مخرن۔ بلغم و مخرن صفر ہے۔

پٹاسی سلفاس۔ سوڈی سلفاس کی طرح سہل ہے۔ ادرار۔ تعرق۔ اور اخراج بلغم وغیرہ کی ناخیرات سمیت کم اثر

پٹاسی سوزو آوڈول۔ یہ محض خارجی طور پر پکائے آوڈو فارم استعمال کیا جاتا ہے۔ اور زینا اور لیونجائٹس میں

اسکی نوا لیتی ہیں۔

پٹاسی کاربوناتس۔ دافع ترشی معدہ بقوی معدہ و سکن درد معدہ معدل خون۔ مدر۔ قدرے معرق مخرن بلغم و صفر اور

پٹاسی کلوراس۔ گردہ بیشش۔ معاد وغیرہ کے راستہ صاف خارج ہو جاتا اور میوکس جلی کی سوزش اور زخم وغیرہ کو فائدہ

بخشتا ہے۔

پٹاسی نائٹراس۔ قوی مدر معرق۔ اور دافع بخار ہے۔

ڈیوبوالی سین مانی پرائڈز۔

پیوری Pituri ڈیوبوالی سین کا بیان دیکھو۔

پٹی رائٹس Pityriasis

پٹی رائٹس روبرا Pityriasis Rubra

پٹی رائٹس کپیتس Pityriasis Capitis

پٹی رائٹس کپیتس دینڈرف میں ایک قسم کی باریک بنانات

جی جلد میں جگہ کر لیتے ہیں۔ اسلئے اسکا علاج مفصلہ اصول اور تدابیر پر کرنا مناسب ہے۔

اول۔ تبدیلی آپ ہوا عمدہ غذا اول اور مقویات جو عام صحت اور طاقت کو ترقی دیتا۔ آرسنک جلدی امراض میں خاصکر مفید ہے۔

دو۔ مقامی ادویہ جلد کی اصلاح کرنا۔ ریڈ آوڈاڈ آف مرکری آئنٹ منٹ یا زینک آئنٹ حسب موقعہ

استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر سرخی اور خارش زیادہ ہو تو مسہلا اور مدرات کا استعمال کریں اور مقامی طور پر سیلاڈونا۔

گلیسرین وغیرہ سکن ادویہ لگائیں۔

پیجین بیری Pigeon Berry کو کم سلوک گارجٹ پوک وٹ فانی ٹولیکا۔ ٹیکنڈرا کا بیان دیکھو۔

پیجین بیری آمبری کیا۔ مدر دافع سوزش مثانہ۔ موی اور محل سنگ مثانہ سے۔ سورش مثانہ میں خواہ

پچی مرندہ ہو یا حاد نہایت فائدہ کرتی ہے۔ چونکہ میوسین اس میں حل ہو جاتا اور پیوریٹس

تھینس اور فاسفٹس اس کے ساتھ ملکر قابل حل ہو جاتے ہیں۔ اس لئے سنگ مثانہ کا میوسین

جو ذرات سنگ کو ملا کر رکھتا ہے۔

اسکے استعمال سے صل ہو کر پتھری رہنے لگتا ہے اور آخر کار باریک ہو کر خارج ہو جاتی ہے۔ ریگ شانہ بھی خوب صاف ہوتا رہتا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ چند ہفتہ کے استعمال کے بعد ریگ اور ریگ شانہ کلی خارج ہو کر بے ثباب صاف آنے لگ گیا اور کوئی شکایت باقی نہیں رہی عرق النساء وج اصب صدار وغیرہ جو پوری ٹوبیا یا فاسے ٹوریا کیجی ہو ہو پھو کے استعمال سے جاتا رہتا ہے۔ ہر مضمی میں جو حصاة صفراوی کیوجہ سے ہونا فر ہے۔

خمر فلوڈ اکثر آف کچی، قطرے سے ہم قطرہ تک۔

پڈا فلوڈاکسین Podophylo-toxine
پڈا فلوڈاکسین Podophylline

خارجی استعمال میں سالم جلد پر ایک کچھ اثر نہیں ہوتا لیکن زخم کو بہتہ بند ہو کر سہل تر پیدا کرتے ہیں۔ کھلانے سے منہ سے کی قدر تھوکر جاری ہوتا اور معدہ میں ہنچا خراش، مروڑ اور غلیان کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اسکو ہمیشہ بلیا دینا۔ ہاوسائیس آف کئی میں انزیکا وغیرہ کے ساتھ استعمال کرنا چاہئے۔ امعا میں ہنچا کئی کئی ریشوں اور غدود کو اور نیز اخراج صفرا کو تحریک کر دس بارہ گھنٹہ کے اندر سہال لانا ہے قبض والکئی میں اسکو پڑ گرین سے پڑ گرین تک کی خوراک میں صبر اور کچلہ کے ساتھ ملا کر دینا مفید ہے خمر پوڈا فلوڈاکسین پڑ گرین سے پڑ گرین تک۔

پروستایٹ Prostate
پروستایٹ آف ہائڈروجن Peroxide of Hydrogen
پروستایٹ آف ہائڈروجن Peroxide of Hydrogen

آکسی جینیٹڈ واٹر۔ ہائڈروجن پروکسائیڈ کا بیان دیکھو۔
پروپیل امین Propylamine
پروپیل امین Propylamine
پریا پیزم Priapism
پریا پیزم Priapism

پریا پیزم Pereira
پریا پیزم Pereirine
پریا پیزم Pereira
پریا پیزم Pereirine

پریا پیزم Primary Syphilis
پریا پیزم Purpura
پریا پیزم Purpura
پریا پیزم Purpura

کسی قسم کی کھجلی یا جلن یا درد وغیرہ بالکل نہیں ہوتے بلکہ اکثر مریض کو کپڑے اُتاتے ہوئے دفعتاً بہرہ دے دیا جائے تو وہیں درد تکلیف کچھ بھی معلوم نہیں ہوتی۔

دوم پریپورا مہیوئے ٹیکا۔ اس میں داغوں اور دھبوں کے ظہور کے ساتھ بخارِ تکان اور درد ہو جاتا ہے تمام بدن کو اسی مہیو معلوم ہوتا اور جو دردِ ناک و رتورم ہو جاتے ہیں غشیان اور صفراوی تے بھی ساتھ ہو جاتے ہیں۔ سوم۔ پریپورا ایموکیٹیکا۔ اس میں عام ضعف بخار۔ درد اور بچھینی زیادہ ہوتے ہیں۔ دھبے بہت بڑے بڑے اور گہرے بنایا ہوتے ہیں۔ لیوں اور رخساروں کی اندرونی سطح مسوہوں تالو اور حلق کی کھجلی کے نیچے ایسے ہی دھبے بن جاتے ہیں۔ ناک۔ منہ۔ مقعد اور شاد سے خون جاری ہو جاتا ہے کبھی پھیپھڑوں سے بھی خون آتا ہے۔ کثرت اور تواتر جریان خون سے مریض بہت جلد نڈھال ہو کر ملاک ہو سکتا ہے۔

تہمی مفصلہ بالانینوں قسام کے ساتھ رگ پتی اوچھل آتی ویدہ نہیں خون جگر تھرا مہوسن جو جانا اور دست لگ جاتی ہیں۔ چھادم عارضی پریپورا اس سے مراد وہ پریپورا ہے جو دوسرے امراض کے ضمن میں ظاہر ہو مثلاً امیضہ جیکپ سکارلیٹ فیور، ٹائیفس فیور، خسرہ، برائٹس ڈیزیزل، وجع مائل، سروس آف لورسور کو سائی تقسیماتاب تلی اور بخارات میں کثرت کھورل اور آلود ڈائڈ آف پوٹاسیم سے بھی پریپورا ہو جاتا ہے۔

پریپورا کے دھبے عموماً جلد کی سطح کے ہموار رہتے ہیں کبھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے برابر کبھی بہت لمبے چوڑے اور کبھی غلوں میں ہوتے ہیں کبھی چھوٹی پھنسی یا چھالہ کی طرح او بھرتے ہیں۔

انجام۔ عموماً اچھا ہوتا ہے مگر جب دوسرے امراض مثل برائٹس ڈیزیز یا امراضِ قلب ساتھ ہوں یا جریان خون کی بہت کثرت ہو تب ہلاک ثابت ہوتا ہے اسکی میاد کوئی مقرر نہیں بعض اطباء اسکو طبعیہ مرض نہیں خیال کرتے بلکہ دوسرے امراض کا ایک ضمنی عارضہ خیال کرتے ہیں۔

تشخیص۔ پریپورا کو دھبے دہانے سے متعین نہیں ہوتے اور ان میں کوئی درد یا جلن یا ٹیس یا کھجلی نہیں ہوتی۔ انکو پریپورا یا لکھڑی نہیں اور تے یہ اسکی تشخیصی علامات ہیں جو اسکو اور تمام امراض سے علیحدہ کرتی ہیں اسکا اشتباہ کھڑی یا آٹنگ یا درگڑ کے ساتھ ہو سکتا ہے مگر سکڑوی ہمیشہ ایسی حالتوں میں شروع ہوتی ہے جبکہ سبز کولات اور تازہ پھل مدوں تک کھانے نصیب نہ ہوئے ہوں جیسے چھازی سفروں میں اور اس میں مسوئے ہو کر کھو کھلو اور کمزور ہو جائے دانت پٹنے لگتے ہیں۔

آتشک میں طرح طرح کے جلدی فسادات ظاہر ہوتے ابتدا ہار و شینکر سے ہوتی پھر کنج ران میں اولی ہوتے اوکا بعد جلدی فسادات ظاہر ہوتے ہیں درگڑ کے دل غمخود اور وحدہ وہ ہوتے ہیں۔

علاج۔ مشروح سے مریض کو ہر قسم کی حرکت و جنبش سے منع کریں حیوانی غذائیں کثرت دیں پانی اور قریق چیزیں کم پینے دیں مگر کوئی خاص بہت و یا ف نہ ہو سکے تو سلونز یا میٹیکلکری پرکھو یا ڈی آر سب کو مین۔ درگڑ پکھڑی۔ سلفیوکل ایڈ۔ کالک ایڈ۔ ٹیکال ایڈ۔ میزری لین۔ ٹیکراف لارج ایسی ٹیٹ آف لڈ۔ ہوا میس۔ پوٹاسی پرکھو

سکرینا وغیرہ حاسل ادویہ استعمال کریں۔ ان سب میں سولورنٹرٹ سب سے زیادہ قابل اعتبار ہے
(۲) ٹنگرٹیل - فادرل سالیوشن ملا کر دینا۔

(۳) ٹرنٹپائن اندرونی اور خارجی طور پر اگر سکروی کی وجہ سے یہ مرض ہو تو تازہ پھل بکثرت استعمال کریں۔ خاصہ لیموں
سنگترہ۔ راسبیری۔ سیب۔ ناشپاتی۔ آڈو۔ لوکاٹ۔ اور آنبہ۔ غذائیں آلو۔ بنترکاری اور ساگ بافراط کھائیں۔ اگر کسی
ادویہ کو استعمال سے ٹنگایت پیدا ہوئی ہو تو اسکا استعمال فوراً بند کر دیں بعض اوقات تمام بدن میں فیئرٹاک کرٹ ٹاکر
کرنا نہایت مفید ہوتا ہے۔

جسے نیم میکروٹم کا بیان دیکھو۔
ہونیگ کف کا بیان دیکھو۔
باگ بھرٹا کا بیان دیکھو۔

Purple Craft

پریل کرافٹ

Pertussis

پرٹوسس

Purgng Nut

پرچنگ نٹ

Perspiration

پرسپائریشن

پسینہ عرق پسینہ کے امراض کا بیان دیکھو۔

پرسپائریشن اکثر ہڈیوں و تھان و پنجاب کی کونسی کی دیوار پر اندرونی سطح میں عموماً ہوتی ہے۔ یہ سب استعمال خون اور خوراک میں ہوتا ہے۔

پر فوریشن یعنی کسی عضو میں سوراخ ہو جانا اسکا علاج طبیب کو مقام اور عضو باؤف

اور حالت مریض کی مطابق خود وقت پر تجویز کرنا چاہئے۔ ہم اسکا ہر طرف چند عام اصول کی طرف توجہ دالتے ہیں۔
(۱) اگر اطراف میں کسی جگہ سوراخ ہو جاوے تو اسکا علاج ناسو کی طرف ہے۔

(۲) اگر کسی کے ٹکمہ یا سینہ کے عضو میں ایسا واقعہ ہو جاوے تو سب سے مقدم یہ کہ مریض کو فہم کی حرکت سے پرہیز کر دیں۔

(۳) اگر معدہ یا اس میں سوراخ ہے تو تمام غذا بند رکھیں اور ٹکچر اوپن دیتے رہیں تاکہ تمام حرکت معدہ یا معاند رہے۔ اگر
علامات پیری ٹو نائٹس شروع ہو جائیں تو بے پے راتوں کر کے جب موقع سوراخ کو درست کر سکتے ہیں۔

(۴) اگر تش یا برا کالی میں سوراخ ہو جاوے تو نیوٹو تھورکس کے بچھو کے لیے سینہ کو مشرب کر دیں۔

(۵) جو علامات درد۔ سوزش۔ بخار وغیرہ پیدا ہوں اسکا حسب حالت علاج کرتے رہیں۔

پرگیٹو Purgative مہل اسکے چند اقسام ہیں۔ جو ذیل میں تفصیل و اربان کئے جاتے ہیں۔

اول طینات یعنی خفیف مہلات جو محض امعاء کو کھجی لیشوں کو تحریک دیتے ہیں۔ دیکھو اپرینٹس کا بیان۔

دوم ڈرہگس یعنی وہ تیز مہلات جو امعاء کو کھجیوں میں سوزش پیدا کر کے ایک قسم کا نزلہ پیدا کر دیتے ہیں اور
عدو اور کھجی لیشوں کو تحریک دیتے ہیں مثلاً الیمیرم خنظل۔ بروغن جب اسلاطین عصارہ ریوند۔ گایاکم۔ انڈیا انما۔

ابو سائیم کنائٹس بے بیرری۔ برای اوینا الباسیے ڈلائیلی ڈونیم جیو کلاڈوفنی نیم جلب پیل پورین نیگرا جیو فا

سوسہ نکین مہلات مثلاً پائسی نائٹس اس ایڈیٹاسی مارٹراس پائسی اسفاس سوڈا مارٹریڈ سوڈا اسفاس

پینادی و ایڈیٹریک شل و ایڈیٹریک سائیر و مارٹراس انفرٹنس سوڈی فاسفاس سوڈیم کلورائیڈ گینٹا اسفاس

نکین مہل کے دینے سے عدو اور کھجی لیشوں کو کھجی تحریک ہوتی ہے لیکن پانی انہیں زیادہ تر چھٹا ہے۔

چھادر کتھارکس۔ یعنی وہ تیز مہلات جو امعا کو خندہ اور ریشوں کو بہت تھریک دیتی اور قد سے نزلہ بھی پیدا کرنے میں مثلاً کیلول بلبول گرے پاوڈر چلب۔ مقونیا پوداغلین پوداغلوناکسین۔ سمینس فرنگولا۔ ایڈکٹھارنگ۔ کیسرا سیکریڈاٹرنٹائن ایل۔ الیٹیم۔ کوکوسنٹھ میٹھی سین۔ برڈاک۔ مارکھنٹھس گایونٹھس کنویرین۔ آیریڈین جیلانین۔ لپٹڈین سی جیلیا۔ سٹلنجا۔ وکٹوریادائر۔

پنجہ۔ سادہ مہلات جو امعا کی حرکت کو ترقی دیکر مہل اٹھیں کرتے ہیں مثلاً سنا۔ صبر۔ کالا۔ یعنی عشق۔ پچ۔ پرمینگنیٹ آف پوٹاش۔ **Permanganate of Potash** خارجی استعمال میں پرمینگنیٹ آف پوٹاش ایک قوی اینٹی سیک۔ ڈس انفیکٹ اور ڈی اوڈورنٹ ہے۔ پانچ چھ گرین فی پائینٹ لوشن خراب بدبو دار زخموں کی بدبو کو رفع کرتا اور انکو رو بھرت کرتا ہے۔ سوزاک۔ گلٹ۔ وچکانائش سرطان الرحم ثور مہنی و دہن و گلومیں بطور پچکاری مغرغہ استعمال کرنا نہایت مفید ہے۔ داخلی طور پر اسکا بھی تک کوئی خاص فائدہ ثابت نہیں ہوا حال میں بطور مدحیف اسکو استعمال کیا جاتا ہے۔

خبر پوٹاشی پرنٹے ناس اگرین سو گرین تک۔ لاکو اور پوٹاشی پرنٹینٹس ۲ ڈرام سے ۴ ڈرام تک۔ پرمیمبو کو جیبورنڈی **Pernambuco Jaborandi** پائیلو کارپس پیڈیٹولیس۔ جیبورنڈی کا بیان دیکھو۔

پرنسیر پائین **Prinoe's Pine** کیسے فلا امبی ایسٹا کا بیان دیکھو۔

پروٹی گان **Protagon** سری برین۔ دماغ اور اعصاب کا سری برین ایک جزو اعلیٰ ہے۔ اور جس کوئی حیوان اعلیٰ عقل و تیز کرتا ہے۔ سیدر انکو دماغ اور اعصاب میں پروٹی گان بکثرت پایا جاتا ہے جس قدر کسی حیوان میں جتنی جسمانی دماغی اور روحانی بوجھ جاتی ہے اس قدر اسکے دماغ اور اعصاب میں سری برین زیادہ ہوتا ہے۔ اس بنا پر یہ خیال کیا گیا اور تجرباً ثابت بھی ہو گیا ہے کہ سری برین نہایت اعلیٰ درجہ کی حافظہ صحت متقوی دماغ و دیگر اعضا میں ثور بکھو کر کے شروع مدارج میں کئی فائدہ بخشی ہے۔ اس میں لاپوفا سفایٹ آف اولی این بخت ہوتا ہے۔ اور اسی پر تمام اہل تافیرات منحصر ہیں۔ خبر ۱۰ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

پرورائش **Pruritis** کھجلی۔ خارش۔ جو امراض جلد کی بیرونی ہوں

پرورائش ولوی **Pruritus Vulvæ** میں ہوں اور ان میں کم و بیش کھجلی اکثر ہوتی

پرورائیگو **Prurigo** جلد کے امراض کا بیان دیکھو ہے۔ لیکن جو امراض گہرے ہوں مثلاً اٹاک

جذام وغیرہ کے فسادات اوٹیں نہیں ہوتی مفصلہ ذیل وجوہات سے کھجلی ہو سکتی ہے۔
(۱) مقامی خارش۔ مثلاً میلے کپڑے۔ جوں۔ ایک۔ داد کے کپڑے۔ جوب کے کپڑے۔ پیشاب یا دوسری غلاظتوں کی وجہ سے یا غیر دواؤں مثلاً سرچ۔ روغن۔ چالکو۔ یا شاربیک گھنے۔
(۲) جلد کی سوزش مثلاً بیل۔ لائی کن۔ پرورائی کو سطحی پسپاں اور دھلا اور داغ رنگ تپتی اور وزیولہ

(۳) انتقال خراش کے طور پر شلاکرم امعاء ہضمی تشری حصہ اور برائیس ڈیزیز میں۔

(۴) خون میں فاسد اجزاء سے شلاکرقان میں صفائے کئے سے اور کو پائید اکلانے سے۔

کھجلی کبھی تو خفیف ہوتی ہے اور کبھی بہت شدید کبھی ایک خاص مقام پر محدود ہوتی ہے اور کبھی کل جسم پر ہو جاتی ہے۔ جب خاص خاص مقاموں پر محدود ہو تو اسکی علیحدہ نام مقرر ہو گئی ہیں جنکی مفصلہ ذیل بری اقسام میں۔

اول پرورائیٹس ولوی۔ اندام نہانی پر کھجلی ہونا۔ اس میں خاص سبب سیلان رطوبت فرج صحر ہونا ہے۔
دوسرے پرورائیٹس سکروٹائیٹس اپنیٹس۔ فوطوں اور عضو تناسل کی کھجلی۔ اسکی وجہ اکثر غلاظت

یاداد یا چنبل ہوتی ہے۔

سومرے پرورائیٹس انانی۔ دبر کے گرد کھجلی ہونا یہ بچوں میں چلونون کی وجہ سے اور جوانوں میں بواسیر یا

چنبل یا پسینہ یا غلاظت کی وجہ سے ہوتی ہے

چھٹھم پرورائیٹس سنائیٹس۔ بوڑھوں کی کھجلی یہ عموماً ناکپڑ وغیرہ سے جو کچھ غلاظت سے ہوتی ہے
علاج۔ آب باہ تو اعداء کے مطابق کرنا چاہیئے۔

پروگریو سکوزائٹرونی Progressive Muscular Atrophy اسکی دوسرے نام

ولسٹنگ پالی اور کرول میرس پیرے کی اس بھی ہیں۔ اس میں عضلات ماؤف ڈھیلے نرم پھیکے اور پتلے ہوتے جلتے ہیں خاص کر اپنے بالائی حصہ میں خوردبین سے معلوم ہوتا ہے کہ کھجلی ریشے تو پتلے اور نرم ہوتے جاتے ہیں مگر ریشوں کے درمیان کی جرنی اور ایریورٹشورٹج جاتے ہیں کبھی خاص کھجلی ریشوں میں بھی جرنی پڑ جاتی ہے متاعی اعصاب کی آٹھی ریر روش اور سبب خفیفک اعصاب جو او میں آتے ہیں پتلے پڑ جاتے ہیں متاع میں اتنی ریر کارڈو اناسد ہو جاتے ہیں۔ اس مرض کی علامات بہت آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں۔ پہلے شانہ کو عضلات پتلے ہو جاتے رفتہ رفتہ تمام جسم کے مگر لکڑیوں اور کھانے کے عضلات سالم رہتے ہیں کبھی کبھی ماؤف عضلات میں ابتدائی درجوں میں خود بخود لرزہ ہوتا رہتا ہے کھجلی کا احساس کم ہوتا جاتا ہے مگر ریش کش آف ڈجسٹیشن نہیں ہوتی۔ دماغ آخر تک صاف رہتا ہے عضلات اور جوڑوں کے قسم کا داکٹر محسوس ہوتا ہے
علاج۔ اصلاح غذا و عادات اور مقویات کو کریں۔

مفصلہ ذیل امراض سے اسکا اشتباہ ہو سکتا ہے مقامی فاکج المائیورٹوفک لیٹرل سکوزائٹس
زہر سک۔ پولیو مائی لائٹس آٹھی ریر اکیوٹا۔ اور سب اکیوٹا منجون کا عام فلج۔

Prolapsus Ani

پرولیپس انانی

Proiapsus Reoti

پرولیپس ریگٹائی

خروج المقعد کا کچھ نکلنا۔ اس میں سبب ہضم
یا مری کے خارج شدہ حصہ کو جلیج مناسب
ہو اندر کے پیریٹل بینڈج کے ذریعہ برابر دباؤ رکھا جاوے خفیف حالتوں میں خود مدین اپنی اپنی جگہ آجیو
سے آسانی خارج شدہ حصہ کو اندر کر سکتا ہے۔ اگر درم ہو گئی ہو تو لٹ کا ٹکر خارج شدہ حصہ پر رکھ کر پہلے ہاتھ کے

ساتھ ساتھ ہر طرف دباؤ دین تاکہ ورم کم ہو جاوے بعد ازاں انگشت سبابہ پر تیل لگا کر مقعد کے اندر جھنڈر و وزن تک ممکن ہو زور سے پہنچاویں اس طرح کرنے سے کلچ اندر ہو سکتی ہے۔ اگر ورم بہت زیادہ ہو اور بوا سیر بھی قدم خوردہ موجود ہو کہ معاً اندر کرنا محال ہو جائے۔ ایسی حالت میں ایک دو روز اسپر پولیٹس لگا دین جب ورم کم ہو جاوے تب اندر کرنیکی کو کریں لیکن اگر بوا سیر سخت ورم خوردہ ہو کر مہر دار پرٹے شروع ہو گئی ہوں تو ہرگز اندر کرنے کا ارادہ نہ کریں بلکہ چند روز برابر پولیٹس لگانے رہیں تاکہ مہر دار شدہ بوا سیر صاف ہو جاویں۔

داخلی طور پر کچھ سکنکینا اور ارگٹ سب و عمدہ ادویہ ہیں۔

مقامی طور پر جو قابض مرہم و تباہیاں پالینز میں مذکور ہوئی انہیں سب بوتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ خروج مقعد کے اسباب نہایت مختلف ہوتے ہیں اسلئے سب کو معلوم کر کے اسکی مدافعت کی کوشش کرنی چاہیئے مثلاً شائد کرم امولنٹلار جڈ پریٹھ۔ پالیس ریکٹائی بوا سیر سٹریکچر آف دی یورنٹھیرا وغیرہ امراض میں سے اگر کوئی موجود ہو تو انکی طرف توجہ ضروری ہے۔ اگر اس قسم کا کوئی سبب معلوم نہ ہوا اور خروج متواتر ہوتا رہتا ہو۔ تو اسلئے فصلہ ذیل قیام میں

- (۱) عام صحت کو عمدہ آب و ہوا۔ غذا اور مقوی دواؤں سے ترقی دینا۔
- (۲) قبض کی مدافعت کرتے رہنا۔ سلفر اور کریم آف ٹاڈار۔ براؤ کو نرم رکھنے کے لیے عمدہ ادویہ ہیں۔
- (۳) مقامی طور پر پھلکری۔ ارگٹ ہینیلین۔ سٹریکچر آف دی یورنٹھیرا وغیرہ کی پچکاری کرتے رہنا۔ دیکھو بیان پالینز کا۔
- (۴) ٹائپرک ایڈ۔ یا کاسک یا کاسٹری سے دبر کے کنارہ کو جلا دینا تاکہ فائبرس ٹشو سٹریکچر دبر رنگ ہو جاوے
- (۵) کسی قدر سوکس ممبرن کو نام دایرو میں ڈسکٹ کر دینا۔

پرولیپس اوویرائی Prolapsus Ovari مریض کی چار پائی پاؤں کی طرف سے اونچے اونچے رکھیں جماع سے ممانعت کر دیں بہتر قسم کی حرکت سے منع اور برابر چٹ لیڈو ہسے کی تاکید کر دیں۔ پٹ پر سکرم کے قریب گلاس لگانا۔ وجانا میں گرم پانی کی پچکاری کرنا مفید ہیں۔

سخت حالتوں میں اگر ممکن ہو کہ تو وجانا میں چہرہ دیکر ادوری کا نکال لینا ضروری ہوتا ہے یہ اسی حالت میں ممکن ہے جبکہ ادوری دگلاس پاؤں میں گر پڑے اور وجانا میں کو انگشت کو ساتھ معلوم ہو سکے۔ رنگ پیسری یا رڈ بال پیسری کے سہارے سے چند ایام میں انہیں اپنی جگہ پر قائم ہو سکتی ہیں۔

پرولیپس یوٹرائی Prolapsu Uteri خروج الرحم م اول تدابیر حفظ مانتقام

جب شروع علامات پرولیپس کی معلوم ہوں تو مریض کو چلنے پھرنے سے منع کر دیں۔ بستر پر آرام سے لٹا رکھیں۔ یوروجین مستورات کا طرز لباس رحم کے لیے سخت مضرب۔ کیونکہ اس میں ٹھکم اور پیڈو کے اعضاء پر غماز ہوتا ہے۔ پرولیپس کی حالت میں خاصکر نہایت ضروری اس سے کہ پیڈو پر دباؤ نہ پہنچے بلکہ اس قسم کی پٹیاں یا سہارے ٹھکم پر لگائی جائیں جن سے تمام ٹھکم کے اعضاء کا بوجھ اوپر کو تھلا ہے۔ روتا دھنڈے پانی میں بیٹھ کر غسل کرنا مفید ہے۔ اگر ہم مہانا اور شرمگاہ میں اجتماع خون ہو تو انکا علاج مسہلات ہونک برف

یہ کتاب شریعہ محمدیہ پر مبنی ہے۔ اس میں مذکور ہر چیز کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے اس کو بے حد احترام سے لے کرنا چاہیئے۔ اگر کوئی شخص اس میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔

یہ کتاب شریعہ محمدیہ پر مبنی ہے۔ اس میں مذکور ہر چیز کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے اس کو بے حد احترام سے لے کرنا چاہیئے۔ اگر کوئی شخص اس میں کوئی تبدیلی کرے گا تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔

لگانے یا انٹرنسٹ پکڑیوں سے کرنا چاہیے قبض کچال میں چونکہ اخراج براز کے وقت زور لگانا پڑتا ہے جو پرولیپس کے لیے مضر ہے اسلئے ایسی تدابیر کرتے رہیں جسے قبض نہ ہونے پاوے اور پاخانہ نرم و رقیق آتا ہے اگر رحم میں غم آگیا ہو لیجئے جگہ گریزا ہو تو عام قواعد کے مطابق اسکا علاج کریں کھانسی جھینک ہچکی ریفخ معدہ پھر واپس کو زیادہ کرتے ہیں اسلئے ان امراض کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔

دوم۔ رحم انجا افتادہ کو اپنی اصلی جگہ پر پہنچانا۔ اسکی تدبیر یہ ہے کہ مرضیہ کو فی البیو یا الٹھاؤمی کی وضع پر کرکے خارج شدہ حصہ کو باہر تنگی وزمی ایسی ترتیب و انداز کریں کہ جو خضیہ سب سے پہلے خارج ہو جائے وہ سب سے پیچھے اندر جاوے اور جو سب سے پیچھے خارج ہو جائے وہ سب سے پہلے۔

سوم۔ رحم کو اصلی جگہ پر پہنچا کر اسی جگہ قائم رکھنا خفیف حالات میں ہینڈرکانی جو کہ مرض کو دو تین ہفتہ برابر چار ہائی پر لئے رکھیں شست برداشت اور چلو پھرنے سے باز رکھیں۔ عام صحت کو مقویات سے ترقی دیں۔ القصہ جو تدابیر حفظ ماتقدم کی بیان کیں ان سب پر عمل کریں شروع درجہ میں جب کہ رحم بے جگہ یا خمیدہ ہو گیا ہو تو مفصلہ ذیل پیسیریز میں سے جو مناسب ہو استعمال کریں۔ ہاج گرین ہال گھرنگ۔ گسٹی ہو لیٹ۔ زوانگ۔ بارنیک پاورسٹیم کیکرس پرولیپس۔ اقلینٹک۔ گاڈن زوانگ۔ ایرینڈ لیکن اخیر حالات میں جبکہ رحم شرمگاہ سے باہر نکلے تک اسی حالت میں ہے اور کسی علاج سے اپنی اصل حالت پر قائم نہ ہو تو مفصلہ ذیل جراحی دستکاریوں میں سے جو مناسب موقع ہو کر نی چاہیے۔


(۱) الای ٹرو ریونی یعنی وجائنا کی سطح پر سے میوکس ممبرین کے مثلث یا بیضوی یا مسدس ٹکڑے سیکٹ کر اسکو تنگ کر دینا۔

(۲) اپنی سیور سفی شرمگاہ پر دستکاری کر کے اسکو تنگ کر دینا۔

(۳) کالپوٹروسس۔ رحم کے بالمقابل سطح کو چھلکے باہم ملا دینا۔

(۴) پیری نیوٹرمی۔ اسکا مطلب ہے کہ پیری نیوٹرمی کو کر کے تھک کر نہ ہو گیا قائم اور مضبوط کرنا یہ دوطرح کرنا جاتا،


اول اسطرح کہ ایک بالائی انگاف سیون میں اسطرح چبے ہیں کہ ہر دو سرے سامنے کی طرف حسب ضرورت لمبائی ختم ہوں پھر اس انگاف کیوں کو خوب زور سے کشادہ کر کے ایک خم دار سوئی پیرونی ب کو قریب کی گہرائی تک




داخل کر کے اندرونی لب کو قریب انکاسر نکال لیتے ہیں پھر دوسری طرف اسی سوئی کو اندرونی لب کے قریب زخم کے اندر کافی گہرائی تک لجا کر برونی لب کو قریب نکالتے ہیں تب اس دھاگہ کو ایسے زور کے ساتھ کھینچ کر باندھتے ہیں کہ ایک طرف کو زخم کی سطح سے جاملتی ہے گو یا کہ سیون کے اطراف کی سطحیں اس ترکیب سے کھنچ کر درمیانی خط میں آ رہی ہیں اور اس طرح پیری نیم خوب مضبوط ہو جاتا اور لہذا جانتا وہ

وجہ اس طرح کو خوب سہاے رکھتا ہے۔
دوسرا اس طرح کہ سیون میں ایک چھوٹا سا آڑا شکاف دیکر اس کے ہر دوسروں سے ایک ایک

(الف)



(ب)




۱۔ انچ لبا لجا تے ہیں۔ جیسا کہ شکل (الف) میں نمونہ کے طور پر دکھلایا گیا ہے۔ تب زراید ہلے (الف) میں ریٹر کر کے ڈال کر خوب زور سے اوپر اور نیچر کی طرف زخم کے لبوں کو کھینچتے ہیں تاکہ زخم کشادہ ہو کر اسکی شکل نقشہ (ب) کے مطابق ہو جائے۔ ایک طرف زخم کے قریب خط الف پر ایک خمدار سوئی داخل کر کے خط ب پر اسکو

نکال لیتے اور پھر خط ج پر داخل کر کے خط د پر نکال لیتے ہیں۔ اس طرح چار پارچہ دھاگہ جب اندر داخل کر لینے چاہئیں بعد ازاں ایک ایک دھاگہ کو خوب زور سے کھینچ کر باندھ دینے سے تمام طوقین کا گوشت وسط میں جاتا اور زخم بہت جلد مندمل ہو کر سیری نیم خوب مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس شکلی میں قدیم پیری نیم کی ہر دو قطع جو چھٹنے سے الگ الگ ہو گئے تھے اب ہمیں مل ہو کر بدست ہو جانے اور نیزہ

کچھ زیادہ فائبرس ٹشو بھی آسین لجا جاتا ہے۔

چھٹا۔ قطع فم رحم۔ ایمپوشن آف دی سرکوس۔ سرکوس کو چاقو یا قیچی سے کاٹ ڈالنے کے بعد وہاں نیکی ممبرن کو فم رحم پر پٹی دینا چاہیے۔ جیسا کہ نقشہ ذیل میں دکھایا گیا ہے۔



کچھ نیا نیا اور امراض کا بیان دیکھو

Purulent Ophthalmia

دیکھو بیان پر ورس ورجیا کا

Prunus Serotina

پرونس لاروسس Prunus Laurocerases لاروسس فو لیا کا بیان دیکھو

پرونس ورجینیکا Prunus Virginica اسکے دوسرے نام پرونس سروٹینا۔

بلیک چیری اور وائلڈ چیری ہیں۔ اسکی چھال میں ہانڈرو سٹاک ایڈاؤٹینین بکثرت ہوتے ہیں۔ انھیں دو اجزا پر اسکی تمام تاثیرات منحصر ہیں۔ مخدر و مقوی اور مخرج بلغم ہے۔ مفصلہ ذیل امراض میں استعمال کی جاتی ہے۔

دکام، نزلہ، سرفیسچس، اسہال، اختلاج قلب، خشک کھانسی، بدبھی سل اور ذات الریہ۔

خمر فلوئڈ اکثر ۳۰ بوند سے ۶۰ بوند تک، انفیوزن دچھال ۲ اونس پانی ایک پائٹ، ۲ ڈرام سوڈا

تک ٹیکچر ۲ بوند سے ۳۰ بوند تک پرونس ایک گرین سے ۳ گرین تک، سرپ ۲ ڈرام سے ۴ ڈرام تک۔

کھلڑی، عضوتناسل کی جلد کا وہ حصہ جو غصہ میں قطع کیا جاتا ہے۔

Prepuce پری پوس

دیکھو عضوتناسل کے امراض کا بیان دیکھو۔

بعید نظری، بصارت کے نقصانات کا بیان دیکھو۔

Presbyopia پریسی اوپیا

پریشی کے امراض یعنی ایام حل کو امراض۔ ایام حل کے امراض کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

اول، معدہ و امعاء کے متعلق۔

(۱) غشیان و فے۔ اکثر تو خفیف ہوتی مگر بعض اوقات شدت اور کثرت ہوتی ہے کہ مریض ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں کر سکتی۔ اور کبھی غذا اور پانی نہ پہنچ کر کبھی ہلاکت تک نہ پہنچ جاتی ہے کبھی اسقاط ہو کر اس آفت سے نجات ملتی ہے۔

(۲) آسہال۔ کبھی ایسا سخت ہوتا ہے کہ اسقاط ہو جاتا ہے۔

(۳) قبض۔ اکثر رہتا ہے اسکی دو وجوہات ہوتی ہیں اول انشڑیوں کا ضعف دوم مقعد پر رحم کا دباؤ رہنا۔

(۴) بدبھی۔ عدم اشتہا۔ نفخ۔ شوک بکثرت قاعج ہونا۔

(۵) بواسیر۔ یہ مقعد پر رحم کا دباؤ پہنچنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔

دوم۔ خون اور دوران خون کے متعلق

(۱) اینمیا۔ اور ہانڈریمیا یعنی خون کا ناقص اور رقیق ہو جانا خفیف حالت تو ہمیشہ ہوتی ہے مگر جب سخت اینمیا یا

ہانڈریمیا ہو جائے تو قابل توجہ ہو جاتا ہے۔ شدت ہانڈریمیا سے اندام نہانی اور پاؤں پھول جاتے ہیں

کبھی کل جسم کا استفا ہو جاتا ہے۔ اسوقت برائش و زہر سے اسکا اشتہا ہو سکتا ہے۔ شکم کی وریدوں

پر رحم کا دباؤ پڑنے سے بھی ایسی حالت ہو جاتی ہے۔ انکی تشخیص فارورہ کی متحان اور علم علامات

سے بھی ہو سکتی ہے۔

(۲) کبھی کبھی اختلاج القلب یا غشی کا ہو جانا۔ یہ دو طرح سے ہوتا ہے ایک تو رفت و قلت خون سے

اور دوسرے قلب پر رحم کا دباؤ پہنچنے سے۔

(۳) ٹانگوں اور اندام کی ویدوں کا بھول جانا۔

سوم۔ فرج۔ رحم اور مثانہ کے متعلق

(۱) البیومی پوریا۔ یہ مفصلہ ذیل وجوہات سے ہو سکتا ہے اول قلت و رقت خون یا گروہ کی ویدوں یا یو سے ٹرس پر رحم کا دباؤ پڑنے یا بلڈ پریشر زیادہ ہونے سے دوم خاص برائٹس ڈیزیز کے ہو جانے سے صورت ثانی میں عام سقسقا۔ درد سر غٹیان قے پیشاب کا قلیل المقدار اور گاڑھا ہونا۔ امین البیومن خون اور کاسٹ وجود نہ رکھتی کہی تشخیص ہونا تشخیصی علامات ہیں۔ بخون کیوجہ سے اقطاع بھی ہو جاتا ہے۔

(۲) احتباس البول۔ جو رحم کے بے وضع کرنے اور فشار دباؤ پھینکنے سے ہو جاتا ہے۔

(۳) سلسل بول و قطط البول۔ رحم کا دباؤ مثانہ پر پڑنے سے ہو جاتا ہے۔

(۴) لیوکیوریہ۔ جریان برفیدی و فحیل جملع خون بہنے سے ہو جاتا اور وضع محل کے بعد دفع ہو جاتا ہے

(۵) اندام کی کھجلی۔ یہ سیلان بطوبت یا نقصان خون کے انتقال حیل عصابی سے ہو جاتی ہے

چھ۔ اعصاب اور دماغ کے متعلق

(۱) بے خوابی۔ بعض اوقات بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔

(۲) فوج و استرخا۔ مثلاً لقوہ۔ پیرالمیجیا۔ ہیپلیجیا۔ یہ اخفاق الرحم یا برائٹس ڈیزیز کیوجہ سے ہو جاتی ہیں

پیرالمیجیا رحم کا دباؤ سکل و بلبریکس کے اعصاب پر پڑنے سے بھی ہو جاتا ہے۔

(۳) اعصابی درد۔ مثلاً چہرہ پیشانی سینہ پستان اور کمر میں۔

(۴) کوریائینی رعشہ جس عورت کو پہلے سے کوریامہوا و سکوا یا م حمل میں دور ہو جاتا ہے۔ ابتداء بھی ہو سکتا ہے

ایک دفعہ ہو کر آئندہ کو حمل میں دور کرتا ہوتا ہے کبھی اس سے اسقاط ہو کر صحت ملتی ہو اور کبھی مریضہ

کو ہلاک کر دیتا ہے پس ایام حمل میں سکا ہونا خطرناک ہے۔

(۵) جنون اور اکلینیشیا۔ انکا بیان وجہ کے امراض میں دیکھو۔

پنجم۔ اعضا کے تشق کے متعلق

(۱) کھانسی جو انتقال حیل عصابی کیوجہ سے نتیجی طور پر ہوتی ہے۔

(۲) دکشی۔ پہلے مہینوں میں انتقال حیل عصابی کی وجہ سے ہوتی ہو اور آخری مہینوں میں ایذا

رحم کا دباؤ بہنے کی وجہ سے۔

نشیم بار آور حرم حرم کھا جانا یا اپنی جگہ سے گر پڑنا

(۱) آئینی ورشن یعنی رحم کا معمول کی نسبت آگے کی طرف زیادہ گر پڑنا جب ایسا ہوتا ہے تب نشیم

پر دباؤ بہنے کی وجہ سے سلسل بول یا قطط البول بہتا ہو کبھی آنٹی ورشن اس قدر ہو جاتا ہے کہ

کی دیوار کو ٹیکٹس عضلات درمیانی خط میں علیحدہ ہو کر رحم درمیان میں اور پیٹ لٹکا ہوا معلوم ہوتا ہے (۲) پرولپس - خروج الرحم جب ہم پہلے سے گرا ہوا ہو تو حمل کے بعد اور زیادہ گرجاتا ہے عموماً جو تھے مہینہ میں رحم پیڈوسے اوپر چڑھ کر شکم میں چلا جاتا ہے۔ مگر بعض حالتوں میں پیڈوسے کے اندر چھسارہ جاتا اور مثانہ و مقعد کو دبا کر پیشاب و پاخانہ کے متعلق تکالیف پیدا کر دیتا ہے مثلاً قبض بار بار حاجت ہو جانا دوست گنجانا سلسلہ نبول تقطیر البول - احتباس البول - آخر کار یا تو شکم کی طرف چڑھ جاتا ہے یا اسقاط ہو کر نجات ملتی ہے۔ (۳) ریٹرو ورتن - کبھی تو یہ حالت پہلے سے موجود ہوتی ہے اور کبھی صدمہ یا ضرب یا گر پڑنے سے ایام حمل میں واقع ہو جاتی ہے۔ اس میں رحم کا جسم پیچھے کی طرف گر کر روده مستقیم کو دبا لیتا اور اسکی گردن سامنے کی طرف بڑھ کر مثانہ کو دبا لیتی ہے۔ اس طرح سے مثانہ کا مزہ رک کر احتباس البول ہو جاتا اور مثانہ تنجاتا ہے اور دوسرے روده و دیگر قبض ہو جاتا اور بار بار حاجت معلوم ہوتی ہے پیٹ کو ٹٹولنے سے رحم نہیں معلوم ہوتا بلکہ میں انگٹ داخل کرنے سے پچھلی طرف گرا ہوا محسوس ہوتا اور فرج میں اونگلی داخل کرنے سے اونگلی گردن سامنے کو اڑتی ہوئی معلوم ہوتی ہے اسکا انجام یہ ہوتا ہے کہ یا تو چھتے مہینے کے بعد رحم اوٹھ کر شکم میں چلا جاتا ہے یا پیشاب نہیں بہنے سے اسقاط ہو جاتا ہے ورنہ مثانہ کے گلجانے یا پھٹنے یا پیشاب کا زہر چڑھ جانے سے مریضہ ہلاک ہو جاتی ہے۔

(۴) پیڈوسے کے جوڑوں کا ڈھیلا پڑ جانا۔ بعض اوقات یہاں تک نسبت بنتی ہے کہ چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا اور درد رہتا ہے۔

هشتم جنین اور اسکی جھلیوں اور انول وک انراض۔ اکلیان علیحدہ کیا گیا ہے۔ وکجنین اور اس کے متعلقات کا امراض۔

هشتم حالہ کے متفرق امراض۔ جنکا اثر جنین پر بھی پڑتا ہے۔

(۱) چیچک۔ حاملہ عورت کو یہ مرض ہو جانا خود اوکو اور نیز جنین کے واسطے مضر ہے۔ اس میں رحم سے پانی جاری ہونے اور اسقاط کا اندیشہ رہتا ہے کچھ کبھی اکثر چیچک ہو جاتا ہے۔

(۲) خسرہ اور سرکار لیٹ فیورہ اگر خفیف ہوں تو اندیشہ نہیں اگر شدید ہوں تو اسقاط ہو جاتا ہے۔

(۳) آتشک خواہ اجداسے ہو یا مرض نطفہ سے عورت کو پہنچا ہوا اس میں اسقاط کا اندیشہ ہوتا ہے۔

(۴) مانیفکسٹ انیفس اور قسط کے بخارات۔ اس میں جریان خون ہو کر اسقاط کا اندیشہ ہوتا اور نہ کبھی شدت حرارت سے جنین مر جاتا ہے۔

(۵) نیومونیا۔ یہ عورت کو بطن ہلاک ہوتا ہے۔ اس میں اسقاط اکثر ہوتا اور شدت بخار یا دکشی یا نقص خون کی وجہ سے جنین بھی اکثر مر جاتا ہے۔ ماں کا خون حمل کی وجہ سے پہلی رقیق اور ناقص ہوتا اور دکشی بہتی ہے۔ نیومونیا پر پچھالیف دونا لا ہو کر ہلاک ہو جاتی ہیں۔

(۶) سل اول توسل والی عورتیں حاملہ نہیں ہوتیں۔ اگر حمل ٹھہر جائے تو سل کا زور کم ہو جاتا ہے اور کبھی شدت بڑھ کر مملکت ثابت ہوتا ہے۔

(۷) امراض قلب۔ انکی شدت زیادہ ہو کر تنہا اور دکھشی زیادہ ہو جاتی اور رنگت زردی یا لہڑ جاتی ہے۔

(۸) یرقان۔ صفراوی نالیوں پر رحم کا دباؤ پڑ کر خفیف یرقان تو ہمیشہ ہو جاتا ہے۔ مگر بعض اوقات مہلک قسم کا یرقان ہو جاتا اور جگر کی بلو اٹرونی ہو کر مریضہ ہلاک ہو جاتی ہے۔

(۹) ذیابیطس۔ یہ مرض جنین اور حاملہ کی سطر خطرناک ہو خفیف کلائی کو سوریہ تو اکثر اسطر حیرت ہی پیدا ہو جاتا ہے کہ دودھ کی غلغلہ خون میں جذب ہو کر پیاب کو ساتھ خارج ہونے لگتی ہے

(۱۰) رحم کا سرطان۔ حمل کی حالت میں یہ مرض بہت جلدی ترقی کرتا ہے۔ اگر یہ حالت معلوم ہو جائے تو فوراً استقامت کر دینا چاہیے ورنہ بعد میں شکم گھولنے اور رحم میں چپا لینے کے سولے اور کوئی صورت بچہ باہر نکالنے کی نہیں رہتی۔
(۱۱) اور ری کی سٹ۔ اگر پیسنے یا متوم ہو جانے سے ہلک ترانج ہو سکتی ہیں پیدائش کی وقت انکی وجہ سے سخت روک واقعہ ہو جاتی ہے۔

(۱۲) رحم کی رسولیاں۔ حاملہ رحم کے ساتھ یہی بڑھتی اور وضع حمل کے بعد اصلی حالت پر آ جاتی ہیں۔ ان سے

پیدائش کی وقت دقیقہ نش آتی اور کبھی قبل از وضع حمل یا بعد از وضع حمل خطرناک جریان خون ہو جاتا ہے۔ چونکہ ایام حمل میں کار ہالک البتہ کثرت خارج ہوتا ہے اسلئے حاملہ عورت کو صاف اور تازہ ہوا میں رکھنا۔ اور ہلکی ورزش بھی کرنا چاہیے شکم اور سینہ پر کسی قسم کا تنگ لباس نہ ہو اور غذا لطیف سادی اور صریح لہضم کھلائی جاوے۔ ایام حمل میں مختلف امراض عموماً چار وجہ سے پیدا ہونے میں اول اسوجہ سے کہ رحم اور انجین کو جو پرورش لفظ کے لیے بہت بخلاف عادات قیامت برداشت کرنے پڑتے ہیں اسوجہ سے اعصاب اور اعضاے انہضام میں بفلکس طور پر بہت مافور رہا ہو جاتا ہے دوم اسوجہ سے کہ خون ناقص اور رفیق ہو جاتا ہے۔ سوم اسوجہ سے کہ گردہ اور شش پر زیادہ کام آ پڑتا ہے چھامہ اسوجہ سے کہ رحم کا اعضا و قرب وجوا بہ دباؤ رہتا ہے۔

فیل میں چند امراض ایام حمل کا علاج مختصر طور پر بیان کیا جاتا ہے۔

علاج اول غیشان حقے۔ بعض عورتوں میں یہ تکالیف اس شدت سے ہوتی ہیں کہ کوئی غذا یا دوا ہرگز معدہ میں نہیں رہ سکتی بلکہ فوراً اترتے ہو جاتی ہے۔ ایک جرمد آب یا برف کا ٹکڑا بھی ہضم کرنا دشوار ہو جاتا اور متواتر خافوشی سے مریض خوفناک حالت کو پہنچ جاتا ہے خفیف حالتوں میں محض سفید ملانج کافی ہے کہ امعاء کو صاف رکھیں صریح لہضم غذا میں قلیل مقدار میں تھوٹے تھوٹے وقفے سے پیتے رہیں مثلاً دودھ اور سوڈا وائر حریرہ یخنی شوربا اور فیل روٹی۔ یہیہ غیر شربت وغیرہ۔

لیکن سخت حالتوں میں بعض اوقات اگر لیکٹ آف بہریم (مکون فی خوراک) ٹائیرسٹ آف ہستہ یا ڈرو سا

کرے زوٹ منتعال۔ اگر ناک پیسین۔ انگلووین۔ برومانڈ آف پوٹاسیم۔ نائٹرو گلیسرین۔ مارفیا جلدی بچکاری
کو کین کیسٹیم کلورائیڈ۔ وائیم اپی کیک۔ ایڈرین کومیس۔ پنکرے ٹین۔ پارایلڈی مائڈ۔ وای برنم پونی فولیم
وغیرہ کے بعد دیگرے آزمائی گئی لیکن سوائے پائوسی اور حیرانی کے کچھ حاصل نہیں ہوا یہی حالتیں حسب ذیل
علاج کرنا چاہیئے۔

۱۔ دانہ کی بجھنے ہوئے ریفیہ کو چبائیں۔ اگر فائدہ نشی کی وجہ سے طاقت چبانے کی نہ ہے تو انکو بطور ستو
یا دیہ یا آرد مکی کی روٹی کھلائیں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ بعض مریضوں کو جب کسی دوائے کچھ فائدہ نہ دیا تو
مکی کے استعمال نے اپنا طلسماتی اثر دکھا کر فوڑا تے کو بنا کر دیا۔ اگر ضرورت ہو تو برف کو خلع کو سردی
پہنچائیں تاکہ رحم کی خراش نثار کے راستہ معدہ پر اپنا اثر نہ پہنچائے۔ مٹھا ریٹا اور سیلا ڈونا یا کولین
یا سیلا ڈونا کی تھی رکھیں تاکہ خود رحم کی خراش کم ہو جاوے۔ داخلی طور پر مسکات معدہ مثل ہسٹے ڈگریٹ
آف سیریم۔ ہائڈرو سائیکل ایڈ۔ اوپیم وغیرہ استعمال کریں تاکہ معدہ پر خراش کا اثر نہ ہونے پاوے
مقام معدہ کو اتھیرے سن کرنا۔ سرکس یوٹرائی میں کاسٹک لوشن (اگرین فی اونس کی طاقت کا)
لگانا چھارم انچ پیم لمبروٹی برکے مقابل ہسٹر لگانا مقام معدہ پر رائی کا ہسٹر لگانا اکثر سخت حالتوں
میں نہایت مفید ثابت ہوئی ہیں۔

اگر سرکس یوٹرائی میں اجتماع خون ہو تو اسپرچینڈو ٹکین لگوئیں اور اگر رحم ٹھیکہ گر پڑا ہو تو اسکو درست وضع
پر رکھ کر پیرسی سے اسی جگہ قائم رکھیں۔

اگر ان تمام تدابیر کے بعد بھی ناکامی ہے تو مریض کو بذریعہ حقنہ غذا پہنچاتے رہیں (اینا کا بیان دیکھیں)
آخر انجیل یہ ہے کہ اگر مریض کی جانبری اور کسی طرح متصور نہ ہو سکے تو اسقاط کر دیں (ا بارش کا بیان دیکھیں)
دوم۔ اسہال فیض۔ بدضمی۔ بواسیر اور کثرت لعاب دہن کا علاج عام ہول کی مطابقت کرنا چاہیئے۔
سوم۔ انیمیا۔ ہائڈرمیا۔ اختلاج قلب غشی۔ ویری کو زونیز وغیرہ امراض کا علاج عام قواعد کی مطابقت کرنا چاہیئے۔
چھارم۔ البیومی نوزیا کا علاج مرکبات فولاد۔ درات۔ مسہلات اور معرقات سے کرنا چاہیئے۔

تقطیع البول اکثر رحم کے انشی و رشن سے ہو جاتا ہے اسکو انسالی صلاح کریں پر وٹیس ولومی میں
برومانڈ آف پوٹاسیم داخلی طور پر اور لیڈ لوشن۔ اکوا استھمی وغیرہ خارجی طور پر کافی ہیں۔

پنجم۔ بخوبی کا علاج مطابق سبب کریں۔ فلانج اور دیگر اعصابی امراض میں یہ ضرور خیال رکھیں کہ اگر
نہ ہو۔ اگر برائیس ڈیزیز ہو کر یہ علامات پیدا ہوئی ہیں تو پوریمیا کا خیال کرنا چاہیئے اور اسقاط کی تدابیر کریں
لیکن اگر البیومی نوزیا ساتھ موجود نہیں تو کچھ اندیشہ نہیں۔ یہ مرض پیدائش جنین کو بعد خود بخود دفع ہو جاتا ہے
رعشہ اور نوریمیا کا علاج عام قواعد کے مطابق کریں۔
السیسٹائی اور انجیلیٹیا کا علاج زچہ کے امراض میں دیکھو۔

ششم۔ اینٹی ورشن آف وی یوٹرس کے لیے پشت پرچٹ لٹانا اور مناسب چٹکا باندھ دینا کافی ہے۔
 پرولیپس آف وی یوٹرس کیمالت میں مریضہ کو چھ مہینہ تک برابر آرام سے لٹائے رکھیں اور اصل جگہ پر رحم
 کو پہنچا کر پیری کے ذریعہ اسی جگہ اُسکو قائم رکھیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اسقاط کرادیں۔
 اگر ریٹروورشن آف وی یوٹرس ہو گیا ہو تو بذریعہ کھینچ پٹیاں نکال لیں۔ اگر کھینچ داخل نہ ہو سکو تو بیویز کے
 اوپر سے ٹوکا ر اور کینو والے کے ذریعہ مثانہ کو خالی کریں بعد ازاں شرنگہ یا مقعد میں انگشت داخل کر کے رحم کو اصل
 وضع پر لانے کی کوشش کریں اور اصل وضع پر لانے کو بعد بذریعہ ہاج صاحب کی پیری کے اُسکو قائم کریں
 اگر رحم اپنی اصلی وضع پر نہ آئے اور جس البول کے سوائے مثانہ کے بچٹ جانے اور یوریا وغیرہ کا اندیشہ
 ہو تو اسقاط کر دینا چاہیئے۔

ہفتم۔ بعض اوقات پیڈ کے جوڑ نرم اور کشادہ ہو کر رفتار شکل ہو جاتی ہے۔ یہی حالتیں مناسبت نسو سہارا دینا چاہئے
 ہشتم۔ ریفلکس کھانسی کا علاج۔ بیلادونہ..... اور پوٹاسیم برومائڈ سے کریں
 نهم۔ ایکلیپسیا۔ اسکابیان پوررل ایکلیپسیا میں دیکھو۔

پرلی سس اکولر Pralysia Ocular یعنی آنکھ کا استرخاشلا استرخا بخن جول
 پرلی سس الکمالک Pralysia Alcoholic یعنی وہ فلج جو شراب نوشی کی کثرت سے پیدا ہو
 پرلی سس انائی ایٹ ریختائی Pralysia Ani et Recti استرخا المقعد
 پرلی سس انفینٹیل Pralysia Infantile بچوں کا فلج۔
 پرلی سس ایجٹنس Pralysia Agitans رعشہ
 پرلی سس پروگریسو Pralysia Progiriso اسکا دوسرا نام پروگریسو سکو اٹرونی

پرلی سس پیری فرا Pralysia Peripherai یعنی ایسا فلج یا استرخا جسکی ابتدا اعضاء میں
 پرلی سس جنرل Pralysia General عام فلج۔ یہ کا دوسرا نام جنرل پرلی سس دی انسین جی
 پرلی سس ڈیفٹھریٹک Pralysia Diphtheritic
 پرلی سس سڈو ہائپرٹروفیک Pralysia Seudo-hypertrophio
 پرلی سس فرام سپائی ٹل کروکچر Pralysia from Spinal Curvature لقوہ چہرہ کا فلج۔
 پرلی سس فیشل Pralysia Facial
 پرلی سس لائڈرے Pralysia Laundre's
 پرلی سس لوکل Pralysia Local
 پرلی سس لیڈ Pralysia Lead

مفصلہ بالافانجون کا علاج ذیل میں علیحدہ علیحدہ درج کیا جاتا ہے۔

پیری فرل پریلیس۔ یعنی وہ تمام اقسام فالج یا استرخا جنہیں ابتداً مرض نخاع یا دماغ سے نہیں ہوتا بلکہ اعصاب میں ہی کوئی نقصان پہنچ کر حس و حرکت معزول ہو جاتے ہیں مثلاً استرخا البطن، حول، استرخا القعدہ لقوہ عموماً اسی قسم سے ہوتے ہیں۔ اس کے علاج میں سب سے مقدم سبب کا تلاش کرنا ہے عموماً کسی رسولی لگما۔ ذہیل۔ دبلیہ مردارہ کی غیر جنس شے بکائی وغیرہ سے عصب پر دباؤ پہنچ کر اس کے حصہ کے حس و حرکت زائل ہو جاتے ہیں۔ پس اگر ایسا کوئی سبب معلوم ہو تو جس طرح ممکن ہو دباؤ کو دور کرنا چاہیے بعض اوقات محض مکان، ضرب یا سردی سے دو مرتبہ ہو لگنی سے فالج و قہ ہو جاتا ہے۔ جب کوئی خاص سبب معلوم نہ ہو تو عام طور پر حسب ذیل علاج کیا جاتا ہے۔

(۱) مقام ماؤف پر ٹکڑ کرنا۔ الشین کرنا۔ رانی کا پلستر لگانا۔ چھالہ اٹھانا۔

(۲) جب مرض پرانا ہو جائے تو سر کی نیکی جلدی پیکاری کرنا اور داخلی طور پر قویات کو نین پکچا سکھانا اور فوٹو استعمال (۳) ایسی بجلی کا استعمال کرنا جس سے آسانی اور سرعت عضلات ماؤف کو حرکت ہو۔

لقوہ کا علاج کی بھی ہی تدابیر ہیں۔ کان کو پیچھے جو نکلین یا پلستر لگانا مفید ہے۔ داخلی طور پر ٹیم آئیوڈائیڈ زیادہ مقدار میں دینا اور اگر تشنک موجود ہو تو پارہ کی کمبکات کھلانا مفید ہوگا۔

سکوائٹ یعنی حول اور استرخا البطن میں گھنٹی پر پلستر لگا دینا ضرور اٹکے کے درمیان کی بجلی گزاریں اس طرح سے کہ اینوڈ مثبت پول، آکسیڈ پٹ پر اوکسیوڈ منفی پول، ایکٹو پٹر کھڑکیاں سے نکل بجلی پاس کریں۔

پریمیٹریس الکحالیہ۔ اس میں ہر قسم الکحالی سے قطعی پیچ کرانا ضروری ہے۔ باقی تدابیر وہی ہیں جو عام طور پر شرو میں بیان کی گئی ہیں۔ سر کھینا کھلانا اور بطور جلدی پیکاری استعمال کرنا تمام ادویہ میں زیادہ قابل اعتبار معلوم ہوتا ہے جس قسم کی بجلی سے ماؤف عضلات کو آسانی اور بزدلی حرکت حاصل ہو اسی کا استعمال کرنا چاہیے۔

پریمیٹریس انانیٹ ریٹائیٹ یعنی استرخا القعدہ پر سے لی س پیری فرل کا بیان دیکھو۔ اس میں اگر بجلی گزارنے کی ضرورت ہو تو ایک سر نخاع پر لمبر ریجن میں اور دوسرا درپر رکھ کر گزار سکتے ہیں۔

پریمیٹریس انفنٹائل۔ اس کے دوسرے نام کیوٹ اور فاک پیریسیس۔ کیوٹ انفنٹائل پیریسیس۔ پولیو مانی لائٹس اینٹی ریڈیو ایکٹو مختلف درجہ میں علین مختلف طور پر کیا جاتا ہے۔

اول۔ علاج درجہ اول جب کہ نخاع کے اینٹی ریڈیو ایکٹو میں سوزش ہو کہ علامات دردی قرار دی تھیں و بجا وغیرہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اس درجہ میں مریض کو آرام سے لٹائے رکھیں۔ ٹنگر کو نائیل و لائٹوارامو نیا ایسی ٹاس یا فینٹین اور کوئین وغیرہ ادویہ سے بخار کا دفیہ کریں اور سوزش نخاع کے لئے مقامی طور پر پمٹ کر وٹن۔

لنٹ اینٹی منی لینٹ آئیوڈین یا سے پرم یا گلاس وغیرہ کی کاؤنٹرائی ٹیشن کریں۔

اگر فالج کے طرف بالائیں ہو تو فقرات گردن کو مقابل کاؤنٹرائی ٹیشن کریں اور اگر اطراف تیریں ہیں تو کر کے مہر وٹن اور اگر ہر دو طرف میں ہو تو ہر جگہ پر شروع میں اگر ضرورت ہو تو کوئی تیر سہل مثل کیلول اور جلیپ یا کیسٹرائیل

دیکھتے ہیں۔ اگر بخار زیادہ ہو تو شراب و دیگر گرم پانی سے پیچ کرنا اور آئس بیگ ربرف کی تبدیلی، بخار بر لگانا چاہیے۔ لیکن جب سوزش بخار پر کچھ مدت گزر جائے اس وقت آئس بیگ کی جگہ کاؤنٹر آرمیٹیشن کا ایک یہ بھی فائدہ ہو کہ کچھ پھر کر نہیں لیٹ سکتا بلکہ پہلو پر لیٹا رہتا ہے جس سے بخار کے اجتماع خون کو فائدہ پہنچتا ہو۔ اس وجہ میں آرٹ بھی نہایت مفید بیان کی جاتی ہے۔ پلوٹاسیم آئیوڈائیڈ اور مرکبات پارہ کا استعمال سدرجہ میں با احتیاط کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس سے کمزوری بہت سخت ہو جاتی ہو اگر سقیراری اور تھنخی حرکات زیادہ ہوں تو پلوٹاسیم برومائیڈ اور کلورل ہائیڈریٹ شروع سے استعمال کرنے چاہئیں۔

دوسرے علاج درجہ دوم جبکہ عضلات اطراف بالا یا زیرین یا ہر دو میں علامات استرخاش شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ میں سٹرکینیا اور آرسنی ایل لیڈ سے عمدہ ادویہ ہیں۔ چونکہ سٹرکینیا سوسو بخار میں اجتماع خون ہو جاتا ہے اس لیے ابتدائی مرض سے کم سے کم ایک مہینہ بعد تک ہرگز ہرگز اس کا استعمال نہ کرنا چاہیے جب تمام علامات مقامی سوزش درد اور بخار کی سرخ ہو جاویں اس وقت یہ مفید ہو۔ عضلات ماؤف کی مائلز ورمی چابی کرنا۔ اگر ممکن ہو تو خود مرض سے ورنہ غیر کی مدد سے انکو حرکت دیتے رہنا۔ سٹی مولٹ لیمٹ ملنا اور بجلی لگانا انکو طاقت بخشنے اور ان کے زائل شدہ فعل کو بحال کرنے میں۔ بجلی لگانے کا ایک یہ ڈرافٹ فائدہ ہو کہ جو عضلات بحال ارادہ حرکت نہیں کر سکتے وہ اس کے لگانے سے متحرک ہو جاتے ہیں گویا کہ مصنوعی طور پر انکو اپنے فعل کی پرورش ہوتی رہتی ہو۔ گیلونیک بجلی کا ایک یہ بھی فائدہ ہو کہ اس مقام ماؤف میں کیمیائی تغیرات یعنی افعال تغذیہ و تحلیل کو خوب مدد ملتی ہو۔ اگر فیراڈک بجلی سے عضلات کو حرکت ہو سکے تو یہی لگانی چاہیے ورنہ گیلونیک کیونکہ جب تک عضلات کا اعصابی تعلق کس قدر باقی ہے اسی وقت تک فیراڈک بجلی کے لگانے سے عضلات کو حرکت پہنچگی اور فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن جب احساس بالکل فاسد ہو جاویں اور محض کھمی ریشہ ہی باقی رہ جائے اس وقت گیلونیک بجلی ہی عضلات کو حرکت دینی اور کارآمد ہوگی اور فیراڈک بجلی کچھ اثر نہ کیگی۔ دیکھو الیکٹریٹیٹی کا بیان، گیلونیک بجلی کا اینوڈ عضلات ماؤف پر اور کیتھوڈ نخل پر رکھ کر بجلی گذارنی چاہیے تاکہ عضلات پر پورا اثر پہنچے۔ فیراڈک بجلی کا دس منٹ روزانہ استعمال کرنا کافی ہے اور گیلونیک تین چار منٹ بعد میں آہستگی اس کے اوقات کو بڑھاتے ہیں۔

علاج درجہ سوم جبکہ بعض عضلات کو فاسد ہو جائے اور دوسروں کے مرکز جانے سے بد وضعگی سکڑ جائے ہڈیوں کا اپنی جگہ سے اکٹھا جانا وغیرہ کا کیف ظاہر ہوتی ہیں انکا علاج سرجن کو اپنی سمجھ کے مطابق حسب حالت مناسب ہلنتوں پھپھکوں اور پیٹی وغیرہ سے کرنا چاہیے۔

پریلی سٹس ایچیٹس۔ رعشہ۔ اسکوٹیک پالسی بھی کہتے ہیں۔ یہ مرض نامعلوم طور پر شروع ہو کر تیز ہوتا ہے خود بخود ہاتھ پاؤں رتے رہتے عضلات سخت ہو جاتے اور رفتار دگائی ہو جاتی ہے سر اور گردن اور لرزہ سے صاف رہتی ہے۔ مرض کا چہرہ اور رفتار زالی قسم کی ہو جاتی ہیں۔ ہاتھ کا انگوٹھا سیدھا اور باقی

اوپر گلیاں ٹیڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ بادِ جہم سے علیحدہ رہتے ہیں رگتکو سنت اور شکل ہو جاتی ہے کبھی زبان بھی لرز کر تھلا جاتی ہے جب مریض اپنے ارادے سے حرکت کرنی چاہتا ہے اسوقت ہاتھ پاؤں کا لرزہ بند ہو جاتا ہے۔ ایسے وہ مہلکہ باطن کھینچ سکتا ہے مگر لمبی بل سکی روسنس میں سبب باطن نہیں کھینچ سکتا مریض رفتہ رفتہ زایل ہو کر یا کسی عارضی بیماری مثلاً نیومونیا وغیرہ سے فوت ہو جاتا ہے۔

اسباب (۱) کثرتِ تفکرات و ترددات (۲) اختناقِ الرحم (۳) انتقالِ حواسِ عصابی مثلاً کرمِ امعاء اور زخموں کی وجہ سے (۴) تھکاوٹ شراب۔ چار قبوہ اور مرکباتِ پارہ کا کثرت سے استعمال کرنا دھیرے دھیرے مرض عموماً چالیس سال کی عمر کے بعد ہوتا ہے۔ اسکا اشتباہ لمبی بل سکی روسنس اور کوریبا ہو سکتا ہے تشخیص کے

علاج۔ اس مرض کا ابھی تک کوئی علاج قابلِ اعتبار ثابت نہیں ہوا کورائڈ آف بیریم ذہنی و لیبرے ناس۔ ہائیوین اور آرٹک مختلف حکماء کے تجربے میں مفید ثابت ہوئے ہیں۔ نخلع پر گلیوے نکات بجلی لگانا بھی مفید بیان کیا گیا ہے خفیف حالتوں میں مفصلہ ذیل نسخہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹینچر ہائیوین ۵ ہونڈ فارلس سالیٹرن ۳ ہونڈ ٹینچر و لیبرے ناس ۴ ہونڈ گلیسرین ۲ ہونڈ پانی ایک اونس ایسی تین خوراک روزانہ کھانے کے بعد۔ فاسفس۔ سٹرنکینا۔ پوٹاسیم برومائڈ۔ بیلادونا۔ ڈائروپین۔ پوٹاسیم آیوڈائیڈ۔ افیون۔ کیلورائیڈ۔ مینٹھریٹ۔ ارگٹ۔ کیورار۔ ایلیمینٹیم۔ ایڈ۔ ہائیڈروبرومک ڈائی لیوٹ۔ اکیٹار۔ سی موزار۔ کونین۔ سلفاس۔ اینٹی پائیرین۔ اینٹی فیبرین۔ اپومارینا۔ سکلورنائیٹ۔ ہینگ۔ کافور۔ مونو برومیٹ آف کفر سیری آئی اگر نالیس۔ کاسن سوینا۔ کونائین۔ ہائیڈروبروماس۔ سالی پرے پیڈیم۔ ارگوٹین۔ ایسیرین۔ فیبری۔ اسی نیاس۔ فیبری برومائڈ۔ لوبلیا۔ پکروٹاکسین۔ سے ٹریا وغیرہ ادویہ ہیں مفید بیان کی جاتی ہیں لیکن کوئی انہیں سے قابلِ اعتبار نہیں ہے۔

بچوں میں یہ مرض اکثر حشفہ کے امراض سے پیدا ہو جاتا ہے اور خندہ سے جاتا رہتا ہے۔ عورتوں میں امراض رحم و طمث سے اکثر لاحق ہو جاتا ہے پس انہیں اگر کوئی مرض اعضائے ولادت سے متعلق ہو تو اسکا علاج سب سے مقدم ہے۔

پرولیسی پر وگرسو۔ بلبر پرے لی سس کا بیان دیکھو۔ پرولیسی سیری فرل اسکا بیان شروع پرے لی سس میں کیا گیا۔ پریتلی س جنرل۔ اسکا نام جنرل پرولیسی آف دی انین بھی ہے۔ اہم ابتدائی حرکات رفتہ رفتہ ناقص اور کمزور ہوتی جاتی اور ساتھ ہی دماغی قوا ناقص اور خراب ہوتے جاتے ہیں پس عضلات کلام ماؤف ہو کر آواز مولی ہو جاتی اور پالاب تھوڑا سا پھر زبان لرزے لگتی اور بولنا دشوار ہو جاتا ہے بعد میں جسم کے اور عضلات ماؤف ہو کر قرار شربوں کی طرح ڈھکائی ہو جاتی ہے آخر کار مریض بالکل بے بس ہو کر بڑا رہتا ہے بولنے اور چلنے پھرنے کی طاقت جاتی رہتی ہے شروع سے دونوں گھٹکی تیلیاں چھوٹی بڑی رہتی ہیں کبھی کبھی مرگی کی قسم کے دورہ ہوتے رہتے ہیں۔

پڑے رہنے اور جلد کی بھیجی سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ دماغی فسادات کبھی جسمانی نقصانات کی پہلی ہوتے ہیں اور کبھی بعد میں شروع سے بخوبی سمجھنی گھبراہٹ اور اداسی ہو کر مانگو لیا ہو جاتا ہے۔ لیسان غالب رہتا اور آوارہ طور پر پھر تار تار ہے۔ ایک بات پر خیال قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ نقصانات بڑھتے بڑھتے مریض بالکل سادہ لوح اور محجوب الحواس ہو جاتا ہے شروع سے یہ ایک ضروری کیفیت ہوتی ہے کہ کیسی بڑی ہمہ کے واسطے اسکو کہا جاویں فوراً مادہ ہو جاتا ہے جس طرف جا ہیں فوراً اسکو مائل کر سکتے ہیں مگر ترجیح سخت جذبات بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ بے بنیاد شہنی بڑائی، بہادری، حشمت اور وجاہت کو خیال کیے بعد دیگر کم پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ان تمام علامات میں کبھی کبھی وقفہ بھی ہوتا رہتا ہے **مفصلہ ذیل**
امراض سے اسکا اشتباہ ہو سکتا ہے۔ عام فالج جو دماغ میں خون خارج ہو کر دماغی ایسا لازم یا تھرمبوس سے پیدا ہو۔ اعتناق الرحم۔ کوکوموٹا رائیکسی جنون الخم جنون پرہی۔ مسکوٹرونی۔ پرلیس جنبل کی تشخیصی علامات حسب ذیل ہیں جو اسکو دیگر تمام امراض سے پہلے کر دیکھ کر
 ۱۔ شروع سے عضلات کلام کا ضعف اور لرزہ دم، ارادی حرکات کا رفتہ رفتہ ناقص اور بیدہب ہو جانا۔
 ۲۔ دماغی تواضع اور ہودگی (دم) رفتہ رفتہ قویٰ و تعلیم میں فتور آنا۔

انجام پوری صحت متاثر و نادہی حاصل ہوتی ہے کادورہ کبھی تین چار مہینہ اور کبھی چار یا پنج سال تک رہتا ہے۔ دس سال تک بھی دیکھا گیا ہے۔

اسباب جوان مردوں میں ۳۰ اور ۵۰ سال کے درمیان اکثر ہوتا ہے۔ دماغی ترددات و تفکرات۔ کثرت فکر و طمع و محنت و دماغی اور ضربات سر اسکا باعث ہو جاتے ہیں۔ اصل کیفیت۔ دماغ کے پردہ اجتماع خون سے منے ہو جانے اور دماغ کی کارٹریل حصہ میں کنکریٹوٹو یا ہو کر اعصابی ذرات میں چرپی پڑ جاتی ہے یہی فساد نخاع اور ہیموٹھینک گینگلیا میں بھی دیکھا گیا ہے مگر یہ فسادات دائمی نہیں ہیں اسلیو حکما کا البتہ اتفاق نہیں ہو

علاج یہ مرض اسکی تک لا علاج شمار کیا جاتا ہے جو کالیف نکلا ہر یوں انکی مدافعت کرتے نہیں بھضل ہی قدر ہمارے اختیار میں ہی مسٹر کلینٹا اور کرسپ کے تجربات کے تھراپید و لاتے ہیں انکی یہ سنے ہو کہ تمام فطرہ جنون اور استرخاء و فالج وغیرہ اس مرض میں سطح پیدا ہوتے ہیں کہ دماغ کے کارٹریکس میں خراش اور دم ہو کر طو متیں خارج ہوتی اور دماغ پر دباؤ پہنچا کر یہ علامات پیدا کرتی ہیں۔ اس بنیاد انھوں نے کھوپری کو ٹریٹین اور فلوئورٹم کو قطع کر کے دماغ پر سے دباؤ کم کیا جن مریضوں میں یہ عمل کیا گیا انکو نہایت آرام ملا۔

پرہیزی و فحش ٹیک۔ اس سے مراد وہ فالج ہے جو فحش کے ضمن میں پیدا ہوتا ہے۔ فو الحقیقت یہ ادون تمام فالجوں کا نمونہ ہے جو سخت بخارات مثل ٹائیڈ لیبنگ بکالیٹ چیک نیوٹو یا پچیش اور وجہ مفاصل کے ضمن میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ فالج کی علامات او وقت ظاہر ہوتی ہیں جب مریض

دُفقیہ مارے اچھا ہونے کو ہوتا یا بالکل اچھا ہوتا ہے۔ کبھی دو چار یوم یا ہفتہ تک وقفہ سے شروع ہوتا ہے کبھی یہ عین شدت دورہ کی حالت میں بھی ہو جاتا ہے خفیف تکلیف مثلاً خارش حلق کے بعد بھی کبھی فالج شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی تو فالج محض حلق اور نالوں میں محدود رہتا ہے جس سے آواز بچھ جاتی اور ٹھنڈا شور ہو جاتا ہے چہرہ کے عضلات کا فالج ہو کر دیوانوں کے مشابہ ہو جاتا ہے لٹکا رہتے ہیں اور اللین بکتی ہیں یہ حالت کبھی مختصر عارضی ہوتی اور کبھی مدت تک رہتی ہے سخت حالتوں میں فالج بڑھتا جاتا اور مختلف حصوں کو یکے بعد دیگرے رفتہ رفتہ مفلوج کرنا جاتا ہے یہاں تک کہ قریب قریب کل جسم مبتلا ہو جاتا ہے۔ اطراف میں ہلچل ملن یا سننا بہت محسوس ہو کر حس باطل ہوتا ہے ضعف بڑھتے بڑھتے فالج کی نوبت ہو جاتی ہے۔ آنکھیں نا بینا ہو جاتی ہیں اور کبھی پریسی اوپیا یا مائی اوپیا یا ڈیپلر یا ہوتا ہے پتیلیاں سُست اور کم و بیش ہو جاتی ہیں مثلاً مبتلا ہو کر تقاطر اور احتباس البول کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اگر حركات قلب و تنفس میں خلل نہیں آیا تو انجام بخیر ہوتا ہے۔

اسکی اصلیت کی نسبت اختلاف ہوا بعضوں کا یہ قول ہو کہ سخت ضعف اور انیمیا ہو کر فالج ہوتا ہو (۱) ڈاکٹر ویلیو کا یہ تصریح کو دو خیال ہیں ایک یہ کہ خون میں فضلات کو ختم ہونے سے فالج ہوتا ہے۔ دویم یہ کہ اعصاب میں مقامی سوزش ہو کر ہوتا ہے۔

کیفیت بعد مرگ بھی یقینی طور پر ثابت نہیں ہوئی اعصاب و مخاع کے آنٹی ریر کا نو ایں ورم و فکھی گئی ہے علاج۔ یہ مرض جیسا کہ اپنی ظاہر علامات میں خوفناک معلوم ہوتا ہے ویسا ہی علاج پذیر بھی ہو اس کے علاج کالب لبا ب و فقرات میں محدود ہو کہ غذا با فراط دیں و قلب کشش کی حرکات پر برابر توجہ رکھیں۔

پیشہ سے سی دودھ بھینڈ نہ شرت۔ ایک فلپ پینٹی شور و جلی و روغن زرد بالائی وغیرہ با فراط دیں۔ اگر معدہ کو خاص طور پر مضہم نہ کر کو تو مصنوعی طور پر اکلوز و مضہم ہا کر کھلاویں مثلاً گریں پنکرے مین اور ۲۰ گریں سوڈی پلی کا رب ایک اونس پانی میں حل کر کے ایک پائٹ دودھ میں ملا دیں و اس دودھ کو ایک گھنٹہ تک ۱۱۰ درجہ فارنہائٹ پر گرم رکھیں چھانسن کو بھی یہی طریقہ پیشو نایز کر سکتے ہیں کہ ڈیڑھ گھنٹہ بار چھانسن کو اس آل میں بھگو رکھیں بعد میں اسکو تین چار دوش جلدی سے دیکر اتار لیں بیغ بی کے لئے نصف اونس الکلورائیڈ کرکٹر فی پائٹ کے حساب سے ملا کر سوڈی بانی کا رب ملا دیں اور تب ہو درجہ حرارت پر دو گھنٹہ بار بھگو رکھیں اگر بوجہ ہتر خاوری مری کے غلغلہ میں نہ پہنچ سکے تو ایک کپچر ڈیڑھ ٹیوب ٹاک کو اندر سے متحدہ تک پہنچا کر بذریعہ پچکاری غذا میں اندر پہنچا دیں یا بذریعہ شاک پپ ڈگریا کرنے میں سخت وقت معلوم ہو تو بذریعہ حقنہ مرض کی پرورش کرتے رہیں غرضیکہ جسطرح ممکن ہو جسم کی بخوبی پرورش کرتے رہنا ہے مقدم علاج ہے۔

دویم اگر مرض کمزور و دیرپا نہ ہو یا ضعف قلب کی اور کوئی علامات معلوم ہوں تو فوراً امونیا کاربوناٹ و ڈیجی ٹالس سٹروینٹھن ڈیوٹی وین سپرٹ انیخیر الکا لک ٹی مولٹس وغیرہ اندر دینی طور پر تھوٹے تھوٹے وقفے

بار بار دیں۔ ہاتھ پاؤں پر مالش سینہ پر فریڈ ایزلین۔ پاسے پزم کریں اور امونیا کاربونا س بار بار سنگھاتے رہیں عموماً دقتیں بامیں ہوت ہیں اچانک غشی ہو کر دل قہ ہوتی ہے اسلئے قلب کی طرف ہر وقت خاص توجہ رکھنا اور ضعف قلب کا فوراً علاج کرنا نہایت ضروری امر ہے۔

سوم عام مقویات فولادینگھیا۔ کوئین اور سٹرکینا سے عضلات اور اعصاب کی طاقت قائم رکھیں کچل کی نسبت یہ امر قابل یادداشت ہو کہ شروع درجہ فالج میں اسکو ہرگز استعمال نہ کرنا چاہیئے۔

ہر دو قسم کی بجلی اس فالج میں نہایت مفید ہو مگر شروع درجہ میں اسکو استعمال نہ کرنا چاہیئے۔ اسکا بیان پیرلی سس انفنٹال میں نہایت عمدہ طور پر کیا گیا ہے۔ رائی سوئچہ مسرخ مرج۔ اور جانفیل کی مالش کرنا بھی نہایت عمدہ محرک دوران پرورش کنندہ و تقویت دہندہ عضلات ماؤف ہو۔

پیرلی سس سیوڈو ڈوائی پریٹروفاک۔ اسکا دوسرا نام ڈیچن صاحب کا فالج بھی ہے۔

یہ ایک بہت دیر پا مرض ہے پہلے ناگوں اور کمر کے عضلات ماؤف ہوتے ہیں۔ پھر باقی جسم کے ماؤف عضلات ظاہر ہوتے اور سخت ہو جاتے ہیں سگدر اصل لحمی ریشے تو پتلے پڑ جاتے یا ذلیل ہو جاتے ہیں اور انکی بجائی چربی اور فائبرس نشور زیادہ ہو کر عضلات کو موٹا اور سخت بنا دیتا ہے۔ اسی واسطے اسکا نام جو ٹھنی فزبی کا فالج ہے۔

دیرے کی سس فالج سیوڈو جینی کا ذب ہائی پریٹروفاک یعنی فزبی)۔ اسکی خاص علامت حسب ذیل ہیں د، پنڈلی۔ ران۔ اور کمر کے عضلات پشت کی جانب بہت موٹے اور سخت ہو جاتے ہیں (۲) مریض کا جسم

استادگی کی حالت میں ڈنگنا معلوم ہوتا ہو وہ ناگوں کو چوڑی ایڑوں کو اوٹھائے ہوئے اور شانوں کو پچھلی طرف اور ہاتھوں کو پچھلائی رکھتا ہے تنک کی ٹون نکل آتی ہے خفیف دھکے سے مریض گر پڑتا ہے دم جبڑ وقت بھی ناگوں کو علیحدہ رکھتا اور پاؤں کی اوٹھکیو پڑ جاتا ہے پہلو کا جسم کو ایک پاؤں پر سہارا پھر دوسرا پاؤں اوٹھا کر اوپر لگاتا

اگریشا ہو اور قوت اوٹھنا اسکو دھکی بہت دشوار ہوتا ہے (۴) دماغی قواؤں میں بعض اوقات ناقص ہو جاتے ہیں

۵ برقی صفاقص ہو جاتا ہے (۶) ریفلیکس حرکات پہلے ناقص پھر معدوم ہو جاتی ہیں۔

انجام مریض عموماً اعضائے تنفس یا قلب کو مبتلا ہونے یا انہما سے ضعف یا دوسرے ضمنی امراض سے فوت ہو جاتا ہے علاج۔ یہ مرض ابھی تک قطعاً لا علاج ہے۔ فریڈل اوگیلویک بجلی سنگھیا۔ سٹرکینا لپوٹاسیم آیوڈائیڈ فاسفرس۔

فولاد۔ اسپین مفید بیان کئے جاتے ہیں

پیرلی سس فرام سچائی نل کرو پچر۔ اسے علاج کے لیے پائل کرو پچر اور کیریڈ کا بیان دیکھو۔

پیرلی سس فٹیل۔ لقوہ پیری فرل پرے کی سس کا بیان دیکھو۔

پیرلی سس لائڈرینز۔ اسکا دوسرا نام پیرے لی سس اسپینڈیلینس اکیوٹا ہے یعنی جلدی ہو

اوپر کو چڑھنے والا فالج یہ فالج اوٹھکیو نہیں شروع ہو کر کل پاؤں کو مبتلا کر لیتا اور یہاں سے پھرتا ہوا کل جسم

میں پھیل جاتا ہے عضلات ایسوزائل نہیں ہوتے اور ری اکشن آف ڈیجریشن بھی ظاہر نہیں کرتے ہیں۔

رفعیکس حرکات یا تو ناقص یا معزوم ہو جاتی ہیں مثلاً اور متحدہ صاف پستے میں جس لامسہ میں بہت کم خلل آتا ہے۔ مائی لائٹس کا بیان دیکھو۔

پہلی سس لوکل - پیری فرل پرے کی سس کا بیان دیکھو۔

پیریلیس لیڈر اسمیں گیلونیک بجلی مفید ہو ایک سر ازبان پر دوسرا مقام معدہ یا ایک سرافقراں پر دوسرا معدہ عضلات
ماؤف پر رکھنا چاہیے۔ خود سلسلہ فقرات میں کو بجلی گذارنا بھی مفید ہے۔ اس سے دوفائدہ حاصل ہونے میں
ایک تو یہ کہ ماؤف ساختوں سے علیحدہ ہو کر بذریعہ پیشاب خارج ہو جاتا ہے دوسرے یہ کہ عضلات کی پرورش
اور تقویت کو مدد ملتی ہے۔ ڈاکٹر سموا صاحب اس طرح بجلی گزارتے ہیں کہ مریض کو الیڈ باتھ میں بٹھلا کر ایک
سر ازبان پر اور دوسرا سر اپانی کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے بھی اسکے پیشاب کو راستہ بخوبی خارج ہوتا
ہے۔ علیحدہ علیحدہ عضلات اور اعصاب میں بھی گیلونیک بجلی پاس کرنا مفید ہو کہیں کہیں صبح کے وقت میگنیشیا
سلفاس تین ڈرام کی خوراک میں دینا اور پوٹاشیم آیوڈائیڈ تین دفعہ روزانہ پانچ گرین کی خوراک میں دینا اخراج
سکھائی دے دیتا ہے۔ باقی تدابیر اسطرح ہیں جو عام طور پر پیریلیس میں بیان کی گئی۔

پہلے تان کے امراض۔ انکی مختصر فہرست حسب ذیل ہے۔

۱۔ بعض اوقات بچپن میں جبکہ یہ غصہ واپسی انہدالی حالت میں ہوتا ہے بعض اوقات خفیف ورم ہو کر کمر
پستان دردناک ہو جاتا اور اس کا گرد و گچھلہ نیلگون ہو جاتا ہے جب یہ تکلیف ظاہر ہو تو اس کا علاج صرف
استعداد ہے کہ سینک کرین اور گرد و ضرب سی دردناک حصہ کی حفاظت رکھیں۔

دوم۔ ایام جل میں بعض اوقات پستان بہت جلدی بڑھ کر سوج جاتے اور اسکو سطح پر انگشت چھینے کو گھسیٹنا محسوس ہوتی ہیں اس تکلیف دور و محض ناف حصہ ہی محدود نہیں رہتا بلکہ شاذوں اور شکم کی طرف بھی پھیل جاتا ہے۔ ہمیں پوئیسیم آیوڈائیڈ اور اینٹی بائیوٹکس کا داخلی استعمال مفید ہیں ساتھ ہی سینکڑے مینا اور پولیوٹیشن لگانا ضروری ہیں۔

تسومہ جبکہ ایامِ حل میں پستانِ اسطح سے بڑھ کر دردناک ہو جاتی ہے تو بعض اوقات ایک لوبہ یعنی حصہ پستانِ بڑھ کر رسول کی صورت نمودار کر دیتا ہے گمبہ یا درکھنا چاہیے کہ ایامِ حل میں سولی کا نمودار ہو جانا نہایت ہی خافہ ہے جب اسطح سے محدود و نرم ظاہر ہو تو اسکا علاج بھی معمولی طور پر پولٹشوں سے کریں۔ رفع درد کو لینے انٹی پیٹرین اور نوٹائیم ڈائیڈ کھلائیں۔

بعض اوقات ایامِ حمل میں قحی قسم کی ترقی پستانیں ظاہر نہیں ہوتی اور پیدائش کے بعد دودھ بالکل نکل کر تمام حالت کا نامور لگ سکتا ہے۔ یہاں علامہ فرید شاہ دویہ کے اناج سے تنقضا کر کے دیکھنا اور ان لگ سکتے ہیں۔

پنجم۔ میٹائٹس۔ ورم پستان۔ ورم الغدین۔ اس مرض کی ابتدا عموماً اسطر جبر ہوتی ہے کہ ایک پستان کا سر دوسرے کی نسبت چھوٹا ہو کر کچھ کو انکے چومنے میں دقت معلوم ہوتی ہے اور جب سے اسکی دوسری

پستان کو زیادہ تر چونکھانا شروع کر دیتی ہے جو کبھی نتیجہ ہوتا ہے کہ شیر کو خارج ہونے کی وجہ سے ناقص پستانیں خون زیادہ جمع رہتا اور پستان کے متورم ہو جانیکا باعث ہو جاتا ہے پھر ورم کی حالت میں جب کچھ اسکو چھو گھتا ہے تو ماں کو سخت تکلیف معلوم ہوتی اور اسکا بچہ گھٹا کم کر دیتی ہے پھر ورم بڑھتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ منہ اس ورم میں چھپ جاتا اور بچہ کے لئے دودھ چونکھنا نامکن ہو جاتا ہے پس جب سر پستان چھوٹے بڑے ہوں تو ہمیشہ شروع سے انکا خیال رکھنا چاہیے اگر خفیف زخم یا شقاق کی وجہ سے دودھ چونکھانے میں وقت واقع ہو تو خالص طبیعت یا زنک اینٹینٹ لگا کر اسکا خراش کو تسکین دیں اگر منہ کا دہانہ کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو تو کلاس لگا کر اسکو صاف کر سکتے ہیں اگر کچھ کو کسی وجہ سے ایک پستان کا پورا دودھ نہ پلایا جا سکے تو مصنوعی طور پر گلاس وغیرہ کی مدد سے دودھ نکالتے رہنا ضروری ہے مصلحہ بالاتدابر سے ورم پستان کا اندازہ ہو سکتا ہے لیکن عموماً شروع میں کوئی مضر طبیعت تک نہیں پہنچتی بلکہ اسی وقت طبیعت کی طرف رجوع ہوتی ہے جبکہ با احتیاطیوں اور لاپرواہی کی وجہ سے پستان اچھی طرح متورم ہو جاتی ہیں پس جب ورم صاف ہو کر ظاہر ہو جائے تو اسکا علاج حسبِ قیاس ہو۔

ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ پستان ماؤف کو سٹریپ کر کے آرام دینا سینک کرنا پوسٹین لگانا جو کونو نو خون کر دینا۔
تشخیص و دلیلہ اند میں ہمیری البیس پستان کا پھوڑا اسکا علاج ان اصول و قواعد کے مطابق کرنا چاہیے جو عام طور پر البیس کے بیان میں مذکور ہوئے دیکھو بیان البیس کا پستان کے دلیلہ میں محض دو امور خانہ زن اول یہ کہ تکاف ہمیشہ نالیوں کو متوانی یعنی محیطی مرکز پستان کی طرف کو دینا چاہیے۔ دوم یہ کہ اخراج پیپ کو وقت حتیٰ الوسع کوئی وباؤ نہ دین۔ کیونکہ خود پستان کے لحمی ریشہ سکر کر پیپ کو صاف کرتے رہتے ہیں سوم یہ کہ نامانی سیٹیک نہ ابر کی پائے طور پر پابندی کریں تکاف کو بعد دس بیچ خوب داخل کر کے انہی پائے ڈریسنگ لگاویں۔ چہاں یہ کہ پستان کا پھوڑا تین جگہ پر واقع ہو سکتا ہے یعنی خاص پستان کو اندھا خانہ پستان کے باہر اور جگہ کے پچو یا پستان کے پچو جبکہ پھوڑا پستان کے پچو واقع ہو اسوقت اسکی تشخیص نہایت دشوار ہوتی ہے۔

ہفت روزہ اندھین میں یہ عموماً دلیلہ کے بعد بر ملا جی کو چھو باقی رہ جاتی ہیں انکے اندر کا شکشن اگر گین فی انوس یا ٹیکلر اوڈین کی بیماری کرنا مفید ہو سکتے ہیں اگر سطر سے آرام حاصل ہو تو تکاف ہو انکو کشادہ کر کے ڈریسنگ خوب داخل کریں اور انہی سیٹیک ڈریسنگ لگاتے رہیں۔

ہشتم دلیلہ کی سیل دودھ کی تھیلی یہ عموماً کسی دودھ کی نالی کی بند ہو جانے یا پھٹ جانے سے ہوتا ہے یا کبھی اسکا علاج یہ ہے کہ تکاف دیکر معمولی زخموں کی طرح اسکا علاج کرتے رہیں۔ اسکی تہیں انکو پریدام ہو کر غار معدوم ہو جاتا ہے۔
نہم پستان کی رسولیان یہ تھیلی واریا سخت مختلف اقسام کی ہو سکتی ہیں اسکا علاج رسولیوں کے علاج کے مطابق ہے۔ دیکھو بیان ٹیومر میں کا۔

دھم شقاق سر پہ تان اس میں خالص گلہ سرین کا نایاب فی کی گدی رخنہ یا خشک نشاستہ یا بونہ
یا آگ آف زک یا الیٹ میگنڈیا پھر فی منیدہ

پسچول آفتیلیا Pustular Ophthalmia کنجکٹائیوا کے امراض کا بیان دیکھو۔

پسڈیا ایری تھرائنا *Pisidia erythrina* آجرو اور دیگر اوبھی

آجیر کاواک ڈولیاں دیکھو۔

پسیدین Piscidine

پسینہ کے امراض: بعموماً پانچ قسم کے ہیں۔ آسمی، ڈیوسیس، متفقہ، پسینہ، اینجی ٹوروس

رقعت لیسینہ اگرچہ ڈور و سبز رنگ دار لیسینہ انانی پری ڈور و سبز لیسینہ کنٹر لیسینہ لودروس یعنی خون آنکھ لیسینہ

اول، آسمی دُروس یا برومی دُروس یعنی بدبودار سپینہ نعل اور پاکون میں اکثر یہ مدح ظاہر ہوتا ہے یہی نیا جادو یا فو

کار مالک ہوا اور گرم باہار کے ساتھ خوب ہو کر کار بالک لے شین ریلہ کی طاقت و خوبئیں سے غیبت کریں بھونڈا

سلاسل اسلیم حصہ اور نرواک ایسٹ حصہ نکاتہ حصہ میں ملا کر پور پورین یاد کو افسردہ کی طاقت کا

کروہاک اسٹریٹس، کاکا ٹاکا کرس۔ انگلستان آف پورک ایڈمنٹنٹ بھگو کر اور خشک کر کے بخل میں گدھی کے

طہر رکھو، اور باؤن کے وسط موزوں کو سطح طہار کر لیں، یا نیچھا، حصہ گلہسن، حصہ اور الگ کیا حصہ

میرا کلا اکبر : ہاکا فوجہ حصہ تھا ، حصہ نشاستہ : حصہ مہر : ہاکا حصہ ٹکڑے : ہاکا ہوا فوج گنڈ سیکو کو : ہونو فوج

دومہ انڈوسر سے یعنی زیت لسنہ پر مرض عموماً مفضلاً حالت میں ظاہر ہوتا ہے۔

(۱) شروع و درجہ خفایات میں (۲) مسلسل البول، غیاہ طبعیہ اور ریٹینس، (۳) طبعی امراض مثل کتھوس

سے راسخ و رازگو غیہ جنہم کہ جاسخت اور غرور و سستہ فاسدینہ جاتے ہیں۔

سموم کرم و زہر سنبلہ رنگ دار اس زہر میں مرض ہستہ، رشاد و ناور و کھنکھہ ہوتا ہے۔ علاج الکاح معرق۔

در او ز صلہ جان داد و بر سر کمان جا سخن

حکیم ہمارے یزید دقہ کا کہتا ہے اولا جنہ لہو کا جسم کا۔ دوں لہو کا کہ باخا صر حصہ شمل

پھر اس کی پیری دوروس یہ دوسرا ہوا ہے افسوس برسوں کی ان کی زندگی میں جیسا کہ اس سے پہلے

[illegible]

جائے اور وہاں پہلے ان کی سی سلاٹیں دم صلیب بروائے صلیب سانسے ان صلیب دار چہرے کا یا جس صلیب سیر کے

ماتر لڑایا خالص بورک ایچھر لاجی عیدیں۔ دائرہ میرا صاب ہی اور پاؤں و پستینیں لبریں دیں سونے کے ہیں۔

یہ بلا شکر و میلین ہونے پہلا ارمس پچھلے سے اور جبراسو باکھ اور بانوں پر میت دی وری باندہ جراب پہناؤ

ہیں۔ سطر جسے ایک دو ہفتہ برابر دو دفعہ روزانہ لگائے لیکن ہاتھ اور پاؤں کو دھو لے ہیں۔ آخر کار باریک

جھلی اترکے پاؤں اور پشلیاں صاف نرم اور خشک ہو جاتی ہیں۔ جنرل ہانی پری ڈروئس میں مفصلہ ذیل اور

مفید ثابت ہوئی ہیں۔ لیمتھورک ایسڈ (خوراک ۳۰ کرین) اثر دینے پر بیلا ڈونا، فاسفورک ایسڈ و الیٹھ سلینورک

جیورنڈی، فری پرکلورائیڈ، ریوس ٹاکس کوڈنڈرن، یمنین، سلفوئل، ڈیلووالی سین، کوڈو، سکریٹن، آگسٹ آف
زنک۔ ان ادویہ کا بیان دیکھو۔

جو کثرت پسینہ کہ مرض میں ظاہر ہوتی ہے اس کے لئے کیمفولائیڈ، اڈروپین، آگسٹ آف ٹیک سے اعلیٰ درجہ پر مفید ہیں
پنجم نمبر می ٹی ڈوس، یعنی خون آمیز پسینہ یہ مرض معمولی طور پر عروق شریہ جلدی و جریان خون ہو کر ظاہر ہوتا
ہے اس لیے اس کا علاج ایک معمولی علاج ہے مقامی طور پر جاس الدم ادویہ لگانا اور داخلی طور پر آرگوٹین
یا سلورائیٹ استعمال کرنا کافی ہیں

پکراز مالو اسی آئیڈز اسکا دوسرا نام بروشیا کو اسی آئیڈز
ہے۔ اور اپنی تاثیرات اور طریق استعمال میں کو اشیا کو مشابہ ہی۔ پنجاب میں خارش کے لئے اسکا لوشن مستعمل ہوتا ہے۔
پیکرک ایسڈ Picric Acid ایسڈ پیکرک کا بیان دیکھو۔

پیکروٹاکسین Picrotoxine اسے مرٹا کاکولس کا بیان دیکھو۔
پیکریٹ آف آئرن Picrate of Iron فری پیکراس کا بیان دیکھو۔

پیکریٹ آف امونیا Picrate of Ammonia امونیا پیکراس کا بیان دیکھو۔
پیکروکینا انٹی ٹیڈسم Picrokema Antedismia { کیسے لایا گیا کا بیان دیکھو۔

پیکمینا بارک Picein Bark
پیکس برگنڈی Pix Burgundy برگنڈی میچ کا بیان دیکھو۔

پیکس لکوائڈ Pix Liquid مارمخ، بوند سے ۶۰ بوند تک دیکسیول میں پنا چاہی ہو
سرپ آف نار ایک ڈرام سے ۴ ڈرام تک خارجی استعمال میں نہایت عمدہ محرک خون، مصلح جلد اور مسکن خارش ہے۔

داخلی استعمال میں برا کھلی اور گردوں کو راستہ خارج ہوتا ہوا ہو اکی نالیوں و مجری پیشاب و مثانہ پر ڈوس انفلکٹ اور
دی اوڈر زٹا پریڈاکرٹا ہے اس لیے پرانی سرفہ اور خوروش مثانہ میں مفید ہے۔

پکون ریڈ Puccoon Red سینگوی نار یا کینا ڈانسس کا بیان دیکھو۔
پل بیرنگ سارج Pil Bearing Sarge یوتا یا ہیلوی فرا کا بیان دیکھو۔

پلساتیللا Pulsatilla
پلساتیللا کامفور Pulsatilla Camphor

پلسٹیللا وولگریس Pulsetilla Vulgeris
دائیمینیا کاسا سائی - انشادالا ہاب، سوزش شرگان، بلیغ فرائش -
بمرض البیخرا میں زیادہ ہوتا ہے، بدمدہ و جگر کے فسادات خال حال جیتے تیر

مکارت و غیرہ مرضوں کا اس کا کئی کئی اکر ہو جاتا ہے۔ شرگان کی جڑوں میں سوزش ہو کر سخت کھجائی ہوتی ہے۔

کھجلائے سے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ پلکوں کا کنارہ سرخ، تورم اور دردناک ہو جاتا ہے۔ رات کو سوتے ہوئے طو بات خارج ہو کر نار و سپر جھجانی اور پلکوں کو باہم چپکا دیتی ہیں جس سے مرض پرانا پڑ جاتا ہے اسی قدر طو بات غلیظ اور پیکے مشابہ ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ سخت کھنڈر وقت جمو رہتے ہیں پھر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں شرکون کی جڑوں میں پیدا ہو کر کھڑی جاتی اور زخم رہ جاتے ہیں جو عموماً آنکھ شدہ طو باتوں کے بچے چھپے رہتے ہیں۔ بال اکھڑتے رہتے ہیں اور پلکوں کا کنارہ گول موٹا ہو کر باہر کی طرف پٹ جاتا ہے۔ پلکوں کے کنارے کے پلٹے کے ساتھ پنکچہ لکیری ہیلی ڈیلی سی دور ہو جاتا ہے تب آنسو کثرت سے بہتے رہتے ہیں جس سے پلکیں جھک کر اور زیادہ سرخ اور دردناک ہو جاتی ہیں اس کی آخری حالت کو پٹی ٹو کہتے ہیں۔

علاج پلکوں کو کامل طور پر صاف رکھیں۔ رات کو سوتے ہوئے ڈائلیوٹ شرین انٹیمٹ پلکوں کے کنارے پر لگا دیں صبح وقت بورک لوشن یا سوڈا سالیوشن سے دھوئے رہیں۔ اگر شوریا قروح نمودار ہوں تو کاسٹک لوشن ۵ سی ۲۰ گرین تک کی طاقت کا لگا دیں سخت حالتوں میں جبکہ پلکیں دبیز اور سخت ہو کر نکلا باہر کر طرف کھینچ جاوے تو کئے گا کولس کو ویبرس کنے کی کولر ناف کو ساتھ کھول دیں اور بورک لوشن سے دھوئے رہیں۔ اگر عام صحت خراب اور جسم لاغر ہو تو عمدہ غذاؤں اور تقویٰ دواؤں سے اسکی اصلاح کریں۔

(۲) ہارڈ یولس۔ سیسٹائی۔ گہا بخی شہور الجھن۔

شرعین مٹی گیند کا شک یعنی سلو رائٹ پونا سی نائٹراس لگا دینا کافی ہے اگر ورم زیادہ ہو گئی ہو نو پٹیس لگانی چاہیئے اور اگر پٹی بگنی ہو تو شکاف دیکر صاف کریں اور بعد میں کاربالک لوشن سے خوب دھو کر کاسٹک لوشن لگا دیں۔

اگر بار بار پھنسیاں نمودار ہوں تو داخلی طور پر پہل کرانے کے بعد سلفا ڈی آف کیلیم یا گلیفری پرکلورائڈ اور کلوربٹ آف پوناٹرا استعمال کریں

(۳) اگزیما۔ اسکا علاج عام قواعد کے مطابق کرنا چاہیئے سو کھو بیان کریں۔

(۴) ٹیٹیکاٹی سیس۔ ڈسٹی کالی سیس۔ پڑوال شعر زائد و شمر متطلب اسکا علاج چھوٹے طریق سے کرنا چاہیئے

دالف، اگر صرف دونین بال اندر کی طرف خم کھا گئی ہوں تو انکی جڑوں کو بجلی سے جلا دینا نہایت عمدہ طریق ہے۔

(ب) کاسٹک پائنٹ کو ساتھ جڑوں کو جلا نا لیکن یہ طریق قابل طہینان نہیں ہے۔

(ج) شعر بے وضع کو پاک کرنا یہی قریب جلد میں سولج کر کے بائرنکالڈینام ۲ گھنٹہ تک مریض کو پاک پر ہاتھ لگانے نہ دیں۔

(د) تمام کنارہ پاک کو قطع کر دینا سخت حالتوں میں ہی سب کچھ طریق ہے۔

(ه) منقلب شہر کی جڑ کے بچے کو ہارڈ نارنا کالڈینام ۲ گھنٹہ تک مریض کو پاک ہو جا دیں

(و) پاک ماؤف کی جلد میں سے ایک مناسب مقدار قطع کر کے زخم کے کنارہ کو فیکوٹا کول سے جلا دینا کچھ کھانا

باہر کی طرف کھینچ کر شہر منقلب کا رخ بدل جاوے بالائی پلک میں سیو مللی اور زیرین پلک کے مٹشی ٹکڑے قطع کرنا چاہیے۔ طبعی طور پر انٹروپین کے لیے مناسب ہو۔

(۵) انٹروپین۔ یہ دوطرے ہو سکتا ہے اول پلوں کے عضلہ کے تشنج ہو جانے سے۔ دوسرے پانی سوزش یا روتوں کی وجہ سے پلک کا اندر کی طرف مڑ جانے سے مڑگان ڈیل پر لگتی اور پانی جاری رہتا ہے چھتہ کی درگڑ اور سوزش و فزینہ متورم ہو کر زخمی ہو جاتا اور پھی لے پڑ جاتے ہیں مریض یہی وہ طور پر آنکھ کو بھونکتا رہتا ہے۔ جس سے نقصانات اور جلدی بڑھتے ہیں۔

اگر محض تشنج آربی کو لیس عضلہ کی وجہ سے ہو تو صرف ہفقد رکافی ہو کہ جلد اور عضلہ کا کچھ حصہ قطع کر دیا جاوے لیکن اگر سوزش مزمنہ و فساد ساخت کی وجہ سے ہو تو مفصلہ ذیل دستکاریوں میں سے ایک عمل کر سکتے ہیں۔

اول۔ تمام قطار شعریہ کو قطع کر دینا۔ اگر پلو کا سورخ تنگ ہو گیا ہو تو برقی کنکھن (اتصال) میں ٹنگاف دیکر کھینکا گیا کو جلد کے ساتھ پیدیں تاکہ پھر پلوں کے ملنے سے سورخ تنگ نہ ہو جاوے۔

دوم۔ ڈاکٹر بڑ و صاحب کا عمل اس طرح ہے کہ غضروف کو کنارہ شعری کو اندر کی جانب سے قطع کر لیتے اور جلد کو سالم بنے دیتے ہیں۔

(۶) انٹروپین۔ یعنی پلک کا باہر کی طرف پلٹ جانا اس کے اسباب حسب ذیل ہیں۔

اول۔ جلنے یا زخم کے بعد پلک کی جلد کا سکر جانا۔ دوم پلک کو فریب مدت تک پھوڑا رہنا سیوہ لوہیں کو بعد جلد کا سکر جانا جب پلک کا کنارہ باہر کی طرف پلٹ جاتا ہے تو ہر وقت آنکھ قرمزی اور ہوا لگنے سے بار بار آنکھیں دھکنے آتی ہیں قریبہ کی سوزش کا بھی احتمال بہت ہے کہ یہی تو جزوی ہوتا ہے اور کبھی کلی یعنی تمام پلک پلٹ کر اوپر کی اندر کی سطح یا برنگی رہتی ہے۔ کھلاسنے سے کھینکا گیا ہو اچھول کر موٹا ہو جاتا ہے۔

علاج۔ اس کا علاج حالت موجودہ کے مطابق کرنا چاہیے پس اگر آنکھ کی سرخی مزمنہ کی وجہ سے کھینکا گیا ہو اور پلک کا باہر کی طرف پلٹ جانیکا باعث ہو رہے تو اس کا کچھ حصہ کاٹ کر جلد دینا یا قطع کر کے نکال دینا کافی ہو سکتا ہے اگر پلک میں سیوہ جو زخم ہو کر اس کے اندمال کی وقت پلک ربت کو ساتھ پوتہ ہو گئی ہو یا زائد رین بکر لگے سکرٹنے سے پلک باہر کی طرف کھینچ گئی ہو۔ تو ان ہر دو صورتوں میں زاید ریشوں یا وصل کا جلد کے نیچے نیچے اقطع کر کے دونوں پلوں کو باہم سیدیں تاکہ زخم کے وقت دوبارہ وہی صورت پیدا نہ ہو سکے اگر ساتویں حصہ کے استرخانی کی وجہ سے پلک باہر کی طرف پلٹ گئی ہو۔ تو سرکونیکی جلدی پچکاریوں سے اس کا علاج کریں۔ اگر پلک پر جلد کافی طول طویل نہ ہو تو نہیں شکاف دیکر اور پیشانی یا بازو سے جلد لیکر پیوند لگا سکتے ہیں ان تمام حالتوں میں لیکریل کینیولی کو لوس کو کھول دینا مناسب ہو تاکہ آنسوؤں کا پانی باسانی اس کے اندر داخل ہو کر ناک میں پہنچتا ہے

(۷) اسٹروخا انجمن۔ ٹوئیسٹس۔ پلوں کا نیچے گرے رہنا۔ ڈرونگ فائی لڈز۔ اس کی حسب ذیل وجوہات ہوتی ہیں ان میں سے عصب و امیجی کا فالج (۲) کیوے ٹریپلی بری ہی ریر کاکٹ جانا (۳) کبھی پیدایشی ہوتا ہے۔

(۴) ضعیف عمر (۵) پیشانی کا دیر پا زخم کبھی استرخا لیکن جزوی ہوتا ہے اور کبھی کلی علاج اسکا علاج مطابق سبب کرنا چاہیے پس اگر تیسرے عصب مانع یعنی مونار اکولی کے فالج کی وجہ سے ہے تو عام برصیا کے پیری فرل پر سلی س میں بیان کیا گیا اسکا علاج کریں اگر کسی زخم چھنی یا دہل وغیرہ کی وجہ سے ہے تو ہلکا علان کریں اگر عام طبی تدابیر سے آرام حاصل نہ ہو تو آخر اچیل جراحی عمل کر کے پاک کو کسی ٹیو فرنے لیس عضلہ کے ساتھ ملاویں تاکہ لمبے ٹری پلیٹی ٹریجی پورس کو بچائی گئی ٹیو فرنے لیس عضلہ پاک کو اٹھائے رکھے۔

(۵) ادنیٰ کلڈریس عضلہ کا فارجہ۔ لوگ آفتاب اسس چشم خرگوش یہ وہ عضلہ ہے جسکی لحمی ریشہ جھل طور پر دونوں پلکوں کے گرد محیط ہوا دیر پیا پلکوں کو بند کرنے میں اگر انکا فالج ہو جائے تو پلکوں کا بند کرنا محال ہو جاتا ہے۔ اسوجہ سے آنکھیں بے اختیار کھلی رہتی اور مریض گھورتا ہوا معلوم ہوتا ہے اسواسلے اسکا نام لاکٹھیلا میں یعنی خرگوش چشم ہے۔ ڈیڈ کے کھلے رہنے اور ہر وقت گرد پڑنے سے بار بار سوزش ہوتی رہتی ہے نیچے کی پلک اکثر و بیشتر چوڑا کر دی جارہی ہوتی ہے۔ اسکی وجوہات حسب ذیل ہوتی ہیں۔

(۱) سردی لگنا (۲) آتش نفرس اور وجع مفاصل (۳) لقوہ (۴) عصب چہرہ کے ان ریشوں پر باد جو پلکوں میں آتے ہیں یا اونکا کسی طرح سے کٹ جانا۔

علاج جیسا کہ پیری فرل پر ملی سس میں بیان ہوا اسکا علاج کریں اور انکے کو بند رکھیں بہتر سایہ اور غبار وغیرہ سے محفوظ رکھیں تاکہ کھلی رہنے کی وجہ سے گرد وغبار اور ہوا کا ضرر نہ پہنچے۔

(۵) پلینفر و سینڈیفر۔ پلکوں کا بند رکھنا نتیجہ اجخان۔ اسکی وجوہات حسب ذیل ہیں سلا شوبہم اور روسی۔ یہ قریب کی سوزش اور زخم بلطبی ناکی سوزش ہے آنکھ کے اندر غیر جنس شوکا داخل ہو جانا یا پانچویں عصب مانع کا درد اور الغرض پانچویں عصب مانع میں کسی وجہ سے خراش ہو تو پلکین بند ہو جاتی ہیں پس جب تک بلطبی ناکی کا علاج نہ ہو۔

(۱۰) نکلی ٹیشن۔ پلکوں کا پھرننا بار بار بے ارادہ پلکوں کا جھپکنا بعض اوقات یہ ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ ہر قسم کا بزرگ کام مشکل ہو جاتا ہے جو سب دریافت ہوا کو مطابق علاج کرنا چاہیے عموماً کو بیا یعنی ریشہ کا یہ ایک حصہ ہوتا ہے۔

(۱۱) زخم حیرتگان۔ یہ چار قسم کے ہوتے ہیں (۱) آتش کو زخم (دب) (۲) روڈنٹا (۳) زخم خشک (۴) زخم کی قسم کی بر بوائیں نہیں ہوتی۔ کھرڈ اکثر انکے اوپر جم جاتا ہے لیکن خود بخود چھو نہیں جاتے اور ایک خفیف چھنی ہو کر شروع ہوتے ہیں۔ رطوبت کچھ خارج نہیں ہوتی جب مریض کھلا کھرڈا دتا دیتا ہے اور وقت گھر زخم نظر آتا کہ جو اچھا ہونے میں نہیں آتا (۱) اپنی تھیلیوں سے رطوبت بہت خارج ہوتی۔ انکو بہت بڑا اور اکثر در کرتے ہیں۔ اسکا ادب کبھی کھرڈ نہیں جاتا۔ اور خود بخود اچھے ہونے میں نہیں آتے۔ قریب کو فلوڈ چھو تو دم ہو جاتے ہیں۔

(۱۲) معمولی زخم۔

روڈنٹا (۱) تھیلیوں کا صرف یہی علاج ہے کہ انکو تمام خراب انگو کو تک کھلا دیا جائے تاکہ مالک ایڈیا ملونا میٹریٹ جلا دیں یا سکوپ کر ساتھ کھرڈیں (۲) بعد ازاں معمولی طور پر ڈریس کرتے رہیں اگر دوبارہ کھرڈ یا بلا نیکی ضرورت

معلوم ہو چھ بھی ایسا ہی کریں۔ آنکھ کو زخم نہیں پارہ اور پوٹا ہم آؤ ڈایڈ وغیرہ اندرونی اور داخلی طور پر فعال کریں۔
(۱۲) ٹائرسنل سینسٹ۔ کلایزین۔ مارٹی بوفین سینسٹ۔ ٹسٹ ناٹ۔

یہ ایک قسم کی رسولی جو خود دوا شک کو بڑھانے سے بچاتی ہے کچھ نکائیو امیں شگاف دیکر اسکو کھجک یا ڈسکٹ کر کے نکالیں اور بعد میں اگر ضرورت معلوم ہو تو کاسٹ یا اسکی تھیلی کو جلادین کبھی ایک سو زیادہ ہوتی اور دبانے سے چہروں کی مشابہ معلوم ہوتی ہیں۔

(۱۳) زینتھی کاسٹا پیلانی بریڈ۔ اسکا دوسرا نام دئی لیگلے ڈیالینا بھی ہے۔ یہ بے ضرر زرد رنگ کی جلدی اور بھار ہوتی مین جو پلک کو اندرونی سرے پر پیدا ہو جانے میں کچھ نقصان نہیں ہے صرف بد نمائی کی وجہ سے انکو قطع کر سکتے ہیں۔

(۱۴) اپنی کینٹھس۔ یہ ایک پیدائشی ہلالی شکل کا جلدی مل ہوتا ہے جو دونوں آنکھوں کو اندرونی گوشہ پر لٹکا رہتا ہے اسکا علاج یہ ہے کہ آنکھ کو درمیانی جلد کا کچھ حصہ قطع کر کے زخم کے کنارہ ٹانگوں سے ملا دیں۔

(۱۵) ایچی مونسٹراف دی آئی لنڈ ٹر پیلینٹ آئی سیاہی شرگاں۔ اسکی اصل محض سحر ہے کہ جلد کے نیچے خون بہ کر حجاما اور سیاہ ہو جاتا ہے ٹھنڈے پانی یا کاربالاک یا الیم یا لیدوشن وغیرہ میں گدی بھگو کر برابر اٹکھے بر رکھیں۔

(۱۶) دبیلا الجفن معولی چھڑوں کی طرح شگاف دیکر پولسین لگائیں۔

(۱۷) انکائی لوبلی فران۔ وصل الجفن یعنی دونوں پلکوں کا آپس میں مل جانا یہ حالت اکثر زخموں پرانی سوزشوں کے بعد پیدا ہو جاتی ہے بعض اوقات ہر دو پلکوں کے درمیان ایک جھلی پیدا ہو کر وصل کا باعث ہوتی ہے اور بعض اوقات خود پلکیں آپس میں مل جاتی ہیں ہر دو صورتوں میں سطح مکن ہو سکتا ہے ڈاکٹر لیٹر اندر پنچا کر وصل کو قطع کر دینا چاہیئے اور بعد میں دونوں پلکوں کے درمیان لٹ رکھتے رہیں تاکہ دوبارہ اتصال نہ ہو جاوے اور بعد کی تدابیر سے ہی تمام کامیابی منحصر ہے

(۱۸) سمیلے فران۔ وصل الجفن بالعین یعنی پلک انکھ کے ساتھ مل جانا۔ چاقو کو ساتھ

وصل کو قطع کر کے بعد میں پروب گذارتے رہیں۔ اولیٹ تیل میں تر کر کے پلک اور آنکھ کو درمیان برابر رکھیں۔

(۱۹) ہرپیزن اسٹرفنٹے لس۔ اس مرض میں ایک جانب کی پلک اور نصف پیشانی پر سرخ دھبہ نمودار

ہو کر اوپر چھوٹی چھوٹی پھیناں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ پھیناں علیحدہ علیحدہ یا خوشوں میں ہوتی ہیں پہلے سخت

ہوتی پھر انکے اندر پانی بڑھتا ہے۔ بعد ازاں ان میں چار روز میں خشک ہو کر کھنڈ بن جاتے ہیں۔ دو چار خشک

ہونے پر آتی ہیں دو چار نئی نکل آتی ہیں۔ اس طرح دس بارہ روز تک حالت بد رہتی ہے پھر میں جلن اور درد

شدت سے ہوتے ہیں پھیناں عموماً اعصاب کو راستہ پر ہوتی ہیں بجا نہیں ہوتا۔ ماضی میں بھی بعض اوقات

پھیناں یا چھال نمودار ہو جاتے ہیں مگر میرے اور ماضی میں یہ پہچان ہو کہ میری کی سرخی اور ورم ہمیشہ نصف

چہرہ پر ہوتی ہے اور وہ بھی پلوکوں اور پیشانی پر لکین مائشری کی ورم بہت جلد و طرفہ بھلیتی جاتی ہے۔ ہر ہیز کے ساتھ بخار لازمی نہیں مگر مائشرے میں بخار ضرور ہر وقت رہتا ہے ہر ہیز کی پھنساں چھوٹی چھوٹی اور متغیر ہوتی ہیں مائشرے کے چھالے بڑے بڑے اور بقیاعدہ طور پر ہوتے ہیں ہر ہیز میں درد شدید ہوتا ہے مگر عام ضعف کچھ نہیں ہوتا۔ مائشرے میں خفیف مگر عام ضعف بہت ہو جاتا ہے ہر ہیز علیحدہ سرخ و صبوں سے شروع ہوتا ہے مگر مائشرے کی ورم ایک ہی جگہ سے شروع ہو کر پھیلیتی جاتی ہے۔

علاج۔ نمکین مہل و دیگر مسکن اور میٹل افیون اور ایٹھی پائیرین وین اور آلہ بنویرت یا اسکے کامرہم لگانا اور ماریفائی جلدی پچکاری کرنا بہت سریع اثر ہے۔

Plumbism فسادات سکہ پرانا ہر سکہ مدت تک سکہ کو برتنوں میں کھانے یا بطور ادویہ استعمال کرنے سے جو نقصان پیدا ہوتا ہے اسکا مجموعی نام پلمبرم ہے۔ زہر ونگلیان دیکھو۔

Plumbum لیڈ۔ سکہ۔

Plumbi Oxidum پلمبائی آکسائیڈم

Plumbi Acetas پلمبائی ایسیٹاس

Plumbi Carbonas پلمبائی کاربوناٹس

Plumbi Nitrates پلمبائی نائٹریٹس

Plumbi Iodidum پلمبائی آیوڈائیڈم

عروق شعریہ کو سکیرنے اور اعصاب کو سست کرنے میں گویا ایک مقامی استعمال میں قابض۔ حالبس الدم مسکن ورم و درد

ہیں۔ ایسے پرانے زخموں نئی زخموں جریان الاذن ورم شانہ اور جلدی سوزش و خارش میں لڈوٹس بجھت بہت استعمال

کیا جاتا ہے۔ پلمبائی کاربوناٹس کو خالص بھی چھڑک تیز ہیں۔ لڈائٹریٹ۔ اسی ٹیٹ اور کاسٹک۔ لڈائیوڈائیڈ کامرہم

گلیٹیل۔ ورم بخاقل اور رسوئیوں بطور مائش استعمال کیا جاتا ہے۔

داخلی استعمال میں اول تو منہ کی رطوبت کو سخت اور عروق کو کشیدہ کر کے خشکی پیدا کرتا ہے۔ ایسے ہی گلو کے اندر بھی خشکی اور

کینج معلوم ہونے لگتی ہے ایسے مختلف اقسام سوزش دہن و گلو میں بطور غرغہ یا گلیسرین استعمال کر سکتے ہیں ایسا ہی

معدہ اور معامیں پہنچانگی رطوبت کو سخت کر دیتا عروق کو سکیرنا اور خشکی پیدا کرتا ہے۔

علاوہ برہن معدہ اور معامیں پیری سٹائٹک حرکات کو بھی کم کرتا ہے ایسے معدہ اور معامیں زخموں اور سوزش میں بہان

نہایت مفید ہے جب نمونگی و نہایت سخت مہال جاری ہو جاوین جو کسی دولے بند نہ ہو سکیں اسکاٹیں لیڈ ایسیٹ

نہایت عمدہ دوا ہے۔ ٹائیٹائیڈ اور ٹیوبرکٹ وایا ریا میں مفید ہے معدہ اور معامیں الہی نیٹ آف لڈوٹس زخموں میں

پہنچتا اور پھر تمام ساختوں میں پہنچا کر جمع ہو جاتا ہے خاص کر خفاہ و باغ و عصاب میل و مستخوان و دیگر اور گردہیں اگر کچھ

مدت تک استعمال کیا جاوے تو پلیمز کی علامات - مضمی قبض قو لچ اعصابی درد تشنج - امراض پیشاب - ہسترا و عضلات رقت خون - ہسترا لاغری وغیرہ پیدا کر دیتا ہے آخر کار آہستہ آہستہ براہ صفر پیشاب پینہ اور دودھ باہشتی خارج ہوتا ہوا اپنے مقامی اثر قبض سختی رطوبات اور احتباس الدم کی پیدا کرتا ہے اسلئے اکثر بلغم و سیدہ میں گاہے گاہے اسکو استعمال کرتے ہیں - بول الدم - رعان - نفث الدم - قے الدم اور اسہال الدم میں مفید ہے - براز کی رنگت اسکے استعمال سے سیاہ ہو جاتی ہے - کیونکہ یہ سلفاڈ آف لڈیو بکریز کو ساتھ خارج ہوتا ہے -

پلیمز کی ٹیوبرکلوٹس Pulmonary Tuberculosis
پلیمز کی کنزیمپشن Pulmonary Consumption
پلیمز کی گولڈن گولڈ Plantago Ispgola
پلیمز کی گولڈن گولڈ Plantago Lanceolata
اسکے پتے حامل الدم اور قابض ہیں -
پلیمزین خمر فلوئڈ اکٹرٹ ۳۰ سے ۶۰ یونڈ تک -

پلیمزین Plaintain کیلا - اسکے پتہ گٹا پرچہ اور ربڑ کی طرح تخیر پانی کو روکتی ہیں اسلئے جو پٹ یسنگ کو ترکھنا ہو تو گٹا پرچہ کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں لکھ پر سبز سایہ رکھنے کے لئے اسکے پتوں سے ربڑ کو کوئی شے نہیں جھالے کے زخم پر کیلے کا پتہ تیل لگا کر رکھنا نہایت عمدہ ڈرینک ہو -
پلیمزین روٹ Pleurisy root اسکی پیاس ٹیوبروراز کالک روٹ ہر فلانی وڈیا کیلے
اسکی جڑ دفاع تشنج تقوی مخن ج ریح مرق - مدر اور ملین ہو قو لچ ذات الجنب پلیمزین روٹ کام بصر قبض حبس طمث اور ورم کی امراض میں مفید ہو خمر سفوف خمر ۶۰ گرین سے ۶۰ گرین تک فلوئڈ اکٹرٹ ۶۰ یونڈ سے ۶۰ یونڈ تک -
ایکلی پیڈین لایک گرین سے ۵ گرین تک -

پلیمزین Pelvic Abscess
پلیمزین Pelvic cellulitis
پلیمزین Pelvic Haematecele
جیسا کہ اوپر گہرے دیلیوں کا علاج ہے ویسا ہی پلیمزین کا بھی کرنا چاہیے -
اور پلیمزین لگائیں تاکہ دیلی کا مضمخ کسی ایک طرف کو ہو جاوے اگر پو پاٹس لگینٹ سے اوپر بیسیں کا اوجہار معلوم ہو تو انتظار کریں - کہ جلد کے ساتھ بیوست ہو جاوے - اس عرصہ میں مریض کو ہر قسم کی حرکت سے منع کریں - اور پلیمزین لگانی ہیں مگر مواد ان کی طرف رجح کرے تو جس جگہ اسکا اوجہار معلوم ہو اسی جگہ شکاف دینا چاہیے ان ہر دو صورتوں میں ڈرینج ہو -
اندر داخل کرنا نہایت ضروری ہے - مگر تمام مواد پیڈولی تہ جمع ہے اور اسکا وڈانہ میں علامات خواشانی ہوں تو اس پر سے ٹر کے ساتھ پیٹھ پال لینی چاہیے اور اگر وڈانہ یا ریگیم مستقیم ہیں ایسی کانٹھ صاف طور پر معلوم ہو تو ٹرڈار اور کینولا داخل کر کے پیپ خارج کریں اور بعد ازاں وڈانہ پیڈولی داخل کر کے دودھ روزانہ اینٹی سپٹیک لوشن سے دھوئے رہیں جب انخارج پیپ قطعاً بند ہو جاوے اسوقت اسکو نکال سکتے ہیں مریض کے لیے ایسی وضع تجویز کریں جس میں پیپ ٹرینج ٹوب کانٹھ بچا ہو -

تاکہ پیرپانی خارج ہوتی ہے عموماً غذاؤں مقوی دواؤں اور محرکات سہریض کی طاقت کو قائم رکھیں۔

پلوک ٹیوٹیل اسکا علاج مختلف مراح میں مختلف طور پر کیا جاتا ہے۔ درجہ سوزش حاد میں حقنہ سے امعا کو صاف رکھیں تسکین درد و حرکت معا کے لیے افیون دیتے ہیں مقامی طور پر سینک اور پولٹین استعمال کریں۔ اور وجوہات میں بھی گرم پکاریاں کرتے ہیں۔ نرم رحم یا سیون یا گٹ پر چونک لگوائیں جب شدت سوزش سفع ہو جاوے اس وقت مقوی کونین و فولاد یا پونامیم آیوڈائیڈ کھلائیں تاکہ خارج شدہ رطوبت جذب ہو جاوے ہر حالت میں آرام دینا نہایت ضروری ہے۔

پلوک ٹیوٹیل پیڈوک کے اندر خون جمع ہو جانا کیسی برا اخراج خون پری ٹیم کرا اندر رحم کو سمجھ پاؤں آف وگلاس میں ہوتا ہے۔ اور ریڑھ و ٹیوٹیل کہلاتا ہے کہی رحم اور شاد کے درمیان تبا کو انٹی ہی ٹیوٹیل کہتے ہیں کہی پری ٹیم کو باہر سیولر ٹشو میں جمع ہو جاتا ہے تبا سکومچو ٹو کہتے ہیں جب خون پیڈوک کے اندر دفعہ جاری ہوتا ہے تو صدر ضعف اور گرانی معلوم ہو کر غشی کی حالت ہو جاتی ہے حرارت کم ہو جاتی اور انتقال حسل اعصابی کی وجہ سے دل متلاتا اور تے ہوتی ہے نبض پسلی اور کمر و ریڑھ جاتی اور تدا بیر کے کرتے کرنے مریضہ جلنے لگتی ہے۔ اگر جریخون خفیف ہے تو تمام علامات بھی خفیف ہوتی ہیں ناف کو پچھنے یا کج ران کی طرف ابھار اور گرانی معلوم ہوتی ہے فرج یا مقعد کے اندر اوٹلی داخل کرنے سے نرم پلا ا ابھار معلوم ہو سکتا ہے جو بند بیج سخت ہوتا جاتا اور رحم ایک جگہ چھچھاتا ہے سخت گرو بندہ جاتی ہے۔ ورنہ پیر پکھوڑا بچا تا جو فرج یا شاد یا مقعد کے اندر نہ کر لیتا ہے اگر پری ٹیم کے اندر ہے تو پری ٹیوٹالی ٹس اور بیٹی سیمسا کا اندیشہ رہتا ہے

اسباب (۱) فسادات و خون مثلاً اینیما پلٹھورار پریور اسکروی یرقان (۲) احتباس الطمث یا خون بوسیر یا کسی دفتنگا بند ہو جانا (۳) سروی لگنا شدت جملع دم، خارج الرحم حل قرار پا جانا۔ غلط رحم کا پھٹ جانا (۴) یا فلوئین ٹیوٹیل پھٹ جانا (۵) دم یا ٹشین پر لات مکہ یا لائچی وغیرہ کی ضرب پہنچنا۔ زیادہ بوجھ اوٹھانا ٹیٹیس کا استعمال (۶) پیری مٹرائی یا میرامٹرائی ٹس۔ اسکی تشخیص کے واسطے دیکھو بیان پیرامٹرائی ٹس کا۔

علاج۔ اسکے علاج کے دو مایج ہیں۔ جو ذیل سے ظاہر ہیں۔

۱۔ شروع میں جبکہ خون جاری ہو رہا ہے تو فوراً ہر قسم کی حرکت بند کر کے پیڈوک پر آئیں بیگ کھینچیں اور ٹھنڈے پانی کی وجہ یا نایں بھی پیکاری کریں حاسب الدم او دیہ مثلاً گلیک ایڈر ٹریٹلین۔ ارگٹ۔ شوگراف لڈ وغیرہ افیون کھلائیں۔ اگر معرہ قبول نہ کرے تو بذریعہ حقنہ یا جلدی پیکاری یہ او دیہ پینچا دیں۔ شراب اور دیگر گرم دواؤں سے منع کریں اگر خون بند نہ ہو اور علامات متدرجہ پیدا ہوتی جائیں تو لیے را ٹیوٹیل کے مناسب بند و بست کر سکتے ہیں۔

دومہ جینجی کا زیادہ خارج ہونا بند ہو جاوے تو اسکے جذب کرنے کی تدابیر کریں یعنی مریض کو مطلق آرام دے رکھیں آیوڈائیڈ پونامیم اور کونین کھلائیں۔ اور عام صحت کو مقبولیت او دیہ وغذائے ترقی دیں۔

پلیک تھو

Plethora

غلبہ خون - زیادتی خون مزاج دموی - دوران خون کا بیان دیکھو۔

Pili Sibotium

پنجا و جیبی - سبوتیم سبوتس اسکے تنہ کے ریشمی بال نہایت عمدہ حاسب العلم اور

فابض ہیں سرخ گرین سے اگر کین تک۔

پلیک طاعون ہمارے یو پاک پلیک اور پیٹ مشرقی ٹائفس وائے تعفن۔

یہ ایک نہایت ہی مہلک اور متعدی وبائی بچا ہے جس میں جسم کے غدود پھول کر کھاتے ہیں اور کار بیکار و شبک اڑھیں
بھی نکل آتے ہیں تالیخ میں اس مرض کا پتہ دو تین صدی سچ تک لگتا ہے کہ افریقہ مصر سے یا اوریسیا میں سکی تیار
ہوا کرتی تھی مگر یورپ میں چھٹی صدی سنہ عیسوی میں اس کا ظہور ہوا۔ شاہ جہی نین کی حکومت میں جو ۵۲۵ء سے ۵۶۵ء
تک ہی یہ مرض مصر میں شروع ہوا اور پھر وچکے سے نہایت شدت و سرعت کو ساتھ افریقہ اور ایشیا کے متصل ممالک میں
پھیل گیا بعد ازاں کل یورپ کو ہلاک کرنا شروع کیا رفتہ رفتہ کل پرانی دنیا میں پھوٹ پڑا اور لاتعداد جان و نکتوں تلف کر گیا جس
شہر یا گاؤں میں ہوا نہایت ہی خوفناک مری پیدا کرنا لیا۔ اس صدی کے بعد آج تک یعنی تیرہ سو برس تک یورپ میں حال
چلا آئے کہ کبھی زیادہ اور کبھی خفیف شدت کو ساتھ پھوٹتا رہتا ہے جو دو سو صدی عیسوی میں کل یورپ میں نہایت ہی
شدت سے پھیلا اور متعدد جانبیں تلف کیں کہ قیاس سے باہر ہیں اور کالی موت کو نام سے مشہور ہوا بعض کی رائے میں یہ
کالی موت ایک علیحدہ قسم کی وبائی جو بعض بعض باتوں میں طاعون سے مشابہ تھی۔ مگر فی الحقیقت یہ اوس قسم کا طاعون
تھا جو پھیٹھڑوں کو کھاتا اور سانس میں سے سڑے ہوئے مردار کی بود و دوڑ تک آتی ہے یورپ کی آبادی دس کروڑ
کے قریب تھی جس میں سے دو کروڑ پچاس لاکھ جانبیں تلف ہو گئی تھیں۔

تندرستوں صدی کی نسبت بہت لگتا ہے کہ یہ مرض وقتاً فوقتاً شمال افریقہ مصر مغربی حصہ عرب سیریا فلسطین
ایشیا کوچکہ فارس ہند چین اور یورپ میں ہوتا رہا سو گویں اور ستر سو صدی میں ممالک مذکورہ کے متفرق
مقامات میں سال بسال کم و بیش ہوتا رہا مگر ستر سو صدی کے آخری نصف میں یورپ میں بہت کم ہونا شروع ہوا
یہاں تک کہ ۱۶۶۱ء سے ۱۸۰۰ء تک اطالیہ انگلستان مغربی جرمن سوئٹزرلینڈ ہینڈرلینڈ اور ہسپانیہ سے بالکل
معدوم ہو گیا۔ اٹھارہ سو صدی میں یورپ میں کم ہو گیا اور تعداد میں بھی محض دو دفعہ ہوا۔ ایک دفعہ ۱۸۰۰ء سے ۱۸۱۳ء
ٹرکی و بنگلہ رروس پلوٹڈ۔ آسٹریا و ہیمیا اور مشرقی جرمنی میں ہوا۔ دوسری دفعہ ۱۸۲۰ء سے ۱۸۳۰ء تک
براؤنس میں ہوا۔ انیسویں صدی کے شروع میں یہ محض یورپ کو اس حصہ میں محدود رہ گیا جو ٹرکی کے ماتحت ہے۔
۱۸۴۰ء میں کل یورپ میں بالکل معدوم ہو گیا جبکہ یورپ میں کمی ہوتی گئی ویسے ہی دوسرے ممالک میں بھی جہاں یہ
پھیلا کرتا تھا کمی ہوتی رہی یورپ کے پہلے طاعون شمال افریقہ (سولے مصر کے) سیریا اور فارس کے غائب ہو گیا۔
۱۸۶۰ء میں ایشیا کوچکہ سیریا اور فلسطین سے غائب ہوا ۱۸۶۰ء میں مصر سے جاتا رہا اس سال کے بعد یورپ
کو اس خطرناک مرض سے نجات ملی جو صد ہا سال سے نہایت ہی خطرناک معدوم تو نہیں پھیلا آ رہا تھا مصر میں بند بنوسی
نوسال بعد ۱۸۶۰ء میں ایشیا اور مشرقی عرب میں ہوا اس کے بعد دوسرے ممالک میں اس کا ظہور ہوتا رہا ۱۸۶۵ء

چاہیے۔ ورنہ جلاوینا بہتر ہے۔ کھلمیدانوں میں رہنے سے یہ زہر ایسا رقیق ہو جاتا ہے کہ قریب قریب ناپید کر
برابر ہو جاتا ہے اسلئے متاثرہ گاؤں کے لوگوں کو باہر لے جانا جیسا کامیاب طریقہ ثابت ہوا ہے ایسا کوئی طریق
نہیں ہے میدان کی کھلی ہوئے تمام چٹا ہوا زہر صاف ہو جاتا ہے۔

سویڈر سوئی تغیرات سردی اور گرمی کے ساتھ یہ مرض بڑھتا اور گرمی خشکی کے ساتھ گھٹتا ہے چنانچہ ۸۶ و ۸۷
فار ہائیٹ پر کم ہونا شروع ہو کر ۱۱۳ درجہ پر معدوم ہو جاتا ہے۔ سردی میں شروع ہو کر موسم بہار میں انتہا کو
پہنچتا ہے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قسم اول اور سویم میں جو اسباب گناہ گئے ہیں وہ قطعی طور پر فیصلہ شدہ نہیں
ہیں کیونکہ ان کے خلاف بھی طاعون کی وقوعات ہوئے ہیں مثلاً گرم موسم اور پھاڑی قطعاً ہیں۔

چھ لاکھ طاعون کا اصل سبب ایک قسم کی باریک بنات ہیں جو ایک پن کے سرور ہزاروں سما سکتی ہیں ساتھ کہ قریب
ایک بال کے برابر بڑے ہوتے ہیں۔ وہ وہ جلتے ہیں۔ بکری اور بھیر کی بخنی اور اگر اگر میں بہت جلدی پرورش
پاتے ہیں۔ ان اشیاء میں سے کسی ایک شے میں انکی بستیاں پیدا کر کے ایک شفاف عرق تیار کر سکتی ہیں
جسکو بلون کہتے ہیں۔ بلون برسوں تک شفاف رہ سکتا ہے۔ اگر مریض طاعون کے پھولے ہوئے غدود کی ذرہ بہر طوطا
اس میں ڈال دیا وگو تو دو تین روز کے بعد گہرے خطوط بننے شروع ہو جاتے ہیں جو نے بحقیقت طاعون کے کیرٹوں
کی قطاریں ہوتی ہیں جسکو بلیک ٹیگر وڈ کہتے ہیں۔ ہلانے سے یہ تمام بنات مندرجہ ہو کر تمام عرق کو گندلا کر دیتے ہیں
اگر اس گندلے عرق میں سے ایک خفیف مقدار دوسرے بلون کی شے میں ڈالا جاوے تو اس میں بھی وہی بنات
پیدا ہو جاتے ہیں علیٰ ہذا القیاس بحد مرتبہ تک نئے نشیوں میں طاعونی بنات کی زراعت حاصل کر سکتے ہیں۔
یہاں تک کہ مریض کا کوئی مادہ اس کے اندر نہ رہے اور خالص طاعونی بناتوں کی زراعت ہو جائے تو ویسے صرف کہ
نئے یہ بھی دریافت کیا ہے کہ بلون میں سے کبھی یا کبھی ملانے سے زراعت اور زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے۔
چین میں ایک پیاری ضلع ہے جسکا نام نیان ہے اس ضلع میں بھی کڑواں کی طرح اکثر طاعون رہتا ہے اسلئے
اس ضلع میں طاعون پھیلا ہوا تھا کہ چند فوجی قافلے کو اسے پہنچے اور پھر وہاں سے چند کسرتے لوگ لاناگ چوہے
اچانک انکو طاعون ہوا اونی پلے و با شہر میں پھیلی اور بعد میں چھاتی میں پھیل گئی سردی شروع ہونے کے ساتھ وہاں
کم ہو گئی گرمی میں پھر شروع ہوئی۔

۱۹۲۱ء میں ایک چینی گاؤں کی کھیتی نام میں ہوئی اور پھر وہاں سے گینٹن میں پھیل کر قریب ایک لاکھ جانوں کو تلف
کیا پھر وہاں سے ۱۹۲۲ء میں ہانگ کانگ پہنچی۔ کتبہ ریانو میں بڑے ہور و سب ۱۹۲۵ء میں پھر شروع ہوئی
۱۹۲۶ء میں جہازوں کے ذریعہ جزیرہ فارموزا میں پہنچی اور ۱۹۲۷ء میں بمبئی میں ظاہر ہوئی ۱۹۲۷ء میں عرب
کے ضلع بنی شیر میں ظاہر ہوئی تھی یہ قطعی طور پر فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ بمبئی میں یہ وہاں کانگ یا فارموزا سے
آئی یا شیر سے یا کافی زمانہ یہ تو قریب قریب طاعون کا اصل سبب باریک خورد بینی بنات ہیں
اور یہ مرض سخت درجہ کا شہدی ہے مگر ابھی تک اسکی متعلق بہت سوامورات ایسی ہیں جنکی کچھ حقیقت معلوم نہیں ہو سکی

مثلاً کیا وجہ ہے کہ بعض مقامات میں نہایت شدت کو ساتھ پھیلتا ہے اور بعض میں چند کیس ہو کر جاتے ہیں مثلاً بستی میں اس کثرت سے ہوا اگر کلتہ اور جہدہ میں چند کیس ہو کر خاتمہ ہو گیا پھر جن مقامات میں مدت سے چلا آتا ہے اسکی کیا وجہ ہے کہ بعض سالوں میں ہوتا ہے اور بعض میں نہیں۔

زمانہ سرائیت کم از کم دو تین روز اور زیادہ سے زیادہ دس روز شمار کیا گیا ہے۔

علامات۔ بلحاظ علامات کو کم و فضا فیل تقاسم میں بیان کر سکتے ہیں۔

اول۔ خفیف طاعون۔ اس میں بخار نہیں ہوتا۔ گردن۔ بغل اور کچھ ران کی گلیاں بھول کر چودہ روز میں بھیج جاتی ہیں کبھی کبھی کسی درجہ میں پیپ بھی پڑ جاتی ہے اور خفیف بخار بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے طاعون کے متعدی ہونے میں اہل کوشہ بھی نہیں بخار ساتھ نہیں ہوتا۔

دوم۔ معمولی طاعون۔ پہلے سر گرد اور جوڑوں میں درد ہو کر عام ضعف ظاری ہوتا اور لرزہ کو ساتھ بخار ہو جاتا ہے پھر اتنا وہی روز یا تین چار روز تک گردن کچھ ران اور بغلوں میں بدن میں گل آتی ہیں کبھی بخار اس شدت سے ہوتا ہے کہ مریض کو نہ بیان یا ہوشی ہو جاتی ہے۔ بدن میں شدت کا درد اور چہن ہوتا اور ورم زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ انکے سولے جسم پر بھوٹے اور کال بھل بھی گل آتے ہیں اگر مریض زندہ رہے تو ساتویں روز بدن میں پیپ پڑ کر بھوٹ جاتی ہیں بعضوں میں ابتداء سے بے حواسی اور خوف بہت ظاری ہوتے ہیں بعضوں میں دوران سر تن شیخ اور قے الدم ہو جاتے ہیں بعضوں میں چھ سات گھنٹہ تک لرزہ رہتا ہے۔ عموماً بخار ۱۰۲ اور ۱۰۴ درجہ کے درمیان رہتا ہے کبھی ۱۰۶ درجہ تک ہو جاتا ہے کبھی ناک منہ قعدہ اور مجری بول کے راستہ خون آتا ہے جو ہمیشہ مہلک ثابت ہوتا ہے بعضوں میں دلکشی زیادہ ہوتی ہے۔ بدھیں کبھی تو بخار پہلے نمودار ہو جاتی ہیں کبھی بخار کے ساتھ اور کبھی تین چار یا پانچ روز بعد تک دن میں آدھ مرغی کو انڈی کے برابر ہو سکتی ہے اور کبھی اوس سے چھوٹی ہوتی ہیں پیپ کا جلدی پڑ جانا اچھی علامت گنا جاتا ہے جلد کے نیچے خون خارج ہونے سے جایا سرخ وہی ہو جاتے ہیں جو بعض اوقات اس کثرت سے ہوتے ہیں کہ تمام بدن سیاہ ہو جاتا ہے چہرہ کی ایک نرالی صورت ہو جاتی ہے۔ آنکھیں اندر گھس جاتی ہیں مگر ہیفہ کی طرح انکے نیچے حلقہ نہیں ہوتا۔ تمام چہرہ پر رکھ دردا اور خوف کو گل پڑ جاتے ہیں مگر وہ انکے سطح پائیدار نہیں ہوتا دیکھنے سے نہایت ہی مصیبت زدہ اور قابل رحم معلوم ہوتا ہے مگر موت کو اتنا قریب نظر نہیں آتے۔ بلکہ جو دو ایک گھنٹہ میں مرغوالا ہے کچھ بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی نہیں مرگا۔

سپوہ۔ تقسی طاعون۔ اس میں پھیپھڑے مردار پر گر گئے شروع ہو جاتے ہیں یعنی گینگریں آن لنگر ہو جاتا ہے سانس کے ساتھ سڑے ہوئے گوشت کی بد بو آتی ہے جبکی وجہ سے دور تک کھڑے ہونا بھی محال ہو جاتا ہے سینہ میں خاص مقام پر درد ہو جاتا ہے قے اور تھوک کو ساتھ خون اور گلے ہوئے پھیپھڑے کے اجزا خارج ہوتے ہیں۔

چھ گھر۔ قلبی نٹ طاعون۔ اس میں مریض دفعتاً بیمار ہو کر ایک دو گھنٹہ میں مر جاتا ہے۔ خاص فسادات طاعون یعنی بدھیں کا بیکل اور پھوٹے نہیں ہونے پائے گئے یہی ایسا ہوتا ہے کہ بخار کے ساتھ کسی قدر بدھیں و مرنون کے دھبے نمایاں ہو بھی جاتے ہیں اور تشیع و بیہوشی ہو کر مریض تھوڑی دیر میں چلتا بنتا ہے۔

پنجم خونی طاعون۔ اس میں نہ ناک بقدر مجری بول اور فرج سے خون بکثرت خارج ہوتا اور تمام جلد خونی و صول سے سیاہ ہو جاتی ہے اس واسطے اس کو کالی موت کہہ سکتے ہیں۔

ششم اعصابی طاعون۔ اس میں دوران صداع تشیع بخوابی عینی بدحواسی احتلاج القلب و کشی بزبان اور بیہوشی وغیرہ عصبی علامات زیادہ شدت کے ساتھ ہوتی ہیں۔

ہفتم گیسٹرو انٹسٹائی ٹل طاعون۔ یہیں عمدہ اور امعاء کے متعلق فسادات شدت سے ہوتے ہیں مثلاً فی الدم صفراوی تہ۔ ورم معدہ و ورم جگر اسہال الدم و در معدہ خشکی اور ورم طلق۔

تشیع طاعون کی تشیع بہت آسان ہے کیونکہ اور کوئی وبائی بخار ایسا نہیں جو کثرت و لوگوں کو یکو بعد و مگر مبتلا کرے اور ساتھ ہی بخلوں گردن اور گنجان میں بدھیں و تمام جسم پر پھوٹے اور کاندھ بیکل مکمل آویں خنازیر میں جو گلشیاں پھوٹی ہیں اور کھو ساتھ بخار نہیں ہوتا اور انکی ورم پرانی اور تشیع رنج ہوتی ہے طاعون کا بخار عموماً مسلسل بلا تخفیف کی ہوتا ہے کونین سے کم نہیں ہوتا بخار اور بدھوں کا ہونا تمام اقسام میں لازمی علامات ہیں قلبی نٹ قسم میں طاعون کا دہر اس کثرت اور شدت و سرایت کر جاتا ہے کہ بدھوں کی فوہت نہیں پہنچتی مریض پہلے ہی مر جاتا ہے۔

انجام بدھیں جس قدر جلدی پکپکائیں اور پیچ خاں ہو جاؤں اس قدر اچھا ہے اگلا بے رہنا خراب علامت ہے جگر جیسفہ۔ دماغ اور امعاء کو متعلق جس قدر علامات زیادہ شدت کی ہوں اس قدر خوفناک ہیں خونی صفرا کا اور اعصابی طاعون عموماً مہلک ہوتا ہے ایک دفعہ طاعون ہو کر دوبارہ بھی ہو جاتا ہے بیچ میں کبھی تخفیف بھی ہو جاتی ہے۔

علاج۔ اس مرض کی اصل حقیقت ابھی تک کافی طور پر معلوم نہیں ہوئی اسی وجہ سے اس کا علاج بھی نہایت تہہ سے مفصل ذیل اصول پر ایسا علاج کیا جاتا ہے۔

اولی تدابیر انداد چونکہ هجوم بند ہوا اور افلاس اس مرض کے زہر کو تیز کر دیتے ہیں اسی کو ان اسباب کی اصلاح کرنی چاہیے مریض کو ایک علیحدہ ہوا دار مکان میں جگہ دیں علیحدگی خود اسکے اور نیز دوسروں کے لئے مفید ہے۔ اس کے کپڑوں برتنوں مکان اور تمام اسباب کو بعد صحت کامل طور پر دوس انگٹ کر ادب اور جو شے سوختی معلوم ہو اسکو جلا دیں۔ پیرنگ پرانی ایکٹک سرم کا ٹیکہ کرائیں۔ اول تو کھلی ہوایں تبدیل مکان کرنا چاہئے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو اور مکان خراب ہو اور آبادی سے علیحدہ ہو تو جوہوں کو بھرے کے ذریعہ کمرہ کرنا چاہئے اپنے مکان سے چھوٹے کالہ سے کی ایک کسان تدبیر ہے کہ آٹھ خطہ نول

میں ایک حصہ خالص سلفیوکل ایڈ ملکا تمام سوراخوں میں ڈال دین۔ انکے لئے سے ایک ونٹی گیس پیدا ہوتی ہے جو گہرے سوراخ میں اتر جاتی اور جو ہے ٹھکڑا جھاگ جاتے ہیں اگر ایک ہستی کے تمام لوگ ایسا کریں تو تمام دیہہ کے جو ہے فراہم ہو سکتے ہیں علاوہ بریں کل اسباب کو دھوپ لگاتے رہیں اور بقیہ وارے کان کن فیئیل سے ڈس انفیکٹ کرتے ہیں۔ دیہات کو لوگ پتھر روں کے تمام کمروں میں کافی اوپلو اور گھاس بھوس جلا کر جس سے تمام فرش اور دیواریں خوب گرم ہو جائیں یا سانی ڈس انفیکشن کر سکتے ہیں تمام مکان کو صاف اور خشک کھانا چاہیے بہشتہ جگہ آدروفت بند کر دینی چاہیے گھر کے تمام لوگوں اور بچوں کو ٹیکا لگوانا سب سے زیادہ یقینی اور زبردست محافظ ہے۔

دو۔ بندہ پیر علج کونین۔ کہے زوٹ کار بالاک ایڈ سلفوکل ایڈ لٹ آف زٹک ایڈ لپٹل ایل وغیرہ اینٹی سپنگ ادویہ با افراط وین۔ کثرت تنگی میں معدنی تیزاب مثلاً فاسفوکل ایڈ سلفوکل ایڈ وغیرہ با افراط وین سارنگار زیادہ ہو جاوے تو جسم کو شراب اور پانی کے ساتھ سپنج کریں۔ ورم خوردہ غدود پر آب وین اور بارہ وغیرہ کی مالش کریں ہڈیاں میں ٹیکچر ایڈ سانس اور پوٹیم برومائیڈ دیں۔

لیور کے امراض۔ لیور ہر غشاء جو سینہ کی اندرونی سطح اور جیمینڈ پر لگی ہوئی ہے اس کے امراض مفصل ذیل اقسام کے ہوتے ہیں (۱) لیور کی سوزش جسکو لیورسی کہتے ہیں (۲) ایمپھما یعنی لیور کا اندر سے پھپھکا (۳) ہائڈروٹھوم کہیں یعنی لیور کے اندر پانی پھجانا (۴) نیوموٹھوم کہیں یعنی لیور کے اندر ہوا بھر جانا۔

اولی لیورسی یعنی سوزش

علامات۔ شروع میں پہلو کے کسی مقام پر چھپن یا پکڑسی معلوم ہوتی ہے جبکی درو کی شدت بتدریج بڑھتی جاتی اور سانس کے ساتھ دردناک گڑ معلوم ہوتی ہے۔ اسکو طومریض سانس کو عمارد وکتا اور دردناک مقام کو پکڑتا ہے سانس جلدی جلدی اور کھچکا آتا۔ تعداد میں تین نیتس باری منت ہوتا ہے وکشی ہیتی جاتی اور خشک وناک کھانسی اٹھتی ہے عموماً ابتدا میں خفیف بخار رہتا ہے ضعف چنداں معلوم نہیں ہوتا نغیان قے اور درد سر بھی کبھی کبھی ہوجاتے ہیں پیشاب میں البیومین ہو سکتا ہے چند روز میں سرم تحلیل ہونی شروع ہوجاتی ہے یا رطوبت خارج ہو کر اسکو جذب ہونے میں کچھ زیادہ ایام گذر جاتی ہیں کبھی اسکی رطوبت باہر کی طرف ناسو نیا دیتی ہے تب ضعف بہت رہتا ہے۔ دونوں جانب کی لیورسی بہت تکلیف دہ اور خوفناک ہے کیونکہ اس میں وکشی بہت زیادہ ہتی ہے کبھی لیورسی کا مرض ایسی آہستگی کے ساتھ ہوتا ہے کہ درد اور وکشی غائب ہتی ہیں۔ اسکو لیٹٹ لیورسی کہتے ہیں۔

ملاحظہ اور متحان (۱) سانس چھوٹا اور کھچکا ہوا نظر آتا (۲) مقامی درد پر سینہ میں لگائی گئی آواز سنائی دیتی چھپے نرم اور خفیف ہوتی۔ اور بعد میں گھری اور سوتی ہوجاتی ہے (۳)

رطوبت جمع ہونے کے بعد ماؤف جانب کا سینہ اوپر جانا اور پائیش سے بڑا معلوم ہوتا ہے (۴)، ماؤف حصہ میں سانس کی حرکات نہایت خفیف یا معدوم ہو جاتی ہیں (۵)، وکل فرنیٹل اوپر کے حصہ میں معمول سے زیادہ اونچے کم ہوتا ہے (۶)، قلع رطوبت کو مقام پر سینہ ٹھونکنے سے سخت معلوم ہوتا اگر اوپر زیادہ تو فلکچو لیشن بھی معلوم ہو سکتی ہے۔ سانس کی آواز غیر مستمع ہو جاتی ہے کلام کی آواز بھی سنائی نہیں جاتی مگر سانس اور کلام کی آواز اوپر کے حصہ میں تیز اور نیچے مدہم ہوتی ہے (۷)، شانہ کی ہڈی کے نیچے کبھی کبھی اکا فونی یعنی جبری کے بچہ کی منمناسٹ سنائی دیا کرتی ہے (۸)، ٹھونکنے اور سینہ میں لگا کر سننے سے پانی کی چھلک بھی کبھی سنائی دیتی ہے (۹)، جب خارج شدہ رطوبت جذب ہوتی ہے تو ماؤف حصہ اندر کو سکڑ جاتا ہے اگر بعد میں باہر ہو اچھٹھڑ نہ بھولے تو مفصلہ ذیل آثار باقی رہتے ہیں۔ ماؤف جانب سکڑا ہوا رہتا ہے متعین حرکات خفیف یا معدوم رہتی ٹھونکنے کی آواز مدہم اور سانس کی آواز ہلکی سنائی دیتی ہے۔ ناسوں کے بعد ماؤف جانب بہت سی سکڑ جاتی ہے۔ اسباب (۱)، مقامی خراش، ضرب غیر جنس شے کا سینہ کے اندر گھسنا، ہڈی کی ورم یا کیریو سیرطان یا ٹیوبرکل یا سیولی ہو جانا (۲)، سردی، گلداد، شدت محنت، دہ، پیری کارڈیم یا شش کے ورم کے بعد (۳)، فسادات خون مثلاً بخارات سپٹیسیا اور پانی ایبیا برائٹس ڈیز یا شراب نوشی میں (۴)، مری یا زفرہ کے اندر سے کسی غیر جنس شے کا سوراخ کر کے پلیورکے اندر جانا۔

کیفیت و انجام۔ پہلے تو اجمل خون ہوتا پھر لطف خارج ہونا شروع ہو کر اجتماع رطوبات ہو جاتا ہے بعد ازاں بہہ رطوبات آہستہ آہستہ جذب ہو کر زائد واصل ہو جانے میں بعض اوقات یہ رطوبت مدت تک جذب نہیں ہوتی بلکہ غلیظ ہو کر اسکی سپینجائی ہے۔ اس حالت کو میاٹما کہتے ہیں۔ یہ سپینج کی دیواروں پھیسٹھڑے کو کھانا شروع کرتی ہے اور آخر کار باہر کی طرف ناسور بنالیتی یا کسی ہوائی نالی میں سوراخ کر کے کھانسی کے ساتھ خارج ہوتی رہتی ہو کبھی مری یا انٹری میں جا کھلتی ہے۔ دو طرفہ پلیورسی اکثر مہلک ثابت ہوتا بلحاظ علامات کے اسکی مفصلہ ذیل اقسام کی گئی ہیں۔

(۱) خشک پلیورسی جس میں ورم جلد تحلیل ہونی شروع ہو جاتی اور رطوبت کچھ خارج ہونے نہیں پاتی ہو۔
(۲) اکیوٹ ہیپتیر ج میں تمام علامات درد و دکشی۔ اجتماع رطوبت وغیرہ تیزی کے ساتھ ہوتے ہیں۔
(۳) ڈائفرنیٹک۔ یعنی پلیورکے اوں حصہ میں سوزش ہونا جو ڈایا فرام سے ملا ہو ہے اس میں دکشی خفیف ہوتی سینہ تو پوری حرکت کرتا اگر پٹ کی حرکات کھینچ اور درد کے ساتھ ہوتی ہیں۔

(۴) بلا درد اور دکشی کے۔ اس میں ورم ہو کر اخراج رطوبات تیز و درد اور دکشی کچھ محسوس نہیں ہوتی۔
(۵) فائبرائٹ۔ اس میں ریشے بہت بڑے پھیسٹھڑے کو ہمیشہ کے واسطی دیوار سینہ کے ساتھ پیوست کر دیتے ہیں۔
(۶) ٹیوبرکلر جمل کے بعد ہو یا اسکے بعد مل ہو جاتا ہے جس میں رطوبت خارج شدہ میں سل کا مادہ بڑھ جائے یا پہلے پلیورکس ٹیوبرکل ہو کر مل ہو جائے۔

دویم ایسا نما۔ یعنی پلیوریس پیپ پڑجانا یہ عموماً پلیوری کے بعد ہوتا ہے اسلئے اکیلیان پلیوری میں کیا گیا۔

سولیم ہائڈرو تھوریکس۔ یعنی پلیوری کے اندر پانی پڑجانا یہ مرض عام استسقا کو ضمن میں پیدا ہو جاتا کرتا ہے پس جو عام استسقا اسباب میں ہی لنگھ اسباب میں دیکھو بیان استسقا کا دونوں پلیوری کے اندر صاف پانی بھر جاتا ہے جو پھیپھڑوں پر باؤں پہنچا کر دکشی پیدا کرتا ہے کبھی محض ایک ہی طرف پانی پڑتا ہے۔ ورم اور درد کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ دکشی کی وجہ سے خون پھیپھاڑے پر گردن پھیپھاڑے جاتا ہے ٹھوکنے سے سینہ دونوں طرف ٹھوس معلوم ہوتا سینہ میں لگنے سے کلام اور تنفس کی آواز مدہم یا معدوم معلوم ہوتی ہے پسلیوں کا درمیانی حصہ لہو کو ابھر آتا ہے۔

چھٹا ہمیشہ تھوریکس پلیوری کے اندر خون خارج ہو جانا اسکی علامات وہی ہیں جو پلیوری میں اجتماع رطوبت کے وقت ہوتی ہیں یعنی دکشی ٹھوس آواز کلام اور تنفس کی آواز کا معدوم ہو جانا وغیرہ اخراج خون کی وجہ سے ضفوف اور غشی کی علامات بھی طاری ہو جاتی ہیں یہ فصلہ ذیل کے کتاب سے ہو سکتا ہے۔

(۱) ضرب یا جراحی عمل (۲) کسی اینورزم کا اندر پھوٹ جانا (۳) پھیپھڑے کا سرطان جو پلیوری کو اندر

پھوٹ جائے (۴) پھیپھڑے کا جریان خون (۵) سل (۶) لیو کو سائی تھیسیا خود پلیوری کا سرطان

پنجم نیو مو تھوریکس۔ پلیوری کے اندر ہوا بھر جانا۔

اسباب (۱) اول، کسی سل کے غار کا پلیوریس کھل جانا (۲) دوسرا ایسا نما ہو کر پھوٹنے کا اندر کھل جانا (۳) سوم،

ضرب (چھٹا) ہری یا معدہ یا زخروں میں سورخ ہو کر پلیوری کے اندر کھل جانا (پنجم) پلیوری کے اندر پانی یا لف

پیپ جمع ہو کر اسکو تھن سے ہوائیں بننا (ششم) کالی کھانسی یا ایفنی سیا میں ہوائی نالی کا پھٹ

جانا (ہفتم) سینہ کی پیپ نکالتے وقت ہوا کا داخل ہو جانا۔

کیفیت جو ہوا تھن سے پیدا ہوتی ہے اس میں کچن کا ربا نک لیدر نائٹر جن اور سلفیورڈ ہائڈروجن ہوتے ہیں۔

زائد و صلوں کی وجہ سے خاص خاص خصوصیتیں محدود ہو جاتی ہے تب اس حالت کو ہائڈرو نیو تھوریکس کہتے ہیں۔

اور کبھی پیپ پڑ جاتی ہے تب اسکو نیو تھوریکس کہتے ہیں۔

علامات اگر دفعتاً کسی سورخ کے ہونے سے نیو تھوریکس ہو جائے تو ایک بیک شدت کا درد پیلوں میں ہوتا ہے

اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سینہ کے اندر کوئی شے جمع ہوتی جا رہی ہے پھر دکشی اور صدمہ کی علامات

غالب ہوتی ہیں خشک تکلیف دہ کھانسی آتی ہے۔

لاحظہ و امتحان (۱) سینہ پھولا ہوا (۲) سانس کی حرکات قریب معدوم (۳) کلام اور تنفس کی آواز

ضعیف یا معدوم (۴) ٹھوکنے سے سینہ و صول کی طرح بجتا ہے (۵) کھانسی موجی و دہات کی جھجکا سنا

دیتی ہے (۶) ٹن ٹن کی آواز کھانسنے بولنے یا سانس لینے کے ساتھ سنائی دیتی ہے (۷) سینہ کو جھجکا دینے سے

پانی چھلکنی آواز سنائی دیتی ہے (۸) دل اپنی جگہ سے کسی اور طرف کو دھکیلا جاتا ہے اور اوکی آوازیں تیز
گو بخنی والی ہوجاتی ہیں۔

انجام خطرناک کہی مریض جان بچھی ہوجاتا ہے۔

علاج۔ بلحاظ معالجہ اور علامات کو پلیوری کے چار اقسام کر کے اوسکا علیحدہ علیحدہ ذیل میں بیان کیا جاتا ہے۔
۱۔ اول خشک پلیوری جبکہ درد معلوم ہو چند جو تکلیف لگو اگر اسی کی پوسٹنی ہاٹکس پس لگا دیں عموماً اسقدر علاج کا
ہو جاتا ہے اگر اس سے آرام نہ ہو تو مقام درد کو شلنگ بلاسٹر لگا کر آرام دیں اور شروعیل ایک ٹین سہل دیکر
مفصلہ ذیل نسخہ استعمال کرائیں۔


۲۔ اگرین لائیکو ارامونیا ایسیٹس ڈرام کو آکفر ایک انس ایسی ایک
خوراک چار گھنٹہ بعد استعمال کر لے جس حتی کہ درد کو آرام ہو جاوے اگر سوزش کم کا اشتباہ ہو تو اگرین پیلین یا سوڈیم
سیلی سیٹ خال کر دیں آئوڈین پیٹ کرنا۔ رائی کالپسٹر لگانا۔ پوسٹ کی ٹکور کرنا اور چھالنا بھی مفید ہیں۔

۳۔ دوم تر پلیوری جس میں کہ خفیف مقدار میں جمع ہو کر چارپانچ انشت جگہ ٹھوس ہو جاوے اسکا علاج بعینہ اسی طرح
ہے کہ جیسا کہ خشک پلیوری کا یعنی امگا کو ٹین ہسلمات ہی صاف رکھنا مقامی درد اور سوزش کی سوزیم آئوڈین پیٹ
پلاسٹر جو تک اور مصنوعی ہلے سے کم کرنا معرقات مدرات اور لفیڈنگ ٹی ہونٹا دویہ سی خارج شدہ رطوبت کو تحلیل
کرنا بخار کو فٹین۔ اینٹی پائیرین۔ اینٹی فیرین اور کوئین وغیرہ سے اتارنا اور جو مختلف علامات پیدا ہوں ان کا حسب قواعد
عام علاج کرنا۔ آئیون پلیوری کے لئے نہایت عمدہ دوا ہے کیونکہ اس سے سوزش۔ درد۔ کھانسی جھینک اور دکشی
وغیرہ میں تخفیف اور زیادہ اخراج رطوبت بند ہوجاتی ہے۔ اسکو معرقات اور لیڈناٹک کرنا نفع دلا کر استعمال کرنا
چاہیے۔ پوٹاسیم کوڈائیٹ اور ٹارٹار ایمینٹک ملا کر دینا نہایت مفید ہے۔

۴۔ سوم تر پلیوری جبکہ پانی زیادہ مقدار میں خارج ہو کر اینگل آف دی سکے پولاسے اوپر تک ٹنٹیس ہو جاوے اسکا
علاج اسی طرح ہے جیسا کہ نمبر دو میں بیان کیا گیا فرق صرف مقدار ہے کہ اس میں کاؤنٹر ایٹین۔ ادرار اور سہا
زیادہ قوی کرنا چاہیے مرکزی آئمنٹ کی ماؤف حصہ پر مائش کرنا جذب طوبات میں مدد دیتا ہے۔ اگر چند روز
تک اس علاج سے پانی جذب نہ ہو بلکہ اور روز بروز زیادہ ہو کر سخت دکشی ہوتی جائی تو ٹرکار اور کینولا کو ذریعہ
کل یا کچھ حصہ پانی نکال لینا چاہیے۔ ایسا اکثر کچھا گیا ہے کہ کچھ پانی خارج ہونے کے بعد باقی خود بخود جذب
ہو جاتا ہے۔ اگر بہت سا حصہ جذب ہو کر بقدر پانی مدت تک باقی ہے تو تبدیلی آب و ہوا کی صلاح دینی چاہیے
اینٹی پائیرین۔ اگرین خوراک میں چار دفعہ روزانہ دینا نہایت مفید ثابت ہوا ہے۔

چھٹا تر پلیوری جبکہ پانی بہت زیادہ مقدار میں خارج ہو طبی تدابیر ایسی حالت میں ہی ہیں جو اوپر بیان کی گئی
لیکن اگر ان تدابیر سے خارج شدہ پانی جذب نہ ہو تو نفس اور دوران میں زیادتی پانی سے دقت اور خلل واقع
ہو جائی یا مدت تک اُسکو دوا کی وجہ سے پھر بیکار اور بند پڑے یا سرفرد طرف پانی جمع ہو گیا ہو تو تھوہے

مضد عام: سپریم، ریپ، ہیر، بکریہ۔ روہ ردریو لاداس لکے بغیر یہ اسپر اور سالیفٹ اکشن



پانی نکالا جاوے۔ پانی صاحب کا اپنی ٹیڑاس
مطلب کے لئے سب سے عمدہ جسکی تصویر نقشہ ذیل
میں دکھائی گئی ہے۔ بائیں طرف چھٹے یا ساڑھے
اور داہنی طرف پانچویں یا چھٹے انٹرسپیس میں
نڈاگزیری لائن کے قریب ٹروکار روہل
کریں۔ اگر جلد سخت ہو تو پہلے جاؤ کر اسکا ڈیکوئری
جب تک ٹروکار روہل نہ لائے استعمال
کیا جاتا ہے اسکی تنگی کی کچھ ضرورت نہیں
رہتی۔ اگر تشخیص پانی میں کچھ شبہ ہو تو پہلے

ہائپوڈرمک سنج کے ذریعہ اپنا اطمینان کر سکتے ہیں۔ اس وپریشن میں مفصل ذیل جیلا نہایت ضروری ہیں
لامیہ کہ ہر ایک اوزار خاص کر ٹروکار روہل کو خوب پانی میں چکا کر کاربانک روشن فیصدی کی طاقت میں رکھ
چھوڑیں اور استعمال کے وقت اگمال میں ڈبو کر سپرٹ لیمپ پر خشک کر لیں جب قدر زیادہ اینٹی سپیک
احتیاط کیا جلتے مناسب ہے۔

(۲) چونکہ ہر سلی کے زیرین کنارہ پر انٹرکاسٹل شریانیں ہوتی ہیں اسلیوں اس کنارہ کو اوپر لٹھ کی وقت چا چاہیڑ
(۳) تمام پانی ایک دفعہ نکالنے میں سخت اندیشہ میں۔ اول یہ کہ دفعتاً بے ہوئے پھیپھڑے جو پھوٹے لئے نہیں انکی
وریدوں اور شریانوں میں خون بافراط جمع ہو کر سخت کھانسی اور سوزش شروع ہو سکتی ہے۔ دوم
یہ کہ دماغی مینینجیا اور غشی کا اندیشہ ہی کچھ حصہ جو باقی چھوڑا جائیگا اول تو وہ خود جذب ہو جاتا ہے ورنہ
دوبارہ اسکو نکال سکتے ہیں۔

(۴) اگر دوبارہ پھر پانی جمع ہو جاوے تو اسی طرح اسپر کے ساتھ اسکو نکال سکتے ہیں لیکن اگر بار بار پانی
بڑتا رہے تو یہ خیال کرنا چاہیے کہ پھیپھڑے زائد ساختوں کے دباؤ کی وجہ سے اپنی اصلی مقدار تک نہیں
پھولتے اسوجے خون یا دیگر پانی چھتنا شروع ہو جاتا ہے پس ایسی حالت میں بار بار اسپر کے
سے پانی نکالنا کچھ فائدہ نہیں کرتا۔ بلکہ خون کا سر اسر نقصان ہو کر ٹھکان اور کمزوری زیادہ ہوتے ہیں۔
۵ ٹروکار نکالنے کے بعد فوراً سوراخ کو ٹوڈین سے بند اور اینٹی سپیک لٹ رکھ کر ٹنگ کر دیں کر دیں۔

پرو فیسر ملیو اسکیر صاحب کی یہ رائے ہے کہ کچھ حصہ پانی کا نکال کر اسکی بجای پچھلے حصہ تک سوختہ شی رسی لایز و پانی
میں حل کر کے شیر گرم اسپر پر گامخ بہ لکر اندر پنچاویں اس سے اندرونی دباؤ کا سوازدہ کر وہ نقصانات ختم
ہونے پاتے جو دفعتاً پانی کم ہو کر پیدا ہوتے ہیں پھر اور پانی نکال کر ٹنگ کاٹھ رسی لایز و سالیفٹ اسپر

اپنی بڑے دال کریں۔ دوا ہر دو روز ایک بار دینا۔ جو ۱۰۰۰ سی سی پیوٹ
کچھ ضرور نہیں کرتا اور خود بخود جذب ہو جاتا ہے۔

پلیوریٹ میں غذائیں خشک یا رقیق غذاؤں اور پانی سے پرہیز کرنا اور کینتیا سلفاس کم سے کم مقدار پانی میں حل کر
پلانا شروع میں اس مرض کو روک دیتا ہے مفصلہ ذیل دو یہی اس مرض میں مفید ہیں۔

اکونائٹ ایٹھی منی۔ پوسالی نین ایسکی پاس ٹیو برورز اکیوڈین ہرا یونیا البانی لونا پین جیسو نڈی قسٹین
خفیل۔ کرائی روٹ کریزوٹ۔ جی ٹیس۔ ہائیڈروکائی نان۔ کیو بریکو۔ ورے ٹریا۔ انکاسیان دیکھو۔

سنگنگ پلاسٹرے ماؤف جانب سینہ کو مشرپ کرنا سطر سے کہ ایک سراسٹر فرم پر اور دوسرا پائین پر قائم ہے
اس طرف کی حرکت کو کم اور درو کو فرو کر دینا اور جذب پانی میں مدد دیتا ہے۔

پنجمہ۔ پروٹ پلیوریٹ۔ ایٹھا۔ دیوار سینہ اور شش کو درمیان پیپ ٹر جاننا۔ پانو تھو جیس۔ یہ مرض اکثر بچوں
میں ظاہر ہوتا ہے اگر پیپ قلیل المقدار اور غیر متعین ہو تو اکثر خود بخود جذب ہو جاتی ہے لیکن اگر متعین یا کثیر المقدار
ہو تو اخراج ہی اسکا علاج ہے۔ بعض اوقات قدرتی طور پر پیپ کی تھیلی کسی بڑی ہوائی نالی (براہیل ٹیوب)
میں کھل کر تدریج تمام کھانسی کے ساتھ پیپ خارج ہو جاتی اور جوف پیپ بند ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو مفصلہ
ذیل تدریج میں سے کوئی تدبیر مناسب حال کر سکتے ہیں

(الف) پیپر ٹرے جیسا کہ قسم چار کی پلیوریٹ میں بیان کیا گیا پیپ نکالنا رقیق قلیل المقدار اور غیر متعین پیپ کے
یہ علاج کافی ہے۔

دب (ب) پلیٹ کے درمیان شکاف دیکر ڈرنیج ٹیوب داخل کرنا۔
(ج) پلی کا کچھ حصہ قطع کر کے زیادہ کھلا شکاف دینا اور بڑا ڈرنیج ٹیوب داخل کرنا پلیٹ کو درمیان شکاف
دینے کی نسبت اس میں یہ بہتری ہے کہ گفت اندر داخل کر کے جمی ہوئے پیپ کٹروں کو نکال سکتی ہیں اور ڈرنیج
ٹیوب پر دباؤ نہیں پڑتا ہے جب پلیٹ کا درمیانی خاصہ بہت تنگ اور پیپ کثیر المقدار اور متعین ہو تو ایسا ہی بہتر ہے
آن ہر دو ہفتہ تک ریلوں کے لیے بہترین مقام بائیں چھٹی یا ساتویں ریل کے بالائی اور مائیں ریل کے
قریب ہے۔ اگر قدرتی طور پر نہ نکلا جائے تو اسکا سوراخ کو کشادہ کر کے ڈرنیج ٹیوب داخل کر دینا چاہیے
اگر اس قسم کا کوئی قدرتی سوراخ نہ بنا ہو تو شکاف پیپ سے پیشتر ہائی پوڈک سرخ کے ساتھ تشخیص کو متحقق کرنا
چاہیے۔ اگر پیپ خراب اور متعین برآمد ہو تو ڈرنیج ٹیوب داخل کرنے کے بعد مفصلہ ذیل روشنیوں میں سے کسی
روشنی کے ساتھ جوف پیپ کو دیکھ سکتے ہیں۔

(۱) فی پائٹ ایلو ہوئے پانی میں دو ڈرام تک حل کیا ہوا

(۲) ۲۰ انس ایلو ہوئے پانی میں اگر نیلی سلک ایڈاڈ اگر نی پورک ایڈل شدہ۔

پلیوریٹ روٹ Pleurisy Root جیسی نیم ہونڈ کا بیان دیکھو۔

پلیوریٹائٹ pleurodynia درد پہلو۔ ذات الجنب لُجھی۔ پسلی کا درد۔ اس سے مراد وہ درد ہے جو سینہ کے عضلات میں عیب دردِ سطحی اور منتشر ہوتا ہے کھانسی اور بخار کچھ ساتھ نہیں ہوتا۔ دبانے اور سانس سے آرام معلوم ہوتا ہے۔ دکشی نہیں ہوتی کسی خاص نقطہ پر درد محدود نہیں ہوتا برخلاف پلیوری کے کہ اوہیں عموماً بخار اور دکشی لازمی ہیں سانس کے ساتھ درد زیادہ ہوتا جاتا ہے اور خشک کھانسی بھی اکثر ہوتی ہے۔ یہ ملاحظہ اور امتحان میں وہ اندرونی امور جو پلیوری میں ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہوتا یہ مرض عموماً فسادِ ہاضمہ یا گرمِ سرد ہونے یا ورزشِ جسمانی کے بعد ہو جاتا ہے اور جلدی آرام پذیر ہو جاتا ہے۔

علاج - یہ مرض عموماً میوے شرم کے سبب ہی ہوتا ہے اسلئے شروع میں ہاٹ پیک - ہاٹ آیر ہاتھ یا پاؤں
وہ پر ہاتھ یا کرکٹس ہاتھ ویکر سوڈی پلی سلاس ۳۰ گرین کی خوراک میں کھلاویں۔ اور بعد ازان اینٹی پائین
اگرین خوراک میں آٹھ گھنٹہ بعد دیتے رہیں۔ مقامی طور پر رائی - بلشر - لیمینٹ کر وٹن گلاس - سسج مرچ
لیمنٹ مارٹار - منتھال - کلورل کیمفر لیمنٹ کمینٹر کز لیمنٹ آئیوڈین وغیرہ کا نوٹرائیٹ یا لیمنٹ آئیوڈینٹ لیمنٹ
بیلارڈ ونا بیلارڈ ونا پلاسٹر ککورا فارم وغیرہ سکن مراد وید لگاویں اگر دروبست سخت ہو تو یارنیا اور اسٹروپیا کی
جلدی بچکاری کریں اگر زبان جلی ہو تو شروع میں سہل ویکر مفصلہ بالا علاج شروع کرنا چاہیئے جب درد پڑا
پڑ جائے تو پوپاسیم ایوڈائیڈ اگرین - پوٹاسی بائی کاربہ اگرین ٹینکچر سیسی فوگاکا - ایونڈاکہ اگریمی ایکٹونس
ملاکر ایسی تین خوراک روزانہ دیتے رہیں۔

پلیورونیومونیا Pleuroneumonia نیومونیا کا بیان دیکھو۔

پیتل فلور Pencil flower سٹائی لونگ تنخیر الیٹور کا بیان دیکھو۔

پنسی Punsy وائیولا اٹالی کلور کا بیان دیکھو۔

پیشہ کاری کے امراض۔ انکی علامات اور کوائف حسب ذیل ہوتے ہیں

اول سعد سے نیچے ہر دو جوانوں تک پہنچتا ہے گھر ابا نے سے پکڑا میں گھبرا کر رونا ک معلوم ہوتی ہے۔

دومہ۔ اگر نیکریاس کی رطوبت کم خارج ہو تو روغنی اشیا ہضم نہیں ہو سکتیں بلکہ براز کے ساتھ ... جربہ تیل

ایسے لوگ ہیں خارج ہوئی ہیں۔ برائے رنگت میاں ہو جاتی ہے کیونکہ صفر اور طوبت پھر مایں طوبت کی گنجین مئی ہزار

سقی م سعدہ پر دیا اور خراش پہنے سے ڈکا
ت تو اور نفی اور قتل بھی ساتھ ساتھ قریب۔

چھٹا۔۔۔ پیشاب میں تیز اور روغن کے قطرات خارج ہوتے ہیں یہ سہولت اس کے کہ شہابہ عالمی ہو یا غیر عالمی۔

پس بھی ہو سکتا ہے۔

ششہم روغنی اشیاء ہضم نہ ہونے کے سبب و لاغری رقت رفت خون بہت جلدی بڑھتے جاتے ہیں۔

تفصیل امراض جو پھیپاس میں پیدا ہو سکتی ہیں (۱) دم (۲) اجتماع خون (۳) انیمیا (۴) جریاں خون (۵) ہزال (۶) کنکر لیان یا پتھری (۷) سکرس یعنی سرطان (۸) متفرق سولیاں۔

تشخیص سودا و سکرس کے دوسرے امراض کی یقینی تشخیص نامکن ہے سرطان میں اسکا بڑا ہوا سر خلوص کی حالت میں محسوس ہو سکتا ہے۔

انجام عموماً خراب سکرس بن یقینی طور پر جھک۔

علاج۔ اگر کسی قسم کی میگنٹ رسولی اسکی ساخت میں پیدا ہو جاوے تو محض اسقدر ہمارے اختیار میں ہو کہ معمولی طور پر دم کو سرخ کیا جائے اسکی سوزش اور دم کا بھی کوئی خاص علاج نہیں ہو۔

پکڑے ٹکسٹ بعض اوقات ہتھکڑی ہو جاتی ہے کہ ایک گیلن یا اس سے بھی زیادہ پانی پڑھاتا ہے۔ اسکا سبب عمدہ علاج یہ ہے کہ کان پکڑیٹھ کر ڈینج ٹیوب اندر داخل کر دیا جاوے ٹیپنگ اسپیشلین۔ او۔ کیسرن سے بھی اسکا علاج کیا گیا ہے بار بار ٹیپ کرنے سے بھی اکتا اسکو آرام ہو جاتا ہے۔

پنکریٹک اکسٹراکٹ **Pancreatic extract** اسکو زانی میں بھی کہتے ہیں عموماً زانی میں فیئر پنکریٹک لین **Bencreatine** کے نام سے مشہور ہے۔ زانی میں کلابیان دیکھو۔

پیپی نیلا انانی نرم **Pimpinella Anisum** سوئف کو درخت کا نام ہے سوئف کا بیادیکھو **Poison** پوایزن زہروں کا بیان دیکھو

پوٹینٹیللا سارمنٹو سا **Potentilla Sormentosa** اس درخت کا نام فلوئوٹنگرا **Potentilla Canadensis** اسک فوہل بھی ہے ایک

عہدہ ٹانگ اور اسٹرنٹ ہے۔ سل کے قوق شبیہ اسہال اور پیش میں مفید خمر سفوف درخت ۲۰ گرین سے ۶۰ گرین تک۔ فلوئوٹنگراٹ ۱۰ پونڈ سے ۶۰ پونڈ تک۔

پورائی گو **Porrigo** ایک عام قدیم معیجی مصلح ہے جو سر اور چہرہ کے مختلف امراض مثلاً اگر یا مینیا فاؤڈرا وغیرہ پرستعل ہوتی تھی۔ آگزیما اور مینیا کابیان دیکھو۔

پورٹ **Port** سب سے عمدہ سٹی ولٹ اور ٹانگ شراب ہے الکمال کابیان دیکھو۔ پائڈروسیل میں پانی نکال لینے کے بعد لٹے ہوزن پانی میں ملا کر تھیلی کے اندر پکچاری کرنا سوزش پیدا کر کے اسکی دیواروں کو پورٹ کر دیتا اور دوبارہ پانی پڑے ایک مانع ہوتا ہے۔

پورمینٹر کو عین **Poor Man's Quinine** سبائین کابیان دیکھو۔ پوروزاوپریشن یا اور ویشیٹوٹی۔ عمل ان حالتوں میں جبکہ یہ کا قدرتی رہتا ہے پیدا ہوا یا **Quinine** اسکی مدد سے عمل میں تیز تر سیکشن کی جائے اختیار کیا جائے۔

اگر جریان شروع ہو گیا ہو تو فوراً خالی ہاتھ جو خوب اینٹی سپٹک کر لیا ہو یا برف کی ٹولیاں (اگر موقعہ پریس کر جاویں) رحم کو اندر پہنچا کر جلدی سے ہر چار طرف پھیریں۔ ایسا کرنے سے رحم سکڑ کر خون کو بند کر لیتا ہو یا ہر سے بھی رحم کو دبائیں اور پھر اگر رحم کے اندر آنول کا کوئی ٹکڑہ یا خون کا تو تھڑا معلوم ہو اسکو نکال لینا چاہیے رحم کے اندر ٹکڑہ یا تھنڈی پانی کی چھلکا کرنا بچہ کو پستان پر لگا دیا جائیگا اگر ناراضی رحم کو سکڑے اور اکثر جریان خون کو بند کر دیتے ہیں۔

اگرانی نل اور ٹا پر دباؤ دینا رحم کے اندر آؤ ڈو فارم گاز کی گدیاں بھرنا بھی مفید تدارک ہیں۔ اگر سطر سے خون بند نہ ہو تو لائکوار فیرو پر کلورائیڈ ایک حصہ پانی میں چھ حصہ لیکر اسکی رحم کے اندر پھکاری کریں یا لٹ بھگو کر رحم کے اندر پھیریں۔ اس سے سطح سخت لگیں بند اور خون ٹھہر جاتے ہیں۔ اسیں ایک آدھ سے دو کھجور شدہ خون کے ٹکڑے سپٹک حالت میں خون میں لٹجائیں اور پٹی سیسیا پیدا کریں۔ اسکی بجائے ٹنگل آؤ ڈوین چار پانچ حصہ پانی میں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں جب خون بند ہو جاوے تو ایک ٹنگل کا ٹکڑہ دیدیں۔ مریض کا سر نیچا اور پاؤں اونچ کر دیں تاکہ سر کی طرف خون زیادہ نہ پہنچے۔ اتھیر اور امونیا براہ دہن یا جلدی پھکاری دیں۔ اگر تقاضا بدرجہ کمال ہو گئی ہو تو خون یا دودھ یا سناک بانی خون کی رگوں میں پہنچائیں جب مریضہ اس حالت میں بحال ہونے لگتی ہے تو اکثر سر میں درد کی تکلیف ہو جاتی ہے ایفون اسکے لیے عمدہ علاج ہو۔

پوچھ Posture وضع نشست و برخاست وغیرہ۔ وضع نشست و برخاست کا صحت و امراض پر بہت کچھ اثر ہوتا ہے۔ جسکا مختصر بیان ہم ذیل میں کرتے ہیں۔

اول پوچھ کا اثر عام صحت پر۔ انداز سے زیادہ کھڑے رہنا یا بیٹھے رہنا یا لیٹنا ماحکم کر کا کم کرنا بہت سی امراض کا باعث ہوتا ہے جن میں عموماً تو کم از کم زیادہ کھڑے رہنا یا پھر کھڑے رہنا یا لیٹنا ہے انہیں اکثر دیر کی کوئی اور چیز دلیلی تھکان کمزوری۔ رحم کا جیکر گر پڑنا وغیرہ امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ زیادہ جھک کر کام کرنے سے نقصان بعض ماضیہ بد وضع کی سینہ خلل دوران و فاساد قلب عروق ہو جاتے ہیں۔ مرض کجالت میں زیادہ چٹ لیٹوٹے سے پیچھے پھرنے اور خنجر خون اور سرفریز ہونا کجالت میں اختل اعلم ہو جاتا ہے۔

زیادہ نشست کی حادثہ بوقض و ایٹمی۔ بویہ خضع ماضیہ اور عام کمزوری پیدا ہوتے ہیں۔

دوم پوچھ کا اثر امراض پر۔ اگر کوئی امراض خرابی پوچھ سے پیدا ہو رہے ہو اس مرض کے علاج میں سب سے مقدم پوچھ کی اصلاح ہے۔

سخت لاغری اور قہارست کی حالت میں جو اکثر پرانے امراض میں لاحق ہو جاتی ہے مریض کی پوچھ بدلتے رہنا۔ اسکو دھتا اور بیڈ سوئے بچانا ہے۔ ایسی حالت میں نرم بستر پر چٹ لٹانا۔ اور مریض کے پسٹ کو موافق کر دینے بدلتے رہنا بہت مفید اور آرام دہ ہو گا لیف سینہ مثلاً کھانسی و کھشی اور درمیں سیکھ بیٹھنا یا ایک تھکے کے کوچک کر سینہ کو دبا کر علاج بلغم میں مدد اور کھشی کو کم کرتا ہے۔

ضعف بصل و عشتی کی حالت میں مریض کو چٹ لٹا دینا اور سر کو باقی جسم کی نسبت نیچا رکھنا چاہیے تاکہ خون نہ باغ کی طرف

بہت بچھا ہے واقفان اکثر کہتے اور دیکھنے میں آئے کہ بعض مریضوں کے گرد اور پیروں کے گرد لٹا کر کھلا دیا جکا نتیجہ
ہوا کہ مریض کا وقتاً و بختی ہی دیکھتے خاتمہ ہو گیا بدعکس اس کی بعض امراض قلب ایسی ہوتے ہیں کہ انہیں مریض ہرگز لٹ نہیں سکتا
مثلاً ڈائی لٹیشن اور ہائی پریشر وائی آف ڈی ہارٹ یعنی قلب کا موٹا اور کشادہ ہو جانا ایسے معاملات میں مریض کا اپنا بخیر
قابل اعتبار نسخہ ہوتا ہے طبیب کو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔

سینہ کے اینورزم میں مفتول اور مینیبول مریض کو چٹ لٹا کر کھنا دے اور طرح سے فائدہ دیتا ہے۔ اول تو اس طرح کہ دوران
خون سست رہتا۔ اور دوسرے اس طرح کہ غذا کم کھائی جاتی ہے۔ اطراف کو اینورزم میں عضویہ و ف کو خم
دینا دوران کو بند کرنا اور اصل مرض کو فائدہ بخشنا ہے مثلاً کسی ٹانگ میں اینورزم ہو تو گھٹنے پر اور کلائی میں ہو تو
کہنی پر خم دینے سے دوران خون کم ہو کر اینورزم کم ہوتا جاوے گا۔ ایسے مفاہات کا خون بند کرنے کے لئے بھی
اوقات ضرورت ہیں یہ ایک نہایت عمدہ اور آسان ترکیب ہے۔

ورم اور لٹیریا کے علاج میں ایک نہایت عمدہ طریق ہے کہ ماؤف حصہ کو باقی جسم کی نسبت اونچا رکھا جاوے
مثلاً پاؤں ٹانگ گھٹنے فوطوں۔ ہاتھ بازو وغیرہ کے ورم اور ابلیہ یا میں

چٹ لیٹورینا سی سکینس گھمیر صدر ع شقیقہ اور کومار (بیہوشی) ماغی) میں مفید ہے۔

آوند یا لیٹنڈا مالی لائٹس سپائینل تنجائٹس۔ آئی ورتھن آف یوٹرس میں مفید ہے۔

پولٹیس Poulitice پولٹس پیری۔ انکا خاص مطلب کسی حصہ کو گرمی اور تری پہنچانا ہوتا ہے اور مقام
خراش گرمی اور رگوں کی کشادگی سے کیفیت کا وثراری ٹنڈل بھی پیدا کرتی ہے بعض اوقات انہیں مختلف دودھ
خاص خاص فوائد کی غرض سے شال کر دی جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے پولٹس جب بل قسام پر منقسم ہیں۔

اول ساوہ پولٹسین مثلاً اسی کی پولٹس۔ یہ عروق کو کشادہ جلد کو نرم کھینچ تناؤ اور درد کو کم کر کے ورم کو
تخلیل کرتی اور اگر پینٹی شروع ہوگئی ہو تو اسکو جلدی کا دیتی ہے۔ اندرونی اعضا کی سوزش مثلاً ہرڈ کانٹیس
نیومونیا پیری کارڈائٹس سیپٹائٹس سپلے نائٹس ٹفلائٹس پیری ٹفلائٹس۔ اوویٹائٹس پیری
پیرامیٹرائٹس وغیرہ میں پولٹس بعض کا وثراری شیش لگائی جاتی ہیں۔ لیکن انکا استعمال مریض کو لئے
ایک ناگوار بوجہ اور غلط ہو جاتا ہے۔ نحوڑی دیر میں ٹنڈی ہو جاتی اور مریض کی حرکات متواہد ہر کچھ کر ستر کو
خراب کر دیتی ہیں۔ چھوڑ دینا لگانے سے بعض اوقات انکی گرمی اور تری کی وجہ سے اور نئے نئے بھوٹے نمودار
ہو جاتے ہیں۔

زائد بوجہ اور غلطی اور جلدی سرد ہو جائیگی وجہ سے ایسی پولٹسین متروک استعمال ہوتی جاتی ہیں۔ انکی
بجائے ایک لٹ یا کسی کپڑے کی گدی تیز گرم پانی میں جھگو کر جائو ماؤف پر رکھنا اور اس پر گٹھ پرچہ یا سوم جامہ یا تیل لٹک
یا کیو کا پتہ جو گدی سے قد سے زیادہ ہو رکھنا اور بعد ازاں ایک رانی کی شجہا کر پٹی باندھ دینا تاہم پولٹس کے فوائد
بجھتا لیکن کسی قسم کی غلط یا رفت پیدا نہیں کرتا ہی پس ہمیشہ ایسا ہی کرنا بہتر ہے۔

دوم ڈس انفیکٹ پولسین۔ مثلاً چار کول پولس۔ یہ ایک کریہ اور پیورہ پولس ہے۔ اسلئے بجاؤ اسکو ایسی سیکنڈ ہل یا اولم کی ایک ہوا گدی تیز گرم پانی میں جھگوڑا کر بورک لنٹ کھلکھلاندھ دینا درجہ بہتر ہے۔ اولم کی گدی کے نیچے کاربائل آئل لگانے سے جلد پر وارغ نہیں پڑتا اور خراش بھی کم ہوتی ہے۔

سوم سڈیو پولسین۔ مثلاً فرمٹ اور ہیلاک پولسین۔ انکی بجائے تیز گرم ہیلادونا گلیسرین میں لنٹ کی ایک گدی جھگوڑا کر اوپر گدی پر چھ یا آئڈسلک یا کیا کا پتہ رکھ کر بی باندھ دینا بہتر ہے۔

چھٹا ہر کاؤنٹری ٹنٹ پولسین مثلاً رائی کی پولس۔ ہماری رائے میں فارماکوپیا کی تمام پولسوں میں ہی ایک پولس ہے جو قابل استعمال وجہ سے بدل کہلا سکتی ہے اسکو دس منٹ سی ایک گھنٹہ تک کھسکتی ہیں اکثر مرض اسکو تھوڑی سی دیر بھی برداشت نہیں کر سکتے زیادہ دیر رکھنے سے چھالہ پڑنے اور چھپچھپے بن جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اچکا استعمال اندرونی اعضا اور گہری ساختوں کے درم میں عمدہ کاؤنٹری ٹنٹ ہی اسکی بجاؤ چارٹا سنس پس (رائی کا کاغذ) یا معمولی لنٹ پولسین کی نیچو کھلورافارم یا ٹرنپائین چھڑک دیا ہوا کام دیکھتی ہیں۔

پولیو مانی لائی ٹریٹری ریبرکیوٹا۔ دیکھو بیان انفنٹیل پر سلی سنس کا۔
پولیو مانی لائی لاس آنٹی ریبر سب کیوٹا۔

علامات۔ یہ مرض تب شروع اور نامعلوم طور پر بڑھتا ہے۔ فالج کچھ لمبی ٹانگوں میں شروع ہوتا ہے اور کبھی ٹخنوں سے غرض ایک جگہ سے شروع ہو کر بڑھتا جاتا ہے عضلات شروع سے ہی قویٰ ہو جاتے ہیں اور جلدی بہت تپل ہو کر ری اکشن آف ڈسٹریشن دینے لگتا ہے ہیں حرکات انتقالی کم یا معدوم ہو جاتی ہیں جس عموماً غیر متبرہنہ نشانہ اور مقعد کبھی تو آؤف ہو جاتے ہیں اور کبھی نہیں۔

یہ مرض ۳۰ اور ۵ سال کی عمر کے درمیان ہوتا ہے نخلع کی انٹی ریبرکاروائس پرانی ورم ہو کر فاسد ہونے شروع ہو جاتے ہیں ایسا ہی انٹی ریبرنہ وروٹس کا حال ہوتا ہے۔

علاج۔ دیکھو پرے لی سنس کا بیان۔

پومی گرینٹ Pomegranate اس کے لذیذ خوشگوار دانوں کا پانی ایک عمدہ فخر اور مراض نافذ سکروی ہے۔ اسے پھل کی چھال محسوس کر ماما اور قابض اور ہمال پھپھس اور ورم گلو میں مفید ہو۔
خمر ڈاکشن ۱۲ اونس کم اونس تک۔ اسکی جڑ کی چھال میں ہر ایک جوہر سیلین ٹرین نام کلا جاتا ہے جو نہایت عمدہ مخزج کرم امعا اور ٹیپ ورم کے لیے مخصوص ہو۔

پھولا۔ لیو کوما۔ دیکھو بیان کارینا کے امراض کا۔
پھل بہری۔ برص امض دیکھو بیان جلد کے امراض کا۔
پھپھڑا شش۔ لنگ۔ پھپھڑا ہوائی نالیوں اور تھیمیکو ہوا ہوتا ہے جب زرخوئی لکیش جھگوڑا

برائے کہتے ہیں بھیسچر داخل ہوتی تو پہلے دو شاخوں میں تقسیم ہوتے ہیں، سطح ہر ایک شاخ دو شاخی ہوتی جاتی ہے آخر کار بال سے زیادہ ہر ایک شاخیں ہو جاتی ہیں جو پھولے ہوئے سروں میں ختم ہوتی ہیں۔ اس پھولے ہوئے سروں کا نام انفنڈی بولم ہے اسکی دیوار میں ہر طرف او بھار ہونے میں جو علیحدہ علیحدہ تھیلیاں ہوتی انکو ایروسی کہتے ہیں۔ پس بھیسچر کے امراض کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

اول برائے امراض

- (۱) اکیوٹ برائے ٹش یا اکیوٹ برائے کٹار۔
- (۲) کرائک برائے ٹش یا کرائک برائے کٹار۔
- (۳) پلاسٹک یا کروپس برائے ٹش۔
- (۴) برائے ایکٹس۔

دومہ برائے تھیلیوں یا خاص بھیسچر کے امراض

- (۱) پلمزری تھیسین بھیسچر میں اجتماع خون ہو جاتا (۲) پلمزری ایڈریا بھیسچر میں فی جمع ہو جاتا (۳) پلمزری مہیوینج بھیسچر کے اندر خون خارج ہو جاتا (۴) بھیسچر کی ورم۔ یعنی نیومونیا دیکھو بیان نیومونیا کا (۵) براؤن نیومونیا کٹارل نیومونیا لایو نیومونیا دیکھو بیان نیومونیا کا (۶) گینگرون آف دی لنک بھیسچر کا مردار پڑ جانا۔ دیکھو بیان گینگرون آف دی لنک کا۔ (۷) ایسفی سیا آف دی لنک ہوائی مساموں کا پھول جانا۔ دیکھو ایسفی سیا کا بیان۔ (۸) آستھا۔ ورم دیکھو بیان ورم کا (۹) پلمزری کوئیس (۱۰) تھائی کسٹر پلمزری کنٹریشن۔ دیکھو بیان تھائی کسٹس کا (۱۱) بھیسچر کا سرطان۔ بھیسچر کا آتش کسٹر (۱۲) بھیسچر کی مختلف سولیاں (۱۳) پلیر کے امراض۔ انکا علیحدہ بیان ہو چکا۔ دیکھو بیان پلیر کے امراض ان میں سے بہت سی امراض کا بیان علیحدہ علیحدہ کیا گیا ہے باقی ماندہ امراض کا ذکر ذیل میں دیا گیا جاتا ہے۔

اول پلمزری تھیسین کے اسباب حسب ذیل ہیں۔

- (۱) قلب کے دہنے بطن کا بڑا اور موٹا ہو جانا (۲) قلب کا فعل قوی اور تیز ہو جانا (۳) خراش (۴) ورم (۵) کثیفی (۶) رسولیاں (۷) دیر پا اور ضعیف کنندہ بخارات۔

دومہ پلمزری ایڈریا۔ یہ تھیسین کے بعد ہو جاتا ہے یا قلبی استسقا اور بڑھتی فزیز میں ہو جاتا ہے۔ سیوہم ہیمورج یعنی جریان خون۔

اسباب (۱) تھیسین (۲) ایما لزم (۳) ضرب (۴) بھیسچر کا سرطان یا رسولی یا غار یا اینورزم (۵) شریانوں کے امراض (۶) فسادات خون مثلاً سکروڈی پریپورا ملکت بجا۔

کیفیت (۱) تھیسین میں رنگ گہرا سرخ ہو جاتا ہے موقوف حصہ پھولا ہوا ڈھیللا اور تر رہتا ہے پانی میں تیز تازہ مسامات نظر نہیں آ سکتے اور لٹنے سے آسانی ٹوٹ جاتا ہے تلی کے مشابہ ہو جاتا ہے اسوہطی کا نام

سپلینڈر ٹکشن ہے۔

(۴) ایڈیا میں بھیشپھر اکثر کمر سخت ہو جاتا ہے اور اگر سینہ کھولا جاوے تو بچکانہ نہیں کاٹنے سے صاف یا رنگدار پانی خارج ہوتا ہے بھیشپھر کے کبھی سرخ رنگ کی ادھ کی پیچیدگی ہوتی ہے۔

(۵) بھیمو بیچ چار طرح سے ہو سکتا ہے۔ اول محدود جبکہ لمبائی اپالیکسی کہتی ہیں جب خون جذب ہو جاتا ہے تو زاندریشہ نکر اور رنگ باقی بکراؤف حصہ سخت بھوسے رنگ کا رہ جاتا ہے د ویدہ منتشر سویم لایو لو کے درمیان چھ آدم متفرق نقاط اور دھبوں کے طور پر۔

علامات۔ دکھی کھنچ گرائی کھانسی جبکہ ساتھ رفیق بلغم باظراط خارج ہوتا ہے اگر جریان خون بڑھ جائے تو بلغم کے ساتھ خون بھی نکلتا ہے کبھی بخار بھی ساتھ ہوتا ہے۔

ملاحظہ اور تھکان۔ سانس تعداد میں کمی ہوتی ہے پھر پھونکنے کی آواز صاف ہوتی ہے کمر بعد میں ٹھون پھونک اور ایڈیا میں خاص مقام پر ٹھون پھونک کی آواز ضعیف یا کمروری ہوتی ہے۔ ایڈیا میں چھوٹی تر لاسائی دیتی ہے بعد میں نیو نیالی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں کلام کی آواز کبھی زیادہ ادھ کی کم ہوتی ہے۔

انجام خطرناک خاصہ کجبالہ اور پیرگیان ساتھ ہول یا دوسرے امراض کی ضمن میں ظاہر ہو۔

(۶) پلما نری کو لیس بھیشپھر کے کچک جانا پیدائشی کو لیس پلما نری لیکٹوس اینیوٹوس کہلاتا ہے پلما نری کپشن پھیر کا ویجا نا کاسنی ٹکشن بھیشپھر کے کا گوشت کی طرح سخت ہو جاتا۔ ان حالتوں میں بھیشپھر کے کو اندر ہوا داخل نہیں ہو سکتی جب یہ حالت پیدا لشی ہو تب اسکو ایڈیا ٹکشن کہتی ہیں

علامات۔ دکھی ضعیف اور خالی کھانسی لاغری جسم اور ضعف کبھی تنفس کی وجہ سے خون ناقص ہو کر جسم کا رنگ بھیکار پڑ جاتا اور جلدی لاغر ہوتا جا تا ہے۔ اندرونی سانس لینے کے وقت سینہ کا ماؤف حصہ نہیں ابھرتا بلکہ اندر کو دبا معلوم ہوتا ہے ماؤف حصہ میں سانس کی آواز کم سالی دیتی ہے اگر دباؤ بترج و ارق ہو اور شروع میں چھوٹی چھوٹی ضعیف لاسائی دیتی ہے کیفیت بند حصہ کی کارہنے سے اجمل خون ہو کر انکا دھو جاتا پھر رفتہ رفتہ عروق خون محدود ہو جاتے ہیں ہوائی قلیلیوں کی دیواریں آہیں ہیوست ہو جاتی ہیں۔ اگر ماؤف حصہ کو قطع کر کے دیکھا جاوے تو صاف سطح نکلتی ہے حالت صحت کی طرح سام و انہیں ہونے ہولے بالکل خالی اور دبائے ملنے سے کوئی ہوائی بلبلہ چھوٹتے نہیں سنا لئی دیتے بلکہ وہ حصہ سخت اور مضبوط ہوتا ہے پانی میں ڈوب جاتا ہے کپشن میں کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ اگر دباؤ اس قدر ہے کہ ماؤف حصہ کی محض ہوائی ہوتی ہے مگر خون کی رگیں بدستور ہیں تو وہ حصہ سیاہ سرخ زحمت کا اور سخت مضبوط ہو جاتا اس حالت کو کاسنی ٹکشن کہتے ہیں جبکہ سمی میں گوشت بن جانا مگر بعد میں خون کی رگیں بند ہو کر اور تمام رنگت جذب ہو کر پیچیدگی رنگ کا ہو جاتا ہے اور بھونک سے بھول نہیں سکتا۔

اسبب۔ کولیسپس ہوائی نالی جو بھیشپھر کے کسی لایول میں ہو اور ہینچانی ہو اسکا تنگ یا بند ہو جانا جب کوئی غلیظ شے نالی کے اندر ہو تو میرنی سانس کو ساتھ اندر کی ہوا اسکو باہر کی طرف

دھکیل کر خارج ہوجاتی ہے مگر اندرونی سانس کی قوت ہوا اُس غلاظت کو اندر کی طرف لیجا کر رکھ جاتی ہے کیونکہ ہوائی نالیاں باہر کی طرف سے اندر کی طرف بند رہ جاتی ہیں اس طرح اندر کی ہوا تو خارج ہوتی رہتی لیکن بیرونی ہوا داخل نہیں ہو سکتی آخر کار تمام ہوا خارج ہو کر وہ لاپرواہ چمک جاتا ہے بمصلہ ذیل حالتیں اسکی مدد ہوتی ہیں۔

۱) اسپلیٹ کی سختی اور عضلات تنفس کا ضعف (۲) کمزور کھانسی جو بلغم کو خارج نہ کر سکے (۳) شکم کی رسولیاں یا عظم طحال و جگر وغیرہ جبکی وجہ سے ڈایا فرام کی حرکات تنگ ہیں (۴) کسی قدر پیدائشی ایچی لیٹو سس۔ اسبما کمپریشن (۵) پھیپھوں کے اندر ہوا یا پانی یا پیپ کا جمع ہونا (۶) پھیپھوں کی سطحوں کا اسپین پرست ہونا (۷) پیپ کی پیری کارڈیم کے اندر پانی بھر جانا (۸) قلب کا بہت بڑھا ہوا (۹) سینے کے اندر ایئر وزم یا رسولی ہونا (۱۰) شکم کا تہا نا جسکی وجہ سے سینہ پر دباؤ ہے مثلاً استغنا یا مراق البطن جل۔ اور وی کی رسولیاں عظم الطحال عظم الکبد رسولیاں وغیرہ ہیں۔

(۱۱) پھیپھوں کا سرطان۔ کبھی تو ابتداً جو تپ ہے اور کبھی دوسرے سرطان کو بعد چالین پچاس سال کی عمر کے درمیان مردوں میں ہوا کرتا ہے۔

علامات۔ سخت تکلف دہ کھانسی، دکشی، درو عام منصف لاغری، رات کو پسینہ آنے اور صبح بہت طبع لاغر ہونا جانا، ملاحظہ و متحان سینہ اور پھیپھوں پر مارو۔ مابون حصہ میں حرکات تنفس کم یا محدود آواز کا فزیز کر کمزور یا مدار و دھوکے کی آواز سخت تنفس کی آواز کم یا غائب قلب کا ایک طرف کو دھکیلا جانا۔ اگر تمام پھیپھوں میں سرطان پھیل گیا ہے تو مابون جانب سکر کر اسپلیٹوں کا درمیانی حصہ اندر کو دیکھاتا ہے تنفس کی حرکات بہت ہی کم ہوجاتی ہیں آواز اور سانس کا فزیز کم بعض حالتوں میں کم بعض میں زیادہ اور بعض میں غائب ہوجاتا ہے۔

ٹھوکنوں کی آواز کبھی لکڑی کے مشابہ اور کبھی ٹکڑیوں کے مشابہ ہوجاتی ہے، سرطانی حصہ خارج ہو کر فاسکی علامت باقی رہ جاتی ہے (۱۲) پھیپھوں کا آتشک۔ اسپن آتشک کی گیاں ہو سکتی ہیں یا نیوموینا ہوجاتا ہے بخار نہیں ہوتا۔ آتشک کی دوسری علامات جسم پر موجود ہونے اور بخار کے ہونے اور آتشک کی تشخیص ہو سکتی ہے۔

(۱۳) پھیپھوں کے اندر مختلف قسم کی رسولیاں ہونا یا مثلاً یا ٹیٹے ٹڈر سا کو مارا اکا ٹڈر مارا ہے تو وغیرہ ایسی علامات جسامت مقام اور سوزش کو مطابق مختلف ہوتی ہیں ای ڈیڈز میں تھیلی کے ٹکڑے یا اکائی ٹوکائی یا اکا کاپانی کھانسی کے ساتھ خارج ہو سکتا ہے دکشی زیادہ ہوتی ہے۔

علاج عام ہول اور علامات کو مطابق کرنا چاہیے۔

پینٹونائزیشن Pentonization اس ترکیب سے غذائیں ایسی تیار ہوتی ہیں جو ہضم ہوجاتی ہیں کہ حد بھر اور دیگر سانس کو زیادہ طاقت خرچ کرنی نہیں پڑتی یعنی جو کھانسی یا خیرات غذا میں ان اعضا کو فعل کے اندر ہوتا ہے

پیٹو نائیزیشن میں خارجہ جابید اہو جاتا ہے مثلاً البیومی نائیز کا پیٹو تریں بدلتا اور نشاستہ کا دیگر شین اور شکر میں بکاتے ہے بھی کیتھر غذاؤں میں یہ لیسر پیدا ہوتا ہے اور معدہ اور امعاء میں پیٹو نائیزیشن کی عمل سے اسکی تکمیل جاتی ہے پیٹو نائیزیشن کے دو طریق ہیں ایک تو معدہ کے طور پر یعنی پیپسین اور ہائیڈروکلورک ایسڈ کے ساتھ اس طریق سے البیومینس غذا میں پیٹو ترین بدلتا لیکن نشاستہ پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ غذائوں کا ذائقہ اور طبیعت چندان خراب نہیں ہوتے دوسرے امعاء کے طور پر پیکرے تک جوس کے ساتھ اس طریق میں البیومینس غذا میں پیٹو نائیز اور نشاستہ دار دیگر شین اور شکر میں بدلتا ہے۔ لیکن ذائقہ اور بھی خراب ہو جاتے ہیں یہی طریق زیادہ تر رائج ہے پس پہلی ہم طریق لاگوا انکری لیکن بننے کا بیان کر کے غذاؤں کی پیٹو نائیزیشن کے ذیل میں تشریح کریں گے۔

بیل یا بھیر یا حوک کا پیکر اس یعنی البیلے لیکر انکی تمام چربی صاف کریں اور چاقو یا پیچنی کے ساتھ اسکی باریک فیلا کا ٹکڑا اور چار چند ڈالٹیوٹ سپرٹ ریسیٹی فائڈ سپرٹ ایک حصہ باقی تین حصہ ملا کر ایک ہفتہ تک ایک بوتل میں رکھ چھوڑیں اور ایک دفعہ روزانہ خوب ہلاتے رہیں۔ ایک ہفتہ کے بعد ٹبل میں کچھ انکر جاذب میں کو چھان لیں۔ سطح ایک عمدہ لائیو انکر جو ٹیکس طیار ہو جائیگا۔ **اول** دودھ کا پیٹو نائیز کرنا ایک پائنٹ دودھ میں ۵ اونس پانی ملا کر ۱۴ درجہ فارنہائٹ تک گرم کرو۔ اگر تھراپیسٹ جو چاہے تو اس میں نصف دودھ کو ابال کر باقی نصف میں ملا دو۔ اس طرح کرنے سے فریڈ ہی حرارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اب اس میں چار ڈرام لائیو انکر ٹیکس اور اگرین سوڈا ابالی کا رب ملا کر ایک برتن بند کر کے ایک دو گھنٹہ تک کھ چھوڑو اس کے بعد دو تین منٹ جوش دیکر اٹار لیو۔ اسکا اندازہ یہ ہے کہ ایسی خفیف تلخی محسوس ہو جو ناگوار معلوم نہ ہو۔

دوم گندم جو۔ وال۔ ارا روٹ۔ ساگو۔ دانہ وغیرہ کے پانی کو پیٹو نائیز کرنا۔ پہلے انہیں سو کوئی سٹخوٹ یا نہیں بکا کر اسکو گھٹا کر لیں اور تب ایک برتن میں ڈال کر غنڈا ہونے دیں یہاں تک کہ شیر گرم ہو جائے تب فی پائنٹ گروا میں ۴ ڈرام لائیو انکر ٹیکس ڈال کر اسی برتن کو ڈھک کر اور گرم پے میں لپیٹ کر دو گھنٹہ تک کھ چھوڑیں بعد ازاں جوش دیکر اور چھان کر استعمال کریں گروال میں کوئی تلخی محسوس نہیں ہوتی اور پہلو خواہ کیسا ہی کثیف اور گاڑا ہو۔ اس عمل کے بعد صاف اور لطیف ہو جاتا ہے۔

سوم گروال اور دودھ کا کھ پیٹو نائیز کرنا۔ گروال کو آگ پر جوش دیکر اس میں موزن دودھ ملا دیں اور تب چار پانچ ڈرام لائیو انکر ٹیکس اور اگرین سوڈا ابالی کا رب فی پائنٹ حساب میں ملا کر دو گھنٹہ تک کھ چھوڑیں بعد ازاں دو تین منٹ دوبارہ جوش دیکر چھان لیں یہ ایک نہایت لطیف اور سرج اہضم غذا بن جاتی ہے اگر اس میں تلخی زیادہ محسوس ہو تو لائیو انکر ٹیکس کم ڈالیں۔

چھٹا پیٹو نائیز وٹوفیل نصف آثار گوشت کا خوب باریک قید کر کے اس میں دس چھٹا تک پانی اور قیل گرین سوڈا ابالی کا رب ایک بندو تلخی میں تھوڑی تھوڑی انچہ پردیہ گھنڈا تک پکادیں پھر اس تلخی کو دوسری برتن میں منتار کرانی قیہ کا چم کے ساتھ ملید بنا کر اس میں ملا دیں جب ۴ درجہ فارنہائٹ تک غنڈا ہو جاوے تو اس میں ایک اونس لائیو انکر ٹیکس ملا کر دو گھنٹہ تک بند ہو دیں اس برتن کو گرم پے میں لپیٹ دینا بہتر ہے تاکہ گرمی اور تک محفوظ رہے۔

ایسا ہی تمام متذکرہ بالا عملین کرنا مناسب ہو۔ اس عرصہ میں گائے گائے اسکو خوب ہالنے بھی رہیں۔ دو گھنٹہ کے بعد دوتین منٹ جوش دیکر اسکو چھان لیں یہ ایک نہایت قوی اور سرخ لہضم غذا بنجاتی ہے۔ اسکا ذائقہ بھی خراب نہیں ہوتا۔

پنجم پیشو نائزہ انیمیشیا مفصلہ بالانڈین سے دودھ اور گروال یا دودھ۔ گروال سیفی ٹی کو پیشو نائزہ ذکر کر بطور استعمال کر سکتے ہیں۔ روود کی کھاری سطح اور مناسب حرارت کیوجہ سے پکے ٹکے اسٹاک کا غذا بہ خوب اثر ہوتا ہے۔ لیکن معدے کے راستہ گیسٹرک لائڈ کا اس کو مقابلہ کرنا پڑتا اور اپنے فصل میں وقت اٹھانی پڑتی ہے۔ جب معدہ کوئی غذا قبول نہ کر سکتا ہو یا امعاء میں کسی جگہ بالاجہ میں سخت وک ہو مریض کو پیشو نائزہ انیمیشیا کے ذریعہ پرورش کر سکتے ہیں۔

پیشو نائزہ غذاؤں کے بارہ میں یہ امر قابل یادداشت ہے کہ موسم گرمی میں زیادہ دیر تک سالم نہیں رہ سکتی۔ اسلیو ایسی موسم میں اسکو دو دفعہ روزانہ لیا کرنا چاہیو تاکہ بارگھٹنے زیادہ آسیر نہ گزیدیں اور جس حصہ پر بارگھٹنے زیادہ گندہ جا کر اسکو دوبارہ خفیف جوش دینا چاہیئے۔

پیاس عطش تھرسٹ عطش کا بیان دیکھو۔

کامیان دیکھو

Pepper منج کامیان دیکھو

Peppermint ادبیم منجی کامیان دیکھو۔

پائیز کنفر نتھان کامیان دیکھو۔

Peppermint Camphor

Pepsine پیٹر بچھڑے یا خوک کو معدہ کی قلی صاف کر کے کھرج لینو اور اسکو کشیدہ

رکھ کر سو درجہ حرارت فارنہائٹ پر خشک کر لیتے اور پھر پشیں لیتے ہیں۔

معدہ کی کمزوری میں خواہ برقی سوزش کیوجہ سے ہو یا غدود کے فاسد ہوجانے سے یا قلت خون سے جو عام انیمیشیا اور تقاہت میں ہوجاتی ہے یا اثر اشار درد۔ کیوجہ سے جیسا کہ زخم یا سرطان کی حالت میں نہایت عمدہ عمدہ صنفیہ ہو سکتا ہے یا ہائڈروکلورک لائڈ کے ساتھ کھلا سکتے ہیں حقہ غذائی میں اسکو شامل کرنا روودہ کو کما صنفہ کو تقویت دیتا ہے۔ وٹنیز یا اور ممبرش کرپٹن پیسین کو گلوٹین لگانا فاسد زہریلی حملی کو حل کر لیتی ہے گلوٹین بذریعہ انسفیڈ لگا سکتے ہیں یا ایک ٹنگی میں بھر کر چھونک سواندہ پینچا سکتے ہیں گلوٹین پنچکر فوٹامیوس حملی پر چپک جاتی اور اپنا حل کنندہ ظاہر کرتی ہے جن دھنیز خفیف پیچھے جگہ ہوں یا انکی نہ میں بیا و صبح انکو کے سفید حملی ننگی ہو پیسین کا سرم لگانے سے جھپٹے اور خراب حملی حل ہو کر زہر بوہمت ہو جاتا ہے۔ جلتی یا زہموں کو بعد جو کارشوسیدہ ہو کر مفاصل کی حرکت کامل ہو جاتا ہے۔

اول سرم پیسین لینو لین ایک اورن پیسین۔ آگروں۔

دوم خوراک پیسین آگروں سے گلوٹینک۔

پاپا کا بیان دیکھو۔
 Papayotine
 Papaine
 Papay Tree
 پاپا کا بیان دیکھو۔

اپا پاپا کا بیان دیکھو۔
 Papaveris Rheds
 اپا پاپا کا بیان دیکھو۔

پا پاپا کا بیان دیکھو۔
 Paget's Nipple
 پا پاپا کا بیان دیکھو۔

پا پاپا کا بیان دیکھو۔
 Peditrix
 پا پاپا کا بیان دیکھو۔

پا پاپا کا بیان دیکھو۔
 Pedloul
 پا پاپا کا بیان دیکھو۔

پا پاپا کا بیان دیکھو۔
 Paraest phenitidine
 پا پاپا کا بیان دیکھو۔

پا پاپا کا بیان دیکھو۔
 Parasitoides
 پا پاپا کا بیان دیکھو۔

پا پاپا کا بیان دیکھو۔
 Paracanthosis
 پا پاپا کا بیان دیکھو۔

پا پاپا کا بیان دیکھو۔
 Paraphimosis
 پا پاپا کا بیان دیکھو۔

پا پاپا کا بیان دیکھو۔
 Paraphimosis
 پا پاپا کا بیان دیکھو۔

پا پاپا کا بیان دیکھو۔
 Paraphimosis
 پا پاپا کا بیان دیکھو۔

پا پاپا کا بیان دیکھو۔
 Paraphimosis
 پا پاپا کا بیان دیکھو۔

پا پاپا کا بیان دیکھو۔
 Paraphimosis
 پا پاپا کا بیان دیکھو۔

پا پاپا کا بیان دیکھو۔
 Paraphimosis
 پا پاپا کا بیان دیکھو۔

پا پاپا کا بیان دیکھو۔
 Paraphimosis
 پا پاپا کا بیان دیکھو۔

جو کھڑی کے پیچھے کھینچنے اور بچھنے سے پیدا ہوتی ہے جب عضو کا نقاب تنگ اور موٹا ہوتا جاتا ہے اگر مریض اس کو زبردستی کھینچ کر خشفہ کے پیچھے لے جائے تو وہ ایٹھ کر عضو کو ایسا گھومتا ہے کہ تمام خشفہ بہت جلد متورم ہو کر گھٹنے لگتا ہے ایسی حالت میں اگر جھٹ پٹ اسکی اصلاح نہ کی جاوے تو خشفہ مردار پڑنا شروع ہو سکتا ہے۔

علاج اس کے درست کرنے کے دو طریق ہیں۔ جو ذیل سے صاف ظاہر ہیں۔

اول طریق اسطرح کہ دونوں ہاتھوں انگشت سبابہ وسطی آئیں ملا کر ان کے درمیان عضو تناسل کو مین سپاری کے قریب پکڑیں اور جلد کو سامنے کی طرف کھینچیں ساتھ ہی ساتھ ہر دو انگلیوں سے سپاری کو دو بار کچھلی طرف جلد دیکھیں۔ ایسا کرنے سے سپاری جلد کے اندر چلی جاتی ہے۔

دوسرا طریق ہے کہ ہائیں ہاتھ کی انگشت وسطی و سبابہ کے درمیان عضو تناسل کو سپاری کے قریب پکڑیں اور سپاری کو سامنے ہاتھ کے انگلیوں کے سبابہ یا نام انگلیوں کی پھنگلیوں سے جوٹے ہائیں اور ساتھ ہی ساتھ پچھلی طرف جلد کے اندر دیکھیں حتیٰ کہ سپاری جسامت میں کم ہو کر تنگ شدہ جھلہ جلدی کے اندر جا گھے اگر ضرورت ہو تو سپاری کے اوپر پچک دار ربڑ کی ٹوپی چڑھا کر اسے دم کو کم کر سکتے ہیں۔ ان ہر دو طریق سے سپاری جلد کے اندر نہ جاکے تو اوپر لین میں دیر نہ کرنی چاہیے ورنہ دوران بند ہو کر سپاری کی سوزش اور مردار پڑ جائے گا اندیشہ ہے۔ اوپر لین صرف یہ قدر ہے کہ مریض کو بیہوش کر کے پھر مذکورہ بالا طریقوں کو دستی کی کوشش کریں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ایک تیز نوکدار برسٹری تنگ شدہ جھلہ جلدی کے نیچے گڈا کر اسکو دو ختم پری یوکس سے پچھلی طرف سپاری کے قریب کاٹ دیں۔

پیرافین سافٹ Paraffine Soft ویسلین یہ روغنی شے جلد پر کسی قسم کا خراش نہیں کرتی اور مستحق بھی نہیں ہوتی چونکہ بہت سی ادویات اس میں بخوبی مثال ہو جاتی ہیں اسلئے بعض مرہم مثلاً جبت اور سک کے اسی سے بنائے جاتے ہیں۔ آپس دو نقص ہیں ایک تو یہ کہ جلد میں سرایت کے خون میں نہیں پہنچتا اسلئے جوش کا اثر انداز ہر مریض یا منظور ہوتا ہے مثلاً پارہ اور پوٹاسیم آیوڈائیڈ کا آگے مرہموں کے واسطے یہ موزوں نہیں۔ دوسرا یہ نقص ہے کہ جسم کی حرارت پر پگھل کر روئی اور بیٹی کے نیچے پھیل کر گھر و نکو خراب کر دیتی ہے۔

پیرافین ہارڈ Paraffine Hard یہ بہت سی مزیں میں مثال کیا جاتا ہے
پیراگائیٹری Paraguay Tree ایکس بیراگے تنس برازی لین ہائی ایکس بیراگائیٹری
پیراکوٹوبارک Paracoto Bark
پیراکوٹو این Paracotine کوٹوبارک کا بیان دیکھو۔

پیرامورفین Paramorphine یہ ایفون کا ایک جوہر ہے۔ اسکا بیان دیکھو
پیرامیٹرائٹس Parametritis پلوک سیلولائیٹس
پیری مٹرائیٹس Peremetritis پلوک پیری ٹوٹائیں [پیری ٹوٹیم کے اس حصہ کی

سوزش ہو جو پیڈ وکے اعضا پر لگی ہوئی ہے۔ یہ مرض عورتوں میں بڑی کثرت سے ہوتا ہے۔
 اسپیکٹا۔ رحم یا ادری یا فلوپین ثوب کو درم احتباس الطمث سیبی سیمپا اسقاط اور پیدائش کے وقت رحم یا کمر
 پر کوئی جراحی عمل ہو نہ کہ۔ رحم کے اندر شش داخل کرنا ہائی من جلی کا سالم رہنا نشیبن کی رسولی رحم کی رسولیاں
 یا بیو برکل یا سلطان۔

اقسام۔ اسکی تین قسمیں ہوتی ہیں (۱) وصل میدا اگر نبولی یعنی رطوبت خارج ہو کر بعد میں پیڈ وکے اعضا ایک دوسرے
 سے پیوست ہو جاویں (۲) سبرس (۳) پرولینٹ یعنی پیپ والی۔ سیرم اور پیپ مقدار میں سیروں ہوئی ہیں۔
 علامات۔ شدید حالتوں میں لرزہ کے ساتھ بخار ہوتا جی مثلانا اور قے ہوتی ہے پیڈ وکے مقام پر درد
 ہوتا جو دبائے اور ہلانے جلانے سے زیادہ ہوتا ہے پیٹ بھوک جاتا۔ رحم میں اونچلی داخل کرنے سے
 سیرم یا پیپ کا اوجھال معلوم ہو سکتا ہے اگر وصل ہو گئے تو رحم ایک جگہ جمیانا اور ہلانے میں تکلیف
 ہوتی ہے اگر قطن خیز مادہ سرائت کرجائی تو عام سیبی سیمپا اور پیری ٹوٹائی ٹس ہو کر ہلاک ہو سکتا ہے۔
 انجام۔ خوفناک پھوڑا نہ بکفرج یا مقعد یا مثانہ یا رحم میں یا کسی اور طرف کھل سکتا ہے۔

پیرامٹرائیٹس - Parametritis

اس سے مراد پیڈ کے سیلو لٹشکی سوزش ہے۔ یہ اونہیں اسباب سے پیدا ہو سکتا ہے جو پیری مٹرائیٹس
 میں بیان کئے گئے پہلے اجتماع خون ہوتا پھر رطوبت خارج ہوتی۔
 یا قویہ رطوبت تجلیل ہوتی شروع ہو جاتی ہے یا پیپ بکر بھوڑا بن جاتا ہے جو درد و پھیل کر فرج یا مقعد یا مثانہ
 میں یا سیوں یا ران یا کمر میں کھل سکتا ہے۔

علامات

لرزہ کے ساتھ بخار ہو کر پیڈ میں درد ہوتا ہے۔ پیشاب اور پاخانہ کے متعلق تکالیف ظاہر ہوتی اور چلنے
 پھرنے میں درد ہوتا ہے۔ اگر الیک یا سو آڑ عضلہ تک درم ہو چنچ جائی تو ران سکر جاتی ہے۔ یہ مرض
 بہت اہستہ آہستہ ترقی کرتا اور مدتوں رہتا ہے۔

مفصلہ ذیل امراض میں باہم اشتباہ ہو سکتا ہے۔

پیری مٹرائیٹس۔ پیرامٹرائیٹس۔ فائیدس ٹیومس۔ ہم ٹو سیل

تشخیص کے لئے دیکھو اسکا

نقشہ لا بر صفحہ ۳۲۹

پیر الیٹریٹس	پیریٹریٹریٹس	سیرسولیکان	سیرسولیکان	
(۱) زیادہ تر جراحی عملوں اسقاط و منع عمل اور کبھی کبھی سیساک کے ساتھ ہوتا ہے۔	ان ایک باک کے علاوہ سوزاک، احتیاس الطست حیض میں ہوا لگنا اور دیگر امراض رحم ٹیٹریٹس بھی ہو جاتا ہے۔	بالکسی خاص وجہ کے آہستہ آہستہ نامعلوم طور پر بڑھتی رہتی ہیں	احتیاس الطست یا عسرت الطست یا ضرب یا سدہ فرج و رحم و زائما کی وجہ سے ہوتا ہے۔	
(۲) بخار اور زرد لایہ نمی نہیں۔	بخار زرد کو ساتھ کو خفیانہ اور قے اور نفخ و درد درشت۔ یہ ہو جاتا ہے۔	نہ بخار نہ درد و خفیانہ و قے کو کفرینہ الطست اکثر ہوتا ہے۔	دفعہ خون جاری ہو کر خفیانہ نصف اور غشی طاری ہو کر نکلتی ہیں۔	
(۳) دونوں جانب سختی ہوتی ہے۔	سختی رحم کے سامنے یا پیچھے محسوس ہوتی ہے۔	سختی خاص رحم میں ہوتی ہے	پیریٹریٹریٹس کے علاوہ لایہ نمی نہیں۔	
(۴) فرج میں انگلی داخل نہیں ہو جاتا اور پیرم پیرم سخت معلوم ہوتا ہے پیرم پیرم ہوتا جاتا ہے۔	اوپر رحم کے نیچے محسوس ہو سکتا ہے۔	اوپر رحم کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اور شکم کا سخت حرکت کرتا ہے یہ شروع حرکت اول حمل ہوتا ہے۔	اوپر رحم سے نرم پیرم سخت ہوتا جاتا ہے۔	
(۵) مافوف جانب کی ران سکری رہتی ہے	دونوں رانیں کھڑی رہتی ہیں۔	اس میں نہیں۔	اس میں نہیں۔	
(۶) رحم ایک طرف کو جکڑا جاتا ہے۔	رحم اپنی جگہ پر جکڑا جاتا ہے۔	رحم آزاد اور طرف ہل سکتا ہے	رحم مخالف سمت کو دیکھلا جاتا ہے۔	
(۷) ورم الیٹریٹریٹریٹس ہوتی	ورم منتشر ہوتی ہے	ورم محدود اور گول ہوتی ہے	ورم الیٹریٹریٹریٹس کے علاوہ لایہ نمی نہیں ہوتی	

علاج عام مہول کے مطابق کریں۔ زیادہ تفصیل کے لئے

دیکھو بیان پیریٹریٹریٹس و لایہ نمی کا

پیرامونو بروم ایسیٹنیس Paramonobromaoetinilide بیٹی سپین کا بیان دیکھو۔

Paronychia ڈلو کا بیان دیکھو

پیریکائیٹس پیریکائیٹس Parenchymatous Nephritis برائٹس ڈیزر کا بیان دیکھو۔

Parotitis پس کا بیان دیکھو۔

پیری اوٹیٹس Periostritis یا پیری آسٹائٹس۔ ماوف عضو کو کلی آرام دین اور

باقی جسم سے اونچا رکھیں۔ بلایڈ ونا گلیسرین یا سپرٹ لوشن۔ لگا کر آئڈسلک یا گٹا پرچہ رکھ کر ٹی باندھ دیں خفیف اور محدود سوزش میں اس قدر کافی ہے لیکن اگر وہانی امراض یا آتشک یا سخت ضرب کی وجہ سے پھیلنے والی شدید ورم ہوئی ہو تو درد بخار۔ زنی سوزش۔ ملاکت آستخوان وغیرہ کے علاج اور انسداد کے واسطے زیادہ کوشش کرنی چاہئے پس ماوف مقام کو تین چار دفعہ روزانہ سینک پیرائینی سپینک پولٹیشن لگائیں۔ ایک لٹ کی گدی گرم مرکزی لوشن دے گا یا کابک ربیم یا بورک ربیم ہیں جگہ کو اسپر آئڈسلک یا گٹا پرچہ نشو رکھ کر اور پھر روٹی کی مہوار دبیز تر جا کھی باندھ دینا نہایت عمدہ لوشن کا کام دیکھتی ہے۔ اگر اس درد اور سوزش میں تخفیف نہ ہو تو دس بارہ جونکلیں لگو کر اس طرح سے پولٹیشن لگا دیں کہ خون خوب خارج ہو جاوے۔ اگر اس سے بھی مرض میں تخفیف معلوم نہ ہو تو بلا توقف دوا میں گہرے شکاف سخت ڈی ٹک پیر چائینس۔ ایسا کرنے سے درد اور تناؤ کم ہو کر آستخوان کے مردار پٹے کا اندیشہ جاتا رہے گا۔ اگر یہ پٹے بھی تب بھی اس طرح بلاتال خوب گہرے شکاف دینی چاہئیں بعدہ حسب طریق بالا ایٹمی سپینک پولٹیشن باندھتے رہیں۔ اگر عام حکایف مثلاً بخار سرد درجہ چینی وغیرہ ظاہر ہوں تو معمولی طور پر مسہلات۔ مدرات محرقات اور دافع درد ادویہ سے اسکا علاج کریں۔ درد کے لئے خاص کر جیب آتشک موجود ہو تو پوٹاسیم آیوڈائڈ نہایت مفید ہوتا ہے۔ پوٹاسیم آیوڈائڈ اگرین ٹینک کو نائیٹ ہو نہ لانا گوارا مونیو ایسی ٹاس ایک ڈرام۔ آلو کمفر ایک انس اسکی تین چار خورا مناسب وقفہ سے بخار اور درد کی حالت میں دینے میں۔ بیٹی سپینک بھی ایسی حالت میں نہایت مفید ہوتی ہے۔ بعض اوقات سوزش ایسی سخت نہ ہو کہ بقیہ جلدی تمام ہڈی پر پھیل کر کرسک باعث ہو جاتی اور مرض کو ہلاک بھی کر دیتی ہے ایسی حالت میں شکاف دینی میں ہرگز تامل نہ کرنا چاہئے مقوی اور محرک ادویات مثل کونین شراب ورمعدہ غذائیں باذراطیہ دے رہیں۔

کر ایک پیری آسٹائٹس عموماً آتشک کی وجہ سے ہوتا ہے اسکا علاج داخلی طور پر پوٹاسیم آیوڈائڈ اور پارہ اور مقامی طور پر ٹینک پیرائینیس۔ سیریا ٹینٹ۔ اسپلا سٹرم ہائڈر جرائی۔ سینک۔ پولٹیشن جونک شکاف وغیرہ سے حسب حالت مریض کریں۔

آسٹائٹس کا علاج جبکہ پیری آسٹائٹس کو طریق پر ہے یعنی اکیوٹ حالت میں سینک۔ پولٹیشن جونک۔ پائیسٹیک وغیرہ مقامی طور پر اور پوٹاسیم آیوڈائڈ محرقات مسہلات مقویات داخلی طور پر دینا۔ اگر درد کسی ہڈی کی کسی جگہ میں محدود ہو تو دردناک محرقہ کو ٹریفیان کر کے نکال دینا آرام دیتا ہے۔

پیری ٹفلائٹس Perityphlitis اور ٹفلائٹس۔ ٹفلائٹس سے مراد سیکم اور پی فارم اپنڈیکس کی سوزش ہے اس کے گرد جو ٹیکٹو ٹشو ہے اس کی ورم کو پیری ٹفلائٹس کہتے ہیں۔

اسباب (۱) سیکم کے اندر برازیہ غیر متل شیا کا اجتماع ہو کر ورم ہو جانا۔ سیکم کی ورم پھیل کر باہر آجاتی اور پیری ٹفلائٹس کا باعث ہو جاتی ہے (۲) سوازیہ ایکس کے بعد ہو سکتا ہے۔ (۳) ہلاٹ کی ویا لکڑی کی ضرب (۴) سپٹی سیما (۵) بلا کسی ظاہری وجہ کے بھی کھجی ہو جاتا ہے۔

علامات جس قدر ورم زیادہ شدید اور زیادہ وسیع ہوا وسیعہ مقامی اور بھارا اور درزیادہ ہو کر بخار زیادہ ہوتا ہے۔ دانت کچ ران کے قریب دبانے سے درد محسوس ہوتا اور اوجھا نظر آتا ہو اگر ورم گہرا اور ضعیف ہو تو ملاحظہ سے مقامی درد اور ورم کا معلوم کرنا مشکل ہوتا ہو ماں گہرا دبانے سے کسیدہ رہتہ لگی تاہو چٹو پھرنے میں مریض کو تکلیف ہوتی اپنے جسم کو داہنی ٹانگ کی طرف خم دیے رکھتا اور چلتا ہوا لنگڑا ہوتا ہے۔ ٹیٹھے میں داہنی ٹانگ کو خم رکھتا ہے کبھی فضل کبھی اسہال کی شکایت رہتی۔ اشتہا نادر اور نفخ اکثر ہو جانا ہے سخت مالتوں میں فوجی ہوتی ہو۔

انجام ورم کے بعد پیپر کرچوڑا ہوتا ہے جو عموماً سیکم کے اندر سولخ کر لیتا ہے اگر یہ پھوڑا پیری ٹو نیم اندر کھل جائے تو بہت جلد مہلک ثابت ہوتا ہو اگر سطح شکم پر اکھلے تو ہمیشہ براز آمیز پیچکتی رہتی ہوا عراج برازی کی وجہ سے داہنی ناسور ہو جاتا ہے جو آخر کار مہلک ثابت ہوتا ہے۔ اگر انٹسٹری کے اندر کھلے تو سی پیلے یہ پھوڑا منہ باہر کر لے تب اچھو ہو جانے کی امید ہوتی ہے ورنہ نہیں۔

علاج۔ اس کا علاج انہیں اصول پر کیا جاتا ہو جیسا کہ پیری ٹو ٹفلائٹس کا یعنی پیٹھ کو آرام ہی ستر چٹا اور کھانا۔ ٹانگوں کی حرکت اور کھنکھوڑ پر خم دینا کہ شکم کے عضلات پر کھینچنے سے مقامی ورم پر پولیس سینک ایجنٹک وغیرہ استعمال کرنا غذائیں قوی مثلاً دودھ کھینی۔ سیام دینا حرکت امعا بند رکھنی وغیرہ سو افیون کھانا جب پیپ ٹینکی علامات معلوم ہوں تو پہلی باپوڈرک سرخ کو ذریعہ اپنی تشخیص کو متحقق کریں اور اگر پیپ کا پڑ جانا یقینی طور پر ثابت ہو جاوے تو مریض کو بوش کر کے ایسی میٹریڈل داخل کر کے پیپ کی گہرائی معلوم کریں تب اس گہرائی تک شنگاف بکرا اور ڈیٹیم ٹیوٹ داخل کر کے ڈیس کرتے ہیں۔

اگر مقامی ورم دروازہ سوزش شدید اور سختی بخار مثیانی ہے۔ اور پھینی سخت ہوں طبیب کو نہایت شیا اور خبردار ہونا چاہیو ایسی حالت میں شکم کو وسطی خط یا لینا ہی لیونے سے کچھ کر مناسب علاج کرنا مریض کی جانبری کے لئے ضروری ہو جاتا ہے۔

شنگاف کا فیہا دینا چاہیو جواں کیو ایچ ایچ یا اس زیادہ باریک گاف دیکھتے ہیں یہ شنگاف ایکس عضلہ کی ورنی کا مریض ساتھ ساتھ ایسا واقع ہونا چاہیے کہ شکار کر اس خط مستقیم پر ملے جو ناف و انتی پیپی براہیک سپائن ٹانگ پھیلے جاوے جب تک مریض سیس فیشیا تک گہرا ہو جاوے تو نام خون کی ٹانگوں تک کہ کے سب پیری ٹو ٹفلائٹس و پیری ٹو نیم میں شنگاف

وین پیری ٹونیم کے معلقہ ہی درجی فارم۔ اپنڈکس خود بخود نظر آجائے لیکن بعض اوقات سوزش و رنج جگہ جگہ کی وجہ سے اسکی تلاش و ترمیم میں سخت وقت کٹاٹھانی پڑتی ہے جب اپنڈکس ہیوسٹہ معلوم ہوتا تو اسکی جگہ کے قریب گھسیٹا ہوا ہندھ کر اسکو قطع کر دیں اور باقی ساختوں سے علیحدہ کر کے باہر نکال لیں۔

اگر اسے اندر اجتماع براؤنڈ نکریٹ پیغمبرہ موجود ہو یا اسکا کچھ حصہ سورخ واریام و اسہو گیا ہو تو شکاف دیکر صاف کر دیں یا فارصہ کو قطع کر کے جڑ کے قریب مضبوط لپیٹ کر سے باندھ دیں۔ اگر کسی جگہ یا عام طور پر اجتماع پیپ ہو اسکو سطح مناسب ہو خارج کر دیں آخر کار ایک ڈرنیج ٹیوب داخل کر کے انٹی سیڈیک ڈرینگ حب قاعدہ لگاویں نہایت سخت اور نازک حالتوں میں جبکہ پیپ و ڈرنیج پیپ مل گئی اور مرض سخت لاغرا و رقیع ہو گیا ایسی دستکاریوں سے اسکی جانبری ہونی چکتا ہے صاف یہ نکتہ کہ تمام شتہ اور خوفناک حالتوں میں ایسا ہی کرنا چاہیے۔

پیری ٹونائٹس کے امراض Peritonitis مراق البطن کو امراض پیری ٹونیم وہ جھلی ہر جو شکم کے تمام اعضا اور اسکی دیوار کی اندرونی سطح پر طوف ہوا اسکی درم کو پیری ٹونائٹس کہتے ہیں یہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک یوٹ اور کرائک۔ جب کلیان شریحاً حسبِ قیل ہو۔

پیری ٹونائٹس ایک یوٹ۔ مراق البطن کی سوزش عاود۔ علامات۔ لرزہ کے ساتھ بخار ہو کر شکم میں درد ہوتا ہے جو جلن یا جھن یا کٹ یا پھار یا چیرنے کی قسم کا ہوتا ہے کبھی شدید کٹھن موت موت پکارتا اور کبھی خفیف ہوتا ہے حرکت و احساس ہو مرض کو تکلیف ہوتی ہے اسلئے ہاتھ پاؤں کو کھٹکھٹاتی ہوئے پڑا ہوتا ہے بدن پر کپڑے کا بوجہ بہار ناہمی محال ہو جاتا ہے چہرہ شہرہ اور کشیدہ رہتا ہے غٹیان اور نفو غالب ہوتی اور نفخ شدت ہوتا ہے قبض ساتھ ہو کر ان تکالیف کو اور دوبالا کر دیتا ہے شدت درد۔ نفخ اور قبض کو جو سے سانس کھینچ کر آتا اور اکثر کچک باند جاتی ہے جن میں تلی اور تیر چلی زبان سرخ اور خشک و ریلی ہوتی ہے سانس کھانسی انتفلغ اور سلیح کی حرکت بھی جائنا کر معلوم ہوتی ہے۔ آہنا اندر دوا و ریاس شدت بہت ہے جیجی و گھبراہٹ اور ضعف پرے درجہ کے ہو جاتے ہیں بخار ہر وقت قائم رہتا کبھی کبھی بخار ہالی اور ہڈیاں بھی ہو جاتے ہیں۔

ملاحظہ و امتحان۔ پیٹ بھولا ہوا اور زہنا ہوا شکم کی تقسی حرکات محدود سینہ میں لگانے سے رگڑ کی آواز ابتدائی درجہ میں سانی دیتی ہے بعد میں اجتماع رطوبت ہو کر پیٹ ٹھوس ہو جاتا اور ایک طرف ہاتھ رکھ کر دوسرے طرف ٹھونکنے سے رطوبت کی لہر نمود ہو سکتی ہے (فلکچویشن)۔

انجام۔ یہ نہایت ہی ہلکا مرض ہے شدت ضعف یا وکشی یا یہ ہوشی ہو کر بعض فوت ہو جاتا ہو۔ اقسام۔ محدود اور عام سادہ اور مرکب ابتدا یا ضمنا اسی ہی پیرٹس جیمین ماشو کبطرح سرعت کیساٹھ پھیلنے والا ہو جاتا و ادائی نکتہ جیمین ابتدا سے ضعف بدعہ غایت ہو پر فوسے ٹوجس میں کسی عند یعنی انٹری یا معدہ باگردہ یا پیپھرہ یا لکڑ کے اندر سورخ ہو جاتا ہو۔

اسیما (۱) کبھی کم کی دوا میں گہرے ہونے کی صورت میں کٹ جائے سے ہو جاتی ہے اسکو زائیکٹے ہیں (۲) کبھی کسی

عضو میں سوراخ ہونے اور اسکی رطوبت خارج ہونے سے ہوجاتی ہے اسکو پرفورس ٹو کہتے ہیں (۳)، معدہ یا امعاء کو زخم یا سدا یافتہ سے خراش ہو کر اور کبھی خاص پیری ٹونیم میں فاسد مادہ مثل ٹیوبرکل یا چھوٹے سے ہوجاتی ہے (۴)، کبھی دوسرے عضو یا جھلی کی عدم کھینچنے سے ہوجاتی ہے مثلاً پلیموری اور پیری کارڈائیٹس کے بعد (۵)، کبھی دوسری امراض کے ضمن میں ہوجاتی ہے مثلاً ایفیس ٹائیفائیڈ پورپرل فوچیک، برائٹس ڈیزیز وچ مفاسل نفرس پانی ایسا، اشرو اور گلینڈرس میں ہوجاتی ہے (۶)، بچکی لیچائیں اکثر ہوجاتی ہے (۷) اگر گرمیوں میں یا زیادہ کھانے پینے سے بھی ہوجاتی ہے۔

کیفیت پہلاؤف حصہ میں جنماخ خون ہو کر سطح کھردری ہوجاتی ہے پھر اخراج ذرات و رطوبت ہو کر جلی منورم ہوتی جاتی ہے۔ رطوبت زیادہ مقدار میں خارج ہو کر جوف شکم میں جمع ہوتی شروع ہوجاتی ہے جیسے خارج شدہ رطوبت جذب ہونی شروع ہوتی ہے تب زائد ریشہ مجرا احشاء مختلفہ کی سطح کو یا سم یا دیوار شکم سے پیوست کر دیتی ہے اس طرح شکم کو اندر زائد رباط اور علیحدہ علیحدہ جوف بنجاتی ہیں کبھی یہ رطوبت بعض ہو کر زائدہ جہ کا تعلق اور زہر لہ مادہ اور پیٹ بنا دیتی ہے ایسے پیری ٹونائٹس کی پے عموماً سخت زہریلی اور متعدی ہوتی ہے ایسی نیش کے امتحان کیوقت شکم کھولنے میں خاص احتیاط چاہیے۔

امراض تشابہ۔ قویخ امعاء عضلات شکم کا مہیوے نرم۔ وجع امعاء قویخ صفراوی تضائق الرحم کی خیالی تکلیف تشخیص۔ قویخ امعاء قویخ صفراوی اور سیئر یا میں بخار نہیں ہوتا نہ حرکت و ساس ہو در و کی شدت زیادہ ہوتی ہے نہ مریض اپنی جسم کو سیکڑے رکھتا ہے مگر پیری ٹونائٹس میں یہ تمام لانی ہیں۔ وجع امعاء میں ہی حرکت و ساس ہو در و کی شدت اقدر زیادہ نہیں ہوتی جیسا کہ پیری ٹونائٹس میں اور مریض اپنی جسم کو سیکڑے رکھتا ہے جیسا کہ پیری ٹونائٹس میں رکھتا ایسا ہی عضلات شکم کو مہیوے نرم میں حال ہی نہیں پیری ٹونیم کی خاص علامات حسب ذیل ہیں۔ بخار مسلسل رہنا شکم میں درد کا ہونا جس کی شدت حرکت اور ساس سے زیادہ ہوجاتی ہے مریض کنبجے ہوئی اور سکرے ہوئی رہے بغیر سانس کھانسی براز اور دیارح کی حرکت سے بھی درد کا خوف رہنا چہرہ درونک اور شیدہ ہونا شکم کو ہاتھ لگانے کی برداشت نہونا۔

پیری ٹونائٹس کرانک۔ مراق البطن کی عدم مزمنہ

علامات۔ اکیونٹ کے مشابہ مگر خفیف ہوتی ہیں اس میں رطوبت زیادہ خارج ہو کر پیٹ کی اندر جمع ہوجاتی اور زائدہ رباط بھی بکثرت بنتی ہیں۔

اسباب (۱) عموماً اکیونٹ قسم کے بعد (۲) بار بار شکم کا پانی نکالنے کی وجہ سے (۳) عضلات شکم کی کور پرانے امراض مثلاً جگر کا سرطان زخم وغیرہ (۴) عام امراض مثل مرجع مفاسل ٹیوبریکلوسس سرطان پانی ایسا وغیرہ۔ ملاحظہ و متحان۔ اجتماع رطوبت شکم بڑھ جاتا اور فلچوئیشن محسوس ہوتا ہے کل شکم یا متفرق حصوں میں ٹھونکی سے ٹھونک محسوس ہوتا ہے۔ مگر کی آوازیں سنائی دیتی ہیں چونکہ اجتماع رطوبت زیادہ عضلات کی وجہ سے

محدود ہو جاتا ہے اس لیے تغیر وضع کے ساتھ اسکی جگہ نہیں پر لیتی۔

کیفیت پیری ٹونیم بہت موٹی ہو جاتی اور اعضا کو آپس میں پیوست کر دیتی ہے۔ نیز زائد ریشہ بن کر باطن پیدا ہو جاتی ہیں رطوبت پہلے رقیق ہوتی بعد میں غلیظ ہو کر پریکے مشابہ ہو جاتی ہے بعض حصوں میں سل یا سرطان کا مادہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور بعض میں خنازیری۔

علامہ ج بلحاظ تہمیل و صفائی بیان ہم اسکے علاج کو چار اقسام پر تقسیم کر کے بیان کریں گے۔ (۱) پیری ٹونائٹس اکیوٹ۔

(۲) پیری ٹونائٹس پرنوسے ٹو (۳) پیری ٹونائٹس جو بیکولر (۴) پیری ٹونائٹس کرائانک۔

پیری ٹونائٹس اکیوٹ۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں حلق کی طبی اور جراحی استعداد خوب آسانی جاتی ہے اسے علاج کے لیے کوئی خاص قواعد اور اصول ایسے مقرر نہیں کی جاسکتے جنکو مطابق بلا سوجھی سمجھی عام رواج کی مطابق علاج شروع کر دیا جاوے کیونکہ یہ کوئی علیحدہ مرض نہیں ہے بلکہ دوسرے امراض مثلاً برنفرائٹس، ریچر، ہرننا جبران خون، انورزم، دیلیہ وغیرہ حکم کے اندر ہو کر وقتاً پیری ٹونائٹس شروع ہو جاتا ہے بعض اوقات انشٹائل آبسٹرسن ہو کر اور بعض اوقات متعدی امراض مثل فالفاڈ، سپٹی میا، یوٹرکلوکس وغیرہ کی وجہ سے۔

شاذ و نادر ابتداء خود بخود ضرب یا سردی کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔

تین ہلکے بریان کرتے ہیں کہ بذات خود اس مرض کا کیا علاج ہے بعد میں مختصر طور پر یہ بیان کریں گے کہ جب دیگر سخت امراض کے ضمن میں یہ مرض پیدا ہو جاوے اسوقت کیا کرنا چاہیے۔

اقل خاص پیری ٹونائٹس کا علاج

(۱) امراض کو قطعی آرام دیں۔ اگر کپڑے کی برداشت بھی نہ ہو تو ایسا انتظام کریں کہ چادر لٹاف کیبل وغیرہ تنک کے ساتھ نہ لگے جسطرح کہ مرض کے اندر کے اوسط طرح اوکو لٹا رہنے دیں۔

(۲) غذا رقیق ہٹا کر مقدار میں کمی میں خشک چیزیں سخت تکلیف دیتی اور بعض اوقات ہر کام کر جاتی ہیں۔ دودھ یا بخنی کا ایک ایک گھونٹ مناسب تھہ سے دیتے رہیں۔

اگر پیاس بہت ہو تو فہ کی چھوٹی ٹمچھوٹی ڈلیاں چھائیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کچھ مقدار پانی یا دودھ یا کسی خشک شے کی معدہ کے اندر جمع ہو جائے تو سخت درد اور قے ہونے کا اندیشہ ہو اور قے جب ایک فٹ شروع ہوگی تو اسکا بند کرنا نہایت دشوار ہو جاتا ہے۔ اگر شروع سے ہی بہت سخت ہو تو حقہ غذائی سے پرورش کرنے میں دیکھو ایسا کام بیان

شراب کی اجازت نہ دینی چاہیے لیکن اگر شروع سے سخت نقابت ہو تو بوجھنا استعمال کر سکتی ہیں۔

(۳) اینون اس مرض میں نہایت مفید دوا ہے درد کو رفع کرتی معدہ اور امعاء کی حرکت کو مدد کر کے آرام دیتی اگر معدہ یا انٹرنوں میں مومل ہو کر ضلالت حکم کے اندر چھینٹو شروع ہو گئی ہیں تو انکی حرکت بند کر کے

زیادہ اخراج نہیں ہونے دیتی اور اگر کوئی جگہ عدہ یا نثر میں کوئی زخم ہو کر رو نہ لگے ہو یا اندال نغم قریب ہو تو کمزور جگہ کو پھٹنے سے روکتی اور اندال کی مدد سے اگر عدہ آسانی قبول کر سکے تو اسے بوند نکچر اور ہم ایک ایک کھنڈہ بعد پلا سکتے ہیں حتیٰ کہ درد بند ہو جاوے یا ایک دو گرین کی مقدار میں خشک کھلا سکتے ہیں اگر عدہ قبول نہ کرے تو بذریعہ حقنہ یا جلدی پچکاری استعمال کریں۔ ایک نالہ نکلنے سے یہ احتیاط ضروری ہے کہ عدہ اور امعاء کی ہر جمع نہ ہونے پائے بھتقین خطرناک استعمال یہ ہے کہ ایک خوراک پوری مقدار میں کجائے تاکہ کو ایک دو گھنٹہ تک نگاہ کریں اگر درد موقوف نہ ہو اور کوئی خراب علامت پیدا نہ ہو تو دوسری خوراک لے سکتے ہیں اس طرح نظام کے بعد تیسری خوراک بھی۔

برائٹس دُزیری موجودگی میں اسکا استعمال نہایت احتیاط چاہتا ہے۔

(۴) فصد لینا۔ یہ طریق اسی حالت میں مفید ہو سکتا ہے جبکہ پیری ٹوائس کئی دس گھنٹے کی وجہ سے نہ پاہو۔
(۵) چونکیں لگوانا نثر میں اس بارہ چونکیں لگا کر اینٹی سپینک پولشیں لگانا اکثر مفید ثابت ہوتا ہے اگر زیادہ چونکوں کی ضرورت معلوم ہو تو فصد لیکر جلدی خون کم کر دینا بہتر ہوتا ہے۔

(۶) مسہلات شروع مرض میں نگین مسہلات یا کسٹرنیل استعمال کر سکتے ہیں لیکن جب ہم ہو کر سخت شروع ہو جاوے اور خفیف و خفیف حرکت ناقابل برداشت معلوم ہو تو مسہلات کا دینا مرض کو بوجھ کر ساتھ پا کر کرنا ہے اگر سخت ضرورت ہو کہ صاف کر نیکی پڑے تو نالہ شیر گرم پانی کا حقہ کر سکتے ہیں۔

(۷) شکم پر سپینک یا ٹریپٹائن سٹوپ کرنا۔ اینٹی سپینک پولشیں لگانا گرم پلاؤنا اور انگلیسین کا علاج کے پیچھے پانی لینا باندھ دینا مرض کو خوشگوار آرام دہ معلوم ہوتے ہیں۔

(۸) نثر میں شکم پر پرف کی خیمیاں رکھنا کھینچنے کو کم کر کے مرض کو روک سکتا ہے۔

(۹) اگر نفع بہت ہو جاوے تو نہایت باریک ٹروکار اور کینولا کے ساتھ ہوا کال سکتے ہیں۔

دوم دیگر امراض کا علاج جو پیری ٹوائس کا باعث ہوں۔

(۱) اگر ٹوائس آبشکر میں یا بلیری کیلکولائی کیوجہ سے پیری ٹوائس شروع ہوئے تو پیرا ٹومی یا کوئی سائے سے انکا علاج کرنا چاہیے دیکھو ان امراض کا بیان۔

(۲) اگر کسی سٹ یا بیس کو پھٹنے یا جریان خون یا کسی عضو میں سوراخ ہوئے کیوجہ سے یہ مرض پیدا ہوئے تو شکم میں کثافت دیکھو مرق کو اینٹی سپینک لوشن کیساتھ خوب صاف کر کے ڈیجیٹوڈینا لیں کریں۔

دوسرے اگر متعدد امراض مثلاً ٹائفاؤس یا سیپٹیمیا کے ضمن میں یہ تخلیف شروع ہو جاوے تو اس مرض کو خاص علاج کے علاوہ پیری ٹوائس کا عام اصول کیطابق علاج کریں۔

(۳) شوکر کا اور پیرے ٹو پیری ٹوائس کا علاج ذیل میں علیحدہ بیان کیا جاتا ہے۔

پیری ٹوائس پر فوری ٹو ہر قسم کی حرکت کی مرض کو سخت ترس کوئی غذا اٹھانے

راستہ ندیں شکم میں تنگاف دیکر تمام مراق کو چند بار گرم پانی سے کال طور پر صاف کر کے دینے سے ٹیوب داخل
کریں۔ اگر سورخ زیادہ شادہ ہو تو ٹانگوں کا کر بند کریں۔ عمل نہایت کامیاب ثابت ہوا ہے۔ ٹائیفائیڈ کے سورخوں
اور سخت بخار کچھ تھیں زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مریض کی جانبری کی
سوانحی سے اور کوئی راہ نہیں ہے۔

پیری ٹونائیٹس ٹیوب پر کلر اسکے علاوہ صرف بقدر بیان کردینا کافی ہے لگا کر پیری ٹونیم میں پیکل پڑنا
تشخیص ہو سکے تو شکاف اور دینے میں ہرگز توقف نہیں نیز اگر جسم کے کسی اور حصہ میں ٹیوب پر کلر سس کی کوئی
علامت نہیں ثابت ہوتی تب بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر دوسرے اعضا میں ٹیوب پر کلر سس کا شبہ
ہو تو ایسا کرنے سے کچھ فائدہ تصور نہیں ہو سکتا۔ ایسی حالتیں عام اصول کے مطابق پیری ٹونائیسٹس اور
ٹیوب پر کلر سس کا علاج کرتے رہنا چاہیے۔

پیری ٹونائیٹس کے رائٹ اسکے علاج کے اصول حسب ذیل ہیں۔

(۱) سب سے مقدم یہ ہے کہ اہل حسب لوم کر کے اسکا دفعہ کریں۔

(۲) درد کا علاج ایفون اور ہیلڈوٹا کو ساتھ با احتیاط تمام کرتے ہیں شکم پر ٹیکچر آؤ دین ہلا کر یا ریڈ اینڈرٹس یا
نیم ٹیوب یا سی آئیوڈائیڈیم سپیس کی مالش کرنا یا کمزوری بچوں میں کاڈلورائیل کی گدہی اور موم جامہ رکھ کر ٹی بانڈ ہنا یا اگر بردا
ہو گیا اسکی مالش کرنا یا چھوٹے چھوٹے چھال اٹھانا تخفیف درد اور جذب پانی کے لیے مفید ہیں۔

(۳) داخلی طور پر فولاد پوٹاشیم آئیوڈائیڈ۔ کونین اور رخن ماہی کا استعمال کرتے رہنا۔

(۴) اگر پانی زیادہ جمع ہو جاوے جو معمولی علاجوں سے جذب نہ ہو سکے تو ٹیوب کاراڈکینول کو ساتھ کال سکریں۔

رہی قبض۔ نفخ۔ اہمال۔ قے وغیرہ کا عام اصول کے مطابق علاج کرتے رہیں۔

رہی عام صحت اور طاقت کو عمدہ غذاؤں اور تبدیلی آب و ہوا سے قائم رکھیں۔

پیری ٹونیم کے امراض۔ انکی مختصر فہرست حسب ذیل ہے۔

اول۔ پیری ٹونائیٹس اکیوٹ { اکا بیان اوپر گزر چکا۔
دوم۔ پیری ٹونائیٹس کرائک

سوسپیری ٹونیم میں رسولیاں نچا نیا یا فاسد مادہ جمع ہو جانا۔ مثلاً ٹیوب پر کل سرطان وغیرہ سرطان المرق
کی حسب ذیل علامات و نشانات ہیں (۱)

۱۔ شکم کا محدود حصہ میں بڑھ جانا۔

۲۔ ششوں سے اسکا ہوا کرخت سطح سے لوم ہونا۔

۳۔ سرطان کے مقام پر ٹھونکنے سے محسوس آواز۔

۴۔ اونٹنے بیٹھنے سے اوٹل جگہ نہیں بدلتی۔

(۵) نالی داخل کرنے سے کھاری رطوبت خارج ہوتی ہے۔

(۶) وید و نیر و باؤ نے سے پیٹ کو اندر پانی جمع ہو جاتا ہے۔

چھارہ تکلم کے کسی عضو میں سورخ ہو جانا یا کسی عضو کا پھٹ جانا

اسباب: رحمہ اور اسٹری میں بطریق ذیل سورخ ہو سکتا ہے۔ زخم یا لنگون یا سرطان یا یوٹے سی یا تیز اشیا مثل سنگھیا و اچکا لکھ لینے سے یا سخت نوکدار چیزوں مثل سوئی کا ٹاٹا شیشہ کا ٹکڑا صفراوی کنکر خشک برائے کے ٹکڑے سے صدمہ میں صفراوی کنکریوں۔ یا سرطان ہو خانہ میں رسولی قوی کے بعد ڈایا فرام میں پھوٹنے سے سورخ ہو سکتا ہے۔

مفصلہ ذیل حالتوں میں کوئی عضو پھٹ سکتا ہے طحال بہت بڑھ جانے اور نرم ہونے کے بعد ضرب ہو خانہ پیٹاب ہو کنکر کوئی تھیلی دار رسولی یا نرم سرطان زیادہ بڑھنے کے بعد رحم شکلات ولادت کی وجہ سے گر وہ کا جوف پیپ یا پانی کے ساتھ تن کر جب ایسی حالتیں موجود ہوں تو قے یا کھانسی یا استقر رخ کے وقت کینچر یا ضرب ہو واقعہ ہو جاتا ہے۔

کیفیت: سورخ یا شقاق کے بعد عضو ماؤف خاص پیری ٹونیم کے اندر کھل جاتا ہو یا اس کی باہر کی ایک عضو دوسرے عضو کے اندر سابقہ وصلوں کی وجہ سے کھل جاتا ہے کبھی شکم کی دیوار کے ساتھ وصل ہو جانے کی وجہ سے باہر آکھتا ہے۔

علامات جب کسی عضو میں سورخ ہو جاوے یا شقاق واقع ہو تو دفعتاً سخت رد ہو کر مریض صدمہ زدہ ہو جاتا اور پیری ٹونائی ٹس ہو کر مر جاتا ہے کبھی صدمہ سے فوراً غشی ہو کر طحال لگتا ہے کبھی علامات خفیف ہوتی اور کبھی محدود رہتی ہیں۔

انجام: عموماً ہلاکت۔

تشخیص: دفعتاً درد ہو کر مریض کا جان بلب ہو جانا تمام علامات کا دفعتاً پیدا ہونا۔

پنجم: اسانی طیر استقائے مراق البطن۔ اسکا بیان اسانی ٹیز میں کیا جا چکا ہے۔

پیری کارڈیم کے امراض **Pericardium** حجاب القلب۔ پردہ دل۔

پیری کارڈیم وہ جھلی ہے جس کے اندر قلب ہو واسطے اس کو حجاب القلب کہتے ہیں اس کے امراض جب ذیل ہیں۔

اول: پیری کارڈائی ٹس: کچھ درد حجاب القلب شدید۔

علامات قلب کو مقابل درد ہو نا فعل قلب میں خلل واقع ہو کر کبھی اختلاج اور کبھی ضعف ہونا جماع رطوبت کو

سخت اور نرم چیزوں کے لگنے اور سانس لینے میں تکلیف معلوم ہونا۔ سینہ میں کھینچ اور دباؤ رہنا قلب کو مضام

دبانے اور پس کرنے سے درد ہو نا بعض اوقات یہ تمام علامات خفیف ہوتی ہیں اور بعض اوقات شدید۔

دور کبھی مدیم کبھی تیز جارتا ہو یا اجلا تا ہو یا پچھا کر کثیر جھپٹا ہو یا معلوم ہوتا ہے ابتدا کبھی بخار اور دل

کے ساتھ ہوتی اور کبھی نامعلوم طور پر اسکے ضمن میں بہت سی دماغی اور عصبی تکالیف بھی ہو جاتی ہیں مثلاً صدارع ہوجانی ہذیان بیہوشی خشک کھانسی رعنہ لرزہ تشنج اور غصے نبض تپلی سخت اور تیز ہوتی ہے۔

ملاحظہ و متحان غرض میں زور کا اختلاج ہوتا اسپیری کا رویم کی رگڑ کی آواز سنائی دے سکتی ہیں بعد میں جب طبع طوبت ہو کر پیری کا رویم بھر جاتا ہے تو دوسری اور ساتویں پہلی کو درمیان اور بجا نظر آتا قلب کی حرکت اوپر کو اوٹھتی ہوئی پہلی سست اور جمال کی مانند نظر آتی ہے۔ کارڈ ایک ڈل نیس وسعت میں بڑھ جاتی ہے۔ یہ وسعت لینوی کی حالت میں کھڑے ہوئے پہلی نسبت زیادہ ہوتی ہے قلب کی آوازیں کچھ کی طرف دھیمی اور میں کی طرف سنائی دیتی ہیں آیا رٹا پر و باؤ سے کی وجہ سے سناٹا مرسائی دیتی ہے جب طوبت جذب ہو کر خشکی پڑتی ہو تب پھر رگڑ کی آواز سنائی دیتی ہو۔

انجام کبھی تو کلی آرام ہو جاتا ہے اور کبھی اندرونی وصل باقی رہ جاتے ہیں تقریباً ۱۶ فیصدی میں غشی یا دھبے یا پھیپھڑوں کے متعلق دماغی حواریات موت واقع ہو جاتی ہے کبھی جمع شدہ رطوبت پیچ بکھر سینہ یا شکم میں یا باہر کھل جاتی ہے کبھی اسکے ضمن میں دوسرے حواریات مثل ملیوریسی نیومونیا اور انڈوکاردائیٹس ہو کر اسکی ساخت محال ہو جاتی ہے کیفیت۔ اجتماع خون ہو کر رطوبت خارج ہونی شروع ہوتی ہے یہ حالت کبھی علیحدہ قطعات میں اور کبھی کل جمعی میں ظاہر ہوتی ہے خارج شدہ رطوبت کبھی تو ریشہ وار تہ بزر اور وصل پیدا کرنے والی ہوتی اور کبھی نرم قیقح کی پیسہ بن جاتی ہے مقدار میں ایک انس تو تین چار پائینٹ تک ہو جاتی ہے اچھی حالت میں جذب ہوتی شروع ہو کر زائد وصل بن جاتی ہیں۔ مگر ردی حالتوں میں اسکی پیسہ بن جاتی ہے۔

کتاب (۱) ضرب سور ۲۲ کسی تھلہ عضو کے ورم کے پھیل جانے سے (۳) سرطان یا لکامادہ پھیلنے سے (۴) گرم سر دھونے سے (۵) دوسرے امراض مثل وجع مفاصل سکارٹ ٹائیفائیڈ برائیس ڈنیز اور بادی ایلیا کے ضمن میں (۶) کسی تھلہ پوٹے کے اطراف پھیل جانے یا پیری کا رویم کے اندر کھل جانے سے۔

امراض تشابہ اینڈوکاردائیٹس عظم القلب۔ ہائیدوکانڈرما سیس معدہ اور سب کے امراض تشخیص۔ آن امراض میں قلب کے مقام پر اور بجا نمایان ہو گا نہ قلب کی آوازیں لوک کی طرف ہم پڑیں گی نہ قلب کی حرکات پہلی سست اور جمال کی طرح نظر آئیں گی اور نہ کامرڈیک ڈل نیس ہندروغ ہو گی اور نہ اسکی وسعت میں لینے سے زیادتی ہو گی۔

دوم سپیری کارڈائیٹس کرانک۔ ورم حجاب القلب مزمنہ علامات عموماً خفیف اور نامعلوم کبھی کبھی قلب کے مقام پر پھینی یا خفیف ہوتا یا دل کا دھڑکن اور وجع القلب دودھ ہوا متحان و ملاحظہ آپس میں وصل ہو جانے سے قلب کے مقام پر تشعب نظر آتا ہے قلب کی حرکات زیادہ وسیع اور اوپر کی طرف ہو جاتی ہیں ڈل نیس زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں قلب کی آوازیں زیادہ تیز اور سطح کے قریب سنائی دیتی ہیں رگڑ کی آواز قلب کے مقابل سموع ہو سکتی ہے گردن کی شریانیں دیر سے اور شکل میں عبرتی معلوم ہوتی ہیں

برعکس! ون گے وزیدیں جلدی خالی ہوتی ہیں۔

کیفیت پیری کا اندیشہ کی سطح پر آپس میں نیز دیوار رسیدہ پیچروں ڈایا خرام اور سینہ کے خدو کو سامنے وصل ہو جاتے ہیں مقام اتصال و بنبر ہو کر اوں میں جو نہ بڑھتا ہے۔

سیوم ہائیڈروپیری کا رویم۔ استقار حجاب القلب۔ حجاب القلب کو اندر پانی جمع ہو جانا یہ علامت استقار یا براڈس ڈیزز کا ایک جز بہوتا ہے۔ برکار۔ درد۔ اختلاج۔ دلکشی۔ بے چینی وغیرہ کی علامات کچھ ظاہر نہیں ہوتیں کیونکہ جمع شدہ پانی کی مقدار عموماً تھوڑی ہوتی ہے قلب کے مقام پر اوہا بھی کچھ نمایاں نہیں ہوتا۔ مگر کئی اوقات شروع سے معدوم ہوتی ہے۔ ڈنلیس قدرے بڑھ جاتی ہے اور قلب کی حرکت اور آواز کیفیت لگی پڑ جاتی ہے۔ چھارہ پیری کا روئل ہیپو سیج۔ ہیپو پیری کا رویم۔ حجاب القلب کے اندر خون جمع ہونا۔

اسکباب اول دیو از قلع یا شراب یا اینورزم کا پھٹ جانا دعو ضرب سوم پیری کا ردائی سرچام ۱۸۱
خون مثل مکروسی پر پیور او رلیو کو سائی تنیسیا۔

صلوات و فضائل کو قفل میں خلل واقع ہو کر سخت کھربا ہٹ دکشی اور غشی کا غالب ہونا جس سے فوراً موت واقعہ ہو سکتی ہے۔ ہتھان و ملا حظہ سے اجتماع رطوبت کو نشانات ظاہر ہو کر جیسا کہ پیری کا رڈائی ٹس میں بیان کئے گئے مگر ہکامو فہمہ صحتی لکھتا ہے چیک چریان خون خفیف ہو۔

پنجم فیوہو پیری کا روکم۔ حجاب القلب کے اندر ہو ابھر جانا۔

اسباب اول جمع شدہ رطوبت یا خون کے تقفن سے ہواؤں کا پیدا ہونا دوم ضرب یا پھوٹنے کے بعد مری یا معدہ یا برونی سطح کی طرف سوراخ ہو جانا۔

بہد مری یا محدہ یا بیرونی سطح کی طرف سویلج ہو جانا۔
 کیفیت علامات: تلب کے مقام پر ٹھوس کنے کی آواز ڈو ڈو ہول کر شاہ ہو جاتی اور سینہ کو ہلانے سے جھلک اٹھتا ہے۔
 سنائی دیتی ہیں ریڈ ٹیکہ ہاکے ساتھ قد سے رفیق رطوبت بھی موجود ہو۔

علاج اول پیری کا ردائٹیشن۔ بمرض عمومًا اکیوٹ رہوے ٹرم کے ضمن میں ہو اگر تاہم۔ اگر ایسا ہو تو اس اہل مرض کا علاج مقدمہ ساتھ اکیوٹ قلب کو مقام پر سینک دینا مسٹر ڈیلا مسٹر پالمسٹر لگانا۔ پولٹیشن باندھ دینا مریض کو پشت پر آرام سے لٹاے رکھنا مفید ہیں۔ اگر باقی بہت زیادہ مقدار میں جمع ہو جاوے تو باریکٹرو کا رادو کیٹینولا کو ساتھ نکال سکی ہیں۔ اگر سب ٹریجیا تو تکلف دیکر ڈرینج ٹیوب داخل کرنا چاہیے۔ دیکھو میری کارڈیل ڈرائی کی کامیابی۔

عام صحت اور طاقت کو مقوی غذاؤں اور ادویہ قائم کرنا چاہئے۔
اگر سچی سمیٹا کی وجہ یا السرے ٹو اندوکار ڈاٹپس کے ضمن میں یہ مرض واقع ہو تو کونین
فولاد اور سلفوکار پوٹیش زیادہ مقدار میں کھلائے جانے چاہئے۔

دوم پیری گاڈفیل ڈرائیوی۔ باہانڈہ پیری گاڈفیل کا ملن ملان

کرنا چاہیے۔ عام کمزوری، قلت درقت خون، ماورائے میٹس ڈیبر کے ضمن میں یہ مرض پیدا ہو جا یا کرتا ہے اسلئے جو ان امراض کا علاج ہے وہی اسکا علاج ہے۔ پس ان امراض کا بیان دیکھو۔ اگر عام علاج سے پانی کم نہ ہو تو اسی پتھر یا باربکٹروکار اور کینولاکر ساتھ ہاسٹنگی کمال لینا چاہیے۔ پہلو یا پیوڈرمک سرخ کے ذریعہ تشخیص کمال کر کے بانی کالیو کا ارادہ کریں جس مقام پر بعد میں سی پیٹرنڈل یا ٹروکار اور کینولاداخل کرنا ہے اسی جگہ یا پیوڈرمک سوئی داخل کرنی بہتر ہے۔ بہترین جگہ اس ہسٹکاری کے یو سٹرنٹ کی بائیں جانب چوتھی یا پانچویں یا چھٹی پتھر کاٹل سیس جو سٹرنٹ کے قریب یا اس سوائٹ وانچ کے فاصلہ تک کوئی مقام پسند کر سکتے ہیں۔ انٹرل سمیری آرٹری کا پچاننا منظر رکھنا چاہیے۔ اگر یہ پرکھو تو اسی ریٹر کے ساتھ اسکو کلیتا خارج کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ کینولا کے سولہ کی جگہ تدریج جلد اور گوشت میں ٹگاف دیکر اور آخر کا پیری کارڈیٹم کو فارسیں اور چاقو سے چکر ڈینچ ٹیوب داخل کر دیں۔ اگر سخت ضرورت محسوس ہو تو باقیہا تمام ٹیوب کو بک لوشن کے ساتھ دھو سکتی ہیں لیکن اب اگر اندیشہ خالی ہو تو سو۔ پیری کارڈیل ہیٹورجیج جابا قلب میں خون بہ جانا۔ یہ امراض بہت جلدی مرض کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ کوئی انکا علاج نہیں ہے۔

چھارہ بیوٹومیڈری کارڈیل۔ حجاب القلب میں ہوا بھرجانا۔ حاملین کی طیارہ موقعہ مناسب کر سکتی ہیں۔ **پیری میٹرائٹس** - Parametritis ہلکے پیری ٹوٹیم کی درم مرضیہ کو سرد ہواؤں سے محفوظ رکھ کر مکان میں آرام سے ٹائے رکھیں گرم پانچیں انی یا نیلکے آبیروں ملا کر مرضیہ کو پندہ یا میں منٹ کیو سطورانہ بھلاتی ہیں۔ پوٹیم برڈائیڈ اور ایوڈائیڈ کا داخلی استعمال مفید ہے۔ عام اصول حفظ صحت کی پابندی عمدہ غذاؤں اور مقویات سے مرضیہ کی صحت و طاقت کو ترقی دیں۔ اگر زیادہ تکلیف نہ ہو تو انتظار کریں کہ مواد خود بخود کسی طرف کو رہتہ کرے ورنہ مقعد یا فرج یا سیون وغیرہ کی طرف جس جگہ مواد کو اوجھا محسوس ہو سکتی ٹگاف دیکر اسکو اخراج کا رہتہ کریں اور ڈینچ ٹیوب داخل کر کے ڈریسنگ لگاتے رہیں۔

پیری نفرائٹس Perinephritis اولی ساختوں کی درم جو گردہ کے گرد ہیں۔

علامات گردہ کے مقام پر درد و ناجوڑانے اور زیادہ پوتابے مگر شیب صاف رہتا ہے اور درم گردہ کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی۔

علاج۔ سینک۔ پولشین لیمٹ آبیروں گلاس برائی کا پلستر دوا و سوزش کو رفع کر سکتے ہیں اگر شروع ال مرض کی لیکلوس بانی لائٹس سے ہو تو ٹورک ایڈوگرون خوراک میں مین دفعہ روزانہ کھلائیں۔ اگر پنی شروع ہو جاوے تو گردہ کے مقابل پشت میں جو زیادہ نازک و راجری ہوئی جگہ ہوا میں چاقو سے ٹگاف دیکر ڈریج ٹیوب داخل کریں اور اینٹی سپیک ڈریسنگ لگاتے رہیں۔

پیری سیل ریپچر Perineal Rupture یعنی سیون کا پھٹ جانا اکثر متواتر میں پیدا ہوتا ہے وقت سیون ورنک پھٹ جاتی ہے اور بعض اوقات متعدد سی ساتھ شامل ہوا جاتی ہے جو خف مالوں میں زخم کو صاف

دکھنا اور دماغ کو آرام سے بستر پر لٹائے رکھنا کافی ہیں لیکن اگر درد عرقی اور طویل ہو یا متعدد بھی ساتھ ہی بھٹ گئی ہو تو
 ٹانگے لگاتے چاہئیں۔ بعد میں مریض کی ٹانگیں بائیں کر ایک دو فٹ بستر پر لٹائے رکھیں اور پشیا بھتیر کے ساتھ ٹانگوں پر
 پیریزی نیل فچولا Perineel Fistula فچولا ان اینوکا بیان دیکھو۔

پیرو بالسم پیری ہپاٹائٹس Perihpatitis اوس حصہ پیری ٹونیم کا ورم جو کبیر پلفوف ہی جگر کے مقام
 پر در در ہوتا جو دہانے سے زیادہ ہوتا ہے مگر فعل جگر کے متعلق مثلاً یرقان۔ قبض۔ نفا و اضمہ وغیرہ ظاہر نہیں ہوتے
 علاج۔ جو ٹکس۔ رانی کا پلستر پولٹیس سینک۔ ٹرنٹائن میٹولس۔ گلاس وغیرہ مقامی طور پر استعمال کریں جس میں
 کے ضمن میں یہ عارضہ ہوا کا صاحب قاعدہ علاج کرتے رہیں۔

پیکر کے امراض۔ دیکھو بیان خلق کے امراض کا۔
 سیلیٹیشن Palpitation. اختلاج القلب۔ دل کا دھڑکنا۔ اختلاج القلب بیان دیکھو
 پیلوک ہیو سیل Pelvic Hematocoele دیکھو بیان پلوک ہیو سیل کا۔
 پیلیٹری۔ Pellitory پانی ریختہ ریڈس کا بیان دیکھو۔

پیلی ٹرین Pellitrine پیلی ٹرین ٹانٹاس Pellitrina Tantras
 پیلی ٹرین سلفاس Pellitrine Sulphas
 پیلی ٹرین سولیم Pellisebutium پنجا جی بی کا بیان دیکھو۔
 پیمفوگس Pamphagus ایک جلدی مرض ہے جس میں جلد کے متفرق حصوں پر چھوٹے

کرم بیش تعداد میں ابلہ پیدا ہو کر خود بخود چھوٹے خشک ہوئے اور کھڑکڑاتا کرتے رہتے ہیں یہ کرم جلد کو امراض کا
 علاج نہ کا کوئی خاص اور یقینی علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا اگر سنک کی مرکبات اکثر مفید ثابت ہوتی ہیں جو
 چھال کال ہو گئی ہوں انکا بانی خارج کرنے اور اپنی تسلیم کرنے کے بعد رنگ۔ لیڈ یا یورک آئینٹ سوڈیس کرنا چاہیے۔
 عام طاقت اور صحت کو عمدہ غذاؤں اور مقویات ٹون اور فولاد دہنی دینی چاہیے۔

پین فٹھالماں Panophthalmos کوسے ڈائٹس کا بیان دیکھو۔
 پیٹرسن کالک Painter's Collio لڈ کالک کا بیان دیکھو۔

پینس۔ سبل۔ دیکھو بیان فریڈ کے امراض کا۔
 پینگھا ورجی Penghawariambi انکے دوسرے نام ملی سویم اور سویم بر وٹرز ہیں۔
 نہایت عمدہ قابض و ماسک الدوم سے کھائے اور نیز مقامی طور پر لگائے تو ہر قسم کے جریان خون کو فوراً

بند کر دیتی ہے سر ہا گر ن سے اگر میں تک۔

پپیل ڈائلیٹرس Pupil Dilators یعنی تلی کے کھارہ کرنے والی ادویہ۔

[illegible]

پیوپل کنٹریکٹرز Pupil Contractors مالی انوکھ یعنی وہ ادویہ چھپکی کو سکھاتی ہیں۔
ایسٹ پیبلو کا سین۔ مارفا۔ افیون جیسے بورڈی۔

Puerperal Insanity **بیماری پس از زایمان**

Puerperal Eclampsia - پیرپری اکلیمپسیا۔

Puerperal State پیورپریل اسٹیٹ

Puerperal Fever پھوریزل فیور

Puerperal Hæmorrhage یوئرپل ہیمریج

Pumiline پائیلین - اولیم پائی نائی پیومی لینوس کا بیان دیکھو۔

یونی کا گرتھم Punica Granatum درخت انار۔ پومی گرتھ کا سپان وکھو۔

انکے ہاتھ کھینچنا، قاضی اور عباس الدم تاخیرات رکھتی ہیں۔ خشک کردہ پھولوں میں بھی جو گلنار کے نام سے مشہور ہیں یہی تاخیرات موجود ہیں۔ اسوج سے اسہال بخشیش اور راز الدم۔ اسہال الدم۔ بواسیر نفث الدم اور خالص کچھوں کے پرانے اسہال اور کپکپس میں نہایت مفید ہیں۔ اب انار نہایت خوشحوا رس کن عطش جو۔

مرض آثاروں کا پانی آشوبہم میں آنکھ کے اندر ڈالنے۔ اناس کے پتوں کی لپری باندھتے ہیں۔ پوست آثار قابض
حالبس الدم اور مخرج کرم امعا اور پرانے اسہال و پیش میں مفید ہوگا سفوف منجنوں میں بخرض حبس خون اور تقویت
دندان شامل کر دیا جاتا ہے۔ پوست بنج انار سب کو زیادہ حالبس الدم۔ قابض اور مخرج کرم امعا اور اخراج کدو دانہ
کے لیے مخصوص نما سکی جاتی ہو جریان الرحم جریان الدم میں مفید ہو سوزش گلو میں اسکا جوشانہ بطور غرغره استعمال
کرتے ہیں۔ علاوہ برین اسکا جوشانہ بخارات موسمی طحال۔ اسہال مزمنہ اور بچوں کے ٹیوبرکلرڈ ایاریا میں نہایت مفید
ہے انکی جڑ کی جھال میں سے ایک جو پھٹی ٹرین نام نکالا جاتا ہے۔ اسکایان دیکھو سفوف ناسپال ۱۰۵۰ گرین تک
سفوف پوست بنج انار ۲ ڈرام سے ۴ ڈرام تک جوشانہ پوست بنج انار ۲ اونس سو ۶ اونس تک۔

رَدِّفُ الْمَاءِ

تاپ تلی طحال کا بڑھانا۔ دیکھو بیان سپلیں کے امراض کا۔

تالکھانا۔ اشرے کنڈوانگ، فولیاء، فرح۔ مسکن بدن معقوی باہمسک اور مدرسے ہستقلہ برقان سوزاک

سوزش مثانہ میں مفید ہو۔ اسکے پتوں کا لیپ کرنا یا بطور پولیس استعمال کرنا ورم اور سوجھ مٹاؤ میں نافع ہے۔
خمر تخم پلہ ڈرام سے ۲ ڈرام تک۔

تالو کے امراض۔ دیکھو بیان خلق کے امراض کا۔

تبشیر سطح کبد۔ جگر پر چھالہ پڑ جانا۔ جگر کے امراض کا بیان دیکھو۔

تبریدات۔ دیکھو بیان ریفیجینس کا۔

تپ دق۔ سل۔ تھانی سس اور میٹاک فیور کا بیان دیکھو۔

تپ لرزہ۔ اگیو۔ بلیریل فیورز کا بیان دیکھو۔

تپ محرقہ۔ ٹائیفاؤس فیورز و ٹائیفس کا بیان دیکھو۔

سج یلطف۔ سخن۔ دافع مریح۔ مدربول و حیض و فضلات۔ مخرج جنین و حصاة ہے۔ نزلہ زکام کھانسی سوزش

اور احتشائے ہلنی کے ورم میں مفید ہے۔ بلیریل فیورز میں بھی مفید ثابت ہوئی ہے پیشانی پر کھانسا کرنا دروسر اور

نزلوں کو دفع کرتا ہے خمر نصف ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

تحرک الانسان۔ وائتوں کا ہلنا۔ دیکھو بیان وائتوں کے امراض کا۔

تخم بلسان۔ جب بلساں۔ مقوی مدہ و ہاضمہ۔ نافع امراض مداحی مخرج ریاح۔ محرک جگر اور مدہ۔ اسلٹی

صدراخ کہنہ و جدید۔ دہ کھانسی۔ نیومونیا۔ سوزش مدہ۔ ہستقا عرق النساء۔ عسر البول۔ احتباس الطث۔ و او

والکیمیہ میں نافع ہے خمر پلہ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

تخمہ۔ بدھنمی۔ و شپیشا۔ اندھی چھین کا بیان دیکھو۔

تخیلات۔ سد رکایان دیکھو۔

تر بدہ نسوت۔ سہل مخسج۔ صفر و مخسج بلغم مقوی اعصاب ہو۔ مرطوب کھانسی عرق النساء۔ دروسہ میں مفید

خمر نصف ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

تر بوز۔ و اثریلین۔ سائٹرس و گلیٹرس۔ اسکے تخم دافع تشنگی۔ مدہ مقوی۔ دافع سوزش اور مخرج کرم ہا

جس البول استقا سوزاک۔ پرانی سوزش جگر۔ اور کھال میں مفید ہیں خمر پانی حسب مرضی خمر تخم تر بوز پلہ ڈرام

۲ ڈرام تک۔

ترنج۔ اسکے بیج طین مدہ حیض اور مخرج جنین ہیں۔ برگ ترنج باہم طعام سخن مدہ مقوی احتشاد و مخرج

اور گل ترنج مفرح مقوی دل۔ باہم طعام مقوی احتشاد و مدہ ہیں۔ اکالیپ محلل ورم۔ سخن مقوی دندان۔

اور دقن نافع بواسیر ہے۔ مخر و پوست ترنج یلطف قاضی مخسج۔ صفر نافع۔ صفر وای مقوی مدہ

و جگر و سکن جراثیم تشنگی و ہمال مغراوی ہو۔ خمر مخر ترنج بعد ضرورت چھلکا نصف ڈرام سے ایک ڈرام تک

برگ ترنج و گل ترنج نصف ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

عضلات نہایت قوی ہو گئی ہیں۔ مگر بعد میں مقدار ضعف ہو جاتا ہے کہ فالج تک نوبت پہنچتی ہے جو نقص پہلی تیز اور بعد میں کمزور رہا بال بند ہو جاتا ہے قلب کی حرکات پہا تیز اور بعد میں ضعیف و سست ہو جاتی ہیں اور حرارت غریزی بھی بہت کم ہو جاتی ہے ہونہر بگ کف۔ دوسرے چمکی کرانہ سر سر کنیا اور سختی فرم فرم میں بطور دلخ نشیج استعمال کرتے ہیں۔ آخر کار نکوٹین بول برانز اور شہوک کو ساتھ خارج ہو جاتی ہے۔ پائریڈین ایک دوسرے جوہر ہے جو نمبا کو کے نبول میں جو حاصل ہوئے ہے اسکا بیان چیکھو۔

تطبی - خیمازہ - انگریزی -

تناقض ادویہ - انکیو ٹی ملی ٹی آف ڈرگز ضد ادویہ۔ دو یا کئی ادویہ کے ایک نسخہ جمع کرنے سے جو باہمی نقص پہر پہر ہو اسکو تناقض ادویہ کہتے ہیں۔ یہ نقص تین قسم کا ہو سکتا ہے۔

اول یہ کہ ایک دوا دوسری کو مخالف پرکرا اسکی تاثیرات کی مانع ہو مثلاً ملین اور سہل ادویہ کے ساتھ افیون شامل کروینا۔ افیون بوجہ قابضیت کو سہل کی مانع ہوگی۔

دوم یہ کہ ایک نسخہ کی ادویہ باہمی کیمیائی تغیر پیدا کر کے ایک دوسرے کی تاثیرات کو کم یا تغیر کر دیں یا نہرٹ اور آتش خیز مانے پیدا کریں مثلاً الکلیلائن ہائیڈریٹس اور کاربوئیٹس کو ترشیوں یا معدنی نمکوں کے ساتھ ملا دینا۔ پیراڈیٹ پوائس ہائیڈروکسی ڈائریٹس کو آتش خیز اشیا کو ساتھ شامل کرنا مثلاً پوائس کلورس اور پرینگنیٹ آف پوائش کو نباتی سفوف نمین بنکر گندک سلفائیڈز گلیسرین، الکحل یا سیرس کے ساتھ ملانا۔ نائٹرو ہائیڈروکلورک اور سلفورک ایڈز کو روغنیاں۔ شراب اور نباتی اشیا کے ساتھ ملانا۔

سوم یہ کہ چند ادویہ کو ابھی ملنے سے کوئی بدناما اور کریم صورت پیدا ہو جاوے مثلاً روغن۔ باہم بائین کو بانی میں ملانا

قسم اول تناقض ادویہ کا بیان لفظ نہر میں مفصل کیا جائیگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ اعز و جل

قسم دوم کا تناقض جسکو تناقض کیمیائی کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں عموماً مفصل ذیل اقسام میں سے ایک قسم کا ہوتا ہے (۱) محو ضات اور ترشیوں کو کسی کھارسی اور معدنی ہائیڈریٹوں اور کاربوئیٹوں کے ساتھ ملا دینا مثلاً لایم وارڈ کو ترش

پیسین کے ساتھ یا امونیا کاربونس کو شربت ملا کر ساتھ یا سبٹ لیمونیا اور وٹیک کو شربت لیموں کو ساتھ ملا دینا

ایسی کئی ترش کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ترشی کھا کے ساتھ ملا کر معدل ہو جاتی اور اصل دوا قوی کیمیائی کو بعد ایک نئی صورت پیدا کرتی ہے

(۳) دو یا دو سے زیادہ ادویہ کو جو بانی میں حل ہو سکتی ہیں ایک نسخہ میں شامل کر دینا جس سے نئی مرکب بننے کے طور پر ٹھہ جائیں یا حل شدہ میں لیکن خواص و افعال میں اصلی ادویہ سے مخالف یا متضاد ہوں اسکا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جو سالٹ پائیں حل نہیں ہو سکتے اگر انکے اجزاء کی طرح سے ایک کچھ جمع کر دیے جائیں تو کیمیائی کشش سے وہ اجزاء

ملکر ناقابل حل سالٹ بنادیتے ہیں مثلاً سلفیٹ آف زنک ملا دینے جاویں تو سلفیٹ آف لڈ بنکر لچٹ کلور پور پتے ٹھہ

جاوے گا۔ پس ان تمام سالٹوں کی فہرست یاد کر لینا جو بانی میں حل نہیں ہو سکتے اس احتیاط کے لیے ضروری ہے جو ذیل ہیں

ہم انکی مختصر فہرست پیش کرتے ہیں۔

و الف) دواؤں کے سلفائیڈ اور نیکٹر دواؤں اور الکلیلائڈز کو کاربونیٹ بورسٹ

فاسفیٹ آکسائیڈ اور سیٹ۔

(ب) لیڈ اور کیلیم کے سلفیٹ اور پارہ کے سب سلفیٹ۔

(ج) ہستہ سلور اور ایڈ کے کلورائیڈ اور بر ومانڈ اور پارہ کے کلورائیڈ سب آئیوڈائیڈ اور ب ومانڈ۔

(د) کوپرنس مارینا اور دیگر اکیلاڈز کے آئیوڈائیڈز۔

(۳) ایسی زیادتی زیادہ ایک نسخہ میں ملا دینا جس کو ہر ایک مرکب بخاویں انکی چند مثالیں حسب ذیل ہیں

(الف) پوٹاشیم آئیوڈائیڈ اور پوٹاشیم کلورائیڈ۔

(ب) ہائیڈرو سائیڈک ایڈ اور معدنی ہائیڈریٹ۔

(ج) پوٹاشیم سائیڈائیڈ اور کاربونیٹ یا سب نائٹریٹ یا سب کلورائیڈ۔

(د) کیلومل اور ہائیڈرو سائیڈک ایڈ وغیرہ۔

تنفس - دوم سانس - ریپیشن - سانس سرسری نظر میں ایک معمولی فعل معلوم ہوتا ہے اس پر غور کر کے دیکھئے تو ایک عجیب و غریب کیفیت کا رخ ہے۔ حالت صحت میں انسان کو فی منٹ اٹھارہ دفعہ سانس آتا ہے۔ اندر دنی سانس کرنا خارجی ہوا تک جھڑھ اور زرخروہ میں کو گذر کر پھیچھڑو نہیں پہنچتی ہی جبکہ آکسیجن خون کی ریڈ کاربیلز (سرخ ذرات) کے ساتھ ملکر خون کو تازگی بخشتا اور حرارت غریزی پیدا کرتا ہے۔ بیرونی سانس کے ساتھ خون کے فاسد اجزاء مثلاً کاربانک لیسڈ امونیا وغیرہ خارج ہو کر ہوائیں مل جاتے ہیں۔ آکسیجن کا خون کے ساتھ ملنا اور فاسد اجزاء کا اٹھنا اس طرح ہونا زندگی کو لچو ہر وقت لایا رہے۔ پس ایسی ضروری فعل کر لیتے اس عرصہ میں مطلق نہ دیکھیں کیسا انتظام کر رکھا ہے۔ ہر جگہ ہوا موجود ہے اور ہوائیں کئی خواص اس حکیم برحق جن میں حریم نہیں لگے ہیں جنکی وجہ سے ایک جگہ کی کثیف ہوا دوسری ہواؤں کو ساتھ ملکر لطیف ہو جاتی ہے۔ ایک نوعوت دوران جنکی وجہ سے گرم ہلی ہوائیں ٹھنڈی اوپر چڑھتی اور ٹھیل ہوائیں نیچی بجائی نیچے اترتی ہیں۔ دوم قوت سرائیت جنکی وجہ سے ہندو کمالات کی خراب تنفس ہوا دیواروں کے اندر کو بھی گزر کر خارجی ہوا سے مل جاتی ہے۔ سوم قوت حرکت جنکی وجہ سے ہوائیں تیزی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی رہتی ہیں پھر کاربانک ایڈامونیا وغیرہ جو سانس کے ساتھ خارج ہو کر ہوا کو کثیف کر دیتے ہیں تمام نباتات کی غذا اور جان ہیں۔ انسان کا بول و براز جو ہوا کو تنفس اور فاسد کر دیتے ہیں انکو بھی اللہ تعالیٰ نے نباتات کی غذا بنا دیا ہے۔ دیکھئے کہ ہوا کی صفائی کے واسطے اس قادر حکیم کیسا سامان موجود کرتے ہیں۔ تاکہ ہوا لیکر ہوائی نالیوں تک تمام سطح پر بال یا باریکہ روڈان موجود ہو جو جھانکی کو طور پر ہوا کو صاف کرتا ہے یعنی جعد ہوا سانس کے ساتھ اندر جاتی ہے اس کے تمام کثیف اجزاء بالوں اور روڈین میں اٹک جاتے ہیں پھر پھڑوں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں ہوا کے اندر نہ جانے کا یہ انتظام کیا ہے کہ جھڑھ ہوائی نالیوں پھیچھڑوں سیناؤں اور خون کو ایک نقطہ دماغی کے تحت کر دیا ہے جسکو ایک عظیم بادشاہ یا کرسٹل کہہ سکتے ہیں۔ اس نقطہ کے احکام کے مطابق سانس کی دیواریں پھیلتی اور سکڑتی ہیں دوران خون نیز سانس ہوتا ہے جھڑھ ہوائی نالیاں اور پھیچھڑے بموجب حرکت کرتے ہیں۔ اگر گرمی جگہ بند ہو اس کھڑے ہو جائیں تو فوراً اس مرکز دماغی کے حکم سے سانس جلدی جلدی

انے لگا اور دوران خون سست ہو جاتا ہی اگر جگر کے اندر کوئی غیر جنس شے چلی جائے تو فوراً اس پادشاہ تنفس کے حکم سے اسے اخراج کے لیے سخت کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہوائی نالیوں یا پیپھر ولس میں لمبم جمع ہو جائے تو اس منظم کے حکم سے کھانسی کو اس کے وضعیہ کا حکم ملتا ہے۔ اگر وہ انہایت صاف اور کھلی ہو تو حکم دیتا ہے کہ سانس بامنگی آتا ہے۔ اگر ہوا بالکل ناقص ہو یا کسی کا دم بند کیا جاوے تو یہ جرنیل تمام اعضا کے جسمی کو حکم دیتا ہے کہ اب سخت مقابلہ آن پڑا تم سب سب اس وقت مدد کرو۔ اس وقت تمام اعضا اور رگیں نہایت زور و شور سے حرکت کرنے لگتی ہیں معمولی حالتوں میں یہ تمام امن امان کے ساتھ تنفس کو ایک حالت پر قائم رکھتا ہے لیکن جب کوئی غیر معمولی واقعات آن پڑتے ہیں تو یہ کیا کچھ نہیں کرتا کوئی صاحب یہ خیال نہ فرماوے کہ تنفس میں تمام تغیرات خود بخود شروع ہو جاتے ہیں نہیں ہرگز نہیں بلکہ تجرباً ثابت ہو چکا ہے کہ اس تمام کھانہ کے انتظام کے لیے دماغ میں ایک خاص مقام ہے۔ اگر اس مقام کو کسی طرح ضرب پہنچائی جاوے تو فوراً تنفس بند ہو کر موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ یہ مقام دھلا میں واکس عصب کے آگے نزدیک ہے۔ واکس کے رہتا اسکو اعضا تنفس کی بابت خبر بخبری دیتی ہے پس اگر واکس کو قطع کر دیا جائے تب اسکو قطع شدہ واکس کی جگہ کچھ خبر نہیں دیتی اور اس جانب میں کسی خرافات سے کھانسی نہیں پیدا کیجا سکتی۔ پھر خون کے ریڈ کارپلز اس رخ ذرات میں یہ طاقت موجود ہے کہ ایجن کو جذب کر کے تمام جسم میں لجا دیں اور انہیں یہ قوت جاذبہ ایسی کشندہ آگےجن ہو کہ باوجود کٹے اور بڑے درمیان دو پر وہ حال ہوتے ہیں ایک تو خود عروق شریکہ دوسری کی دیوار دوسرے پیپھری کی ویسی کل یعنی باریک تھیلیوں کی دیوار تمام اندر پھرنے ہی پھرنے ہو اس میں آگےجن کو نہیں چھوڑتے۔

اب ذرا غور فرمائیے کہ محض تنفس کی طرح کی کچھ انتظام ہے اول ہوا کی افراط و تفریط اسکی صفائی کے قدرتی سامان سوہ ناک ہوائی نالیوں اور پیپھر ولس کی خاص قسم کی ساخت چھادھ مرکز دماغی کی حکومت پتھم واکس احصا کا بطور تار برقی اعضا تنفس کی تمام حالت مرکز دماغی تک پہنچا ناقتہ شہم خون کے ریڈ کارپلز میں آگےجن جذب کرنے کی قوت کیا ایسے انتظامی امور خود بخود اتفاقی طور پر ہو گئے اب ہم بیان کرتے ہیں کہ تنفس اور اسکو متعلقہ سامان پر انسان کا کھانا کھا لیتا ہے۔

اول۔ ہوا کی مقدار حرارت۔ رطوبت۔ کثافت اور کیمیائی ترکیب پر ہمیں بہت کچھ اختیار حاصل ہے۔ مصنوعی طور پر خاص خاص ترکیب سے ہوا کو کثیف یا رقیق۔ سو یا گرم خشک یا تر کر سکتے اور بہت سی دواؤں کی بھانپ مارا اسکی کیمیائی ترکیب میں جیسا تغیر مناسب سمجھیں پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ تغیرات مریض کے کمرہ کی ہوا میں پیدا کرنا جاسکتے یا مریض کو گرم ملک یا پہاڑ۔ یا ساحل سمندر یا کھلی خاص نخلستان میں لیجانے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

دوم۔ ریڈ کارپلز انکی کیفیت اور مقدار کو بھی عموماً غذاؤں اور مقویات سے ترقی دینے اور اسکی برخلاف عمل کرنے سے کم کر سکتے ہیں۔ دیکھو خون کا بیان۔

سوم۔ دوران خون۔ اس میں بھی مقویات اور مضائقہ سب کچھ تغیر پیدا کیا جاسکتا ہے۔

چھادھ پیپھر ولس اور ہوائی نالیوں کو فعال اور کثیف میں بھی بہت سی تغیرات پیدا کی جاسکتے ہیں انکی عصاب کو خشک و سرد ہوا۔ کلورین سلی کے کوانا تباہ کو سلا۔ امونیا وغیرہ سے خراشیں کھج کر تحریک ہوتی ہے اور برخلاف انکی گرم اور مرطوب

ہوا گرم خدائز لقات۔ ایون رکورل ہائڈریٹ وغیرہ سے تسکین بختی اور ضعف حاصل ہوتا ہے۔

بہن میں تدریس کے اخراج بلغم کھانسی اور چھینک وغیرہ کو حسب موقع کم و بیش کر سکتے ہیں۔

ہوائی ایون کا خون مضغفات و محرکات قلب دوران ہوا کم و بیش کیا جاسکتا ہے ایسا ہی حال ملازی کرکولیشن کا ہے۔
خارج بلغم کو بھی ادویہ اور دیگر تدابیر سے نرمی دے سکتے یا روک سکتے ہیں۔

بہن میں ایون ہوائی نالیوں کے لحمی و عصبی ریشوں کو مسکنات۔ واقع تشنج و خراش کنندہ ادویہ سے حسب منشاء تغیر کر سکتے ہیں۔
مرکز تنفس مختلف تدابیر سے اثر پہنچا کر لمبی قسم کی تنفسی حرکات پیدا کر سکتے ہیں مثلاً انسوار دینا۔ پلوپہر پرف لگانا۔ تیز روشنی
آنکھ پر ڈالنا۔ سخت آوازیں سننا۔ جلد پر گدگدائی کرنا یا سوس چھونا یا بھیسے ہوئی تولیہ مارنا۔ گرمی دینا یا پلستر لگانا۔
توڑا چھینک یا کھانسی پیدا کرتا یا اس کو تیز کر دیتا ہے۔ برعکس اس کو سینہ پر پوٹیس باندھنا یا سینک بنا کر گرم باقیہ کرنا۔
لکھنا۔ بیت۔ بیلاڈ و ناٹھانا۔ پین یا کافور کی بھانپنا۔ تنفس کو مست کرنا۔ ان تدابیر کے علاوہ بہت سی ادویہ اس قسم کی
ہیں جو خون میں ملکر مرکز تنفس پر گزرتے ہوئے اپنا اپنا اثر کرتی ہیں۔

جو ادویات کہ اعضائے تنفس کی بیماریوں میں متعل ہوتی ہیں وہ بلحاظ تاثیرات کو مفصل ذیل اقسام میں منقسم ہیں۔

اول اسپیکٹورٹ یعنی مخرج بلغم ادویہ۔ اس سے مراد وہ ادویہ ہیں جو بلغم کو مقبلاً میں زیادہ یا اسکی کیفیت متغیر کر کے
اٹکا اخراج آسان یا قوت دافہ شش و براہ کانی کو قوی کر دیتی ہیں بعض مخرج بلغم ادویہ دوران خون کی تقوی
اور بعض مضغ ہوتی ہیں ایسے ان مخرج بلغم ادویہ کو جو تقوی و محرک قلب دوران ہوں سیمونٹ اسپیکٹورٹ
کہتے ہیں اور خلاف اسکی جو مضغ دوران میں سڈیو اسپیکٹورٹ کہلاتی ہیں۔ پھر ایک مخرج بلغم ادویہ ایسی ہیں جو
بلغم کی کیفیت کو متغیر کر دیتی ہیں اور ایک ایسی ہیں جو اخراج بلغم کی آفہ اعصاب کو تسکین دیتی ہیں۔
دوم۔ اینٹی سپازمک یعنی دافع تشنج ادویہ۔

سوم۔ سپرٹری سڈیو یعنی اعضائے تنفس کو تسکین دینے والی ادویہ

چھار۔ سیمونٹس آف سپرٹری سڈیو یعنی مرکز تنفس کو تحریک دینے والی ادویہ۔

پنجم۔ سڈیو سڈیو آف سپرٹری سڈیو یعنی مرکز تنفس کو ضعیف کرنے والی ادویہ۔

ششم۔ اینٹی اسپیکٹورٹ یعنی اخراج بلغم کو کم کرنے والی ادویہ۔

ہف۔ تھریڈ کارپلز اور دوران خون کو متغیر کرنے والی ادویہ۔

تسم فیڈرین طبلہ و ملحدہ اقسام کی تشکیلات و دیگر اٹک استعمال کے موقع بیان کرتے ہیں۔

اول سیمونٹ اسپیکٹورٹ۔ امونیا کاربونا۔ امونیم کلورائیڈ۔ الکھال سلا۔ سینگا۔ لاکو ارامونیا۔ باسم کو یا بنا۔

باسم آف ٹولو باسم آف گرجن باسم آف پیر و تمام ایرٹیکس شکرینا گرم رقیق غذا ہیں۔

موقعہ استعمال۔ دوم ورج سوزش جبکہ مضمض ضعیف ہو جائے یا مریض شروع سے نہایت کمزور ہو۔

دوم سڈیو اسپیکٹورٹ۔ ہنٹی ہنٹی۔ اپنی کے کو اٹا۔ اپو مارینا۔ آئیو ڈائز۔ تبا کو کھاری ادویہ مرطوب اور گرم ہوا پانی

بجانب یہ ادویہ شروع مدت سوزش میں جبکہ نبض پر اور تیز اور حرارت اعتدال سے زیادہ ہو مثلاً ایکوٹ برانکائٹس میں
سومہ سیلانی اسپیکٹورل یعنی ٹیکلین سچ بلغم پوٹاسیم آیوڈائیڈ پوٹاسیم ہائی کارب پوٹاسیم سائٹریکس سوڈائی
کارب سوڈیم کلورائیڈ موقعہ استعمال جبکہ کھانسی سخت تکلیف دہ ہو اور بلغم غلیظ اور قلیل القدر ہوگی وجہ بدقت
خارج ہو سکتا ہو۔

چھاروا انٹی سپٹک اسپیکٹورل آیوڈین سیلفر نیروائن سٹائی ریکس کافور کباب جینی روغن ٹارپین ایوکو پٹس
کے روٹ کاربانک ایسڈ برگنڈی تیج کو بائبا بالسم آف ٹولو بالسم آف پیرو مرچ امونکے کم روغن دیان
تمام خوشبودار ادویہ موقعہ استعمال جبکہ کھانسی کے ساتھ بلغم غلیظ اور متعفن خارج ہوتا ہو۔
پنجم انتی پاراڈکس یعنی واقع تشنج ادویہ الکافیل ہے کہ ہوائی نالیوں اور نایا ظرام کے لحمی نشوونو ہلکا کرتی ہیں
انکی مفصلہ ذیل اقسام ہیں۔

(الف) واگس عصب کے ان تمام ریشوں کو سست کرنے والی جو اعضا تنفس میں سختی ہیں گرم مرطوب ہو اگر
سینہ پر پولشیں لگانا مزلعات ایفون کلورل ہائڈریٹ کلورفارم آتھیر وغیرہ۔
دب تنفسی اعصاب کو سست کرنے والی مثلاً سینہ پریسک وینا پولشیں لگانا وارم ہاتھ لمٹنٹ پویم
لمٹنٹ بیلادونا لطیف وخن (سینہ لگانا) وغیرہ

(ج) مرکز تنفس کو سست کرنے والی ادویہ مثلاً کلورل ایفون کونائیٹ ورموٹریکونایا خالی ساس گھا
(د) ہوائی نالیوں کے لحمی اور عصبی ریشوں کو سست کرنے والی ادویہ مثلاً اٹروپین تریاکو اٹراپیرین
(ه) تمام عضلات متعلقہ تنفس کو ضعیف کرنے والی مثلاً کونائیٹ۔

یہ تمام ادویہ لحمی یا عصبی ریشوں کو سست کر کے تشنج کو رفع کرتی ہیں لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تمام مخرج بلغم
ادویہ بھی ایک طرح سے واقع تشنج ہوتی ہیں کیونکہ وہ بلغم کو جن نالیوں کے اندر خراش کر کے اٹکو مکھڑیتا ہے
نکال دیتی اور اخراج بلغم زیادہ کر کے اجتماع خون کو بھی کم کر دیتی ہیں موقعہ استعمال ہر قسم کی دشمنی
ورم ادویہ ہر قسم کی تشنجی کھانسی۔

ششم سپر پیری سٹیڈیو بیلادونا سٹریونیم ہائیو سائیس سٹریٹائین آیل بھنگ ایل ناٹریس کیو پرکوی
ایسڈ ہائڈرو سائینک ڈالمیوٹ ایتھیل آیوڈائیڈ ایفون موقعہ استعمال جبکہ ہوائی نالیوں میں
وغیرہ بلغم سے صاف ہوں اور محض خراش کیوجہ سے کھانسی بدلت پیدا ہوتی ہو مثلاً خشک کھانسی خشک
ورم ادویہ لکائیٹس دیومونیا وغیرہ کے زمانہ انحطاط میں۔

ہفتم سٹیڈیوٹش آف وی سپر پیری سٹرسٹ کافور بیلادونا سٹریونیم ہائیو سائیس سٹریٹائین کیو پرکوی
ہائڈرو سائینک ڈالمیوٹ خالی ساس گھا امینا الکمال ایتھیر کلورفارم ایٹھی منی اپنی کے گوانا جات
طور پر موقعہ استعمال ہر قسم کا ضیق تنفس۔

ہشتادویں پرنسٹن آف میڈیسیں میں پڑھنے والی مرکز تفصیل کو سنت کرینوالی ادویہ۔ انٹی مینی برومانڈ کا فور
ہیلاڈونڈا میں نیم باؤسائیس۔ لوبیلیا تبا کو (پہلے آخری فصل میں) کلورل کو نایٹ۔ فانی ساسگما کو نایم۔
ایون سے ٹریا۔ ہائڈروکسیٹائیڈ ڈائیوٹ موقعہ استعمال شدت سرفر تیز میٹس خشک کمانی۔
تھو اینٹی الپیکسٹوٹس یعنی مانع اخراج بلغم ادویہ مثلاً ایون۔ فولاد مجموعہ وغیرہ موقعہ استعمال
جبکہ رقیق بلغم نہایت کثرت و خارج ہوتا ہو۔

دھم مختلف تدابیر جبکہ ہوائی نالیاں زیادہ مقدار یا غلیظ بلغم سے اٹ گئی ہوں یا ہوائی نالیاں اوٹھیلیاں کٹنا
اور کڑوہ ہو کر خود اخراج بلغم کی قابل نہ رہی ہوں یا سخت ضعف کی وجہ سے کھانسی پیدا ہو سکی اور جس دم کا اندیشہ ہو تو
اپنی کاک یا ایونیا کا رونا س یا زنگ سلفاسن وغیرہ سے فے کرانا بلغم کو خارج کر دینا اور نہایت آرام بخشا کر
جبکہ کوئی پیپ کا غار زرخہ یا برانکس کے اندر کھل جائے تو مریض کو اٹا کر سنے سے پیپ صاف ہو سکتی ہے۔
بعض اقسام دکشی میں مصنوعی تفصیل بڑا کام دیتا ہے فصد یا جو تک یا کلاسکس خون نکالنا یا مدرات مرقا
وسہلات وغیرہ استعمال کرنا خاص خاص حالتوں میں مفید ہیں
تفصیل مصنوعی۔ آرٹی فیشیل رسپٹن کا بیان دیکھو۔

تھائیرائیڈ گلینڈ کے امراض Thyroid Gland
جو خنجر کے متصل زرخہ پر واقع ہے اس کے بڑھ جانے کو گھڑ کہتے ہیں اس کے امراض حسب ذیل ہیں۔
تھائیرائیڈ گلینڈ اوس غدود کا نام ہے
راگوئے ٹریویراٹکو سیل گھڑ۔ تھائیرائیڈ کا بڑھ جانا بعض قطعات میں گھڑ کا مرض بڑی کثرت سے ہوتا ہے مثلاً بچہ
کے کو ہستانی حصوں بعض اوقات ہند بڑا ہو جاتا ہے کہ مریض اس کو تھیلوں میں اوٹھائے رکھتے ہیں۔ یہ بیان کیا
گیا ہے کہ جس زمین کے پانی میں میگنیشیا اور پوٹاش اور دھاتیں خاص کر فولاد ہو اس میں گھڑ ہوتا ہے خفیف حالتوں میں
اسکی کوئی تکلیف معلوم نہیں ہوتی محض کینڈر بجاری پن یا کھینچ رہتی ہے اگر کھیل طرف بڑھ کر زرخہ پر محیط ہو جاوے
اسوقت دکشی اور عسر البلیح کی کالیف ہو جاتی ہیں ایسی حالت میں سمجھو تھیک اعصاب پر دباؤ پڑ کر تھیلیاں پھیل جاتی ہیں
کو ادھر آتے اور بصارت میں ضعف آجاتا ہے کبھی تو ایک لوب بڑھتا اور کبھی دو لوب بڑھ کر اکیلا اتھم شاذ و نادر ہی بڑھتا
ہے یہ تین قسم کا ہوتا ہے اول پھل جس میں تمام غدود وکیساں طہر بڑھ جاتا ہے دوم سسٹک جس میں ایک یا چند
تھیلیاں دار رسو یاں بھجاتی ہیں سوم فائبرائیڈ جس میں سخت ریشہ بہت زیادہ بلکہ کل غدود یا اس کے کسی حصہ کو مٹا
اور سخت کر دیتے ہیں جنون کرے ٹی نزم سے اس کا خاص تعلق معلوم ہوتا ہے گھڑ والے والدین کی اور انکی
اولاد میں کرے ٹی نزم اکثر ہو جاتا ہے مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کرے ٹی میں گھڑ ضرور موجود ہو بلکہ
ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں جس میں تھائیرائیڈ معدوم تھا۔

انجام عموماً اچھا ہوتا ہے۔ کچھ تکلیف نہیں دیتا اور مدت کے بعد خود بخود جاتا ہی رہتا ہے علاج پذیر بھی آسانی
ہو جاتا ہے۔ جن حالتوں میں زرخہ پر محیط ہو کر ریکٹ لیرنجیل نروڈ کو دباوی یا زرخہ کو گھونٹ لے وہ بیشک

تکلیف دہ اور صہلک ہو جاتی ہیں ورنہ نہیں مگر ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے۔

تشخیص اسکے اقسام کی شناخت ٹھونے اور نلکی داخل کرنے سے آسانی ہو سکتی ہے۔ سیطرہ عظمیٰ کو مفصلہ امراض سے تشخیص کر سکتے ہیں۔ سرطان پتھری پڑ جانا، لفائیڈی ٹوما، اینورز مگردن کی رسولیاں جو زمرہ سے علیحدہ ہوتی ہیں۔

(۴) ایکس آف تھیلک گلے خرابی کے دوسرے نام گریوی صاحب یا بیسی ڈو صاحب کی بیماری ہیں۔ اس میں دل بہت دھڑکتا ہے۔ گردن کی شریانیں بہت زیادہ پھرتی اور تھائیرائیڈ غدود بھی شریان کی طرح حرکت کرتے ہیں۔ آنکھوں کے ذیلیہ باہر کو ابھرتے ہیں۔ رنگ بہت جلد بھیکا یا پیلا یا سبزی مائل ہو جاتا ہے، طبیعت نحیف و کججوری رہتی۔ ڈیلول کے ابھرنے سے بصارت ناقص ہو جاتی ہے۔ قلب تپلا اور کشادہ ہوتا جاتا ہے۔ آخر کار مریض ضعف قلب یا خشی بریا دکشی یا دیگر عوارضات سے ہلاک ہو جاتا ہے۔

اسباب عورتوں میں ۲۰ یا ۳۰ سال کی عمر کے درمیان زیادہ تر ہوتا ہے۔ قلت و رقت خون اور فساد حیض اسکے محرک ہو جاتے ہیں کبھی کسی صدمہ یا جذبہ یا ضربات سر کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ کیفیت بعضوں کی تو یہ ہے کہ ان دوسو موٹا راعصاب کا کلچ ہو کر جو سرگردن اور تھائیرائیڈ غدود کی شریانوں میں جانے میں اور قلب کے کیلریوں میں اعصاب کو تحریک ہو کر یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ تھائیرائیڈ غدود کا شہنا شروع ہوتا ہے کہ ایک تو ایک شریانیں ہو جاتی ہیں۔ اسکے اندر طوبین جمع ہو جاتی ہیں۔ اسکے ریشہ برہنہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈیلول کے ابھرنے کی وجہ بیان کی گئی ہو کہ انکے پیچھے جو چیزیں ہیں اس میں اجتماع خون اور اخراج رطوبت ہو کر زیادتی ہو جاتی ہے۔ بعضوں کی یہ رائے ہے کہ پیچھے خفگی اس میں گردن کے زیرین گینٹھیں فساد واقع ہو کر یہ مرض ہوتا ہے اسکا خلاف موٹا ہو کر گینٹھیاں کو سخت و کرخت بنا دیتا ہے۔

(۵) تھائیرائیڈ غدود کی ورم۔ تھائیرائیڈائٹس۔

اسباب گرم و سرد ہونا، ہوا لگنا، ضرب، جراثیم، پورپل فیور اور ہائی ایما کے ضمن میں ہو سکتی ہے۔

علامات۔ مقامی ورم اور درد کے ساتھ دکشی اور عسر الہلم ہو جاتے ہیں۔

(۶) صائیڈے ٹڈسٹ۔ اسکی شناخت خوردبینی امتحان سے ہو سکتی ہے۔

(۷) پتھریاں پڑ جانا۔ اخروٹ کو برابر تک پتھری دیکھی گئی ہے۔

(۸) سرطان۔ اس میں دکشی اور عسر الہلم بڑی علامات ہیں۔

علاج اول گلے ٹرگلہر اسکی لمحاظ علاج کے تین اقسام کر سکتے ہیں اول فائبرس دوم سکت سوم فائبرس فائبرس گلے ٹر اگر جاست میں بہت بڑا نہیں تو اسکے علاج کا خلاصہ مفاد مقدم ہے کہ مریض کی آب و ہوا بدل کر ادیں مقامی طور پر ٹنگر آؤڈین یا لٹنٹ آؤڈین یا سرم آؤڈین لکھاتے ہیں اور داخلی طور پر آؤڈین یا پوٹاش

کھلاتے ہیں ریڈیو ڈائی آف کر می انٹینٹ کی نسبت یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر دس منٹ تک تمام اُبھار پر اسکی ہالٹ کر کے تیز دھوپ میں سینک میں حتیٰ کہ سخت جلن شروع ہو جائے تو نہایت فائدہ حاصل ہوتا ہے اکثر پھیلاؤ کسی علاج کی ضرورت نہیں ہوتی۔

بذریعہ بلدی کی پچکاری کے آؤ دین اُبھار کے اندر دو دفعہ مہفتہ میں پہلے پہلے نہایت کامیاب طریقہ ثابت ہوا اگر ۲ آؤ دین ۲۵ قطرہ الکحل میں حل کر کے یا پندرہ سین قطرہ پچکار آؤ دین کے بطور پچکاری استعمال کر سکتے ہیں پچکاری کرنے وقت یہ احتیاط نہایت ضروری ہو کہ کوئی کسی وریڈیاشریان کے اندر داخل نہ ہو جاوے اور تیز لہری بالکل اندہ بن جائے۔

بجلی کا کنٹکٹ کرنٹ لگانا اور لیٹرس ٹیوب کے ذریعہ برابر سردی پہنچانا بھی مفید ثابت ہوئے ہیں۔

اگر تھایرائڈ جسامت میں بہت بڑا ہو کر دکشتی اور درد پیدا کرے تو جراحی عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبکہ آسان اور مفید چون صاحب کا اوپریشن ہو جس کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ تھایرائڈ اسٹیمس کو ڈیسکٹ کر اسکے دونوں سروں کو خوب مضبوط باندھ کر درمیان سے قطع کر کے نکال دیں اور ٹرینج ٹیوب اندر رکھ کر ڈریس کرتے رہیں اس عمل سے زخم پر دباؤ نہیں رہتا۔ اور تمام دکشتی کا خوف رفع ہو جاتا ہے اور بعد میں لیٹرل لوہ بھی جسامت میں کم ہو جاتے ہیں۔

تمام درد و کوکلیٹا قطع کرنا ایک نہایت مشکل اور خوفناک عمل ہے۔ نیز اگر کچھ بھی حصہ تھایرائڈ کا باقی نہ رہے تو کسی ڈیما اور کرٹی نزم کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ اوپریشن اُسی حالت میں کرنا چاہیے جس وقت درد اور دکشتی کی وجہ سے جان کا خطرہ ہو۔ کچھ عمل اس طرح ہے کہ ایک لمبا انگاف وسطی خط میں دیکر دو خمدانزنگاف انکی بالائی سرے سے ہر دو جانب سٹرنو میڈائیڈ کی طرف لچکائیں۔ تمام وریڈوں اور شریانوں کو ساتھ ساتھ بند کر دیتے ہیں اور تھایرائڈ آرٹری اور وینز کو لچک کر کرنے کے بعد تمام رسولی کو کھجکا اور سخت تعلقات قطع کر کے نکال لیں۔ ہر دو جانب کو حصوں کو قطع کر دیں سے پیشتر اسٹیمس کو باندھ دینا چاہئے۔

فائبروسٹیک گاؤٹر کا علاج بھی اگر متوسط جسم کی قریب قریب اسطرح ہے جیسا کہ بیان کیا گیا۔

سٹیک گاؤٹر کے علاج میں ادویہ کچھ فائدہ نہیں کرتی مفصلہ ذیل دستکاریوں میں سے کوئی مناسب حال کرنی چاہیے۔

اول میکنیکی صاحب کا اوپریشن یہ اسطرح ہے کہ پہلی پانی کی پمپ کو ٹیپ کر کے خالی کر لیتے اور بعد ازاں ایک دو ڈرام کلورائیڈ آف آئرن سالیوٹن (دھانی صدی طاقت) بذریعہ ایک خاص پچکاری کے جسم میں ہوا اندر داخل نہیں ہو سکتی اندہ پہنچاتے ہیں۔ تب اس نلکی کا منہ بند کر کے تین روز تک اندر رہنے دیتے۔ اس عرصہ میں عموماً پیپ پڑ جاتی ہے۔ اگر بالفرض پیپ نہ پڑے تو پھر دوبارہ اسطرح سے عمل کرتے ہیں جب پیپ پڑ جاتی ہے تو نلکی کا منہ کھلا رکھ کر مفتول پولٹیس لگاتے رہتے ہیں بعد میں یہ احتیاط رکھنا ضروری ہے کہ نلکی بند نہ ہو جائے۔

اونیز سپر بر ابر خارج ہوتی ہے اگر انگور زیادہ اور کمزور ہو کر سبیلی پانی کے مشابہ ہو جائے تو کلو ریت آف بیکوٹ (۲) گرین فی اونس، یا سلفیٹ آف کاپرلوشن (۳) گرین فی اونس (۴) عار کو دینا چاہیے۔

بجائے کلو رائٹ آف آرٹن کے آیوڈین یا سلفیٹ آف کاپر یا دیگر خراش کنندہ ادویہ استعمال کر سکتے ہیں۔

دوسرے صاحب کلاوڈیشن یہ سطر جبر ہے کہ پہلے بذریعہ ٹروکار اینڈ کینیو لاپانی کا ککٹ (کٹنگ ڈانت) جو چوٹی سے ٹکچر آیوڈین میں جگولیا ہوا ہوتا ہے خوب ٹھوس کر بھر دیتے ہیں۔ اس کٹنگ کو اندر رہنے دیتے ہیں۔ تا وقتیکہ سب پتی شروع ہو جاتی ہو۔

سوم سسٹ میں کافی شکاف دیکھو اور اس کے کنارے و نکو جلد کے ساتھ سینکرا اینٹی سپیک رولی اندر بھرتے رہتے ہیں۔

پچھا آہر۔ جو تک صاحب کا طریق عمل سطر جبر ہے کہ سسٹ کلاوڈین یا سلفیٹ ککٹ کا ایک خاص مقدار کے وسیلہ سے کروکسائیڈ ہر چار طرف غامیں لگاتے ہیں۔ بیان کیا گیا ہے کہ کروکسائیڈ کے اثر سے تمام غامیت جلد بند ہو جاتا ہو اگر ایسا ہی ثابت ہو جائے تو یہ نہایت عمدہ علاج ہے۔

۲ ایکس انجیڈ ایک گاؤٹرز اس مرض کا کوئی علاج ابھی تک قابل طمیان ثابت نہیں ہوا مختلف ادویہ مثلاً آیوڈین افیون، فوٹو وکونین، پیاسی آیوڈائیڈ، بیلاڈونا، آرسنک۔ آرگنٹین، کلو رائٹ آف بیرم، ڈیوہوای سین، سٹروٹھس ڈی ٹیس، امونیا کپراس، جسے ٹری اسپارٹین، گیلونیک بکلی کے بعد دیگرے آزمائی گئیں انہیں سے قابل مشابہ علاج صرف امیڈر ہے کہ سٹروٹھس داخل طور پر دیتے رہیں اور گیلونیک بکلی لگاتے رہیں۔ آیوڈین، برومید، آئرن ملارکریٹا بھی اکثر مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس سے اختلاج القلب، درجہ بندی اور اختلاج الشریان میں شفاء ہوتی اور انیمیا رفع ہو جاتا ہے۔ دیگر امراض جو تھائیرائیڈ گنڈ کو متعلق شفا دینا دیکھنے میں آئی ہیں جن میں

۳ الکویڈ الفلیمیشن، چونک، برف سینک، پوٹیس وغیرہ عام ہول کیطابق اسکا علاج کرنا چاہیے اگر گہری سپر بڑ جائے تو فوٹوٹھس کا دیکر کالنی چاہیے ورنہ فیثاکے نیچے پھیلنے والی ٹریکیا کو اندر گزرنے کا اندیشہ ہو۔

۴ انڈیڈ سس۔ اسکا علاج سسٹنگ گاؤٹرز کے مطابق ہو۔

۵ پنجری۔ اسکا علاج نکال دینا ہے۔

۶ کنسینی سرطان۔ شروع میں ہی تمام غدود کو کلینٹا خارج کر دینا چاہیے۔

۷ سارکوما۔ اسکا علاج جی سولے انقطاع کلی کے اور کچھ نہیں ہے۔

نحالی سس Thisis پلازما کزٹیشن سس۔ اس مرض میں پہلو چھپٹے کا ایک حصہ بنتا

پھر کلنا شروع ہو جاتا ہے پھر کلنا جو اھصہ کھانسی کے ساتھ خارج ہو کر غامباتی رہ جاتے ہیں۔ ساتھ ہی خون بہت نقصان ہو کر بدن لاغر ہوتا جاتا ہے اور بخار بھی سلسل رہتا ہے۔ اس مرض کو ابتدائی بابت حسب ذیل رائیں ہیں۔
(۱) عام بے تویہ ہے کہ اسکی ابتدا شور کل سبیلانی سے ہوتی ہے جو ایک خور دینی بنات ہیں اول اول

کا نسخہ صاحب نے انکو دریافت کیا تھا اسلئے اول کے نام پر میلانی آف کلخ کے نام سے مشہور ہیں جب بہ نبات کی طبیعت سرایت کرنے میں تو کبھی تو ذرات اور ریشہ جمع ہو کر علیحدہ علیحدہ دانہ بنجاتے ہیں اور کبھی ہوا و طو پر ایک حصہ میں سرایت جلتے ہیں الغرض کسی طرح سے ہو پہلے تو او ف حصہ سخت ہو جاتا پھر گلتا اور پھر غار بنجاتے ہیں۔

(۲) بعض کی یہ رائے ہے کہ پہلے پھیپھڑے کے کسی حصہ میں ورم ہو کر پھر ٹیو برکل میلانی آف کلخ سرایت کرتی ہیں۔ مثلاً نیومونیا اور براکائی ٹس کے بعد۔

(۳) کبھی آتش کی گیمیاں یا ہائیڈیڈیمیا رسی کو بعد ٹیو برکل میلانی آف کلخ سرایت کرتے ہیں۔

(۴) کبھی پھیپھڑے کی کوئی شریان رک جانے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جھقند حصہ میں وہ شریان جاتی تھی اسکا خون بند ہو کر نہایت پست حالت میں ہو جاتا ہے تب ٹیو برکل میلانی آف کلخ قابو پا کر سرایت کر جلتے ہیں۔ مثلاً ایسا لازم یا فخر امبو سس کے بعد ایسا ہو جاتا ہے۔

اس میں تو کوئی کلام نہیں کہ اس کا اصل سبب ٹیو برکل میلانی آف کلخ سرایت کر جانا ہی خواہ ابتدا ہو یا ورم یا ضعف یا گمایا ہائیڈیڈیمیا جس دوران کے بعد۔

اسکے باب مؤندہ (۱) وراثت (۲) عمر ۲ اور ۳ سال کے درمیان زیادہ تر ہوتا ہے۔ (۳) عام ضعف اور لاغری (۴) زیادہ میٹھنے اور تنگ مکانوں میں جھک کر کام کرنے کا پیشہ (۵) قلت غذا اور ضا داضمہ (۶) بعض ملکوں اور موسموں میں زیادہ ہوتا ہے (۷) زیادتی ترودات تفکرات اور محنت (۸) دوسرے امراض مثلاً مایہ فاسٹ نائیفنس نیومونیا براکائی ٹس خسرو چیک سکارلیٹ فیور کالی کھانسی رزلہ و کام پلیرسی ہفطاط حل ورم حنجرہ کثرت الطمث۔ اہمال و حش مزمنہ وغیرہ (۹) کبھی ایک مریض سے دوسرے کو لگ جاتا ہے (۱۰) اخراش کندہ ہواؤں اور گرد و غبار کا پھیپھڑوں میں کثرت ہو جانا۔ زیادہ حقہ پینا۔ رولی ٹیجنا۔ لوہارینا کانوں میں کام کرنا ضعیف آدمیوں میں اس کا باعث ہو جاتا ہے۔

اسکو دوسری نام۔ پلازری کنسرپشن اور پلازری ٹیو برکلوس بھی ہیں۔ اسکی دو بڑی اقسام ہیں۔ اکیوٹ۔ کروانک۔

اول اکیوٹ تھائی سس۔ اس میں بخار شدت کا سلسل رہتا ہے کھانسی کے ساتھ غلیظ بلغم میں پھیپھڑے کے ذرے یا لکڑہ ہونے میں شخاج ہوتا ہے خون بھی کھانسی کے ساتھ خارج ہوتا ہے بخار دن میں یارات میں رزہ کے ساتھ زیادہ ہو جاتا اور رات کو پسینہ بکثرت آتے ہیں۔ درد شدت کا ہوتا۔ دکشی رہتی تقاہت بہت جلد بڑھتی جاتی اور مریض اندھال پڑا رہتا ہے۔ بدن روز بروز سوکھتا جاتا ہے بخور مینی آہخان کو خارج شدہ بلغم میں ہزار ہا میلانی نظر آسکتے ہیں ایک دو ہفتہ میں ہی مریض ہلاک ہو جاتا ہے۔ کل علامات و نشانات و کیفیت ملاحظہ و آہخان اکیوٹ تھائی سس میں وہی ہیں جو کروانک میں ہیں۔ فرق محض اس قدر ہے کہ اکیوٹ قسم میں تمام علامتیں نہایت شدت اور سرعت کو ساتھ ہوتی ہیں اور

کراٹک میں خفیف اور رفتہ رفتہ طور پر ایسے ہم انکی تفصیل کرنا ایک میں کرلوگو۔

دوم کراٹک تھانی سنس۔

اسباب کبھی تو اچانک نفث الدم سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اور کبھی نزول کھانسی اور نیو مونیہ کو بعد مقامی علامات یہ ہیں۔ بلغم یا اعضا کا درد۔ دلکشی سرعت نفس۔ کھانسی کبھی کبھی شدت کھانسی کو ساتھ ہی بھی ہو جاتی ہے۔ بلغم تیرہ جامہ باخلج ہوتا جو پانی میں خوب جاتا ہے اور اس میں سے ایک خاص قسم کی ببلو آیا کرتی ہے اگر بلغم کا ملاحظہ خوردین سے کیا جاوے تو مفصلہ ذیل چیزیں نظر آتی ہیں۔ اپنی تحصیل کے ذرات یا قطرہ خون کے ذرات چربی کے ذرات اور روغن کے قطرہ چونہ کے ذرات ہوائی خلیوں کی گڑبڑ اور کاخر صاحب کے بیوہ کل میلانی نفث الدم۔ یہ لازمی نہیں کبھی تو خون کھانسی کے ساتھ بہت کثرت سے نکلتا ہے اور کبھی خفیف مقدار میں اور بعض مریضوں میں معدوم بھی رہتا ہے۔ عام علامات یہ ہیں۔ بخار جو مسلسل رہتا اور لرزہ کے ساتھ رات کو زیادہ ہو جاتا ہے۔ رات کو پسینہ بھرت آنے اور مریض لاغر ہوتا جاتا ہے۔ سینہ کے عضلات دردناک ہو جاتے ہیں۔ تمام جسم پھیکا پڑ جاتا اور خون ناقص ہو جاتا ہے۔ رخساروں پر ایک زنگت ظاہر ہوتی ہے جسکو ہیکٹک فلش کہتے ہیں۔ بال جھڑنے شروع ہو جاتے اور انگلیوں کے سرے سے ہونٹے ہو جاتے ہیں۔ ضعف برے درجہ کا رہتا ہے یا ضمیمہ خراب رہتا کبھی قبض ہو جاتا ہے ان تمام علامات کی موجودگی میں مریض ناامید کبھی نہیں ہوتا شریف الطبع زیادہ شریف اور اکثر مزاج زیادہ اکثر ہو جاتے ہیں اکثر کچھ دنوں کے بعد دست لگاتے ہیں جنکی وجوہات حسب ذیل بیان کی گئی ہیں۔

(۱) پھیپھڑوں میں دوکان خون کو کراوٹ رہے مریضوں میں اجتماع خون رہنا۔

(۲) بلغم نکل لینے سے انٹریوں کا بیوہ بکلو سنس ہو جانا۔

(۳) زیادہ خون اور بلغم اور پیپ خارج ہونے سے انٹریوں میں الیومی ناکد مرض ہو جانا۔

(۴) بلغم انٹریوں میں پھینک کر خراش کرنا ان میں سے پہلی اور چوتھی قسم کے اہمال تو علاج پذیر ہو سکتے ہیں مگر دوسری اور تیسری قسم کے نہیں۔

بعض مریضوں میں سختی ہوتی ہے۔ اسکی وجوہات حسب ذیل ہو سکتی ہیں۔ اول معدہ کا اجتماع خون یعنی کینجیسن دوم فاسد بلغم کے گلجانے کے بعد سوم و گس حسب پرخاش چھارم خدک کھانسی پنجم دماغ میں بیوہ بکلو پنجم خراش رہنا ششم معدہ کا لہو کر زخم ہو جانا ہفتم معدہ کے غدود کا زائل ہو جانا۔

زبان کی حالت مختلف ہوتی ہے۔ اگر اجتماع خون ہی اہمال جاری میں تب اس پر پیل کی تہ بھی رہتی اور سرخ پڑتا۔ اور پھر بے ہوشی اور سرخ رہتے ہیں۔ اگر الیومی ناکد ڈایا رہا ہے تب خشک ترخشی ہوگی گوشت کو متاثر ہوتی ہو ملاحظہ و امتحان۔ سل والوں کا سینہ چھٹا اور زنگ ہوتا ہے پیلے درجہ میں جبکہ پھیپھڑے کا مافوف حصہ سخت ہو جاتا ہے۔ دوکل فریٹس بڑھ جاتا مٹھو گنے کی آواز ٹھوس نفس کی آواز میں کمزور لرزتی ہوئی کھر درسی


کزت ہو جاتی یا نلکی یا دھونکی کی پھونک سی مشابہ ہو جاتی ہیں۔ اگر کچھ حصہ گلکز نرم ہو گیا ہے یا قریب قریب حصہ نیو مونیہ یا براکائیٹس ہو تب پٹنچو یا ٹرنسے یا پٹ پٹ یا گر گر یا سر سر کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ آواز اور کھانسی کا فزیریٹس بڑھ جاتا ہے۔ اگر قریب کے پٹیورائیں سوزش ہو تب رگڑ اور چیخ کی آوازیں بھی سموع ہوتی ہیں پھپھڑوں کے سکرٹلٹنے سے دل زیادہ حصہ میں سینہ کی دیوار سے لگی ہوا اور انکی آوازیں زیادہ صاف سنائی دیتی ہیں ہنسل کے نیچے مرمر سنائی دیتی ہے جب گلا ہوا حصہ کھانسی کے ساتھ خارج ہو کر غار بجاتے ہیں۔ تب نشانات ذیل ظاہر ہوتے ہیں۔ ٹھوکنے کی آواز خالی برتن یا دھات کی ٹھیلیا پھونٹے ہوئے سبوح یا پیالی کے مثاب برتن کی آوازیں پھونکنی یا دھونکنی کے مشابہ ہو جاتی ہیں اندرونی سانس میں چوسنی یا شیشمی کی آواز سموع ہوتی ہے سینہ کو بالائی حصہ میں ہوئی پڑ پڑ گر گر یا سر سر یا پھپھڑ سنائی دیتی ہے۔ بڑے غار سے ٹن ٹن اوچھن چھن کی آواز نکلا کرتی ہے اور اسکے ساتھ کجا پید ہوتی ہے آواز کے ساتھ بھی گھٹکی کے مشابہ گنجار اٹھتی ہے سینہ کے لگانے سے مریض کے الفاظ صاف صاف کانوں تک پہنچتے ہیں گویا کہ مریض براہ راست اسکے کان کے اندر بول رہا ہے۔ کھانسی کے ساتھ کھانسی کی جھک کار سموع ہوتی ہے اگر کوئی شریان کشادہ ہو کر اسکا اینورم بجاتے تب مریض سنائی دیا کرتی ہے۔

عوارضات۔ س کے ساتھ عموماً دیگر امراض بطور عوارض کے شامل ہو جاتا کرتے ہیں مثلاً آنحذرہ اور زخروہ کے ورم اور انکے زخم برنگائٹس نیو مونیہ پٹیورائیں پٹیورائیں ہو کر نیو مونیہ ہو جاتا۔ پیری کارڈائیٹس پیری ٹائٹس خنا زیر حق یا معدہ یا انٹسٹین میں پٹیورائیں یا ورم یا زخم ہو جاتا۔ ناسور القعدہ جگر میں جری پڑ جانا۔ براہینٹس ڈیزیز عام ہو کر کلووس ہو کر پنچائٹس۔ ویریدوں کا خطرہ بوس۔ لوہیں۔ کنبہاں۔ قے۔ انجام۔ موت۔ رفتہ۔ رفتہ زوال سے یا پتوق یا عشی یا لغت الدم یا دیگر عوارضات سے۔ امراض مشابہ نیو مونیہ۔ براکائٹس۔

تشخیص۔ امتحان و ملاحظہ علامات مذکورہ بالا سے باسانی ہو سکتی ہے۔

کیفیت۔ س کا فاد عموماً پھپھڑوں کے بالائی حصہ یعنی ایکس میں ظاہر ہوتا ہے پہلو باریک شریانوں کو غلاف یا ہوائی مساموں کی دیوار میں نیو بیکل سیٹائی سرائت کرتے ہیں پھر انکے گرد بہت سو ذرات اور ریشہ جمع ہو کر چھوٹے دانہ بن جاتے ہیں۔ شروع میں یہ دانہ بھوسے رنگت کو ہوتے اور کیزی الیشن کے وقت نرم ہو جاتی ہیں بہت سو دانہ بن کر اور ان کے درمیانی مساحتیں بھی سخت ہو کر پھپھڑے کا ماف حصہ سخت ہو جاتا ہے جب یہ دانہ گلکز نرم رقیق ہو جاتے اور کھانسی کے ساتھ انکا مادہ خارج ہو جاتا ہے تب چھوٹے چھوٹے سولخ باقی رہ جاتے ہیں جو آپس میں ملکر بیچ و بیچ نالیوں کی شکل ہو جاتے ہیں اسی طرح بڑے دانہ جو گھلیوں کے برابر ہوتے ہیں گلکز اور خارج ہو کر غار بن جاتے ہیں یہ غار کبھی ایک یا کبھی بہت سی ہوتے ہیں۔ اگر سولخ اور غار نیو بیکل سے علی طور پر صاف ہو جائیں تب انکو ریکر پر ہو جاتے اور مریض سجال ہو سکتا ہے کبھی ابلا بھی

ہوتا ہے کہ دانہ اور گٹھلیاں کلنی نہیں پاتے بلکہ اُن کے گرد ریشہ جمع ہو کر سخت و سبز غلاف بنا دیتا ہے جس پر اس غلاف میں چونہ پر کر سخت کنکریاں بن جاتی ہیں یہی ایک صورت آرام کی ہو گو ایک سال میں طبعاً نوزل سے صورت آرام ہو سکتی ہے (اول)، دلوں اور گٹھلیوں کی طرح ہوتا ہے اور باقی ماندہ سوراخوں اور غاروں کے بند ہو جانے سے (دوم) اُن کے گرد سخت فائبرس غلاف بن جائے گا (سوم) چونہ پر جانے اور کنکریاں بن جانے سے (چارم) کوئی اور چیز جو کہیں نہ ہو جس سے بعض تو چھوٹے چھوٹے موٹاگٹھلی کی دال کے برابر ہو جائے اور بعض اُن سے بھی چھوٹے اور بعض باوام یا خروٹ کے برابر ہو جائے ہیں۔ ایک دانہ کی خوردبینی ساخت حسب ذیل ہوتی ہے۔



وسط میں ایک شاخدار جائنت پیل جبکہ مادہ دانہ دار ہوتا ہے اسکی شاخوں کے جال میں اپنی پھیلیاؤں سے مل جاتے ہیں جن کا پیرزٹو پلازم دانہ دار ہوتا ہے پھر ان کے گرد گول یا بیضیوں کی لفافہ پیل کا احاطہ ہوتا ہے

جائنت پیل کے اندر بہت سے ٹیوبرکل پیدا کیے ہوئے ہیں۔

علاج۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ لمبا عارضہ علاج پذیر ہونے کے اس مرض کو تین درجہ میں شروع و درجہ میں اوپر جبکہ اسکا فساد قلیل الوعت ہو علاج پذیر ہو جاتا ہے دوم درجہ میں جبکہ اسکا فساد تھوڑی وسعت کا ہو علاج سے کچھ کو تخفیف مل سکتی ہے سوم الاملاح قسم میں اس کے فادات بہت وسیع ہو کر کوئی تدبیر کارگر نہ ہو سکی۔ اس مرض کو علاج کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر کے بیان کریں گے اول حفظ ما تقدم۔ دوم صل مرض کا علاج۔ سوم عوارضات متعلقہ کا علاج۔

اول حفظ ما تقدم۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر والدین میں سے کسی ایک کو یہ مرض ہو تو اسکی اولاد کو بھی ہونا خطرہ ہوتا کہ بہت قریبی رشتہ داروں میں رشتہ ہو جانا یا بہت جھوٹی یا بڑی عمر میں شادی ہونا یا ایسے جنت کا منعقد ہونا جو کسی قسم کی بے اعتدالی یا فلاس آتشک یا کسی علالت یا کسی سے سخت لاغر و کمزور ہو گئی ہو۔ اس کا موجب نہ اس لئے جانتے ہیں پس اگر ممکن ہو تو پہلو سے ایسے واقعات کا انکار کرنا بہتر ہے۔

اگرچہ ایسے والدین کے پیدا ہوئے جسے صل ہو جائے یا کاشبہ ہو سکتا ہو تو شروع سے ہی ایسی تدابیر کرنی چاہئیں جو صحت پرورش خیال کی جاتی ہیں مثلاً قوی ہند رست دایہ کا دودھ پلانا کھلی صاف ہوا میں رکھنا۔ ہر قسم کے تنگ لباس سے جو سینہ یا کمر کو چھینکے منع کرنا ایسی وضع سے منع کرنا جو سینہ کی حرکت کو آزاد نہ ہونے نہ دے اور جن چیزوں کا اجتماع خون کا اندیشہ ہو مثلاً شہ آب بھری کسی چیز کو کرنا یا اسکی بجائے پانی میں تنک اور پست ملا کر استعمال کرنا اگر ماں کی نسبت صل ہو جائے یا کاشبہ ہو تو ہرگز اسکی دودھ کی اجازت نہ دیں اس میں بچہ اور ماں دونوں کو

اندیشہ ہے جب کچھ پانچ چھ سال کا ہو جاوے تو کھلی صاف ہوا میں مناسب نش اور سردیاتھ کی صلاح دیں زیادہ محنت تعلیم سے منع کریں جبکہ کر لکھنا پڑھنا یا اور کوئی کام کرنا سینہ کو تنگ کرنا اور شش پر بوجھ ڈالنا اگر کمیز لڑکا ریش فیور یا ہونیکا کتبچہ کو لاحق ہو جاوے تو نہایت احتیاط لازم ہے۔ اکثر اطباء کا قول ہے کہ اگر کسی وجہ سے روز بروز لاغری زیادہ ہوتی جاوے تو سس کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بلکہ اغلب ہے کہ دراصل خفیف سل شروع ہو پس ایسی حالت میں ہشیار رہنا چاہیے۔

نزلہ زکام اور کھانسی کے جھڑے اسباب میں ان سب کی احتیاط لازم ہے ایسی ورزشیں سینہ اور پیچھے کی کٹا دگی و طاقت حاصل ہو مثلاً تیر پل بار پر ورزش۔ ڈنڈیلنا کشتی کرنا پیرنا وغیرہ ضرور اختیار کرانی چاہئیں سطح بحری کی چار چھ ہزار فٹ اونچے پہاڑوں کی ہوا بھی امراض شش کے لئے نہایت مفید ہے کیونکہ اس بلندی پر ہوا رقیق اور صاف ہونے کی وجہ سے سینہ اور شش خوب کشادہ ہونے اور کافی ہوا اندر پہنچتی ہے ایسی کاموں سے جن میں زیادہ ٹھیک رہنا یا جھک کر کام کرنا یا اعضا کو فراہم رکھنا پسند ہے یا اگر دوغبار۔ باریک ریزہ اور رطوبت اندر پہنچ کر آتش پیدا کرتی ہیں۔ یا متواتر تفریبات گرمی و سردی برداشت کرنی پڑتی ہیں اجتناب کی صلاح دیں۔

چونکہ ہر مرض تعدی ہوا اور عموماً اس طرح سے پھیلتا ہے کہ مریض کا تھوک بلغم خشک ہو کر اس کا بخار ہوا میں لڑنا اور دوسروں کو اندر پہنچا کر اپنا اثر شروع کر دیتا ہے اسلئے تھوک بلغم ہمیشہ جلا دینا یا پانی میں پکانے یا ڈس انفیکٹڈ اور سے ہلاک کر دینا چاہئے مریض کو ہرگز فروش پر نہ تھوکنے دیں اور اگر رد مالوں سے لپٹنا کہ صاف کرنا ہو تو انکو جلا دینا چاہئے۔ زائد پردہ اور اسباب ہرگز مریض کے کمرہ میں نہ رہنے دیں۔ انکی چادر کیل چوٹی وغیرہ گرم پانی میں پکا کر کار بالک سالیون یا مری لوشن سے ڈس انفیکٹ کرنے میں۔ دوسرے اشخاص کو اسی کمرہ میں دن رات رہنے اور خاص کر بوس و کنار وغیرہ سے قطعی منع کر دیں۔ سکرو کی ہوا کو برابر ایو کے پنس آئیل کار بالک اسید کے ڈوٹ وغیرہ کی جانب سے اینٹی سپیک رکھیں۔ تھوک بلغم مناسب اگال دان میں جمع کر کے اور لکڑی کا براؤہ ملا کر جلاتے رہنا سب سے بہتر ترکیب ہے۔

دوم اصل مرض کا علاج۔ اس مرض کے طبی علاج کا باب باب صرف مفید ہے کہ اول تو مریض کی طاقت کو عمدہ غذاؤں اور دواؤں سے قائم رکھیں تاکہ جسم بے سلائی کے ساتھ بخوبی مقابلہ کر سکے اور خراب شدہ حصہ رو سلامت ہو جائیں دوم اینٹی سپیک دوینہ خارجی اور داخلی طور پر بکثرت کیسے دیں تاکہ موجودہ بے سلائی ہلاک ہو کر انکی جگہ ترقی مند و دہو جاوے۔

غداؤں میں۔ دودھ کھن۔ بالائی بیضیہ پختی۔ مال اللہ۔ روح اللحم۔ گوشت خام۔ ٹکڑے وال ہونگ۔ ماش۔ میوے۔ میوے۔ آرد گندم جو چاول وغیرہ حسب پسند مریض مختلف مصلحتوں میں پیش کریں۔ گوشت۔ ہلاؤ۔ زردہ خشک۔ کچھ میوے۔ سبزی۔ قورم قلیہ۔ کوفتہ۔ کباب۔ بکٹ۔ ڈبل۔ روٹی۔ نان۔ پودھ۔ نان۔ نان خطائی۔ جھلہ۔ سلیدہ۔ وغیرہ ہر ایک چیز دیکھتے ہیں۔

طبيب کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مرضِ دل کی حالت میں معمول کی نسبت زیادہ قدرتی ضرورت ہوتی ہے جو پس اگر
حواء کم ہو تو مختلف طعام گوشتوں اور خوشگوار صورتوں میں پیش کرنے چاہئیں تاکہ مریض بلا ہمتہ ہوا کرتا
ہے بعض ڈاکٹروں کا یہ قول ہے کہ اگر ان خود مریض کو فی طعام قبول نہ کرے تو زبردستی کھلا ناپا پائے اگر ضرورت
ہو تو ایک نلکی ناک یا سنہ کے راستہ معدہ تک پہنچا کر اس کے راستہ غذا پہنچا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر دیو صاحب نے
میں کہ نلکی کے راستہ غذا پہنچانا انسانی مفید عمل ثابت ہوا ہے کچن حالتوں میں معدہ ہرگز کوئی غذا قبول نہیں
کر سکتا تھا اور سخت غثیان اور قوی کجیات بہتی تھی۔ اس طریق سے غذائیں مضہم ہونے لگی مریض کی طاقت
اور جسامت ترقی پذیر ہوئی۔ بجاہ عرقِ مشینہ اور کھانسی میں تخفیف شروع ہوئی۔

اگر عمدہ نہایت ضعیف ہو گیا ہو تو پیپٹو مائٹر ڈیٹا میں کھلا سکتے ہیں یا بحالت مجبوری بطور خنہ دلیکے ہیں
روغن مایہی اور مایہ پونا سفارٹ آف کیلیم نہایت عمدہ غذا کا کام دیتے اور اکثر مفید ثابت ہوتے ہیں فولاد بھی بعض
حالات میں مفید پڑتا ہے لیکن نفث الدم کی حالت میں اسکو نہ دینا چاہیے کیونکہ اس سے قلب اور شریانوں کو بڑھش
بہنچا کر اور زیادہ خون خارج ہونیکا اندیشہ ہوتا ہے اگر کاڈلو اور آئیل میں مرض کمزوری نہ ہو یا اسکے استعمال سے اسکو سخت
نفرت ہو تو بجائے اسکے گلیسرین ایک دو اونس روزانہ کی مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں اس سے قوت بازو کو
ترقی ہو کر وزن جسم اور طاقت ترقی پکڑتے ہیں۔ تازہ پھل اور میوے وسعت باضمہ تک دینا ہی لیکن لیکن
چونکہ یہ اکثر ثقیل اور دیر سضم ہوتے ہیں اسلئے زود سضم صورت میں بدل کر لکا کھلانا مناسب ہے۔ البتہ اس کوئی
شبہ نہیں کہ پروٹین اور تقویت جسم سے دوم درجہ پر اگر کوئی علاج ہو سکتا ہے تو سوائے اینٹی سپیک اور ویر کوڈر کچھ
نہیں۔ اگر ایو کوئی دوا کہی مفید ثابت ہو تو انہیں کی دوسرے مفید ہو سکتی ہیں جیسا کہ مثلاً میٹائی یا پیپرین
کے اندبجائیں ہو کر اسکی ساخت کو گلاتے جلاتے ہیں ہلاک نہ ہوں یا انکی ترقی و وسعت سے دوا نہ ہو جائے جب تک
کوئی دوا اثر نہیں کر سکتی۔ اینٹی سپیک اور ویر جو مختلف طور پر آزمائی گئیں اور مفید ثابت ہوئیں انکی مختصر فہرست
جب ذیل ہے۔

الف) اگرے زوٹ یا گایا کول یا کاربوئیٹ آف کایا کول۔ یہ تمام اینٹی سٹیکس ہیں جو اس مرض کو بے
مستعمل میں اعلیٰ درجہ پر شمار کئے جاتے ہیں۔ ان سے پیدائش بخم کم ہوجاتی اور اسکی غلطیت و بعض رفع سے پیشتر ہو
تسکین ہمتی اور نفث الدم بند ہوجاتا ہے۔ آئٹھا اور ہاضمہ یہی اصلاح پر آجاتے ہیں تمام کلی ہونی سکتا
سخت اور مضبوط ہونی شروع ہوجاتی ہیں سکاڈو اور انیل گلیسرین اور آیوڈو فارم کو ساتھ ملا کر کھانے کی
ب) آیوڈین کھلانا اور سنگھانا۔ انیل آیوڈو اور سنگھانا۔

(۷) بٹروائٹ آف سوڈا اسٹیکھانا یا اکلانا۔
 اور بیکلیم ہو جانے میں اسکو بطور جلدی بچکاری یا انشے پٹانی بچکاری کے بھی استعمال کرتے ہیں

۱۔ آرسنک یعنی سنگہیا کھلانا کرانک تھائی س میں نہایت مفید ثابت ہوا ہے۔

۲۔ ٹریٹنٹائن، بیٹری بین۔ کافور ایو کے لپٹال، یونوکلوروفینال (سنگہانا) منتھال، آرسنال، مرٹال، باسم آف پرو کلورین سنگہانا، سلفیورس ایڈکاس بن ایوڈائیڈ آف مرکری، کیلول، پیکلورائیڈ آف مرکری، ٹینین ٹیوبکلین (بھو ٹیوبکل بیسلانی کی زراعت میں ہی ایک قسم کا کلیسرین اسٹراکٹ بکالا جاتا ہے) ما، الدم سگ۔ یا خون بزرگی پچکاری کرنا۔

۳۔ **رفائن** (چونکہ تو کو مرض سل کبھی نہیں ہوتا اور بڑی میں بھی شاذ و نادر دیکھا گیا ہے) اسلئے اس خیال سے کہ لگے خون میں کوئی ایسے اجزا شامل ہیں جو سرائٹ ٹیوبکل بیسلانی کے مانع ہوتے ہیں کتے کے باڈیسم اور بکے کے خون کی ویدی پچکاری میں لگئی اور ڈاکٹر سمول صاحب کے تجربات میں مفید ثابت ہوئی چونکہ کتے کو یہ مرض کبھی نہیں ہوتا اسلئے اسکا سیرم بکے کی نسبت بہتر ہے۔

۴۔ (ذہن رسالہ) یہ ادویہ مختلف طور پر استعمال کی جاتی ہیں بعض سنگہانی جاتی بعض بذریعہ پچکاری جلدیکشش یا ویدیوں کے اندر پہنچائی جاتی بعض کی ماش کی جاتی اور بعض کی بھانپ دی جاتی ہے اور بعض کئی کئی طرح سے متعل ہوتی ہیں۔ ذیل میں تھیل فہم کے لئے چند مثالیں بیان کرتے ہیں۔

۱۔ اول انہی لیشر کار بالک ایڈیا کرے زوٹ، یا کافور یا ایو کے لپٹال کو ہوزن سپرٹ کلورافارم میں ملا کر باسانی سنگہا سکتے ہیں۔ ایو کے لپٹال اور کلورافارم ایک ایک ڈرام کار بالک ایڈیا اور کرے زوٹ دو ڈو ڈرام ملانے سے ایک نہایت قوی اینٹی سیپٹک اینٹی لیشن بن جاتا ہے۔

۲۔ ایوڈین کی بھانپ مرض ڈاکرے میں پھیلائے سے سانس کو ساتھ اندر پہنچ سکتی ہے جو ایوڈوفارم ۲۰ گرن ایو کے پلس آئل ۲۰ پونڈ کرے زوٹ، ابوندی فائیڈ سپرٹ نصف اونس اور انتھو اونس۔ ان سب کو ملا کر اینٹی لیشن طیار کرو۔

۳۔ ٹونو کافورینال ایک نہایت سریع الاثر دوا ہے۔ اور ثقیل الوزن ہوئی وجہ سے تمام باریکالیوں تک پہنچ جاتی ہے۔ دوسرے پچکاریاں کرے زوٹ ۳ پونڈ روغن بادام، پونڈ مقدار، ابوندی پچکاری تیسری پونڈ چوڑو روز گایا کولہ گرن ایوڈوفارم ایک گرن روغن زیتون اور روغن زیتون حسب ضرورت۔

۴۔ کافور ایک حصہ روغن زیتون ۹ حصہ مقدار، ابوندی پچکاری ایو کے لپٹال ایک حصہ روغن زیتون ۴ حصہ مقدار، ابوندی پچکاری۔ منتھال ایک حصہ روغن زیتون ۱۰ حصہ میں ملا کر حجرہ کے اندر پہنچانا۔

۵۔ آرسنال ایک حصہ روغن زیتون ۹۹ حصہ مقدار، ابوندی پچکاری ۵۴ پونڈ تک فی پچکاری سو حصہ سپرے یا باریک فوارہ بن ایوڈائیڈ آف مرکری ۵ اگریم پونڈ باسم آف ایوڈائیڈ اگریم مقطع پانی ۵۰۰ اگریم۔

پکھلائیڈ آف مری ڈیو گرین نمک ایک ڈرام بانی منظرہ اولس۔

چھٹا نم شش کی پکھاریاں۔ کسے روٹ تین فیصدی کے حساب سے باوام روغن میں حل کر کے۔

آیوڈو فارم روغن زیتون میں۔

مرکیورک کلورائیڈ بانی میں۔

آیوڈین اور کاربانک ایسڈ ٹماکر یا کافور اور کاربانک ایسڈ ملا کر۔

شش کے اندر پکھاری کرنا ایک نازک امر ہے اور اکثر مختلف قسم کے حادثات ایسی پکھاریوں سے وقوع پزیر

آئے جس وجہ سے اکھا بھی نکل جاتا نہیں ہوا۔

طریقہ خورش کو لینے ان ادویہ کا بیان دیکھو اور نیز زیادہ تفصیل کیلیو دیکھو بیان انہی دینتر اور جلدی پکھاریوں کا۔
سینہ پکھاریوں میں بانی بستر نمٹ کروٹن وغیرہ سے کاؤنٹرائی میں کرنا یا بارک پکھاریوں میں کاؤنٹرائی میں
کلوی کل کے پکھاریوں میں بانی بستر نمٹ کروٹن وغیرہ سے کاؤنٹرائی میں کرنا یا بارک پکھاریوں میں کاؤنٹرائی میں
یکہ خاتر تک شگاف پکھاریوں میں بانی بستر نمٹ کروٹن وغیرہ سے کاؤنٹرائی میں کرنا یا بارک پکھاریوں میں کاؤنٹرائی میں
عمدہ علاج ابھی تک ثابت نہیں ہوئی۔ اول تو اسوجہ سے کہ اس کا نقصان غار کی دیوار پر محدود نہیں ہوتا بلکہ شش مختلف
حصوں میں پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ دوم غار ٹھیک مقام معلوم کرنا بھی دشوار ہے۔ سوم اکثر بہت چھوٹے چھوٹے غار ہوتے ہیں
جہاں تک غار کسی بڑی ہوائی نالی میں کھلے تو دینتر پکھاریوں میں بانی بستر نمٹ کروٹن وغیرہ سے کاؤنٹرائی میں کرنا یا بارک پکھاریوں میں کاؤنٹرائی میں
تغذیہ اور اینٹی سسٹیکس سے سوم درجہ پر خاص ہوائی و بانی دینتر اور تغیرات آب و ہوا میں اکھا مختصر بیان کرنے
کے بعد ہم جن سے متعلقہ عوارضات اور علامات کا علاج بیان کریں گے۔

مریض سل کو واسطے کھلی اور صاف ہوا نہایت مفید اور ضروری ہے۔ اگر ہوا زیادہ سرد اور مرطوب ہو تو کھلی میں دینتر یا سائے
یا ہوا دار بالا خانوں میں مریض کو زیادہ تر کھنا مناسب ہے۔ اس معاملہ میں صرف اس قدر یاد رکھنا ضروری ہے کہ جبکہ بیمار
اور کھلی ہوا میں سر آئے بہتر ہے کہ اس قدر اسکی سردی اور خشک ہونے کو جو حفاظت بھی چاہیے بھگتانا ضروری ہے کہ بیمار
میں مریض کو کھنا بہت فائدہ کرتا ہے۔

خاص خاص ترکیبیں ایک مریض کی ہوا معمول کی نسبت فیصل الونڈ کر سکتی ہیں۔ ایسے مریض اگر مریض سل کو رکھا جاوے تو
یہ ہوا پیچھے پھرنے سے خواہی طرح داخل ہو کر زیادہ آگے بڑھ کر پکھاریوں میں بانی بستر نمٹ کروٹن وغیرہ سے کاؤنٹرائی میں کرنا یا بارک پکھاریوں میں کاؤنٹرائی میں
الات بھی اس قسم کے ایجاد کی گئے ہیں جنکو ذریعہ سے اندرونی سانس کی پکھاریوں میں بانی بستر نمٹ کروٹن وغیرہ سے کاؤنٹرائی میں کرنا یا بارک پکھاریوں میں کاؤنٹرائی میں
ریری فائڈ ایر دینی بارک ہلکی ہوا میں اسوجہ سے اندرونی سانس کے ساتھ سینہ اور شش کو زیادہ کثافت کی ہو کر
زیادہ ہوا پہنچتی اور شش کو دوران خون کو تیزی حاصل ہوتی ہو گی یا کہ آگے بڑھ کر پکھاریوں میں بانی بستر نمٹ کروٹن وغیرہ سے کاؤنٹرائی میں کرنا یا بارک پکھاریوں میں کاؤنٹرائی میں
خارج ہوتا ہے۔ یہ امور عمدہ تغذیہ اور ماساج بیلانی میں اور خارجی سانس کے ساتھ اندر کی ہوا معمول سے زیادہ خارج
ہو کر زیادہ ہوا داخل ہو کر پکھاریوں میں بانی بستر نمٹ کروٹن وغیرہ سے کاؤنٹرائی میں کرنا یا بارک پکھاریوں میں کاؤنٹرائی میں

مفید اور ضروری ہو کہ وہ بغیر ورزش جسمانی کے تنفس ناقص، تنذیر فاسد، صحت خراب اور طاقت زائل ہو جاتی ہو۔ پیادہ یا سیر کرنا گھوڑے یا شہم یا گھجی کی سواری، بندی پر چڑھنا کشتی کی سیر وغیرہ مریض کے لیے حسب طاقت برداشت تجویز کر سکتے ہیں۔ ان سے تنفس کو مدد، دوران کو قوت، قوائے باطنیہ و غذائیہ کو مدد اور عام صحت و طاقت کو ترقی ملکر مل کا مقابلہ اور ماضیت بخوبی ہوتا رہتا ہے۔

چونکہ مریضانِ قلب کی جلد بھروسہ کی نازک ہوتی ہے کہ خفیف تغیر گرمی و سردی اور خشکی و ترری بھی اپنا اثر کے طرح طرح کے نقصانات پیدا کرتی ہو پس اس نراکت کو رفع کرنے کے لیے خاص خاص صافی، قند ابدان یعنی ہائڈروکھاٹیک، ایجاکنکس، پین جینکلا، صابن صابن، یہ کہ مریض کو ٹھنڈے پانی سے غسل دیا جائے تاکہ جلد سردی برداشت کرے کی عادی ہو جاوے اسلئے چند امور کی احتیاط نہایت ضروری ہو مثلاً اگر مریض سخت کمزور و لاغر ہو گیا ہے مرض بہت ترنہ کے ساتھ پھیلتا جاتا ہے تو ایسی حالت میں ہرگز سر و غسل مناسب نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر مرض کی رفتار چند ان تیز نہیں ہو اور مریض کی طاقت خاصی ہو تو با احتیاط گرم کرہ میں غسل دینا شروع کر کے بتدریج قوت برداشت کو ترقی دے سکتے ہیں اگر عمل بطور قضا یا تقدم کیا جاوے تو بہتر ہے۔

لباس کی نسبت صرفاً سیفید یا دھوا کا چاہیے کہ حتی الوسع مریض کو کپڑے ہلکے گرم اور ہلکے ہوں تاکہ بدن کافی طور پر گرم رہے۔ اور سب سے بھی جس وقت سے خارج ہو اسی رفتار سے خشک ہوتا ہے۔ زیادہ کپڑوں کا گز و بار کرنے میں یہ نقصان ہے کہ پسینہ اندر جمع ہو کر جلد کو تڑاؤ و نرم رکھتا ہے جسکی وجہ سے جلد زیادہ نازک و ضعیف ہو کر مختلف امراض کا باعث ہو جاتی ہے۔

تغییرات آب و ہوا کا اثر بھی مرضِ قلب پر بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ایسا تو تھا کہ نفس کو لیے تغیر آب و ہوا کچھ نہیں کر سکتا نیز اگر سردی و بھیڑ و غل میں بہت نقصان پھیلتا جاتا ہو یا بخار زیادہ رہتا ہے یا سانس کے ساتھ ذات الجنب، سعال اور ذات الریه ہو گئی ہیں تو ایسے مریض کو گہریں ہی رکھنا بہتر ہے۔

تغییر آب و ہوا کوئی قسم کے مقاصد ہماری نظر سے ہوتے ہیں اول تو یہ کہ مشتبہ شخص کو بطور حفظ یا تقدم ایسے مقامات میں لجا کر مرض کو روک سکتی ہیں۔ دوم اگر دراصل خفیف مرض شروع ہو گیا ہو تو تغیر آب و ہوا سے ترقی باطنیہ و تنفس و دوران تغذیہ کے ساتھ تمام فسادِ دل سد و ہو کر صحت شروع ہو سکتی ہو۔ سوم اگر مرض بہت ترقی کر گیا ہے تو اسکو ایک حالت پر قائم رکھنا زندگی کو دراز و نکالیف و تغذات کو کم کر سکتی ہیں چھلوم اگر روز بروز مرض بڑھتا جاتا ہے تو مریض کو ایسے مقامات میں لیجا لے جسے بجائے خوشنما فضا اور دلربا نظارہ موجود ہوں، اکی، دل لگی اور دل افزائی ہو سکتی ہو۔

آج ہوا بمحافظہ طبی فوائد کے کئی اقسام کی ہوتی ہے۔

اول پہاڑوں کی آب ہوا۔ اگر یہ مقامات چار ہزار فٹ سے اوچے ہیں تو انکو اپان کہتے ہیں اور اگر ایک ہزار فٹ اور ساڑھے تین ہزار فٹ کو درمیان سطح سمجھی ہے اوچے ہیں انکو سب اپانین بولتے ہیں۔

دوم میدانوں کی آب ہوا ایسے مقامات اگر سمندر کے قریب ہوں تو انکو سیرین اور اگر سمندر سے دور خشکی میں ہوں

وَاللَّهُ كَفِيٌّ

تغیر آج ہو انی صلااح خیرنے کے وقت مفصلہ ذیل امور مدنظر رکھنے چاہئیں۔

را، ہوا صاف یعنی آمینشس گرد و غبار خاص کر نفاذی و حیوانی ذرات اور فاسد ہواؤں سے پاک ہو۔

(۲) ہوا خشک اور میوے سبز ہیں کثرت کھراواؤں کی مہل جو۔

۱۵۰) ہو اباریک او ملکی ہو۔

(۴۴) حرارت ہوا کم۔ دھوپ شیشہ صاف اور خوشگوار ہو۔

(۵) موسم سرما میں ہوا میں حرکت کم ملاتی ہے۔

(۶) وزن مقابلہ مقدار میں زیادہ ہو۔

ایسے مقامات میں لیجانے سے مریض کی تنہا عام صحت و طاقت ترقی کو پختہ کرنے میں اور خون زیادہ پیدا ہوتا ہے۔

قلب اور دماغ خون کو قوت اور جستی حاصل ہوتی اور عضلات و اعصاب کی طاقت زیادہ ہوتی جو پھر جسم پر غلبہ

ہوا زیادہ مقدار میں ہنجر متفس کو زہری بخششی ہو جو اس کو اور خنک ہے کی وجہ حرارت کو کم کر کے اور بھیچروں کی طرح

خفاک ہوا میں زیادہ خارج ہو کر نہ صرف دوران خون کو تیز کرتی بلکہ لمغم کو بھی کم کرتی اور کئی ہے چھپچھپوں کو ہمیشہ

معمول سے زیادہ کٹاؤ کی حاصل ہو کر سینہ کی وسعت بڑھ ہی شروع ہو جاتی ہے

ان خوبیوں کو بڑا کر کے سمجھنا چاہیے کہ تیزاب دھواں والی اور سطحی طور پر پراسر سفیدی مٹا دینے والے بعض اوقات مضر ایسے

مقامات کے سفر میں ہی جان بچتی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات یہ تغیر نا افاق ہو کر زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے

یہ تغراب و ہوا کی صلاح دینے سے بیشتر مریض کی طبیعت اور حالت کو بخوبی غور کر لینا چاہئے۔ دراصل یہ مسئلہ

پس میرا جب کہ ہوشی سہل کی یہ ہے پیر میں ہی بیت ہے کہ جو بوسہ میری چہرہ پر دے گا وہ میری جان میں رہے گا۔

دور مقامات میں لہجہ ناچکے کا فائدہ غیب اور تصویر میں ہے کوئی آسان امر نہیں ہے۔

سُوم عَوَارِضَات مُتَعَلِّقَاتُہ کا علاج راقی بخار، چونکہ مرضِ سل میں بخار سبکات

کے جذبہ ہونے سے موتا ہے ایسے اس میں سلی سلک ایک ڈیوڈی سلی سالاس کو نین پسند کیا۔ اور سلی نین

سکا اعلا رحمہ فرخندہ - انٹی بائرن فنیشن سیمی سلک ایڈریڈ موڈی سلی سلک اس کے ساتھ ملکر پانی میں

حاصل ہو جاتے ہیں۔

دوم سنہ تا اٹھریل ریائر شپ یعنی نچر ق شینہ یہ ایک غلط العام نام اور خیال ہے کہ مرض سل میں رات

کوئی ایجنسیز یا ادارے نہیں ہیں۔ لیکن جو ۱۲ بہیمات ہیں جو کہ مجموعہ مارات کی آخری حصہ میں موجود کثرت بلغم خوشبو کے

لوہی پسیہ ریادے کے ہیں۔ اس لیے کہ وہ پتہ ہوتا ہے اور حری سہیہ یا پتہ ہوتا ہے۔

کچھ تو آتا ہے منہ پر اسے کہ تیرے گھر میں نہ ہو جائے تو رات کی طرح چلے آئے لگتا ہے۔

عجرت انا ہے یہ کہیں کی کہیں ہے اور یہ کہیں کی کہیں ہے اور یہ کہیں کی کہیں ہے۔

دوسری سخت نقابت کی وجہ سے جو اس مرض کا لازم ہے۔ سوہر جلد کی کیفیت کچھ ایسی متغیر ہو جاتی ہے کہ پسینہ بکثرت آتا ہے پس اس کا علاج سبب کی مطابق کرنا چاہئے اگر اسکی وجہ سخت نقابت اور کمزوری ہو تو کھینٹ سکھیا۔ پیکلورائڈ آف آئرن سٹرکچر ایسٹیم یا ٹیپو فاسفائیٹ اور فاسفورک ایسڈ مفید ہونگو۔

اگر زیادتی کھانے کی وجہ سے ہو تو مارفیا۔ اثر و پیا سیلا ڈونا اور ڈو ورس پاؤڈر مفید ہوتے ہیں۔ دیگر دواں فخرق ادویہ حسب ذیل میں کیمفورک ایسڈ۔ گلیسرین۔ زنگ آکسائیڈ۔ سلفیوک ایسڈ۔ پشکری سلفیٹ آف کاپر۔ دینیلٹوٹیل۔ ایسی ٹیٹ آف لڈ۔ پانی لوکارین۔ پیکروٹاکسین۔ مسکیرین۔ گلیک ایسڈ۔ ٹینک ایسڈ۔ سلفونیل۔ ٹیلورمٹ آف سوڈیم۔ ماسوایوان۔ ادویہ کے تیز پانی یا سرکہ و پانی کے ساتھ پیئ کرنا شکم پر ایس بیگ رکھنا۔

مسیدہ کھانسی۔ اگر کھانسی خشک ہو یعنی محض خراش ہو کر کھانسی پیدا ہوتی ہو لیکن اسکے ساتھ بلغم نکل نہیں ہوتا تو کھانسی نکلنے سے بلغم ادویہ جو اخراج بلغم کریں اور ساتھ ہی بلغم کی غلظت اور چسپ کو کم کریں مثلاً ایونیٹ کاربوناٹس۔ امونیم کلورائیڈ۔ پوٹاشی ٹائیٹرائس۔ پوٹاشی کاربوناٹس۔ سیٹنگا۔ سلا۔ بالسم آف پیرو وغیرہ استعمال کریں۔

اگر کھانسی تر ہے یعنی اسکے ساتھ بلغم بکثرت خارج ہوتا ہو تو ایون۔ مارفیا۔ کوڈایا۔ ایو مارفیا۔ ہائیو سائر۔ اکانٹ پونا۔ ہائیو کورل۔ ہائیڈریٹ۔ سیلا ڈونا۔ اثر و پیا سٹرکچر۔ نائٹرک ایسڈ وغیرہ استعمال کرنے چاہئیں ساتھ ہی کہ زوٹ ٹرینٹامین۔ سینی ٹاس آئل۔ مار۔ بطور اینٹی لیشن اور ٹنٹ آف ڈوین۔ ٹرینٹامین۔ ٹیپو۔ بلشر وغیرہ بطور کاؤنٹر اریٹیشن استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ہونا۔ فیصدی میں کھانسی خشک نہ دیکھنے میں آتی ہو پس مخجج بلغم یا مسکن شش یا خشک ادویہ جیسا کہ مناسب ہو استعمال کرنی چاہئیں۔ اگر گلو و جگرہ میں خراش اور سوزش ہو تو کاسک لوشن (۱) گرین فی اونس) یا کوکین و مارفیا لوشن وغیرہ اندر لگا کر باہر رانی کا پشتر یا ٹنٹ آف ڈوین لگاتے رہیں۔

چھاندرے۔ تین وجہ سے ہوتی ہو اول تو خراش و دوا وعدہ سودوم کھانسی کی وجہ سے سووم رینیٹکس طور پر خراش پہنچ کر پیراگراف وعدہ یا فلیکس خراش کی وجہ سے ہو تو مارفیا و ہائیڈروسائٹک ایسڈ مفید ہو سکتی ہیں لیکن اگر کھانسی کی وجہ سے یعنی بلغم جو بوائی نالیوں میں جمع ہو جاتا ہے کھلنے اور پینے کے بعد کچھ تو اگس عصب پر اثر ہو کر ادخون میں پانی جدا ہو کر اسکے اخراج کی تحریک ہوتی اور سخت کھانسی شروع ہو جاتی ہو پس اس کا علاج یہ کہ مخجج بلغم ادویہ سے بوائی نالیوں کو صاف رکھیں اور کھانسی سے نصف گھنٹہ پیشہ ایک پالہ گرم پانی میں پاشی کاربوناٹس ۵ اگر لین ٹیم کلورائیڈ اگر ناک مارک پادیا کریں اس کو کھانسی کو تحریک بلغم خارج اور وعدہ بھی ہے ہو کر صاف ہو جایا کر گلیا بعد ازان باسانی طعام معدہ میں جگہ کر سکتا ہے۔

پنجم نفث عدم ہیاپاشی سس کھانسی کے ساتھ خارج ہونا مارکٹ۔ اگر کوٹین مارفیا ایک ایک ایسڈ ٹرینٹامین۔ ٹیکر فیری پیکلورائیڈ۔ ٹیپو فاسفائیٹ۔ ایسی ٹیٹ آف لڈ۔ ٹنگ ہیزی لین اسین مفید ہیں۔

اگر خراش زیادہ اور کھانسی بے اندازہ ہو تو ان حاسل الدم ادویہ کو ساتھ ایون یا مارینا ملا دینا مرض کو کلی آرام دیتا اگر کھانگفت و کلام نہشت بربخاست سوا یک سخت سرد پانی پینے سے منع کریں۔ اگر قلب کی حرکات تیز اور بغیر ہوں تو دھڑکی سلیس کالما مفید ہو سینہ پر برف لگانا یا کافور نثرانی مٹین کرنا یا کلاس کھینچنا یا چھانٹنا یا بھی بھول وقت مفید ہوتے ہیں۔

نہش فسادات معده و ہما کا علاج عام اصول کے مطابق کرنا چاہیے بسمتہ کرے زوت سپین۔ انکلودین ریوہ چینی۔ کلبر اکوشا چرانیہ وغیرہ جب موقعہ استعمال کر سکتے ہیں۔

ہفتہ اسہال۔ تین قسم کے ہوتے ہیں اول کھجیب یعنی اسعائیل جنم خول دروشن ہو کر دوم ارمی ثمر یعنی بلغم اندر گنگنے سے معائیں خراش ہو کر سوم البیوی یا لہجہ ہارم ہو کر چارہ یا ریا کا بیان دیکھو بسمتہ سیلا س بسمتہ میناس بسمتہ سبنا تیراس یا کسرٹ کوٹو فوئو یا فیون۔ دو دوس پاؤڈر کرے زوت ایسا سلفیڈ کڈ الیڈٹ وغیرہ جب موقعہ استعمال کرنے چاہئیں۔

ہشتہ لیسر نجل نحلی سس شروع و جب سوزش میں جبکہ محض اجتماع خون اور خشک دم کی علامت موجود ہوں شعل ڈاکٹر اور صاحب شندی ہوا میں دم لینا مفید ہیں لیکن جب اسکی سطح پر بلغم جمع ہو جاوے تو تختہ ہو کر کثرت یا نمک پانی یا نوشادر و پانی یا کاربالکوشن (ایک فیصدی) کا فوارہ اندر نہنچا نا چاہیے جب سوزش پرانی پڑ کر خراش بند ہو جاوے لیکن اخراج بلغم جاری ہے تو فصلہ ذیل ادویہ بطور سپرے یا انہ لیشن استعمال کر سکتے ہیں یٹینین ایسی ٹیٹ آف لڈ نائٹریٹ آف لڈ پٹکری سفید و طیار ایک سی چار فیصدی تک کی طاقت کا حل طیار کر کے، خام جی طور پر لیمٹ آکسڈین یا ٹنگ ایوڈین اور رانی کا پلستر مفید ہیں۔ اگر سرد ہو یا فوارہ اور خشک ادویہ کی برداشت نہ ہو تو کرے زوت کاربالک ایڈر ایو کے پٹس ایل سینی ناس آئل وغیرہ بطور بخاں استعمال کرنے چاہئیں۔

جب خم ہونے شروع ہو جاوے تو ایسی تدابیر کرنی ضروری ہیں جنہو مخم خورد و سطح صاف اور انٹی سپٹک ہو۔ بزواٹ آف سوڈا کا سنگھانا نہایت عمدہ انیمی سپٹک اور مخم بلغم اثر پیدا کرتا ہے۔ اسکی بجائے کوئی اور انیمی سپٹک مخم بلغم انہ لیشن استعمال کر سکتے ہیں دیکھو انہ لیشن کا بیان۔

جب خم رویمت ہوں تو دو یا تین حصہ سلو زائٹریٹ ہزار پانی میں ملا کر بطور فوارہ استعمال کرنا چاہیے۔ نهم ذوات الخنج کا علاج عام قواعد کے مطابق کرنا چاہیے اسکا پریم فراسقہ زیادہ لانا ضروری سمجھتی ہیں کہ جب تک پانی زیادہ مقدار میں ہو کر سخت دنگشی پیدا نہ کرے تب تک ٹنگاف یا ٹنگی سے ہرگز پانی نکالنے کا ارادہ نہ کریں۔ درنہ س کے پیلے کا اندیشہ ہے۔

۵۵۔ نہ ہو موقوف بحسب جب بخیمہ ہو کہ بکول کیوی ٹی میں ہوا داخل ہوتی ہو تو دفعتاً سخت سرد اور صمد معلوم ہوتا ہے اسوقت مارفانی جلدی بچکاری کرنا یا لایا کو مارفانی پلا نادر اور صمد میں تخفیف کر سکتا ہے عمدہ میں مرین

کو تین جا کر فرائض کو ادا کر رکھیں، گفت و کلام نشست و برخاست اور ہر قسم کی حرکت سے منع کر دین اور انتظار کریں کہ پیچھے پڑے گا سو راج نہ ہو جاوے تب اگر زیادتی ہوئی وجہ و کشتی زیادہ ہو تو بار ایک ٹروکار لے کر دیکھو یا کچھ تھپی اور پانچوں پہلی کے درمیان پستان کے مقابل داخل کر کے ہوا خارج کر سکتے ہیں۔ اگر ٹروکار داخل کرتے وقت سخت کھانسی شروع ہو جاوے تو فوراً سوراخ کے ارد گرد دیکھو کہ خوب زور سے دباے رکھیں اور ماریا کی جلدی پچکار سی کہیں اگر اس سے کھانسی میں تخفیف نہ ہو اور ہو اسینہ کو اندر سے جلد کے نیچے پھیلتی ہوئی معلوم ہو تو اول ٹروکار سے اس کے پھیلنے کو روکیں ورنہ ٹروکار نکال کر سوراخ کو فوراً کلوٹن اور سٹکن سے بند کر کے ٹی باندھ دیں۔

یا زہدہم یا نوینو مخور جس جب تک پیپ کی مقدار اس قدر زیادہ نہ ہو جائے کہ سخت دلکشی پیدا ہو اور دل
بجگہ ہے تب تک نگاہ نلکی ہو کر پیپ نکالو کارا وہ نہ کریں کیونکہ پیپ کی وجہ سے دلجوئی کی کیفیت ایسی متغیر ہو جاتی
ہو کہ انہیں پیپ جذب نہیں ہو سکتی اور سینک بخار ہو نہ کا کوئی اندیشہ نہیں رہتا علاوہ بریں کچھ پیپہ ماؤف پر پرا برداؤ
رہنے سے اسکو آرام ملتا نقصان مل زیادہ پھیلنے نہیں پاتا اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایسی حالت میں مریض برسوں
زندہ رہتا ہے لیکن نگاہ نلکی یا ٹرو کار داخل کرنے سے پیپ خارج ہو کر سل کا نقصان پھیلنا شروع ہو جاتا
ہے۔ ہاں اگر پیپ دیر ہی اندر متھن ہو کر انفیکٹو فورسٹن کا بخار پیدا کرے تو اسکا خارج کرنا لا بد ہو جاتا ہے
دوا زہدہم یا نوینو یا سوالات قدر اسکا علاج سولے مناسب شکاری کا اور کچھ نہیں ہو لیکن اگر
مریض سخت لاغر و کمزور ہو گیا ہے یا ناسو کی ساخت میں ٹیور کلر مادہ پایا جا تو شکاری کو کچھ فائدہ کی امید نہیں ہو سکتی
سین زہدہم کیوٹ ٹیور کلوس اس کے علاج کا لب باب صرف اس قدر ہے کہ مریض کو غذائیں اور الکھالکسٹی ٹولٹ
بافراط دیں اور بخار کو کونین اور سیلی سلک ایسڈ وغیرہ کو کم کرتے رہیں اور جو علامات درد وغیرہ پیدا ہوں
انکا حسب قواعد عام علاج کریں سکریلجین ایسڈ ہو کر نال کرنا کسی طرح جائز نہیں جس قدر غفلت کی جائے اسکا
نتیجہ سرسوزناکت ہو یا یقین اور مستعدی کے ساتھ علاج کیا جائے اتنا امید کامیابی ہو سکتی ہے اس مرض کو
قطعاً الای علی خیال کرنا سرسوز غلطی ہے کیونکہ بعض اوقات ایس مرض علاج سے اچھے ہو کر مدوں زندہ ہے
اور بعد میں کسی اور مرض کی وجہ سے فوت ہو تو اور حائثہ نفس سے ثابت ہوا کہ ان کو کبھی کیوٹ ٹیور کلوس
بھی ہوا تھا۔

تھائی مال Thymol متھیل پراپل فیس مال۔ یہ ایک نہایت عمدہ خوشبودار بے خراش۔ اینٹی سپٹک
وٹن انٹیکسٹ اور دماغ دہیوی بنجر حصہ میں ایک حصہ ملکر ٹرن اور غیر کو روک تیل ہے۔ داخلی طور پر سلیمینہ کرم مہا اور متھن
بخارات میں استعمال کی جاتی ہے بطور مہم دادہ سورے سن پٹی راہی س سگزیٹا وغیرہ جلدی امراض میں مفید ہے۔ اس کو غرق
کرنا یا بھانپ لینا یا فوراً ہانڈ پینچا ناگلو وغیرہ کی متعدی سوزش میں فائدہ کرتا ہے جلد پر ایک فیصدی کا لوشن ملتا ہے پھر لیو۔
کھنڈ اور جوں وغیرہ کو دور کرتا ہے۔
خم پکریں سے مگرین تک۔

تھائیمس و لگیئرس - *Thymus Vulgaris* اس دھت کے روغن میں سے تھائی ال حاصل ہوتا ہے۔

تھرسٹ *Thirst* پیاس۔ عطش کا بیان دیکھو۔

تھرسٹ - *Thrush* - سٹوئے ٹائٹلس کا بیان دیکھو۔

تھرومبوسس *Thrombosis* ریدوں یا شریان یا قلب یا عروق جاؤز کے اندر انجماد رطوبات بحالت ذریعگی ہو جانے کو تھرومبوسس کہتے ہیں۔ مگر عام طور پر اسکے یہی معنی لئے جاتے ہیں کہ ریدوں یا شریانوں کے اندر بحالت زندگی انجماد خون ہو جانا۔

اس کا پہلا آؤل ضرب کسی رگ کا کچلا جانا یا پھٹ جانا یا ایک جانا یا کسی رگ کو باندھ دینا۔ دوسری سی اندرونی سطح کا مٹورم یا زخمی ہو جانا سیوی کسی رگ کو اندر غیر ضمیمے کا داخل ہونا ایسی بولائی سے کہ جانا چھڑا دھن میں انجمادی اجزاء معمول سے زیادہ ہونا یا دوران خون کا ست ہو جانا پنجم بعض حالتوں میں خون کی انجمادی طاقت بڑھ جاتی ہے مثلاً پانی ایسا۔ بخا لقصن اخراج خون۔ ایام حمل وغیرہ میں جو تھراس میں کے ہوئی خون میں بنتلے سے وہ سرخ ہوتا ہے اور چلتے خون میں بنتلے سے سفید ہوتا ہے ایک دفعہ تھراس میں بکری بعد میں اوہیں حسب ذیل تغیرات واقعہ ہوتے ہیں۔

اول رنگ جذب ہونا شروع ہو کر سرخی سے زردی پر پھر سفیدی پر آ جاتا ہے۔

دوسرے کبھی رنگ ذرات اور ریشہ وغیرہ تمام جذب ہو کر بالکل تحلیل ہو جاتا ہے۔

سیویوم کبھی اس میں ذرات اور الگو بکثرت پیدا ہو کر رفتہ رفتہ سخت مضبوط سی کے طور پر ہو جاتا ہے۔

چھٹا م کبھی مضبوط سی کے اندر نالیان بکرو دوران خون قائم ہو جاتا ہے۔

پنجم کبھی اسمیں چونہ بڑھ کر لنگریان بن جاتی جنکو فلیڈو تھس کہتے ہیں۔

ششم کبھی کیمیائی تغیرات سو رقیق ہو کر دودھ کے مشابہ ہو جاتا ہے۔

ہفتم کبھی پیپ یا قطن کا مادہ ہینچکر سپٹیک یا منعدی پیپ بن جاتی ہے۔ اس طرح اسکے ٹکڑے یا ریزہ خون کے ساتھ جا کر کسی اور جھوٹی رگ میں رگ جاتے اور المیوں بناتے ہیں۔

شناخت و علامات۔ دوران خون بند ہو کر مختلف اعضائے مختلف مختلف علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر طرف

میں سے کوئی بڑی ورید یا طرہ صغیر بند ہو جائے تو خون رگ کو جمع ہونا شروع ہو جاتا اور اخراج رطوبات ہو کر

سودا القنیہ یا ورم ہو جاتی ہے سخت حالتوں عضو مردار پڑنا شروع ہو جاتا ہے بعد انشری اور گردہ

کے تھراس میں جو جریان خون ہو سکتا ہے۔ دل غ کی تھراس میں سے سرسام ہو سکتا اور الغض کی

عضو کے تھراس میں سے اسکے فعل میں فساد واقعہ ہو جاتا ہے۔

تشخیص۔ تھراس میں اور اسل انجماد خونیں جو مرنے کے بعد واقعہ ہو حسب ذیل شناخت ہو۔

بند کرگ کا لو تھر اسر خ نرم تر ہوتا ہے رگ کی دیوار سے چپکا ہوا نہیں ہوتا اور نہ کامل طور پر رگ کو بند کرتا ہے اور باسانی پکڑ کر باہر کھینچا جاسکتا ہے یہ پہلو دل اور بڑی وریدوں میں بنتا ہے چھوٹی وریدوں میں بچھو بنتا ہے گرتھر اسر سخت مضبوط رگوں کی دیوار سے چپکا ہوا ہوتا ہے پہلے سرخ پھر رفتہ رفتہ زرد یا پھیکا سفید ہوجاتا ہے۔

تھریڈ ورمز Thread Worms چلوڑ انٹسائیل ورمز کا بیان دیکھو۔
 تھور وورٹ Thorowort ایوپے ٹوریم پرفولے ٹم کا بیان دیکھو۔
 تھوس امریکن Thus American کاسن فرنگلین سن۔ اینو خواص افعال میں یزن کو مشابہ ہو۔
 تھوس ع شک تے۔

تھیال Thiol جرمں التھیال خاجی استعمال میں التھیال کی طرح وجع مفاصل مزمنہ۔ وجع القلب بہرینر تھر
 الکئی رکیل، اگر با وغیرہ میں مفید ہو۔
 تھیشیا کارکی نیکا Thapsia Gerganioa نصفہ جس تمام پر لگائی جاوے اسکا جب السلاطین
 کی طرح سوزش بیدار کے چھوٹی چھوٹی پھسیاں اٹھاتی ہو اسلئے سرفہ۔ وجع مفاصل، نقرس وغیرہ میں بطور کاؤنٹرائی
 ٹٹ استعمال کیجاتی ہو۔ دانی استعمال میں قوی اور زیادہ مقدار میں سخت مہل ہے۔
 خم فلورڈاکسراکٹ ۱۰ پونڈ سے ۳۰ پونڈ تک۔

تھیلین Thalline اسکا دوسرا نام ٹھراٹھ روپیر تھیال کسی کانولین ہو یہ نہایت قوی نیٹی پائیرٹیک یعنی
 دفع حرارت ہو خون کی پیو گلوٹین کو کم کر دیتا۔ اعصاب گنگرک اور فاسفرس علیحدہ کر کے انکی ساخت کو سخت نقصان پہنچا
 اور تحلیل کو کم کرتا ہے۔ بخار کی حرارت کم کرنے میں سب سے زیادہ قوی اور مضیی اثر رکھتا ہے لیکن اعصاب کو لیے دہر ہو اسلئے
 اسکا استعمال نہایت احتیاط سے کرنا چاہیے خم اگر گرن سے اگر گرن تک۔

تھیملین Thein نہایت قوی سکون داجار ہے اور نارفع وجع مفاصل وجع القلب شقیقہ صداع
 عرق النساء درد کانکل وغیرہ خم اگرین سے اگرین تک جلدی بچکاری لپہ اگرین کو ایک اگرین تک۔
 تھیوبروما آیل Theobroma Oil کواٹر تھیوبروم اینو خواص افعال میں تھین کو مشابہ ہو اسلئے اسکا بیان دیکھو۔
 تھیوبرومین Theobromine تھیوبروما آیل باڈیروکوننا نہیں مستعمل ہوتا ہے۔

تھیوبرومین سوڈی سلی سلاس Theobromine Sodæ Salicylas
 ڈائیٹوریزین کا بیان دیکھو۔

تھیوبرومین نال Theobrominol بطور مہر بہت جلدی امراض میں استعمال کیجاتی ہے۔ رسائین
 اور کبک کی سیانی درکب کو مائل کیجاتی ہے
 تھیوکیف Theocainph کافور اور سلفور سیا پید کاس کے ملنے سے یہ سائل مرکب حاصل ہوتا ہے اور

دوم سپائی نل کیسری عصب کے قطع کرنا یا کھینچ دینا۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان جراحی عملوں سے کبھی تو کامیابی ہوتی ہے اور کبھی نہیں لیکن انکی تجویز ہمیشہ حاصل احتیاط کو ساتھ کرنی چاہیے۔

ٹاروکولیٹ آف سوڈیم Tarocholate of Sodium سوڈیم کا بیان دیکھو۔

ٹانسلیٹائٹس Tonsillitis گلے پڑ جانا۔ زیرکس کے امراض کا بیان دیکھو۔

ٹانسلز Tonsils لوزین۔ زیرکس کے امراض کا بیان دیکھو۔

ٹائیکس Tonic مقویات۔ اسبجکٹ پر مختصر فرست مختلف اقسام مقویات کی طرح کرتے ہیں لیکن انکے خواص کی تشریح الفاظ خون نظام عصبی اور ہاضمہ کے بیان میں کریں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ جل جلالہ عظم نوالہ اقول بلڈ ٹانس یعنی مقویات خون مرکبات فولاد فیرم ریڈ کٹم حیوانی و نباتی روغن مثلاً روغن ماہی گہری مکھن روغن کچھ روغن بادام روغن سرسوں، الگ انڈا آف منگی نیر عشبہ۔

دوم فروٹن ٹائیکس یعنی مقویات اعصاب۔ سم الفار۔ ورق نقرہ سلور ٹائیٹ۔ آکسائیڈ آف سلور۔ ہروڈیا۔ آگرس لیٹ آف سیریم۔ ٹیلا طوطیا۔ کنولیریا۔ کسپو ریڈ میانا۔ ٹائیپو فاسفائیٹ کچھ سٹرکٹیا سفید طوطیا۔ زنک فاسفائیڈ۔ زنک ولیبرے ناس۔

تسومہ مقویات عمدہ یعنی گیسٹرک ٹائیکس جموضات معدنی الی ٹرس فیری نوزا۔ ہنٹسم۔ ایپی پوٹیل بولڈو۔ برڈاک کیلس۔ ایڈرن۔ ریشاری۔ سیرس۔ ورجیا۔ نا۔ گل۔ باؤنڈ۔ کلونین۔ چکوری۔ کاسیو۔ تھس۔ کالفسو۔ نیا۔ کاکولس۔ کارڈیولس۔ کائنے۔ بارک۔ کوپاچی۔ باک۔ کارنس۔ فلورڈیا۔ گلے۔ ٹائیپلی۔ نین۔ ہونگ۔ ٹان۔ ہانڈر۔ ٹس۔ کینا۔ ٹس۔ ہانڈر۔ کوٹائل۔ ہونٹس۔ لوپولس۔ مینی۔ سپرم۔ بولی۔ گئے۔ ٹم۔ آئی۔ سنے۔ لس۔ پوٹیل۔ عطر۔ قرحا۔ پیرا۔ ایر۔ سپرڈی۔ سپرڈیا۔ زیتھوزائی۔ لم۔ سولف۔ اجوائن۔ لونگ۔ زیرہ۔ سیاہ۔ سفید۔ سوٹھ۔ چرائیا۔ کوٹیا۔ اٹکلیا۔ بنولے۔ ایچور۔ زنک۔ سیاہ۔ ٹمک۔ لاہوری۔ کلونچی۔ خوب۔ کلان۔ کوٹین۔ کچھ۔ سٹرکٹیا۔ کسپو۔ کیل۔ کیرلا۔ جنشین۔ پودینہ۔ دھنیا۔ سویا۔ کوٹسمیر۔ اٹکولن۔ پیسین۔ کھاری۔ ادویہ۔ تلخ۔ ادویہ۔ خوشبودار۔ لطیف۔ روغن۔ مثلاً۔ آئل۔ پیپرٹ۔ آئل۔ ٹائیس۔ آئل۔ کیر۔ روغائی۔ غیر۔ تفصیل۔ اور۔ تشریح۔ کے۔ لیے۔ ان۔ ادویہ۔ کا۔ بیان۔ دیکھو۔ اور۔ نیز۔ دیکھو۔ ان۔ خون۔ ہاضمہ۔ نظام۔ عصبی۔ کا۔

ٹایا لزم Trismus سیلان دہن کثرت لعاب دہن چونکہ اسکی وجوہات مختلف ہوتی ہیں اسلئے اسکا علاج بھی مختلف طور پر کیا جاتا ہے لیکن اسکی مصلحت یہ ہے کہ سب کو دریافت کر کے اسکی دواغت کریں۔ ایام حمل کے سیلان میں پوٹاسیم پروٹائیڈ اور بیلاڈونائیڈ نہیں۔

اگر خود منہ کے اندر کسی قسم کی سوزش یا لالہ موجود ہو تو پوٹاسیٹ آف پوٹاش یا سچھے گرین نی پائینٹ پائینٹ مل کر کے اسکے غرغرو کریں اور پورک ایڈیا۔ کلورائیڈ آف پوٹاش یا ٹینک ایڈ وغیرہ گلیسرین میں مل کر کے متواتر منہ کے اندر لگائیں یا جھال سیلان یا میری یا جاسن یا آئس یا ڈاک کی گئی یا ٹیلا طوطیا یا چنگری یا غنچہ آمار وغیرہ پانی میں

جوش دیکر اسکے غرغرو متواتر کر انہیں اگر کوئی دانت کرم خورد ہو گیا ہو تو اسکا حرب قاعدہ علاج کرن پوناسی کلور اس
مقای اور دھلی استعمال میں لعاب بن پر یہ خاص اثر رکھتا ہے کہ اگر بکثرت خارج ہوتا ہو تو اسکو کم کر دیتا اور اگر کم ہو تو زیادہ
کر دیتا ہے غرض کہ ہر حال میں اسکو اعتدال پر لاتا ہے۔

اگر کسی اندرونی مرض متعدد واسعا و شش دماغ وغیرہ کی وجہ سے ریفیکس طبع پر سیلان دین زیادہ ہو تو اسکے لئے بخور
ادویہ خاص کر افیون بیلادونا اور پاپونیاہم برہما وغیرہیں اگر کسی دوا کو استعمال کچھ سے سیلان بکثرت ہو مثلاً پارہ پوٹاسیم آیوڈائیڈ
تباکو وغیرہ سے تو یہ ادویہ فوراً بند کر کے اگلے فائدہ مندوں کے ساتھ سیلان کا عام اصول کیطابق عمل کرنا چاہیئے۔

ٹائیفائیڈ فیور۔ - Typhoid fever - ایک خاص قسم کا سلسلہ بخار ہے جو خاص نباتات کی وجہ سے
پیدا ہوتا اور عظم الطحال بہاں اور قروح ہوا اسکا اسکی علامات میں جلد پر گلابی رنگ کو وجہ نمودار ہو جاتے ہیں۔

علامات۔ زمانہ سرایت اگلے روز تک خیال کیا گیا ہے اس زمانہ میں کوئی خاص علامات ظاہر نہیں ہوتیں محض قیہ سے
فساد و تہاد باضمہ و دوسرا ضعف معلوم ہوتے ہیں جبکہ بعض کچھ خیال نہیں کرتا اور اپنا کام کاج کرنا رہتا ہے ظہور
بھی بتدریج ہوتا ہے سکر اور خاصل میں درد غشیان ضعف اور عام بے چینی ہو کر لرزہ کے ساتھ خفیف بخار
ہو جاتا ہے نبض تیز زبان سلی اور پیشاب سرخ عام بخاروں کی طرح سے ہو جاتے ہیں اکثر کسیر جاری ہو جاتی ہے بخار
ایک قاعدہ کے ساتھ پہلے ہفتہ میں روزہ روز زیادہ ہوتا جاتا ہے پھر دوسرے ہفتہ میں ایک حالت پر ہوتا ہے
اور تیسرے ہفتہ میں بتدریج کم ہوتا ہے مثلاً پہلے روز شام کی حرارت سو درجہ پر ہے تو صبح کی حرارت ۹۹
درجہ ہو جاتی ہے پھر اس شام کی حرارت ۱۰۱ درجہ اور اگلی صبح کی حرارت سو درجہ رہتی ہے۔
اسی طرح صبح اور شام کا بخار ایک درجہ روزانہ بڑھتے جاتے ہیں۔


دوسرے ہفتہ میں بحال حالت رکھ کر تیسرے ہفتہ میں ایک درجہ روزانہ کمی ہوتی جاتی ہے آخر کار
حد اعتدال سے یہی کم ہو کر پھر اسکی حالت پر آ جاتی ہے ایک دورہ کے بعد دوبارہ ستر بارہ
بھی ایسا ہو جاتا ہے اگر اسکی حرارت کا نقشہ کھینچا جاوے تو حسب ذیل صورت ہوگی۔

نقشہ حرارت کا صفحہ

ایند کا نمبر ۳۷۲ پر تحریر ہے۔

۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۱۰۰
۹۹
۹۹
۹۸
۹۷
۹۶
۹۵

ایام و احوال



ایام و احوال

پہلے ہفتہ صبح کی حرارت ایک درجہ روزانہ بڑھتی ہوئی شلا آج ۹۹ ہے توکل کو ۱۰۰ ہوگی پھر ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵ وغیرہ۔
اسی طرح شام کی حرارت ایک درجہ روزانہ بڑھتی ہوئی شلا آج ۱۰۰ ہے توکل کو ۱۰۱ ہوگی پھر ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵ وغیرہ۔
شام کی حرارت صبح کی نسبت عموماً ایک درجہ زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرے ہفتہ میں ایک حالت پر ہرگز تیسرے ہفتہ
میں اسی طرح بند سنج کم ہوتی جاتی ہے۔

نایفائید کے گلابی و صبیہ کی چوتھے پانچویں روز بھی نمودار ہو جاتے ہیں مگر عموماً دوسرے ہفتہ میں ظاہر ہوتے
ہیں اور ۳۰ فیصدی میں آخر تک غائب بھی ہوتے ہیں یہ دھبہ چھوٹے چھوٹے پن کے سر کی برابر قد سے اٹھتے ہوئے
نوکدار ہوتے ہیں۔ دبلنے یا جلد کو کھینچنے سے غائب ہو جاتے اور پھر فوراً نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تعداد میں عموماً
نصوٹے ہونے اور غیر سادی طوشکم و سینہ پر پیدا ہونے میں تمام دھبہ ایک ہی دفعہ برآمد نہیں ہوتے بلکہ بخار
کے خاتمہ تک یک بعد دیگرے سلسلوں میں نکلتے رہتے ہیں ایک سلسلہ کی مدت عموماً چار یا پانچ روز ہوتی ہے۔
شکم ابدلے کم و بیش تناہوار متا دبلنے سے داسنے کو لہ میں درد کرتا اور ریلج و رقیق برازی کی گرگرنائی دیتی ہے۔
جو تاحہ کو بھی صاف طور پر محسوس ہو جاتی ہے دوسرے ہفتہ میں نفخ درد اور غرغراہٹ زیادہ ہو جاتے ہیں اہمال
پہلے ہفتہ میں شروع ہو کر آخر تک کم و بیش جاری رہتے ہیں براز رقیق خفیف زرد رنگ کا اور بدبودار ہوتا اور وال کو بانی ہر
لٹا جلتا نظر آتا ہے مقدار میں زیادہ او بار بار خارج ہوتا ہے۔

خفیف تر کھانی عموماً شروع سے ساتھ ہوتی ہے طحان پہلے ہفتہ میں بڑھ جاتی اور دوسرے ہفتہ میں زیادہ ہوتی ہے
زبان پہلے ہفتہ میں تر وریان میں سفید روئیں اور میل کی تہ سے دھبی ہوئی کناروں کو مسخ اور صاف ہوتی ہے
دوسرے ہفتہ میں یہی حالت ہوتی ہے مگر تیسرے ہفتہ میں خشک ہو کر کھوٹے سیاہ رنگ کی ہو جاتی ہے۔ غلیظ
لیس و اسیا میل سپر چھانی ہوئی ہوتی ہے۔

عموماً بارہویں روز زبان کی علامات شروع ہو جاتی ہیں پہلے تو بیجوا بی جینی اور توحش غالب
ہوتا۔ پھر مرض ہلکے لگتا ہے۔

تیسرے ہفتہ میں مرض بہت نڈبال پڑا رہتا ہے اور اسکی حالت روی ہو جاتی ہے کوٹین لٹا و شوار ہو جاتا پھر
پھیکا سیاہ رنگ کا ہو جاتا شوائی ناقص ہو جاتی اور مرض نیم خشی کجالت میں پڑا رہتا ہے کبھی کبھی بھینچنے کے
ساتھ خفیف بہک شروع ہو جاتی ہے جسم پر تاحہ لگانے سے درد محسوس ہوتا اور اگر مرض کو اچانک ہلایا جا تو چونکا
پڑتا ہے بعض بعض نہیں خود بخود کڑتی اور ادا کی حرکت کمزور اور عرصہ دلی ہو جاتی ہے زبان نکالتے ہوئے کاتی اور
بالتے وقت ہونٹھ لرزتے ہیں نبض تپلی نرم خفیف اور تیز ہو جاتی ہے ۱۳ دفعہ فی منٹ چلتی ہے۔ ایک حمل کے بعد نایفائید
بنا کے دوبارہ سبار بھی دورہ ہو جاتے ہیں کبھی چوتھی پانچویں دفعہ بھی اسکا دورہ دیکھا گیا ہے جن میں نے سرکاری
تمام علامات کم و بیش ظاہر ہوتی ہیں۔ مگر یہ دورہ زیادہ جہالت نہیں ہوتے جیسا کہ ایک بیماری کے بعد خیال کیا جاسکتا
ہے۔ اہمال الدم سات آٹھ فیصدی مریضان میں ہو جاتے ہیں بعض میں خفیف بعض میں شدید اسکی وجہ زخم یا سلف کے

کسی رگ کا کھلنا ہوتا ہے۔

کبھی کبھار غصہ کی وجہ سے انٹری میں سورج ہو کر دفعتاً سخت گرم ہو کر پری ٹائیفائیس سے مرض ہلاک ہو جاتا، پیری ٹائیفائیس کبھی بلا سورج کے بھی ہو جاتا ہے اور عوارضات ٹائیفائیڈ کے ضمن میں کبھی کبھی ظاہر ہو جانے میں مشتملاً البیوچی نو ریا، فیو مونیہ پلیمانی، گینگوین، پتلیورسی، ٹھمر، ایلوسس، ایمبالز، صیڈرو، ٹائیفائیس، تناسخ ٹائیفائیڈ، بخار کے بعد مرض عموماً کمزور اور دہلا رہتا ہے۔ انٹریوں میں زخموں کو بعد غذا بیت جذب کرنے کی طاقت مددوں نہیں آتی کبھی جنون اور بالیخولیا اسکے بعد ہو جاتا ہے۔

اختلافات۔ کبھی اس میں بخار نہیں ہوتا اور مرض بیکر جلتا پھرتا اور اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ اکثر بخار کم رہتا ہے بچوں میں بخار بہت زیادہ کم و بیش ہوتا اور وجہ کم نایاں ہوتے ہیں کبھی اسکے ساتھ سخت درجہ کی صفراوی فتنہ ہوتی اور بخار میں زیادہ کمی ہوتی ہے یہ صورت زیادہ ہلاک ہو کبھی اسکے ساتھ منجنا ٹائیفائیس ہو جاتا ہے کبھی چودہ روز کے بعد ہی بخار فرو ہو کر آرام کی صورت ہو جاتی ہے کبھی بھگوان اسہال کے قبض ساتھ رہتا ہے

اسباب۔ اسکا اصل سبب ایک بیسیس ہے جسکو کلیب صاحب نے دریافت کیا تھا اس واسطے اسکا نام کلیب صاحب کا ٹائیفائیڈ ہے بیسیس ہے اسکی پیدائش کی نسبت دو خیال ہیں ایک یہ کہ مرض ٹائیفائیڈ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے دوسرا یہ کہ حیوانی غلاظت کو تعفن سے از سر نو پیدا ہو سکتا ہے مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ غلاظت کو تعفن کے ساتھ یہ بیسیس بہت کثرت سے بڑھ جاتی ہیں۔ خواہ خود اس تعفن سے پیدا ہو یا کسی دوسرے سے وہاں پہنچا ہو انسانوں میں پانی کے ذریعہ سے یہ مرض پہنچتا ہے۔ جب ٹائیفائیڈ سلائی سے ملا ہو امتنع کچھ ندی یا کوئے یا نالہ میں پہنچ جاتا ہے تو جو لوگ اسکا پانی پیتے ہیں انہیں اثر پذیر اشخاص میں سرایت کر کے مرض ٹائیفائیڈ پیدا کر دیتا ہے بعض لوگوں اور خاندانوں پر بعض کی نسبت اسکا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ طفولیت اور زخمی عمر ضعف، کثرت ترددات و تفکرات، حد درجہ اور ضراب غذا اس کی مدد ہوتے ہیں۔

کیفیت۔ انٹری کے اس حصہ میں جکانام الیم سے پہلے سخت نرم ہو کر پے، یوسس پیچس ہو جاتا ہے ہیں ایک ہفتہ میں پنی یوسس پیچس پھول کر موٹے سخت اور غلیظ ہو جاتے ہیں دوسرے ہفتہ میں یہ غدد و جھٹے اور زخمی ہونے شروع ہوتے ہیں قریب قریب کے نرم کہیں ملکر کم خور و سطح کے مشابہ ہو جاتے ہیں کبھی تو محض میو کس صمدین زخمی ہوتی ہے کبھی یہ زخم گہرے ہو کر لحمی ریشوں کو کھا جاتے ہیں کبھی لحمی تر سے ہی گذر کر قابریس تک بھی زخمی بنا دیتے ہیں اور کبھی اس سے ہی گذر کر سیدوس کوٹ کو کھا جاتے اور انٹری میں سورج کر دیتے ہیں کبھی ثابت غدد و مردار پر کچھ پیچس کے قطر سے علاحدہ ہو جاتے ہیں یہ کیفیت پیچس توں کے بعد دیکھے ہوتی ہے کل میں ہر ایک سی دفعہ دم اور زخم نہیں ہونے کبھی کبھی کسی جگہ میں زخم ہو کر خون جاری ہو جاتا ہے تیسرے ہفتہ میں ورم خورہ غدد و تحلیل ہونے شروع

ہو جاتے ہیں ضمنی طور پر دوسرے اعضاء مثلاً شش جگر اور دماغ میں چمچل خون ہو کر کبھی کبھی ورم ہو جاتا ہے طحال عموماً بڑھ جاتی ہے۔

امراض تشابہہ۔ ٹیوبرکلر ٹیباٹیس۔ پلمانری تھانی سنس گیسٹرو انٹسٹائی لی کٹار ٹھلانی ٹس نیو مویا۔ گلیٹڈرس۔ پانی امپیا اینڈ وکاردائی ٹس۔

تشخیص۔ ٹائیفائڈ فیور کی خاص علامات حسب ذیل ہیں شروع میں زبان کی نوک اور کناروں کی سرخ رہنا نبض تیز اور نرم ہونا پیٹ کا نفع اور ورم ہونا طحال کا بڑھ جانا پیٹ کو دبانے سے دبانے کو لے میں درد ہونا۔ گوشت کے دھوون کے مشابہ کثرت و دست آنا بخار کا روز بروز تدریجاً بڑھتا جانا اور صبح کی حرارت شام کی نسبت کم رہنا ٹیوبرکلر ٹیباٹیس میں بخار مسلسل مگر کم درجہ کا نبض تیز اور سخت و صراح۔ دوران رفتہ قبض شکم عموماً سکتا ہوا عارضی جھینکا پن تپلیاں غیر ساوی۔ آنکھیں آنکھیں نورائی ٹس کی علامات تھلکی سے شدید کھانسی نفث الدم بلغم میں جھپٹیلوں کے ٹکڑے خارج ہونا بخار مسلسل جھپٹیلے کا ٹھوس ہو جانا ندرات کو پیدائش کرتا ہوا ناخار ہو جانے کی علامات گیسٹرو انٹسٹائینل کٹار یعنی معدہ اور انٹسٹائیٹس میں بخار مسلسل رہ سکتا ہے مگر ٹائیفائڈ کو نمونہ کا نہیں ہوتا ندرتوں کی وہ کیفیت ہوتی ہے ٹھلائی ٹس میں بخار خفیف مقامی ورم اور درد زیادہ رفتہ بکتر ہو جاتا کھانسی بکثرت بلغم غلیظ اور جھوسے رنگ کا بخار مسلسل زیادہ تفصیل کے واسطے ان امراض کا بیان علیحدہ علیحدہ دیکھو انجام موت کی اوسط اس مرض میں ۱۵ اور ۲۵ فیصدی کے درمیان شمار کی گئی ہے۔ بچہ بہت کم مرتے ہیں۔ ضعیف حاملہ اور شریوں میں قدر اوموت زیادہ رہتی ہے۔

علاج۔ اس مرض کا علاج ہم چار حصوں میں تقسیم کر کے بیان کرتے ہیں۔

اول حفظ مائیفائد فیور کا خاص زہر جو ایک قسم کی باریک بناات ہیں۔ ہتوں میں بکثرت ہوتا ہے اور اسی غلاظت سے کسی کھانے پینے کی شے میں ملکر دوسرے اشخاص کے اندر سرایت کرتا ہے مثلاً بیمار دار کے ماتھ پر یہ غلاظت لگ جائے یا مریض کے غلیظ کپڑے کسی برتن کے ساتھ چھو جائیں اور بعد میں ہاتھوں اور برتنوں کی صفائی میں کافی احتیاط نہ کیا جاوے یا غلاظت کو ذرات خشک ہو امیں اتنی جو دوسرے کے منہ یا کھانے پینے کی چیز میں پھینچ جائیں یا بنڈالیوں کی غلیظ ہوا کے ساتھ یہ ذرات مگر منہ کے اندر داخل کر جائیں غرض کہ یہ ہائی ذرات خواہ ہاتھوں سے یا ہوا سے یا اشیاء سے اکل و شرب کرنا جب کسی شخص کے منہ میں پہنچ کر معالک پہنچ جاتے ہیں تو ٹائیفائڈ فیور شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے میں یہ ہائی ذرات بہت جلدی ترقی کر لیتے ہیں۔ زمین کے اندر نوٹ تک دنوں زندہ رہ سکتے ہیں پس اس مرض سے بچنے کے لئے مفصلہ ذیل اصول ہیں۔

۱۔ اگر ایسے مریض کے بدن اور کپڑوں کو اتھ لگانے کا اتفاق ہو تو فوراً بعد میں گرم پانی اور صابن کے ساتھ

ہاتھ دھو کر کار بالک یا مرکری لوشن کے ساتھ اینٹی سپٹک کر لینا چاہیئے۔
(۲) غیر طبعیوں میں خاص کر جب کہ اس مرض کا شبہ ہو ہمیشہ پانی اُبال کر اور فلٹر کر کے استعمال کرنا۔
(۳) دودھ ہمیشہ جوش کر کے پینا۔

(۴) مریض کے دستوں کو ہمیشہ چارپانچ حصہ کار بالک (۵ فیصدی) یا مرکری لوشن (ایک فی ہزار) ملکر یا کار بالک
معدرا ان بوجھا چوڑ اور پانی ملا کر چاہا ت سو دور کرانا۔

(۵) مریض کے کپڑے بستر و مال برتن وغیرہ پانی میں اُبال کر کار بالک لوشن ۵ فیصدی یا مرکری لوشن ایک
فی ہزار اینٹی سپٹک کرنے نہنا اور دوسرے میسرے روز دینے نہنا۔

(۶) کمرہ کے دروازوں اور طاقتوں کو کافی وقت تک کھلا رکھنا اور گندہک، لوہان، اجوائن وغیرہ کی دھوئی
ہو اکوائنٹی سپٹک کرنے نہنا۔

(۷) مریض کے کمرہ میں دری، پردہ، قالین، کپڑے، کاغذ کتابیں، برتن وغیرہ کوئی غیر ضروری شے نہ رکھنا۔

(۸) اگر مریض کا علاج اسکے مکان پر کیا جاوے تو اسکے لئے حتی الوسع حلیہ رکھلا ہوا دار اور ساوہ کمرہ تجویز کرنا۔

(۹) مریض کے تھوک، بلغم اور پس خوردہ شے کو برائے کے برابر خوفناک تصور کر کے اسکا اسبقدر احتیاط کرنا جیسا
کہ دستوں کا۔

دوم خاص مریض کے علاج۔ اسکا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ مناسب غذاؤں اور

مقویات مریض کی طاقت کو ترقی دیں تاکہ مرض کا مقابلہ بخوبی کر سکے اور اینٹی سپٹک ادویہ کے ذریعہ امعا اور

خون کو بنائی ذرات کو طر سے محفوظ رکھیں مریض کو ہر قسم کی حرکت سے منع کر کے نرم بستر آرام سوتا رکھیں

غذاؤں میں دودھ، پختی شور، باسیضہ نیم برشت، ساگو دانہ، رقیق غذائیں، اراروٹ، چائے، کچھڑی، آش جو، لالحم

مادر بحسن، فرنی وغیرہ تجویز کر سکتے ہیں۔ ان غذاؤں کے دینے میں یہ مد نظر رکھنا چاہیئے کہ قوت ہاضمہ کی تنگ

دیجائیں چقدر غذا آسانی ہضم نہ ہوگی اس سے ثقالت، نفخ، سہان، عیشت اور متعفن بخار کا اندیشہ ہو کہ چونکہ غیر ہضم

فضلات متعفن ہو کر خون کو خراب کرینگے اور امعائیں انسوزاں سوزش پیدا ہوگی برعکس اسکا اگر غذائیں کمی سے

تو قوت برداشت زائل ہو کر مرض ترقی کرے گا۔ غذا ہضمی و قلیل المقدار و کثیر الغذاء اور سریع الہضم ہونی چاہیئے۔ دودھ

ایک نہایت عمدہ اور لطیف غذا ہے لیکن اکثر بھاری کھانوں میں جبکہ معدہ اور امعاء کی قوت ہاضمہ ضعیف ہو جاتی ہے اسکا

ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے جب یہ خالص ہضم نہ ہو سکے تو ایک پیالہ دودھ میں ۴ گرین سوڈا پانی کا رب ۴ گرین پوٹاش پانی

۴ گرین بیکنشیا اور ۴ گرین نمک ملا دینا چاہیئے۔ سخت بخار کی حالت میں خون کا پانی بہت کم ہو جاتا ہے اسلئے قوت

پانی کافی غذاؤں، پلانا ضروری ہے۔ دودھ کے ساتھ لایم و ایلرڈ آش جو ملا کر دینا بھی اسکو زود ہضم کر دینا شروع

مرض میں شراب کی ضرورت نہیں لیکن جیب سخت ثقالت اور ضعف نامحسوس ہو کر نبض رقیق ضعیف ست اور

نرم ہو جاوے زبان پشنگی ملے اور سوراخ چھانے اس حالت میں قوت کو لئے شراب یا ضروری ہو جاتا ہے۔
ٹھیکانہ دیکھنا خاص علاج امعا و خول کو اینٹی سپٹک کھانا ہے اس مطلب کو اسے پیشکار اینٹی سپٹک اور

میں سے جو باہر و متعال کر سکتے ہیں لیکن ہم ذیل میں چند دوسری طرف جو ہامی سے مل علی دھیر قابل اعتبار میں خاص توجہ دلا کر لکھیں دوسری ادویہ کا نام تھکڑا صبح کو نیلے انشا اللہ تعالیٰ راہ کلورین اور کونین کچھ اسکے بنانے کی ترکیب یہ کہ ایک ۱۲ اونس کی بوتل لیکر اس میں ۳۰ گرن کلورین ڈال پوناٹ ڈالو اور اسپر ۲ پونڈ سیرنگ ہانڈ روکلورک ایسڈ ڈالکر فوراً مضبوط ڈال لگا دو وہ اب کلورین گار پیدا ہو کر بوتل سبز رنگ کی ہوئے بھر جائیگی تب تھوڑا تھوڑا پانی اس بوتل میں ڈالکر بوتل کا منہ بند کر کے ہلاتے جاؤ تاکہ کلورین گاس فرنی میں حل ہو جائے۔ یک دفعہ زیادہ پانی ڈالنے میں یہ نقصان ہے کہ تمام کلورین گاس خارج ہو جائیگی۔ آخر کار جب بوتل پانی سے بھر جائے تو اس میں ۴۰ گرن میں سے ۳۰ گرن تک کونین ڈالکر حل کر لو۔

یہ ایک نہایت عمدہ اینٹی سپٹک کچھ طیارہ ہو گیا ہے۔ اسکو ایک انس خوراک میں چار پانچ دفعہ روزانہ بلا سکتے ہیں۔ اس سے ہاضمہ کو تقویت ملے گی پر صفائی بخار میں کئی عام طاقت اور صحت میں ترقی اور برائے کی برباد دفع ہو جاتی ہے تھوڑے ہی عرصہ میں مریض رو بہ صحت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کونین زیادہ مقدار میں یکساں فائدہ کے بہت سے نقصانات کرتی ہے خشک کونین کا ہضم ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اس مرکب میں کونین ایک مناسب مقدار اور بہتیت میں ہو۔

(۴) کیلول سیکور شروع مرض میں اسکا دینا نہایت مفید ہے کیونکہ اس سے امعاء فوری اینٹی سپٹک ہو جاتی ہیں لیکن ٹیٹا ایسہال میں صرف سی میں نہیں بلکہ ہر ایک سہل کے دینے میں یہ اندیشہ ہے کہ کسی ختم کی جگہ پراسٹری پھٹ جائے جس کا نتیجہ ناکامی ہو سکتا ہے بہت تھوڑی مقدار میں اس سے کافی اینٹی سپٹک فائیت حاصل نہیں ہو سکتا

(۵) سلفو رس ایسڈ ۲ پونڈ سے ۳ پونڈ تک فی خوراک چار چار گھنٹہ بعد۔

(۶) سلفو سیلی سلاس ایک عمدہ اینٹی سپٹک اور نافع اسہال ہو سکتا ہے جس کا دھڑکیاں متعال کے ساتھ ملا کر دیکھی ہو (۷) تھائی مال۔ کاسا الیک ایسڈ کی نسبت کم ضرر کنندہ ہے لیکن اینٹی سپٹک فائدہ میں اس سے چار چار دفعہ روزانہ اور چھ گھنٹہ پانی میں حل نہیں ہوتا اسلئے اس کا بہتر بخوبی اپنا اینٹی سپٹک اثر کرتا ہے۔

(۸) سلفو کاربوریٹ آف زنگ خراب ہوا اور فائیک اور خراش سے مبرا ہے۔ دین کرین کی گولیاں بنا کر چھ پنا گولی روزانہ کھلا سکتے ہیں۔

(۹) ڈیپٹائین۔ اسکی بجانب اڑ کر زخموں کو بخوبی اینٹی سپٹک کرتی رہتی ہے۔

(۱۰) پورک ایسڈ یہ ایک سہل الوصول ستی اور عمدہ اینٹی سپٹک ہے۔

(۱۱) آیوڈو فارم۔ آیوڈین۔ کاربانک ایسڈ کے زوٹ۔ ہائیپو سلفائٹس سیلی سلک ایسڈ سیلال۔ آیوڈین۔ رسایین ٹینین۔ سلفائٹ آف کاربن۔ کلور۔ اجوا بن پیرنٹ۔ روغن پودینہ۔ روغن لونگ۔ روغن اجوا

انہیں سے کوئی شے حسب موقعہ استعمال کر سکتے ہیں۔

سوم غوار ضات متعلق کا علاج (۱)۔ جیت تک بخار ۱۳۰ درجہ تک نہ

تب تک اینٹی پائیرین اینٹی فیمبرین شین وغیرہ مصنفہ ورن اوویہ ہرگز نہ دینی چاہئیں کیونکہ بخار کی اصل جو مستضعف مادہ کا خون میں جذب ہو جانا ہے اس لیے معمولی اینٹی سپٹیکل دویہ ہی اس کو کم کھتی ہیں اور اینٹی بائیوٹک دویہ کا اثر محض عارضی ہوتا ہے لیکن جب ۱۰۳ یا ۱۰۴ درجہ سے بخار زیادہ ہے اس وقت بہت جلدی اس کا کم کرنا ضروری امر ہے اس لیے اس حالت میں اینٹی پائیرینک دویہ یا وارم پینج یا کوڈین پینج وغیرہ سے حرارت کم کرنا چاہیے ۱۰۳ درجہ سے کم بخار میں کلورین اور کوئین کسچر بلانا یا کوئین شین ہمزون اگرین خوراک میں فی کھنڈہ دینا کافی ہیں۔

(۴) اہمال مرض کو ہر قسم کی حرکت سے منع کرنا۔ آرام سے نرم بستر پر ٹٹے رکھنا۔ غذائیں سریع البضم و لطیف کھلانا شروع کرنا۔ اس کا اکیلوٹل کے ساتھ صاف اور اینٹی سیپٹک کرنا بعد ازاں بورکائیڈ یا کلورین و کونین کبچر کے ساتھ برابر اینٹی سیپٹک رکھنا۔ غذاؤں میں برابر یہ احتیاط رکھنا کہ امعا میں متعفن ہو کر خراش اور نفخ پیدا کریں۔ پس یہی تدابیر اندواہمال کے لئے کافی ہیں لیکن اگر باوجود ان تمام تدابیر کے اسہال زیادہ ہوتے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ ٹائیفائڈ بنانات کا زہر بڑے زور کے ساتھ امعا میں سوزش اور قرح پیدا کر رہا ہو پس ایسی حالت میں افیون ٹینک ایڈبیسٹہ سیلی سلاس نہایت عمدہ ادویہ ہیں۔ ہر ایک دست کے بعد مفصلہ ذیل نسخہ کے حقنہ کرنا نہایت مفید ہے۔

دو دوس پاؤں گرہ کرین۔ ٹینک ایڈ۔ اگرین۔ گھمبولیج ایک اونس نیم گرم پانی ۲ اونس۔ ایک آٹھ دس گھنٹے کی نلکے اندر ہنسا کر اُسکے راستہ سجکارسے کرنی چاہیے۔

اگر سخت فحش اور تشددی ہوا تو حکم پر پڑنٹھائیں گا سینک کروا مفید ہے۔

اور سختی اور شہید بنی ہو جو اسلام پر ایمان لائے گا سب تک ازراہ عقیدہ ہے۔
 ۱۲۳) اسہال الامراض کو کلی آرام دینا حکم پر خدا العین کا چپکا کر نرم باند بننا ٹینک ایڈ اور ڈوورسٹ باؤڈر کے حقہ
 اور ساتھ ہی ٹینک ایڈ اگر ٹینکچر اوچھ ۲۰ بونڈ ایڈ ملیفونک ٹو ایلیموٹ ۳۰ بونڈ اگولسے من ایک اونس ایسی ایک
 خوراک تین تین گھنٹہ بعد پلانایا کر دینا من ۳۰ بونڈ کی خوراک میں پلاتے رہنا کافی ہے۔

اور علامات پیری ٹوٹائش ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ایسی حالت میں افیون زیادہ مقدار میں دینی چاہیئے، ہر قسم کی حرکت و قطعاً منع کرنا اور خام غذا میں سولے خفیف مقدار پانی کے بند کر دینا ضروری ہے جب علامات مندرجہ شروع ہوں تب بھی ان امور کی پابندی کرائیں اور اگر پاخانہ کی حاجت ہو تو صابون اور نیلگریم پانی سے حنہ کریں تاکہ براز نرم اور رفیق ہو کر رہائی خارج ہو جائے اور امعاء کو کچھ زور نہ کرنا پڑے۔

(۵) تنفس قلب اسکے لیے شرکینا اور کیشین سب سے بہتر اور دیر میں۔

۱۷) داغی کالیف مثلاً بخوبی زبان، بے چینی، صداع وغیرہ کا علاج عام اصول کے مطابق کرنا چاہیئے۔
جہاں تک ممکن ہو اٹکا علاج مقامی طور پر جلدی پچکاریوں لیٹ الٹ وغیرہ سے کرنا بہتر ہے۔

چھکرم ایام صحت کی حفاظت۔ اس زمانہ میں اعلیٰ درجہ کا احتیاط چاہیئے کہ مریض کوئی سخت و خشک غذا ہرگز نہ کھائے اور چلنے پھرنے کا ہرگز ارادہ نہ کرے جب بخار نہیں ہوتا تو مریض سمجھتا ہے کہ اب زیادہ پیاز اور بڑے بےسنے کی ضرورت نہیں لیکن انکو معلوم نہیں کہ معاواہ اندر زخموں نے بہت سی مقامات ایسے پٹے اور زخموں کر دیئے ہیں کہ ذرا بھی حرکت یا سخت غذا کی حراش سے خشک ہو کر مریض کی جان تلف کر سکتے ہیں پس اسکو رفیقوں اور عزیزوں کو صاف طور پر اس اندیشہ سے آگاہ کر دینا چاہیئے بخار فرو ہونے سے کم سے کم دو ہفتہ تک برابر تمام احتیاط ضروری ہیں۔

ٹائیفیس فیور Typhus Fever۔ یہ ایک شدید بخار ہے جو تین ہفتہ کے قریب ہوتا اور جس میں داغی، ضعف، بشت ہوتا اور سیاہ اجڑات نمودار ہوتے ہیں شروع میں عموماً لالہ کا بخار ہو کر دروسر ہو جاتا اور غلیان و قے غالب ہوتی ہیں۔ داغ پریشان رہتا اور خیال ہر ایک بات پر قائم کھنا محال ہو جاتا ہے۔ تمام حواس مست پڑ جاتے اور چہرہ سی پختی اور نادانی برپا ہوتی ہے۔ جلد گرم رہتی، نبض تیز اور کمزور ہوتی ہے۔ تمام عضلات مست اور ڈھیل پڑ جاتے ہیں۔

قبض بہت تازان پھیل کی سفید یا بھوری تہہ جاتی ہے پہلے ہفتہ میں یہ تمام علامات برپا ہوتی جاتی اور دوسرے ہفتہ میں ان تمام کی شدت انتہا درجہ کو پہنچ جاتی ہے تیسرے ہفتہ میں تخفیف شروع ہو کر رفتہ رفتہ کلی آرام ہو جاتا ہے عموماً چودہویں دن کے بعد تمام علامات میں تخفیف نمایاں ہو جاتی ہے۔

ٹائیفیس کے اجڑات خاص قسم کے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گول بھوسے سیاہی یا لیل بھوسے صاف طور پر نمایاں ہوتے ہیں جو جلد سے اٹھے ہوئے نہیں ہونے کی شکل اور سینہ پر ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی کبھی اطراف پر بھی بکھارے ہوئے ہوتے ہیں۔ چودہویں روز نمودار ہو کر چودہویں دن تک برابر رہتے ہیں تیسرے ہفتہ میں اور علامات کی تخفیف کو ساتھ و فتنہ آغا ہو جاتے ہیں سخت حالتوں میں بڑے بڑے دھبے بھی نمودار ہوتے اور جلد کے نیچے خون جاسی ہو جاتا ہے اسکی ضمن میں اکثر پھیپھڑوں کا اجتماع خون ہو کر نیو مونیہ بھی ہو جاتا ہے کیونکہ مریض شدت ضعف کی وجہ سے چت لیٹا رہتا اور کمر میں بدلنا اٹکے واسطے مشکل کام ہو جاتا ہے۔

اسیبا یہ مرض سرد اور معتدل ملکوں میں زیادہ ہوتا ہے ایک فحہ ہو کر دوبارہ نہیں ہوتا مگر شاذ و نادر طور پر ایک سال تک ایک مریض سے دوسرے مریض کو ہونے کے ذریعے پہنچتا ہے زیادہ ہو اس میں ملنے سے بے اثر ہو جاتا ہے اگر مریض کو تنگ کمرہ میں رکھا جائے جو کافی طور پر ہوا دار نہ ہو تو اس کمرہ کے اندر رہنے والے اور شخص بھی مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن جیسا کہ اوپر لکھا دوسرے ملکوں میں پہنچتی ہے تو اسکا ہر ترقی ہو کر بے اثر پڑ جاتا ہے گویا کہ یہ مرض عبور کر کے ایک مکان سے دوسرے مکان تک نہیں پہنچ سکتا اسی واسطے یہ مرض کھلے دیہات میں شاذ و نادر اور تنگ شہروں میں کثرت سے ہوتا ہے۔

کیفیت سے بھر خون ترقی اور سیاہ ہو جاتا قلب کو جو فون میں خون کے نرم مضغہ دیکھو گئے ہیں۔ دماغ میں شلج خون ہو جائے گردن کے سبب تھیک گین گلیا ایک دانہ دار مادہ پڑ کر بڑھ جاتے ہیں۔ قلب کی دلیاریں نرم اور ڈھیلی تر بن جاتی ہیں۔

تشخیص ٹائیفائڈ بخار اور امراض دماغی سے یہی اشتباہ ہو سکتا ہے مگر کیفیت انحراف بخار قبض ضعف عضلات اور درد پر نظر کرنے سے آسانی تشخیص ہو جاتی ہے۔

انجام۔ اوسط موت ۱۰ فیصدی سے ۲۰ فیصدی تک ہر مریض جو قدر زیادہ عمر کا ہو اسی قدر تیس یا دو ہوتی ہیں علاج جو کچھ ٹائیفائڈ فور کے علاج میں بیان کیا گیا اسی کے مطابق ٹائیفس فور کا علاج ہے فرق صرف اس قدر ہے کہ اس مرض میں کھلی ہوئی زیادہ ضرورت ہے ایسے مریض کو بالائخانہ میں رکھنا چاہئے۔ دوسرے بیمار دار و نکو ہرگز ہرگز اس کمرہ میں نہ رہے ہیں کیونکہ یہ مرض مہول کے ذریعہ پھیلتا ہے اور کھلی ہوا میں پھیل کر بے اثر ہو جاتا ہے برعکس ٹائیفائڈ فور کے جو خوردنی و نوشیدنی اشیاء کو ساتھ پھیلتا ہے اور بند درجہ ہوا نہایت شاذ و نادر اس مرض میں شروع سے ضعف زیادہ ہوتا ہے اسوجہ سے شراب کی ابتداء سے ہی زیادہ ضرورت پڑتی ہے سر اور دماغ کے متعلق شکایات مثل صداع بے خوابی بے چینی وغیرہ اس میں زیادہ لاحق ہوتی ہیں۔ ان علامات کا علاج سر پر برف لگانا۔ کلورل ہائیڈریٹ و پوٹاشیم برومائڈ وغیرہ دینا۔ قفلے گردن پر رانی لگانا۔ یا چھالنا یا لگانا یا کھینچنا ہے۔

غذا کی نسبت یہ ضروری امر نہیں کہ تین اور سیال دیا جائے اور سہلات کا بھی ان میں چنداں اندیشہ نہیں کیونکہ ٹائیفائڈ کی طرح اس مرض میں امعاء کے اندر سوزش ہو کر رخم نہیں پڑنے۔

ترش چیزیں مثلاً شربت لیموں و زکترہ اس میں خاص فائدہ کرتی ہیں۔

عموماً دو ہفتہ کے بعد بخار خود بخود فرو ہو کر مریض رو بہ صحت ہو جاتا ہے ایسے طبیب کی دانائی اسی میں ہے کہ جن تدابیر سے ان جو دوا یا ام کو بجا فیت اختتام تک پہنچا دیں جو علامات شدید مثلاً سخت بخار قبض۔ صداع۔ ہڈیاں بخوبی ضعف قلب وغیرہ پیدا ہوں انکا دفعہ کرتا ہے اور ضعیف علامات کی چنداں پروا نہ کرے اور ایسی ہیپک تدابیر پر استقلال قائم ہے۔

ٹٹرا آیوڈول Tetra iodol یہ آیوڈول کا دوسرا نام ہے پر اسکا بیان دیکھو۔

ٹٹرا ہائیڈرو پارامیٹھیل آکسائیڈ ٹین Tetrahydroparamethyl oxykinoline

بیسلین کا دوسرا نام ہے اسکا بیان دیکھو۔

Trachomatous Ophthalmia

ٹراکھومائٹس

کرنیورل لنز کا بیان دیکھو۔

ٹرانس Trance یہ ایک قسم کی گہری نیند ہے جس سے مریض بیدار نہیں کیا جاسکتا اور

جو کسی دماغی نقصان یا زہر کے بغیر پیدا ہوتی ہے چونکہ یہی حالت مسرزم سے بھی پیدا کیجا سکتی ہے اس لئے اسکو قدرتی
 چھینا ٹرم بھی کہتے ہیں۔ قوت ارادہ اور عضلات کو مست ہونے کی وجہ سے اسکا نام لٹھا جی بھی ہے۔ تیسرا نام اسکا مرض
 خواب بھی ہے۔ یہ حالت دفعتاً طاری ہو کر مریض کو بھی گھنٹوں کہی دنوں کہی ہفتوں تک خواب کی حالت میں پڑا رہتا ہے
 ایک سال تک بھی یہ حالت دیکھی گئی ہے۔ دیر پا حالتوں میں مریض وقفہ وقفہ سے ہوش میں آکر اپنے ارادہ سے کھاپی لیتا اور
 پھر ہوش پڑ جاتا ہے ابتدا میں میسر یا مرمی کے مشابہ تشبیح بھی ہو جاتے ہیں اور کہی گرمی یا سردی کا حس یا گولہ اطراف
 سے سر کی طرف جانا ہوا معلوم ہوتا ہے چہرہ بیلا چھیکا رہتا عضلات ٹھیلے ہو کر اطراف نرم پڑ جاتے ہیں کہی کہی
 میں یا ابتدا میں سختی عضلات بھی ہو جاتی ہے اور تشبیحی حرکات بھی ظاہر ہوتی ہیں بلکہ عموماً بند ذلیلہ چڑے ہوئے
 اور پھرے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ فیلیکس حرکات پڑ جاتی ہیں کہ سواری سینے یا انشیں کو دبانے یا قریہ کو چھونے
 سے کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی مگر کہی کہی کسی قدر حرکات ہو بھی جاتی ہیں عموماً ہوش بالکل نہیں رہتا کہی کہی ارادی طاق
 ہی زایل ہوتی ہے سانس بول و برازیلینہ اور حیض معمولی طور پر آتے رہتے ہیں مگر سخت حالتوں میں موت کو مشابہات
 ہو جاتی ہے جسکو کہتے ہیں۔ اکثر میں اسکو دورہ ہوتے رہتے ہیں۔ انجام عموماً اچھا ہوتا ہے۔ عام ضعف اور حالت
 نیم مردگی کی وجہ سے بہت کم غذا پر مریض زندہ رہ جاتا ہے۔ رکتہ اور موت میں تسخیر اسطرح ہوسکتی ہے۔ (۱) نقص کا
 پیدا نہ ہونا موت کے بعد ایک دو یوم میں ہی نقص شروع ہو جاتا ہے مگر اس میں کہی نہیں ہوتا (۲) بجلی لگانے سے
 عضلات کی حرکت معلوم ہوسکتی ہے (۳) افتحیما اسکوپ سے فنڈس کی حالت غیر متغیر نظر آسکتی ہے۔

علاج۔ اسکا علاج محض اسقدر ہے کہ زمانہ خواب میں ناک کو رستہ ربڑ کی ٹانگی معدہ تک پہنچا کر غذا اور پانی برابر پہنچا
 رہیں۔ اگر کسی وقت نیند میں کمی معلوم ہو تو مریض کو تیز سواریں۔ امونیا اور الائیٹریٹ وغیرہ لگھا دیں جس کی مختلف
 حصوں پرانی کا پشتر لگا دیں۔ اور تیز گیلوے تک بجلی پاس کریں۔ گہری نیند میں بھی بعض اوقات ان تمام برسی پیدا
 ہو جاتی ہے۔ سرکنیا کی جلدی پچکاری کرنا حاصل اعصاب کو تیز کرنا اور اسی بنا پر ٹرانس میں اسکی بابت بعض ڈاکٹروں
 کی رائے ہے۔

اگر مریض میسر یا میں ٹرانس ظاہر ہو تو ہینگ۔ سنبل۔ مشک۔ و دیگرین مفید ہو سکتے ہیں۔

ٹرائی برومائڈ آف آل Tribromide of ALI آل ٹرائی برومائڈ کا بیان دیکھو
 ٹرائی بروموفینال Tribromophenol اینٹی سپٹک فائدہ کے لیے استعمال ہے

خ۔ اگرین فی اوٹس ویسلین میں ملا کر بطور مرہم استعمال کر سکتے ہیں۔
 ٹرائی فوئمیری سینس۔ دیکھو بیان کلورائیڈ کا۔

ٹرائی کلورائیڈ آف آیوڈین Trichloride of Iodine آیوڈم ٹرائی کلورائیڈ کا بیان دیکھو

ٹرائی کلورائیڈ آف ایسٹ Trichloracetie Acid ایسٹم ٹرائی کلورائیڈ کا بیان دیکھو

ٹرائی کلوروفینال Trichlorophenol ٹرائی کلوروفینال

ٹرانی کلوروفینال آف میگنیشیم Trichlorophenol of Magnesium

سکہ فیصدی کے حساب سے پانی میں ملا کر روزانہ ان فیصلہ میں بطور اینٹی سپٹک استعمال کرتے ہیں۔

ٹرانی کلوروفینک ایسڈ Trichlorophenic Acid

ٹرانی میتھل امین Trimethylamin اسکو دوسرے نام پر اہل ایمین اور سیکیمن میں۔ روس

اور فرانس میں یہ جوہر صاف میں بکتر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے مقاصد و تجارت کو بہت جلدی کم کر دیتا ہے۔

خمر ٹرانی میتھل امین ہائیڈروکلورک ۳ گرین سے ۵ گرین تک۔ ٹرانی میتھل امین ۴۰ بوند سے ۸۰ بوند تک۔

ٹرانی نائٹریٹ آف گلیسرل Trimetrite of Glycerol

ٹرانی نائٹریٹ آف گلیسرل

Trinitrine

ٹرانی نائٹریٹ

ٹرانی نائٹریٹ
کلونیٹ نائٹریٹ

ٹرانی مین کا بیان دیکھو۔

Trypsine

ٹریپسین

اطیم شیری تجنی کا بیان دیکھو۔

Turpentine

ٹرینٹین

urpene

خاص وافعال میں ٹریپسین کے

Turpene hydrate

ٹرینٹین ہائیڈریٹ

قوی تاثیر اور سہل ہضم ہے۔ اس میں دیوا و ربذ مغزی بھی روغن تارپین کی نسبت کم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اسکا پینا بھی آسان نہ ہو یہ نہایت اعلیٰ درجہ کی خنج بلغم ہے ۳ گرین سے ۵ گرین کی خوراک میں بلغم کو تھیرا مقدار اور رقیق کر کے خارج کرتی ہے۔ کیتھارادر بھی کرتی ہے۔ برائیس ڈیزیس اسکے استعمال سے بول الدم اور تھیری گلوبی نو ریا ہو جاتا ہے۔ زیادہ مقدار میں بلغم کو کم کرتی اور برانکوریامیں مفید ثابت ہوتی ہے۔ خمر ۵ سے ۵۰ گرین تک۔

ٹرینی نال Turpinal اپنے خواص اور استعمال میں ٹریپسین کے مشابہ ہے۔

خمر ۲۰ گرین روغن زیتون میں ملا کر۔

ٹرسمس Trismus لاک جلع۔ دند ان پڑ جانا منہ بند ہو جانا۔ ٹے ٹس کا بیان دیکھو۔

ٹریشیری ایل الکمال Ter tiary Amyl Alcohol

امالی لین ہائیڈریٹ کا بیان دیکھو۔

Turkey Pee

ٹرکی پی

کاری ڈیس فارموزا کا بیان دیکھو۔

Turkey Corn

ٹرکی کورن

ٹریمپٹ پلانٹ Trumpet Plant

ساراسینا فلا و لتقا بضع۔ ناخ اسہال نو

و مزہ درد معدہ۔ فنج تخمہ و صدا ہے۔ خمر ٹیکر ساراسینا فلا و ۱۵ بوند سے ۲۰ بوند تک۔

ٹریمپٹ ویڈ Trumpet Weed

ایوپے ٹوریم پریوریٹ۔ گریول ویڈ۔ کون آف ٹو

درمحرک۔ قابض و مقوی ہے۔ ناخ عسر البول۔ جس البول۔ استقار۔ ریگ کردہ و متقاد۔ نفرس۔ بوج۔ مفاصل۔ بول الدم و سیلان الرحم ہے۔ جس البول۔ تشنجی میں خاص کر مفید ہے۔ خمر سفوفنج ایک ڈرام سے ۴ ڈرام

تک۔ فلوئڈ اکثر لکٹ ۳۰ بوند سے ۶۰ بوند تک سالو اکثر لکٹ ۳ گرن ہو۔ اگر کن تک۔ ایو پر پورین اگر کن ہو اگر کن تک۔
ٹرنیرا افرودیسیا *Turnera Aphrodisiaca* یہ ڈیماناکا دوسرا نام ہے۔ پس اسکا بیان دیکھو۔

ٹرمک انڈین *Turmeric indian* یہ ہانڈر اسٹن کیناؤنس کا دوسرا نام ہے یہ اسکا بیان دیکھو۔
ٹرمک روٹ *Turmericio Poot*
ٹرننگ *Turning* ورشن۔ انا پلٹا کر سو کو نکالنا۔ دیکھو بیان ورشن کا۔

ٹروپین بنزال *Tropine benzol* یہ کوکین کے طبع جس مقام پر لگادی جائے بے حسی پیدا کرتی ہے۔ اور شروعات میں کسی قسم کی خراش نہیں کرتی۔

ٹری آف میون *Tree of Heaven* الینتھس گلفینڈ و نو زاکا بیان دیکھو۔
ٹری کامیس *Trichiasis* بالکوں کے امراض کا بیان دیکھو۔
ٹریکیا ٹومی *Trachobome* زخرو کا کھولنا اس عمل کی مفصلہ ذیل حالتوں میں ضرور پڑتی ہے
اقل۔ اطفال کے سیرے اس لیرنجائیتس میں۔

دوم۔ زخرو کی رسولیوں میں جبکہ رسولی کی وجہ سے دم لینا محال ہو جائے۔
سوم۔ جبکہ زخرو میں کوئی غیر جنس شے داخل ہو کر جنس جائے اور فارسیس کی بکری میں آسکی۔
چھام۔ جبکہ زخرو میں کوئی غیر جنس شے جاگھے۔

پنجم۔ جب کہ بچوں کے حلق میں کوئی غیر جنس شے چھنکر دم بند کرے۔
ششم۔ جبکہ چہرے کے قریب کوئی ایسا اوپر تین کرنا جو میں زیادہ خون خارج ہو کر اسے زخرو میں داخل ہو جائے۔
یہ عمل لیرنگا ٹومی کی نسبت زیادہ مشکل اور خطرناک ہے تو اس میں زیادہ خون خارج ہونا اندیشہ ہے۔ دوم زخرو کو تھایا
غودو سے صاف کرنا اور پھر قطع کر کے کھولنا دشوار ہوتا ہے سوم زخرو کے اندر نگی کا داخل کرنا مشکل ہوتا ہے
ٹریکیا ٹومی کا طریق عمل حسب ذیل ہے۔

مریض کو ایسے طریق سے چت لائیں کہ گردن خوب تہی ہے بعد ازاں کاسٹی لیج کو یقینی طور پر معلوم کر کے جلد میں
 سبکی خط پر ایک ٹوپی شگاف جسا طول ۱/۲ انچ سے دو انچ تک ہو دیوں۔ تھایا زغودو کو چاقو کے دستہ کو
 ساتھ کر جکر پنجے کی طرف کھینچیں تاکہ زخرو کو تین چار چھ صاف نظر آجائیں تب کہ یکایک کاسٹی لیج میں تیس
 ہک چھن کر اسکو اوپر کی طرف کھینچا کر ان چھلوں کو قطع کرنا ہو ایسے طور پر دیں کہ چاقو کی دھار کا رخ باہر کی طرف رہے
 زخرو میں شگاف دینے کے بعد فوراً نگی داخل کر دیں۔

اس عمل کے بعد مریض کو روز محفوظ مکان میں رکھیں۔ اس کے کمرہ کی ہوا کو پانی کی جانب سے تر رکھنا بہتر
 نگی کے منہ پر بار یک مائل کی گری لگا دیں تاکہ گرد و غبار اندر داخل نہ ہو سکے۔

Trichinosis **ٹریکینیٹوسس** اس ہیبت ناک مرض کا دراصل کوئی علاج نہیں سوائے اسکے شروع میں نہ کر اگر تیز سہل دہی خاص کر دیا۔ اگرین یا کیلول کیسٹریٹل ایک دوائس۔ اور بعد میں مریض کی طاقت کو قطعی آرام اور عمدہ غذاؤں و دواؤں سے بحال رکھیں تاکہ جسم و مرض کا مقابلہ کر کے انکی زیر دستوں پر غالب آسکی۔

Tragacanth **ٹریگاکنٹھ** کثیرا کوئند۔ دوسرے گوندوں کی طرح مزق ہے لیکن اسکو مضمضہ البوز اور خیل دواؤں کے سنجون میں آمیزش کی غرض سے استعمال کرتے ہیں کسی قدر ضمیم ہو کر غذا کا بھی کام دیتا ہے۔ بحری پشیا پر اسکا خفیف مزق اثر ہوتا ہے۔ ہر قسم کے جریان خون مثلاً قے الدم۔ اسہال الدم بول الدم وغیرہ میں مفید۔ سحر پلوڑکی کنٹھ کو اگرین سے ۶ گریں تک خالص گوند کثیرا ۲ ماشہ سے ۶ ماشہ تک۔

Trinitrina **ٹریٹینرینا** نائٹر وکلیسرین کا بیان دیکھو۔

Tremors **ٹریمرس** لرزہ۔ رعشہ کا پٹنا۔ ہاتھ پاؤں یا چہرہ و لب وغیرہ میں لرزہ ہونا یہ حالت مختلف امراض میں پیدا ہوتی ہے۔ اسوجہ سے مختلف حالتوں میں اسکا علاج بھی مختلف ہے۔ اگر کثرت شراب نوشی کی وجہ سے ہے تو اس میں ہائیوسین ہائڈروبروماس مفید ہے۔

اگر کوریا کی وجہ سے ہے تو زنک فلیسے ناس سلور نائٹریٹ وغیرہ مقوی اعصاب ادویہ سے اسکا علاج کرنا چاہیو۔ مرکوریل یعنی پارہ کی ٹریمرس میں پوٹاسیم آیوڈائیڈ سفیدی ہضیہ ہائیوسین ہائڈروبروماس مفید ہیں۔ لٹی پل سکلے روس کی ٹریمرس میں سلور نائٹریٹ۔ سٹرنیا اور ہائیوسین ہائڈروبروماس مفید ہیں۔

ٹریمرس آف پریلی سس ایچیٹیس کے لئے اس مرض کا بیان دیکھو۔

Transfusion of Blood **ٹرینس فیوژن آف بلڈ** جبکہ کسی سے خون کھینچ کر

Transfusion of Salines **ٹرینس فیوژن آف سلائن** ہر حرکت قلب نہایت

Transfusion of Milk **ٹرینس فیوژن آف ملک** ضعیف اور بھینس ہو جائیں

اور غشی کی علامات ظاہر ہوں تو دوسرے انسان کا خون یا ملک پانی یا دودھ مریض کی رگوں میں پہنچانے سے حرکات قلب نبض بحال ہو جایا کرتی ہیں اور خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اس عمل کا اصطلاحی نام ٹرینس فیوژن ہے۔ اکثر سخت حالتوں میں اس عمل سے جان بچ رہتی ہے پیدائش کے بعد بعض اوقات خون بھی خارج ہو کر غشی ہو جاتی ہے۔ ضربات سے بھی کبھی استفادہ خون کھجنا تاہم کہ نوبت ہلاکت پہنچ جاتی ہے۔ نکسیر و بواسیر سے بھی گاہے غشی ہو جاتی ہے۔ ایسی حالتوں میں ٹرینس فیوژن کا عمل جان بخش نہایت ہوا ہے۔

اسکی مختلف اقسام ذیل میں مختصراً درج کی جاتی ہیں۔


اول۔ ٹرینس فیوژن آف بلڈ یعنی مریض کی وریدوں میں دوسرے انسان کا خون پہنچا دینا

اسکے تین طرق ہیں۔

(۱) دوسرے انسان کی بازو سے مریض کی بازو میں خون پہنچانا۔ یہ عمل نگہب صاحب کی بچکاری کے

ذریعہ سے باہمی ہو سکتا ہے جسکی شکل نقشہ ذیل میں دکھائی گئی ہے۔

بکس صاحب کی پکاری



اسکے دونوں سروں پر چاندی کے کینولا ایک۔ ایک طرف کا کینولا دوسرے انسان کی بازو کی ورید میں داخل کیا جاتا ہے تاکہ اس راستہ سے خون پکاری کے اندر آتا ہے اور دوسری طرف کا کینولا مریض کی بازو کی ورید میں داخل کیا جاتا ہے تاکہ اس راستہ سے خون مریض کی ورید میں پہنچتا ہے مگر عمل شروع کرنے سے پیشتر تمام پکاری کو شیر گرم پانی سے پھرتے ہیں تاکہ مریض کے خون میں ہوا داخل نہ ہو سکے یہ ایک بڑا احتیاطی عمل ہے مریض کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ دوسرا بڑا احتیاط کینولا اور تمام پکاری کا کامل طور پر الیونک ہونا ہے اس طریق میں یہ ایک بڑا اندیشہ ہے کہ خون پکاری کے اندر سے گزرے تاکہ وہاں کیتھنر نہ ہو جائے۔ اور فائبرین کے ریزہ مریض کے خون میں داخل ہو کر الیونک لائی نہ جائیں۔

دب، ویٹا، سیر، نیٹھ خون کی پکاری کرنا پہلے آٹھ دس اوٹس کو قریب دوسرے انسان کا خون ایک شیشہ کے برتن میں نکال کر ایک شیشہ کی دھٹی سے خوب ہلاتے ہیں تاکہ تمام ریشہ بوجاں ہیں پھر اسکو ملینٹ میں سو جھان کر سو دھجہ فارنایٹ پر معمولی پکاری کو ذریعہ مریض کی ورید میں پہنچاتے ہیں۔ اس طریق سے تمام فائبرین صاف ہو کر الیونک لائی بننے کا اندیشہ رفع ہو جاتا ہے مگر خون کے ذرات یعنی کارپلز بدستور قائم رہتے ہیں۔

(ج) دوسرا انسان کا خون لیکر اس میں کھاری ادویہ مثلاً سوڈی فاسفاس وغیرہ ملا دیں تاکہ انجانہ نہ ہو تو پاؤں اور تباہی پکاری مریض کی ورید میں کرویں۔ اس عمل میں معمول کی نسبت زیادہ مقدار میں پکاری کرنی پڑے گی۔ دوسرے ٹریس فیوزن آف سیلا تیر یعنی مریض کی ورید میں نمک پانی کی پکاری کرنا اس طریق میں ۲۰ اوٹس بکرم پانی میں ایک ڈرام نمک یعنی سوڈیم کلورائیڈ حل کر کے کسی ورید کے اندر بڑی پکاری پہنچایا جاتا ہے۔ دوسری

گزن تک فی اولس پانی میں حل کر کے جلدی پچکاری کرنا بھی اکثر بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ دریدی پچکاریوں میں دخل ہوا اور کثیف اجزائے نہایت احتیاط لازم ہے۔

خون اور دودھ کی پچکاریوں کی نسبت تک پانی و رید کے اندر پہنچانا زیادہ مفید اور بے ضرر بیان کیا گیا ہے۔

سوہر رٹنس فیوزن آف ملک یعنی مریض کی و رید و غصہ دودھ کی پچکاری کرنا چار اولس تازہ تازہ بکری یا گاو کا دودھ لیکر اس میں چار پانچ گرین کاربونیٹ آف سوڈا ملا دیں تاکہ کھار پن زیادہ ہو جائے اور جسم کی حرارت پرورے کے اندر پچکاری کریں چار اولس سے زیادہ دودھ کی پچکاری ہرگز نہ کرنی چاہیے ہر ساقسام کی مریض میں مفصلہ ذیل احتیاط نہایت ضروری ہیں۔

۱) کہ نہایت آہستگی کے ساتھ پچکاری کی جائے۔

۲) یہ کہ اگر کسی قسم کی دکشی یا بے چینی مریض کو معلوم ہو تو فوراً بند کر دیں۔ اسکی دو وجوہات ہوتی ہیں ایک تو زیادہ مقدار میں خون یا دودھ وغیرہ کا پہنچ جانا دوم ہوا کا ورید میں داخل ہو جانا۔

۳) یہ کہ ہوا کا کوئی بلبلہ مریض کے خون میں پہنچنے نہ پائے۔ ایک خفیف و خفیف ہوا کا بلبلہ بھی مریض کو ہلاک کر سکتا ہے پس اسکی جقدر احتیاط کی جائے نگم ہے۔

۴) ہر قسم کی اینٹی سپٹک نہادیر کی کامل طور پر پابندی کرنا۔

۵) اگر کسی حاجی شے کی پچکاری کرنی ہو تو اسکی حرارت جسم کے مطابق رکھنی چاہیے۔

Typhlitis تھایفلائٹس بیری ٹھائٹس کا بیان دیکھو۔

Tic Doloireu تیشل نیورلیجیا۔ درجہ درجہ نیورلیجیا کا بیان دیکھو۔

Tympanitis uteri ٹیمپانیٹس یوٹرائی۔ تھیم۔ رحم کو اندر ہوا بھرجانا۔ یہ کوئی علیحدہ

مرض نہیں بلکہ ایک عارضی تکلیف جو دیگر امراض رحم کو ضمن میں واقعہ ہوجاتی ہو پس دیکھو بیان رحم کو امراض کا۔

Tomato ٹامیٹو۔ لائیکوپرسی کن، لائیکوپٹیسٹم، بگن، ولایتی، عمدہ اینٹی سکاربیٹک و قوی مدہ مہل

اور مصفی خون ہو۔ غذایت بھی بہت رکھتا ہے منجہ عمدہ اور امعا کی میوکس ممبرین کی اصلاح کرتا ہے۔ قروح و مہن و

مدہ و امعا میں مفید ہو۔ خون پر قاطع کم اثر کرتا ہے اور اسلئے بہت سی متعدی امراض مثلاً ٹائیفائیڈ فیور اسہال مہل

پیش سے جسم کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس میں گند بک بکتر ہوتی ہے اور اسی پر اسکی جرمی سائیکل طاقت منحصر ہے۔

خبر قلوئے اکثر ۳۰ یونڈ سے ۶۰ یونڈ تک۔

Tinnitus ٹینائٹس کانوں میں شور بہنکا ٹونیں گنجانے دینا۔ طنین۔

Tolu Balsam ٹولو بالسم۔ السم آف ٹولو کا بیان دیکھو۔

Toruli Cerevisci ٹورولی سیری وی۔ ایک قسم کے باریک حیوانات ہیں۔ جب غذا

و امعا میں پچلے مناسب طور پر ہضم ہونے کے سر نہ لگ جاتی ہے تو وہ قسم کے حیوانات پیدا ہو جاتے ہیں جنکا نام

سارسی و نثری کلائی اور ٹورولی سیری وی ہر پھر ان حیوانات کی وجہ سے دوزخ کے لالہ یعنی ٹوٹے این اور لیو کوئے پیدا ہو کر سخت علامات مثل بخار سر درد۔ نفخ۔ درد امعاء صلیع گھمیر وغیرہ ظاہر کرتے ہیں۔

اکھا علین یہ ہے کہ شروع میں کیلول اور طپ کا جلاب پھر بعد میں مینی سپیک اور مخرج ریح اور ذی استعمال کر کے رہیں مثلاً آئیل میپرنت آئیل آف کوزر آئیل ایو کے پش آئیل ٹرپٹ این راجولن سوئچ۔ زیرہ ہونف۔ لونگ۔ فاسفورک ایسڈ ہائڈروکلورک گندک۔ بائیپو فاسفائٹ آف کیلیم۔ کوئین۔ جینین۔ جیزین وغیرہ۔

ٹونگا۔ Tonga: ایک قسم کا کپاڈوڈا کٹرک جو جوفی ڈو فوروالی ٹنس کی جڑ اور پریا ٹنس کی جڑ اور پریا ٹنس کی چھال سے نکالا جاتا ہے۔ اعصابی درموں کے رفع کرنے میں مخصوص ہے۔ صداع۔ شقیقہ۔ مہج الاذن عرق النساء۔ ٹک ڈولیوریو۔ انٹرکاسٹل نیو نیجیا وغیرہ میں بہت جلد فایہ کرتا ہے لیکن اب اسکی بجائے اینٹی پائیرین فیسین یا کیجیلین اینٹی فیرین کا استعمال نام ہوتا جاتا ہے۔ خمر فلوڈ کٹرک ۲۰ پونڈ سے ۶۰ پونڈ تک خشک کٹرک اگرین سے ۶ گرین تک۔

ٹھوس امریکن۔ دیکھو بیان فرینکن سنس کا۔

ٹی Tee چلے کا بیان دیکھو۔

ٹیبیس ڈارسیلس Tabese Dorsalis یہ لوکو موٹا ایکیسی کا دوسرا نام جو لبرل کا بیان دیکھو۔
ٹیبیس میسنٹرکا۔ Tabese Mesenterica نیشری کے امراض کا بیان دیکھو۔
ٹپ ورم Tape Worm ٹنسٹائل ورمز کا بیان دیکھو۔

ٹی ٹینس Tetanus کزاز۔ اس میں مسلسل ہر حرکت سخت ہو جاتی اور اگر بے ہوئے ہے میں ساتھ ہی مقعد و قعر سے دردناک ایٹھیں ہوتی ہیں پہلو میں کو قفا گردن میں پنچاؤ سختی محسوس ہوتی ہے جوڑ ہتی جاتی اور پھر چھل طرف کھینچاؤ پر جالگتا ہے اسکے بعد جب بے چکا کر جلتے اور گھٹنا محال ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ کل جسم کے عضلات اکڑا سخت اور گرہ دار ہو جاتے ہیں محض ہاضوں زبان اور آنکھ کے عضلات متاثر رہتے ہیں جبکہ اکثر تو پچھل طرف خم کھا کر اکڑا ہوا بچا جاتا ہے اس حالت کو اسٹاٹونس کہتے ہیں کہی کھنچا سیدھا اکڑا ہوا بچا جاتا ہے اس حالت کو آرٹھاٹونس کہتے ہیں کہی گئے کو خم کھا کر اکڑا جاتا ہے اس حالت کو امپر اسٹاٹونس کہتے ہیں کہی ایک پہلو کی طرف خم کھا کر اکڑا جاتا ہے جب یہ حالت پکڑاٹھاٹونس کہلاتی ہے فمعدہ پر سخت درناک ایٹھ محسوس ہوتی ہے جسکا درد کمر تک پہنچتا ہے چہرہ کے عضلات کھینچاؤ اور انٹھکڑاٹھناک بل قلیتے ہیں جس سے مریض سخت کھجا ہوا اور دیکھا نظر آتا ہے چھاتی کے عضلات اکڑ جانے سے سانس مشکل ہو جاتا اور زندہ آجاتی ہے۔ دل غ صاف رہتا۔ ٹیلیا کٹاٹا ہو جاتی اور جلدی جس بدستور رہتا ہے سفنکڈ نزل راہ کیطابق کام کرتے ہیں۔

آسجام شدت ضعف اور مکشی موت واقعہ ہوتی ہے کہی کہی مریض تندہ کھجا ہو کر بچ جاتا ہے۔

آسباب ضرب یا ورم کی جگہ میں ایک خاص قسم کو سیلائی کا سرایت کر جانا۔

امراض متشابہ۔ زیر کچلا۔ ہائپر و فوریہ اسپائل ٹل منجائی بس بعض اقسام ہسٹیریا مجموعی علامات پر نظر ڈالنے سے تشخیص آسانی ہو سکتی ہے۔

علاج۔ اب اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر یہ ایک تعدی مرض ہو تو ایک چوبل جیو حیوانات براہ زخم یا رگڑ یا سطح یا مینی ورمین یا ناف اطفال نو زائیدہ یا شمر گاہ زہر سرایت کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ حیوانات ساختوں میں جگہ کر کے اپنی نسلیں پھیلانے اور ٹاکسین یعنی زہر لیاہ جہنیں سے ایک ڈیوٹین ہی پیدا کر کے جس نخل عکوت تیز کر دیتے ہیں جسکی وجہ سے مختلف عضلات خاصہ متعلقہ گردن و چہرہ میں سختی و سختی ظاہر ہوتی ہے پس اسکی علاج کے اصول اور تدابیر حسب ذیل ہیں۔

اول۔ ہر ایک زخم کو خواہ کیسا ہی خفیف ہو اور ہر ایک ورم خور و سطح کو کامل طور پر اینٹی سپٹک کھنا تاکہ ٹیٹس کے حیوانات سرایت نہ کر سکیں۔

دوم۔ دافع تشنج اور دیہٹل پوٹاسیم برومائڈ کلورل ہائڈریٹ مارفیاڈاٹرومین الیٹرن کو نامیہ کلورافارم غلاب پھنک۔ کوئین۔ نائٹریٹ آف ایل سٹائٹرو گلیسرین۔ ٹاکو جلیسی میم۔ ہایوسامین۔ ڈیو بوالی سین و غیرہ سے نخل کی تیزی جس کو کم اور تشنج کو سرف کرنا مارفیاڈاٹرومین۔ نائٹرو گلیسرین۔ ہایوسامین الیٹرن اور جلیسی مین کا عضلات مافقیہ میں پکاری کرنا نہایت مفید ہے۔ کلورل ہائڈریٹ ماسوٹا مخذر اور دافع تشنج فائدہ دینا اینٹی سپٹک فائدہ بھی بخشتا ہے۔ ایک ڈرام پوٹاسیم برومائڈ اٹھیں گرین کلورل ہائڈریٹ کو کچھ بنا کر دو دو تین تین گھنٹہ بعد دیکھتے ہیں۔ افیون بھی دو ڈرام سے زیادہ تک و زرات میں دیکھی اور کوئی نقصان ظاہر نہیں ہوا کلورافارم اور نائٹریٹ آف ایل کاسٹکھانا بہت سریع تاثیر دافع تشنج ہے۔ سوم۔ علامات و عوارضات کا مناسب علاج کرنا۔ اگر جیسے تشنج ہو کر منہ ہرگز نہ کھل سکے تو ایک ربڑ کی ٹنگی ناک کو رستہ معده میں پہنچا کر سائل غذا دینی چاہیے۔ اگر مٹیاب بد ہو جاوے تو کیتھٹر کے ساتھ کانا لچا کر قبض بھی تو فیذریہ حقہ امعا کو صاف کر سکتے ہیں۔

چھارم۔ مرض کو اندہیری مکان میں اور سن سان جگہ میں رکھنا بہتر ہے کیونکہ ہر قسم کا شور اور چمک اسکو تشنج کو زیادہ کرتا ہے۔

پنجم۔ اینٹی سپٹک اور دیہٹل کرو زو سلیمٹ سیلال کاربالک ایریڈ۔ کوئین وغیرہ زیر تحریر ہیں اور بعض تجربات سے کاربالک لیسڈ کی جلدی پکاپا ہی مفید بھی ثابت ہوئی ہے۔

اس مرض میں شراب افیون پوٹاسیم برومائڈ اور کلورل ہائڈریٹ کی بہت زیادہ برداشت ہوجاتی ہے۔ ۱۱۹ انس شراب ڈرام افیون ایک دو ڈانس پوٹاسیم برومائڈ و زرات میں دینا ایک معمولی بات ہے۔ فرمس نیو میو ورم یعنی کچھ نو زائیدہ کا ٹرسس۔ یہ دراصل ٹیٹس ہے۔ اسکا علاج ٹیٹس کے مطابق کرنا چاہیے۔

تیتانی Tetany اس مرض میں ہاتھ اور پاؤں کا مسلسل تشنج ہو کر ہاتھ کی انگلیاں مخروطی شکل میں اکٹھی ہو جاتی اور انگوٹھا کبھی ان کی ساتھ ملا رہتا اور کبھی الگ کر دیتا۔ یہ تشنج ہاتھ اندر کی طرف کھائی پر خم کھاتے رہتا ہے کہیں اس مرض کا تشنج اطراف اسفل کو بھی مبتلا کر دیتا ہے تب پاؤں کمان کی طرح خم کھاکر اکڑنا اور مچھاپ کی شکل کا ہو جاتا ہے۔ تشنج دو طرفہ ہونے اور وقفہ وقفہ سے زور کرنے میں ہوش و حواس قائم رہتے۔ ابتدا میں خفیف سناٹا اور اینٹھ معلوم ہو کر تشنج ترقی کرتا ہے جب ہاتھ اور پاؤں دونوں ماؤف ہوں تو سیدھے آگے ہوتے رہتے ہیں سخت حالتوں میں تنفس اور کھانے کے عضلات بھی اکڑ جاتے ہیں غیند میں بھی یہ تشنج جاری رہتی ہے جبڑے بھی اکثر زور سے بچھ جاتے ہیں۔ اس کا دورہ چند منٹ ہی ایک دو گھنٹہ تک رہتا ہے۔

علاج مرض کی طاقت کو مقوی غذاؤں اور دواؤں کے ساتھ قائم رکھیں۔ کوئین سٹرکینیا آرسنک۔ کاڈلورائیل برابر دیتے ہیں حصہ ماؤف میں ۱ ڈوبین۔ یا یوسین۔ یا رفیا اور ایسٹس کی جلدی پچا کر سی مفید ہو بلا دونا۔ پلاسٹر لگانا یا گلاس کھینچنا یا فصد ریا بھی اکثر مفید ثابت ہوتے ہیں۔

سیرمی تھینا Terebinthina تریبٹھائن۔ آئیل تریبٹھائن کا بیان دیکھو۔
سیرمی بین Terebene خاص سیرمی بین ایک قوی مخرج بلغم دافع سراج اور اینٹی سپیک۔ ہو کر ایک برانکائٹس یعنی سہاسل رانکوریہ یا نزلہ و زکام نفع مندہ و امعا اور حشرش میں بہت جلد نایاں اثر دکھاتی ہے۔ اسکی بھانپ لینا نہایت عمدہ اینٹی سپیک۔ رسکن اور مخرج بلغم فائدہ بخشتا ہے۔
سم خاص سیرمی بین ۵ قطرہ سے ۲۰ قطرہ تک ٹکرین ملا کر۔

ایک ڈرام سیرمی بین ۱۰ اینس البتھو پانی میں ملا کر اسکی بھانپ لے سکتے ہیں۔
سیرمی جیم Terygium ناخونہ ظفر۔ یہ ایک فاسد شلشی شکل کی ساخت ہے جو کنجکٹائیو لے سے پیدا ہو کر ظفر پر آجاتی اور بعض اوقات نصف تہلی پر چھا جاتی ہے کبھی تہلی خفاف ہوتی ہے اور کبھی دبیر لحمی ہو جاتی ہے کبھی ایک جانب اور کبھی دونوں جانب ہو جاتی ہے بہت آہستہ آہستہ نامعلوم طور پر برہمی ہوتی ہے۔ اس میں عروق خون بکھرتے ہوتے ہیں ایک دفعہ کاٹنے سے دوبارہ ضرور ہو جاتی ہے۔

علاج شروع میں جبکہ ناخونہ خفیف اور باریک ہو تو کچھ مدت تک ہلوگسٹرائڈ آف مرکری مگرین ویسلین ایک اونس ملا کر آنکھ میں سلانی سے لگانا یا کاسک لوشن۔ اگر مگرین فی اولس روزانہ ناخونہ پر لگاتے رہنا کافی ہے لیکن جب گہرا اور دبیر ہو جاوے تو تباہی کے وقت قسم کی دستکاری کیجا سکتی ہے اول تمام ناخونہ کی ساخت کلیتہاً قطع کر دینا۔ اس میں یہ قباحت ہے کہ ہمیشہ دوبارہ ہو جاتا ہے۔ دوم ناخونہ کی نوک جو کارینائی طرف ہے فاسپس کے ساتھ پکڑ کر قینچی سے کاٹ کر علیحدہ کر لینا اور پھر اسکو کھینچ کر کارینا سے نیچے کنجکٹائیو کو ساتھ لے کر دینا۔ اس عمل سے یہ مقصود ہے کہ اگر ناخونہ زیادہ ترقی کرے تو تہلی کی طرف سے پکڑ کر کارینا کو نیچے سکلے ساک پر برہم نہ جائے۔

ٹیکسی کم Taraxacum ڈیٹھی لین روٹ تلخ مغوی عمدہ بلیں اور مخرج صفر ہے۔ بد ہضمی
قبض دایمی اور ضعف عمدہ میں مفید ہے۔

خرد کا کم ٹیکسی سائی ۲ اونس ۴ اونس تک۔ اکثر ٹیکسی کم ۵ سی ۳ گون تک۔

ٹیکسی کل Tastele عایہ بیضہ ٹیٹے۔ دیکھو بیان فوطوں کے امراض کا۔

ٹیلی پیز Talipeze کچی پائے۔ کلب فٹ۔ اکثر سرخش پیر الٹھی پوتاہے کچی ضرب۔ پھوٹے اور زخم و زہر
کی وجہ سے بعد میں بھی ہو جاتا ہے۔

شر و عین جبکہ بد وضع کی خفیف اور نرم ہو تو روزانہ تین دفعہ کھینچ کر درست کرنے بعد اور کمزور جانب پر مالش کرنا یا کھلی
لگانا اور ستر کی جلد پر پکاری کرنا کافی ہو سکتی ہیں۔ اگر اس طرح سے آرام کی صورت نظر نہ آوے تو پاؤں کو درست وضع پر
لانے مالش کرنے بجلی لگانے اور ستر کی پکاری کرنے کے بعد پچھکون کے ذریعہ صحیح حالت پر قائم رکھنا چاہیے
خفیف حالتوں میں ستر نیپ ہی کافی ہو سکتا ہے بعض حالتوں میں کچھ مدت تک الٹا کچی سے پاؤں صحیح
وضع کی طرف برابر کھینچ کر زور کر دے عضلات کو توڑ دے اور کمزور کو قوی کر دے اگر اس سے بھی آرام حاصل ہو تو اس وقت
یہ کہ جن عضلات نے زور کر کے پاؤں کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے ان کی نیس جڑا یا کھلا جلد کے نیچے نیچے قطع کر کے پاؤں درست
وضع پر لائیں اور پیرس پلاسٹر کے ذریعہ اسی وضع پر قائم کر دیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر نیس کھلی کاٹ دی گئی ہو تو تین
چار روز تک پاؤں کو قدیم کچی کچال میں قائم کرنا چاہیے تاکہ قطع کردہ سروں کے درمیان اتصالی مادہ کافی طور پر
پیدا ہو جاوے بعد ازاں کچی کو درست کر کے پیرس پلاسٹر پائلٹ لگانا چاہیے۔ اگر پہلے سے ہی کچی دور کر کے
پاؤں کو درست وضع پر رکھ دیا جاوے تو قطع کردہ سروں میں فاصلہ رکھ کر اتصال ناممکن ہو جائیگا۔

مختلف تمام ٹیلی پیز میں جن عضلات کی نیسوں کو کاٹنا پڑتا ہے ان کی تفصیل حسب ذیل ہو۔
اول ٹیلی پیز اکوائٹس جس میں ٹیری انٹھی رہتی اور مریض اٹھکے پیر چلتا ہے ٹیٹہ وایلیز اور پلاسٹریٹیا۔
دوم ٹیلی پیز اکوائٹس جس میں پاؤں کی انگلیاں انٹھی رہتی اور مریض ٹیری پر چلتا ہے اسٹنٹ لاکس ڈچی ڈورم اسٹنٹ لاکس
تسوم ٹیلی پیز وار جن میں پاؤں باہر کی طرف مڑا ہوا اور بیرونی کنارہ اٹھا رہتا ہے۔ ٹیٹہ لاکس ٹیٹہ لاکس ٹیٹہ لاکس
چھٹا ٹیلی پیز اکوائٹس جس میں پاؤں باہر کی طرف مڑا ہوا اور بیرونی کنارہ اٹھا ہوا رہتا ہے۔ اور مریض بیرونی ٹیٹہ چلتا
ہے۔ پیر نیس عضلات۔

پنجم ٹیلی پیز اکوائٹس وارس ٹیلی پیز اکوائٹس وایلیز ٹیٹہ لاکس نیو وایلیز۔

ان مرکب کچیوں میں پہلے وارس یا وایلیز کچی دور کر کے تین چار ہفتہ بعد کیلکیم یا کوائٹس دست کرنی چاہیے
ٹیلی چیری بارک Tellicherry Bark ہولے ریٹا انٹھی ڈسٹرک۔ اندر جو کابیان دیکھو

ٹیلیورٹ آف پوٹاسیم Tellurate of Potassium
ٹیلیورم Tellurium
ٹیلیورم Tellurium

ٹینٹس Tents یا ایک قسم کی بیتاں ہوتی ہیں جو خاص خاص مضر و قوی کے وقت فم رحم کشادہ کرنے کی غرض سے استعمال ہوتی ہیں۔ اگر انکو سروکس کے اندر داخل کر کے چند گھنٹہ سے دن تو رحم کی رطوبت جذب کر کے پھوٹی جاتی اور اسکو کشادہ کر دیتی ہیں عموماً تین قسم کی ہوتی ہیں۔ (۱) سٹیچ (۲) ٹی ٹیگنٹل الیمی نار یا (۳) ٹیوپی لوکی بنی ہوئی۔ انکو استعمال میں مفصلہ ذیل احتیاط لازمی ہیں۔

(۱) ایام حیض کے قریب استعمال نہ کریں (۲) چھ گھنٹہ سے بارہ گھنٹہ تک انکو سروکس کا اندر رکھ سکتی ہیں۔ اس زیادہ دیر تک رکھنے مناسب نہیں۔ دم کسی حالت میں ادخال ٹینٹ کے بعد مضبوطی سے غافل رہنا نہ چاہیئے۔ اگر ایسی صورت ہو کہ کسی وجہ سے رات یا دن میں بوقت ضرورت خود منہ بچا دشوار ہو تو ٹینٹ لگانا جائز نہ ہوگا۔ (۳) ادخال ٹینٹ سے ایک روز پیشتر پوٹا سیم پر وائڈ کھل چاہیئے تاکہ مریضہ کو اسکی کلیف کی بخوبی برداشت ہو سکے۔ (۴) اس عمل کے بعد چند روز آرام سے لیٹے رکھیں اور چٹنی پھرنے اور شافل روزانہ سے معافت کریں (۵) ادخال کے وقت نہایت احتیاط اور نرمی کے ساتھ ٹینٹ داخل کرنا چاہیئے۔ جلدی اور زبردستی ہرگز نہ کرنی چاہیئے۔ (۶) اگر رحم کے اندر کسی قسم کے آثار موجود ہوں تو ٹینٹ داخل نہ کریں۔

ہر قسم اقسام ٹینٹ میں ٹیوپی ٹینٹ افضل ہے۔ اول تو اسکی قوت جاذبہ بہت قوی اور زیادہ ہے۔ ایسے بہت جلدی پکڑ کر سروکس کو کشادہ کر دیتا ہے۔ دوم اسکی ساخت مضبوط ہوتی اور خطر خنکے کا اندیشہ نہیں رہتا ہے۔ سوم اسکا صاف کرنا بھی نہایت آسان ہے۔ چہارم یہ ایک برابر رخسار سے بند رہتی ہے۔

ٹینٹ ہائے کے ساتھ سروکس کے کشادہ کرنے کی ضرورت عموماً مفصلہ ذیل حالتوں میں پڑتی ہے۔
 اقول جب کہ کسی مرض کی وجہ سے رحم کو کشادہ کر کے اسے اندرونی سطح کا معائنہ کرنا منظور ہو۔
 دوم جبکہ پیدائش کے وقت سروکس کلیوہ سے خود بخود قدرتی طور پر کشادہ نہ ہو سکے۔
 سوم جبکہ رحم کے اندرونی سطح پر کوئی دستکاری کرنی منظور ہے۔

ٹینوسپورا کارڈی فولیا *Tenosporea cordifolia* گلوں کا رڈی فوئیس گلو۔
 امرت دیل گلو ایک تلخ ادویات میں سے ہے۔ دار فنجار و امراض نوبتی عفوی اعصاب مہمی مد اور مصنوعی خون شمار کیجاتی ہے۔ بخانات نوبتی غلبہ صفرا ویرقان بلواسیرمزوری۔ وجع مفاصل جربان ضعیف معدہ پیٹھ پی اور جلدی امراض میں مفید ہے۔ یورپ اور امریکہ میں بھی گلو دست گلو کا استعمال شروع ہو گیا ہے۔
 سحرست گلو، اکوٹن سے ۲۰ گرین تک جو شانہ (ایک حصہ گلو دس حصہ پانی میں جوش دیجیے) ایک اونس سے دو اونس تک۔

ٹینیا *Tinea* یہ ایک قسم کے باریک حیوانات ہیں جو جلد میں سرایت کر کے داد رہتی، کی قسم کے امراض پیدا کرتے ہیں۔ نیز ان تمام جلدی امراض کو جو ان حیوانات سے پیدا ہوتے ہیں ٹینیا کہلاتے ہیں۔ انکو حسب ذیل اقسام ہیں۔

شینیا تارسانی Tinea Tarsi سریش خراں۔ پلوں کے امراض کا بیان دیکھو۔

شینیا انجیم Tinea Ungium اردنی کو مانی کو سس۔ اس میں ناخون ہونا گدلا اور پھر بھرا ہوا ہوتا ہے۔

شینیا ٹانسورانس Tinea Tonsurans اس کی کھوپڑی کے بال موٹے بے آب سخت اور بھر پور

ہو جاتے ہیں اور جوڑے فریش کتہ ہو کر گر جاتے ہیں۔

شینیا سانی کو سس Tinea Syosis برض موچہ اور داڑھی کے بالوں میں ہونے والا

بالوں کو موٹا سخت بڑا آب اور بھر پور کرتا ہے۔

شینیا سرسی ناٹا Tinea Circinata دادہ رنگت مہرہ تمام سطح جلد کی پر ہونے والا

ان مقامات کہ جس جگہ بال بکثرت ہوتے ہیں ظاہر ہو سکتی ہو عموماً گول سرخ کھردرے نشان کے طور پر پیشانی

قفلے گردن چہرہ۔ ران اور سینہ پر ظاہر ہوتی ہے۔ کنا روں پر چھوٹی چھوٹی سرخی یا سیاہی لگ جاتی ہے۔

شینیا فاووسا Tinea Favosa اس میں گنداک کی مشابہت ہونے کی وجہ سے گھڑ سر پر چمکتے ہیں۔

شینیا کیسین Tinea Carion اس میں شینیا ٹانسورانس میں صرف اشتافق ہو کہ ہر ایک

بال کی جڑ موٹی ہو کر اچھوٹی اور پھلج کرتی ہو اور بہت سی جڑیں بھر کر ایک گول ہوا رہتا ہے۔

شینیا ورسی کولار Tinea Versicolor جھب جھب۔ بہق۔ اس میں پیدی یا لکھو

دودھ دار ہونے میں جگہ جگہ پر سے بورا تر ہوتا ہے اور خارش بہت ہوتی رہتی ہے۔ اس کو بھی قدیم حکما

دادہ یا بہق کہتے ہیں۔ اس کی فکس کا نام مایکروسپورن فرفر ہے۔

شینیا ٹانسورانس ٹینیا اگویم ٹینیا سانی کو سس ٹینیا سرسی ناٹا اور ٹینیا کیرن کا مجموعی نام ٹینیا ٹانی کوئی نیا کو

شینیا کے علاج میں ڈاکٹروں کا بھی اس قدر اختلاف ہو کہ ان اختلافات پر شرط ڈاکٹر کے علاج کی طرف سخت تاکید

ہو جاتی ہے اور سخت حیرت و پریشانی اٹھانی پڑتی ہو بعض کی رائے میں جرمی سائڈ اوویہ اس کا اصل علاج ہے

بعض سر اس کے برخلاف ہیں اور کہتے ہیں کہ جسد جرمی سائڈ اوویہ اس مرض میں فائدہ کرتی ہیں اسکی وجہ صرف

جلد میں سوزش پیدا ہونا ہے۔ بعض کی یہ رائے ہے کہ کوئی دوا اس مرض کو آرام نہیں دیتی بلکہ خود بخود قدرتی

طور پر انام ملتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اصل علاج ہو اسے حفاظت کرنا ہے۔ ہوا بند ہو کر یہ نانات خود بخود ہلاک ہو جاتے

ہیں۔ بعض کی رائے میں خراب ہالوں کا ٹکانا نہایت ضروری اور بعض کی رائے میں فضول اور غیر ضروری۔ یہی ہم ان

تمام اختلافات کو سر اس پر خیال کرتے ہیں اور جو اصول و تدابیر کو سب سے اہم معلوم ہوتے ہیں ان کو مختصر طور پر ذیل

میں درج کرتے ہیں۔

علاج۔ اول۔ ٹینیا ٹانسورانس۔ اس کے علاج کے لئے مفصلہ ذیل اصول و تدابیر ہیں۔

۱۔ مریض کی عام صحت کو نوادہ کا ڈاکٹر اکمل مرغانات۔ نگلیا۔ کینین وغیرہ ادویہ مناسب و رشش۔ بخیرات

آب و ہوا اور عمدہ غذاؤں سے ترقی دینا۔


کہ ایک حالت میں جبکہ سوزش تیز ہے کوئی لگنے والی شے استعمال نہ کرنی چاہیے بلکہ مسکن یعنی وافع خراش ادویہ۔
پنجم۔ پینینیا انجیمہ۔ ناخون پر لاکھڑا پوٹا سی یا لاکھڑا سوئی یا لاکھڑا رامونی یا ایسی ٹمک ایسڈ لاکھڑا
 کے ساتھ خوب کھجیں بعد ازاں کسی اینٹی سپٹک لوشن میں جھگوڑی باندھیں اور اس پٹی کو برابر تر رکھیں۔
ششم۔ پینیا ورنسی کولار۔ اسکے دوسرے نام پٹی ریگوس ورنسی کولار اور فانی ٹوس ورنسی کولار
 بھی ہیں مقویات منکبیا۔ فولاد مرغانات عمدہ غذاؤں اور ورزش سے عام صحت طاقت کو ترقی دینا اور
 مقامی طور پر کر دزد سلیمٹ یا ریڈمر کری یا سلفیورٹ آف پوٹاش وغیرہ اینٹی سپٹک اور یہ بطور مرہم استعمال کریں
ہفتم۔ پینیا فاووسا۔ اسکے نبات کا نام اکٹھن شان یعنی آئی ہو۔
 اسکا علاج بعینہ پینیا ٹائوٹائس کا علاج ہے۔

ٹینک ایسڈ۔ Tannic Acid ایسڈ ٹینک کا بیان دیکھو۔

ٹیوبرکلوسس Tuberculosis تمام جسم کا سل ٹیوبرکل دانہ سل گو یا کہ مادہ سل کے دانوں کو پر کل کہتے ہیں
 اور جب کسی عضو میں یا کل جسم میں یہ مادہ پڑ جائے تو یہ مرض اس عضو یا کل جسم کا ٹیوبرکلوس کہلاتا ہے ٹیوبرکل دو طرح
 کا ہوتا ہے ایک محدود چھوٹے بڑے دانوں کی صورت پکڑ لیتا ہے اور ایک منتشر بکھرا ہوا رنگ اور سختی کے یہ دانہ
 دو طرح کے ہوتے ہیں۔ گرے اور یلو گرے ٹیوبرکل چھوٹے چھوٹے غلیظ بھوے رنگ کا اور سخت ہوتے ہیں جنہیں
 سے بعض تشخیص کے برابر اور موٹھ مونگ کو برابر تک بوجھتے ہیں فی الحقیقت یہ گرے ٹیوبرکلوں کے باہم ملنے اور
 نرم ہو جانے سے بنتے ہیں مفصل ذیل اعضا اور ساختوں میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ پیچھے پٹو جگر گردہ طحال خصیہ جلد
 تمام لعاب دار سطوحات جہزی کا متخلف حصہ مفصل ذیل ساختوں میں شاذ و نادر طور پر دیکھو گئے ہیں۔ دماغ متخلف سپرائیل
 کیسیول برائیٹ۔ دل پلیریاں لعاب ہن کے غدود پستان ٹھائراڈ اور عضلات بچپن اور نوخیز عمر میں زیادہ تر
 ظاہر ہوتے ہیں۔

ٹیوبرکل کی باریک ساخت ہر ایک ٹیوبرکل چھوٹے چھوٹے اجسام کے باہم ملنے سے بنتا ہے جلی ساخت روہین

میں جب ذیل نظر آتی ہے۔ وسط میں ایک شاخدار
 بڑا سینٹیل ہوتا ہے جسکو جائنٹ سینٹیل کہتے ہیں
 جس کی شاخیں ہر طرف دور دور ایک جال بناتے ہیں
 جائنٹ سینٹیل کے اندر دانہ واسادہ ہوتا ہے
 اسکی شاخوں کے جال میں بڑے نیوکلیس والے
 ذرات ہوتے ہیں اور انکا مادہ بھی دانہ دار ہوتا ہے



انکو اپنی تھیلہ لائنڈ سینٹیل کہتے ہیں۔ ان سے باہر گول یا بیضوی سینٹیل ہوتے ہیں جسکو لفسا لڈ سینٹیل کہتے ہیں
 ٹیوبرکل کی پرورش کے واسطے خون کی نئی رگیں نہیں بنتی بلکہ پرانے عروق بھی دیکر بند ہو جاتے ہیں۔ اس کو شہر کل

بہت جلدی گلن شروع ہو جاتا ہے جس کو کیڑی ایشن کہتے ہیں۔

جائینٹ سینل کے اندر وہ ہار یک بنائی ذرات ہوتے ہیں جو ٹیوبیرکل کا اصل باعث ہیں اور جب وہ ٹیوبیرکل بیکٹیریا
اف کلخ کہتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا ٹیوبیرکل کے از رہی پرورش پاتے اور اپنی نسلیں بڑھاتے ہیں جسم کے باہر انکی
نسلیں نہیں بڑھتی اگر خشک حالت میں چھ مہینے تک اور خشک میں دس گھنٹہ تک زندہ رہ سکتے ہیں بعضے سیدھے ذرے
کی طرح اور بعض خمدار اور بعض تسبیح نما ہوتے ہیں ایک حیوان سے دوسرے حیوان میں خشک یا بول و برا یا زخموں
کی رطوبت کو ذریعہ پہنچا کر منتقل کر جاتے ہیں۔

ٹیوبیرکل مین کیا کیا تغذیاتی واقعات ہوتے ہیں۔

(۱) کیڑی ایشن یعنی گلر گلہیس کے طور پر ہو جانا یہ تھوڑے وسط سے شروع ہوتا ہے کیونکہ اسی حصہ میں خون
نسائت کم پہنچتا ہے۔ (۲) ریشہ بکر محض ایک گروہ جانا یہ تغیر کناروں سے شروع ہوتا ہے اس طرح کہ مفاصل
سیپٹل جو اسکے گرد بغرض حفاظت صحیح اجراع ہوئی ہیں وہ ریشوں میں بدل کر ایک سخت غلاف بناتے ہیں اور وسطی
حصہ تغیر ہو کر چربی میں بدل جاتا ہے بعد ازاں غلاف سکر کر محض ایک گروہ باقی رہ جاتی ہے (۳) چونکہ اکثر گھانا (۴)
گل کر پی پڑ جاتا۔

انجام (۱) سلسلہ اعصابی پر زہریلے اثر پہنچنا یا کان درد اور اخراج رطوبات سموت میں خاتمہ ہو جاتا ہے یا گلر
کلیثانا خارج ہونے یا گروہ یا کنکر بننے کے بعد صحت حاصل ہو سکتی ہے مگر گروہ و کنکر کے بند شدہ ٹیوبیرکل پھر کئی وقت
موقعہ پاکر از سر نو مرض پیدا کر سکتے ہیں۔

ایک جسم سے دوسرے جسم میں کس طرح پھونچ سکتا ہے۔

(۱) براہ نفس (۲) ٹیوبیرکل والے جانور کا گوشت کھانے یا دودھ پینے سے (۳) ٹیوبیرکل والے بچہ یا بچہ سے
دوسرے جوان کو بگا لکانے سے (۴) نم کے رہنے سے جو ان مجلس وحدہ میں پہنچا ملاک ہو جاتا ہے مگر اسکا ختم
اشری میں پہنچا ہو جاتا ہے خود توان میں حرکت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی انشروں میں خوراک کو ساتھ لادہ سے
ادھر چلے جاتے ہیں اور دوسرے اعضائے میں اس طرح پھیلے ہیں کہ خون کے سفید ذرات انکو جذب کر کے لچا تے
ہیں جب انکو جسم میں کوئی مناسب جگہ مل جاتی ہے تو بڑھنے اور پھلنے شروع ہو جاتے ہیں جو سفید ذرات انکو جذب کر
لیتے ہیں وہی بزرگ جائزٹ سا بن جاتے اور ٹیوبیرکل بیکٹیریا کے ٹہننے کے واسطے مناسب زمین ہو جاتے ہیں
جسم میں ٹیوبیرکل کا پھیلاؤ کئی طرح ہوتا ہے۔

(۱) متصلہ ساختم پھیلنے سے (۲) لیو کو سائینس انکو جذب کر کے عروق مجاذب میں داخل ہو کر
فریکے غدود میں لیجاتے ہیں (۳) ویدوں یا شریانوں کے ذریعے سے (۴) خشک غذا اور پیشاب میں ٹیوبیرکل
کا مادہ مگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے۔

علاج۔ اسکے علاج کے لئے وہی اصول اور تدابیر ہیں جو پیچھے کی سلسلہ کا بیان دیکھو۔

ٹیوبرکلین Tuberculin یہ ایک قسم کا گلیسرین اسٹراکٹ ہے جو ٹیوبرکل میسلائی کے زراعت سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کلن صاحب نے پہلے پہل اسکو علاج سل کیلئے دریافت کیا۔ اسکا طریق استعمال حسب ذیل ہے۔

پہلے دو سو حصہ قطر بانی میں ایک حصہ کاربالک ایسڈ ملا کر روشن طیارا کر لیتے ہیں پھر اسے ۹ حصہ میں ایک حصہ کلج صاف کی لطف کا جبین ٹیوبرکلین ہوتا ہے حل کر لیتے ہیں پھر استعمال کے وقت اسکا دس فیصدی کا حل بانی میں بناتے ہیں اور اسکی ٹیٹھ گریں سے تین گرین کی پچکاری روزانہ کرنی شروع کرتے ہیں یہاں تک کہ اسکی پچکاری سے بخار کی زیادتی ہونی موقوف ہو جائے۔ یہ طریقہ اسکی مقدار کو ۱۵ اپ گریں تک پہنچاتے ہیں۔ کلج صاحب کی پچکاری جو حال اسی مطالب کے لئے انہوں نے ایجاد فرمائی دس نشانہ منقسم ہے۔ ایک نشان ایک مقدار بتلاتا ہے جو زیادہ تر گریں کے برابر ہے پچکاری کے لئے نشانوں کی درمیان سی جگہ پسند کی گئی ہے۔ ہر دفعہ سوئی کو سپرٹ لیمپ پر یا باج فیصدی کے کاربالک لوشن میں اینٹی سیپک کر لینا چاہیئے۔ اور پچکاری کی جگہ بھی خوب اینٹی سیپک کر لینی ضروری ہے۔ ابھی تک ٹیوبرکلین کے استعمال سے کوئی عہدہ نتائج ثابت نہیں ہوئے۔ بلکہ برعکس اسکے پھیپھڑے کی سل سے تمام جسم کا سل شروع ہوتا ہے۔ شاید اسکی مقدار اور طریق استعمال میں تغیرات ہو کر مفید ثابت ہو سکے۔

ٹیوبول نیفرائٹس Tubal Nephritis پشیا کی نالیوں کی سوزش۔ رائٹس ڈیز کا بیان دیکھو۔
ٹیومورس Tumours رسولیاں۔ یہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک میلگنٹ یعنی ایذا رساں۔ دوسری سہیل یا نان میلگنٹ یعنی بے ایذا۔ ان ہر دو قسم کی رسولیوں میں جب ذیل پہچان ہے۔

میلگنٹ رسولیاں ہمیشہ بے طرح پھیلی ہوئی اور تمام قریب جوار کی ساختوں سے پیوستہ ہوتی ہیں سہیل رسولیاں برعکس ایک محدود اور قریب جوار کی ساختوں سے محو ماحلیہ ہوتی ہیں میلگنٹ رسولیاں بیدرستی جاتی ہیں۔ سہیل رسولیاں ایک خاص حد تک پہنچ کر زیادہ نہیں بڑھتی میلگنٹ رسولیاں بہت جلد ترقی کر جاتی ہیں اور ہر قسم کی ساخت یعنی گوشت عروق پٹھے۔ اعصاب۔ ہڈی۔ غدود وغضروف وغیرہ کو جو اسی کے قریب ہو اپنے میں شامل کر لیتی ہیں سہیل رسولیاں اندر دم سے بڑھتی اور دوسری ساختوں کو اپنے میں شامل نہیں کرتی میلگنٹ رسولیوں کی ساخت تمام جہانی ساختوں سے مختلف ہوتی ہے سہیل رسولیوں کی ساخت ہمیشہ کسی نہ کسی جہانی ساخت کی مشابہ ہوتی ہے یعنی بے ایذا رسولیاں گوشت یا ہڈی یا مری یا اعصاب یا چربی یا رقیق رطوبت یا کینٹھو نشو یا عروق خون یا عروق جاذبہ وغیرہ سے ملتی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور برعکس ایذا رساں رسولیوں کی ساخت ان تمام سے نرالی ہوتی ہے۔ ایذا رساں رسولیوں میں ہمیشہ درد ہوتا لیکن بے ایذا درد نہیں ہوتا نکال دینے کے بعد ایذا رساں رسولیاں دوبارہ بھی ہو جاتی ہیں لیکن بے ایذا دوبارہ نہیں ہوتی جب ایذا رساں رسولی جسم کا ایک حصہ میں پیدا ہوتی ہے۔ تب دیرینہ خون یا عروق جاذبہ اسکا مادہ اور جگہ پہنچ کر اسی قسم کی رسولیاں پیدا کرتا ہے لیکن بے ایذا رسولیاں اس طرح نہیں پھلتیں۔

خواہ کسی قسم کی رسولی ہو اسکا علاج سوائے اسکے اندر کچھ نہیں کہ اسکو تمام و کمال نکال دیا جاوے میلگنٹ یعنی ایذا رساں

رسولیوں میں چونکہ کوئی حد نہیں ہوتی اور اسکا مادہ اگر ذرہ بھی باقی رہجاو تو ضرور دوبارہ وہی رسولی بنادیتا ہے۔ اسلئے ایسی رسولی کو حد سے زیادہ بڑھ کر قطع کرنا اور بعد میں باقی ساختوں کو کامل طور پر زنک کھوراندیا کار بالک اینڈ یا کرومک اینڈ سے جلادینا چاہیئے۔ اگر قریب کو غدد و بڑھ گئی ہوں یا کسی اندرونی عضو میں بھی ایسی رسولی کی علامات موجود ہوں تو اسکے کاٹنے سے کچھ فائدہ تصور نہیں ہو سکتا۔ دیکھو بیان کنسیر یا مینا بانی فیڈا۔ اور مانی ڈیڈ کا۔

بَابُ شَاءَ مُثَلَّثًا

ثانیاً بحرک شہتا محل ریح سہل صفر او مخرجہ بلغم و ضداد اسکا محل اور ام اور دافع درد پہلو جو موم اور کند کے ساتھ بواسیر کے سوں کو خشک کر کے گرانا ہے۔ اسکے داخلی اور خارجی استعمال سے بال خوب لگتی اور چرہ سرخ ہو جاتا ہے زیادہ مقدار میں مٹی ہے خمر برگ دگرین سے ۴۸ گرین تک۔

تعلب مضری مقوی باہ و اعصاب بمن بدن بفت حصاة اور دافع تشنج ہے۔ کزانہ صمد فاکھ لقوہ۔ شفع باہ و قلت ہنی میں نافع ہے خمر چہ نصف عدد و ایک عدد تک اور خمر نصف ٹرام و دو ڈرام تک۔ ثقل اللسان۔ زبان کا بھاری ہو جانا۔ دیکھو بیان زبان کے امراض کا۔

بَابُ جَمْعُ مَعْمَلٍ

جار التھر۔ یہ دریائی نبات۔ قابض جابس الدم ممکن عطش ہے اسہال و اسہال الدم میں مفید ہے خارجی استعمال میں محلل اور ام اور منحل فروج جو خمر نصف ٹرام سے ۴ ڈرام تک۔

جام بھل۔ سفری انہ بھل مقوی مضری قلب و مدر ہے۔ ابتدا میں قد سے المین اور بعد میں قبض کرتا ہے اسکے پوچے کی چھال ایک ٹخال پانی میں جوش دیکر پینا نفع اسہال رطوبتی ہو اور اسکے غرغہ کرنا سوزہوں پر جاذب جابس الدم اور مقوی اثر پیدا کرتا ہے خمر بھل بقدر ضرورت۔

جام گھاس۔ اسکی پتیان چاکر کھانا۔ استقائی کے لیے سود مند اور اسکی جڑ سیاہ چر کے ساتھ میکرو تیز کی مقدار میں کھانا ختم کو بند کرتا اور ورم طحال کا دافع ہے۔ خمر ایک گرین تین گرین تک۔

جام من جمیل شری۔ اسکا پھل صفراوی و سستوں کو روکتا صفرا کی تیزی کو کم کرتا اور صحوک و باہ کو زیادہ کرتا ہے اسکے خمر کا سفوف دیا ریطس میں اعلیٰ درجہ کا مفید ثابت ہوا ہے۔ کثرت بول۔ بخو الی بے چینی بدبھنی نفع۔ جھوٹے کھنسی وغیرہ کی شکایات بہت جلدی رفع ہو جاتی ہیں بختہ جاسن کا پ گچ کا دافع اور ہال کا تاہم اسکے خشک پتوں کا بخن مسوڑہوں کو مضبوط کرتا ہے۔

Jaundice اکٹس برقان کلیمان دیکھو۔

جانڈیس

جاؤشیر یا جوشیر ایک دخت کا گوند ہے۔ محل ریاچ۔ مفتح سده مقوی اعصاب ہے۔ دوسرے فانیج لقوہ صرع و عشد سرف۔ درد پہلو و نرفال دم تب لرزہ۔ استقار برقان تقطیر البول اور الارطمت اور رنگر نیزہ میں مفید ہے۔ سرساکا کوتا کو مفید اور قطر کو تیز کرتا ہے۔ فطور اسکا نقل سامعہ کو دفع کرتا اور جھول اسکا اخراج جنین کر دیتا ہے۔

خمر ۵ اگرین سے ۶۰ گرین تک۔

جائے پھل۔ جائے فل۔ نٹ میگ۔ می رسیکا۔ اسکا دخن خارجی استعمال میں لوکل سٹی ہولنٹ ہو۔ اور واقع درد ہے۔ داخلی استعمال میں دوسرے لطیف خوشبودار روغنوں کی طرح محرک۔ مخرج ریاچ ہے۔ زیادہ مقدار میں نشہ لاتا اور غنودگی و بیہوشی پیدا کرتا ہے خمر بالفل ۵ سے ۵۰ اگرین تک۔ روغن البوند سے ۴ پوند تک۔

سیرٹ آف نٹ میگ ۳۰ پوند سے ۶۰ پوند تک۔

جائے جو صی۔ یاسمن بری جنگلی جمبیلی محل ملطف مقوی اعصاب سہل بلغم و صفر ہے۔ دوسرے فانیج لقوہ پرانے استرخا کھانسی و دم میں مفید ہے۔ اسکی نسوار درد و شقیقہ کو آرام دیتی اسکی جوشاندہ کا شرعہ درد و نماں کو کم کرتا اور اسکا جوشاندہ زیادہ مقدار میں قے آور ہے خمر ۴ گرین سے ۵۰ گرین تک۔

جٹا منسی۔ بالچھر۔ سینبل نہدی۔ انڈین سپائیک نارڈ۔ بالچھر کلیمان دیکھو۔

Jatropha Curcas جٹروفا کرس

جٹروفا میکرو ورنیزا Jatropha Macrorhiza کو مارحصلع خون۔ مخرج صفرا اور سخت سہل ہے دیگر نباتی سہلات کو خلاف اسکا ذائقہ خراب نہیں بلکہ بعض کو خوشگوار معلوم ہوتا ہے۔ افعال میں لیٹنڈرا او پلوڈا کے مشابہ ہے خمر فلورڈا کشرٹ نصف ڈرام سے ۴ ڈرام تک۔

جڈو آر۔ درواری نرسی مفتح قوے و اعضا و احتیاج اور مدہی بنائی کو قوت دیتی اور باہ کو بڑھاتی ہے ضعف قلب خفقان و جذب القلب میں نافع ہے خمر ۴ گرین سے ۵۰ گرین تک۔

جڈاٹم۔ لیپر وی۔ دیکھو بیان لیپر وی کا۔

جڈب القلب۔ دل کا ڈوبنا سنگ آف دی ہارٹ۔ بہ علامت بہت امراض قلبی نیز نفخ عام کمزوری۔ سخت درد گھبراہٹ وغیرہ امراض کی حالت میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اسکا علاج مطالبی سبب کرنا چاہیئے۔

جرب خارش۔ کے بیز دیکھو بیان کے بیز کا۔

جرمن اکتھیال German ichthyol یہ تھیال کا دوسرا نام ہے۔ پس اسکا بیان دیکھو۔

جرمی سائنڈز Germicides قاتل کرم اسکا دوسرا نام ڈس انفیکٹ ہو۔ نام انجی

بھی زیادہ مقدار میں تمام باریک نباتات و حیوانات کو ہلاک کر دیتے ہیں پس اسکی تفصیل کے لئے دیکھو بیان اینٹی سپیکس اور ڈس انفیکٹس کا

جرونیبا۔ Brubeba اور ویبیا سولے نم بینی کے ٹم مصلح خون۔ دافع تشنج۔ دافع سوزش۔ اشتہار۔ مقوی اور تیز سہل ہے۔ یرقان۔ استسقا۔ قبض۔ امراض جگر و طحال۔ جریان اور سوزش حشا میں مفید ہے۔
خبر برگ ایک رام بطور ضیاء فلویڈاکٹر الٹ ۵ پوند سے ۳۰ پوند تک۔

جریان خون۔ سپرینج کا بیان دیکھو۔
جریان سپرینٹوریا۔ دیکھو بیان سپرینٹوریا کا۔

جبری نیم میکولی ٹم
اسکو کہتے ہیں۔ قابض اور حابس الدم ہے۔ پرلے اسہال۔ چیخس۔ رغاف۔ بول۔ لند۔ سیلان۔ الرحم۔ ذیابیطس اور گلیٹ میں مفید ہے۔ خمر سفوف، ۳ گرین سے ۴۰ گرین تک۔ فلویڈاکٹر الٹ ۳۰ پوند سے ۶۰ پوند تک۔
جست۔ زنک کا بیان دیکھو۔

جشا۔ آروغ۔ ٹوکار۔ آرکیشٹر کا بیان دیکھو۔
جفاف الالف۔ خشک ہونا ناک کا۔

جگر کے امراض۔ انکی مختصر فہرست حسب ذیل ہو۔

اول۔ جگر کی پولیپسی۔ جگر کے اندر خون خارج ہو جانا کبھی تو یہ اخراج تھوڑا تھوڑا علیحدہ علیحدہ حصوں میں ہوتا ہے اور کبھی ایک ہی جگہ۔ الغرض ماؤف حصہ سیاہ رنگت کا اور پھیلا ہوا ہوتا ہے۔
اسباب۔ جگر کا پُرانا مرض یا اجتماع خون میلیریا کی وجہ سے جگر کا بڑھ جانا اسکروی حمل اور رچی۔ ضرب۔
علامات۔ جگر کے تمام پردے سخت درد ہو کر یرقان صفراوی فی اور اسہال الدم ہو جانا جسم کا دفعتاً ٹھنڈا اور پھیکا پڑ جانا جگر پر دبائے سے سخت درد ہونا غشی طاری ہو جانا۔

انجام ہلاکت ہو اگر اخراج خون زیادہ ہو یا کوئی پُرانا جگر کا مرض اسکا موجب ہو۔

دوم۔ جگر کی اٹرونی اکیوٹ یعنی جگر کا بہت شدت اور سرعت کو ساتھ زائل ہو جانا اسکو اکیوٹ اٹرونی بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک کم کاشت بخار ہو جہیں دفعتاً پرلے درجہ کا یرقان ہو جانا جگر غدد و اور عضلات کو سیلر کیا عام سوزش سے دانہ دار البیومن بھر کر چربی یا روغن کے ذرات میں بدل جاتا ہے عضلات کو ریشو نہیں دے سکتے کے بجائے ہی دانہ دار البیومن بھر کر چربی یا روغن بن جاتا ہے اسی قسم کے تغیرات زہرنا سفورس نکھیا سمور اور شراب میں ہوتے ہیں۔ تمام بخارات میں بھی خفیف درجہ کے یہی تغیرات واقع ہوتے ہیں۔

علامات۔ ابتدا میں کبھی مدہ اور انٹریوں کا تڑپنا عام چھپتی اور درد غالب ہونے لگتا ہے اور دست لگنے صفراوی یا لیاں فاسد ذرات سمجھ کر کجانی اور یرقان ہو جاتا ہے جگر دردناک ہو جانا جگر کا شوش پر دفعتاً فائید ہو کر نرم آواز ہو جاتی طحال بڑھ جاتی پیشاب میں لیوسین شامی رو سین صفراوی رنگ خون اور البیومن خارج ہوتے ہیں مدہ اور انٹریوں کی اندر خون کے دھبہ ہوتے ہیں لیوسین بہت جلد سخت قہقہہ

ہوتا جانا، اتہاد درجہ کا ضعف، صداع، بھینسی اور نڈیاں کے بعد بیہوشی ہو کر خاتمہ ہو جاتا ہے کبھی سنج ہو کر پاخانہ پیشاب اور اختیار خارج ہو جاتے ہیں۔

انجام۔ ہمیشہ مہلک۔

اسباب۔ زہر ناسفرس، حل سیٹی، سیما میلدا۔ یہ مرض عورتوں میں ۱۵ اور ۲۵ سال کی عمر کے درمیان زیادہ تر ہوتا ہے۔ نشہ کثرت جماع اور آفک بھی اس کے موجب ہوتے ہیں۔

سیوم۔ جگر کی لگانک لٹرونی۔ یہ پرانے امراض کے ضمن اور بڑھاپے میں ہو جاتا ہے جگر سکڑ کر چرٹے کی طرح سخت ہو جاتا اور عروق خون بند ہو جاتے ہیں۔ اصل ذرات زایل ہو کر ریشہ بکثرت پیدا ہو جاتے ہیں۔ علامات۔ اصل مرض کی علامتوں کے ساتھ ملی جلی ہوتی ہیں۔

چھٹھم۔ جگر کی البیومی نائڈیاری۔ اس میں جگر متغیر کیفیت ہو کر سیوم کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ علامات۔ غیر معین جگر کے مقام پر گرانی اور بے چینی محسوس ہوتی۔ یرقان ظاہر ہونا اور کبھی استسقاء ہی ہو جاتا ہے جگر نیچے کی طرف ہموار طور پر بڑھ جاتا ہے اس لیے شکل میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا۔ دبانے سے سخت اور مضبوط معلوم ہوتا ہے۔

پنجم۔ بلیمیری کنجیشن صفراوی نالیوں کا از حد بڑھ کر تنجنا۔ جب کسی روک کی وجہ سے صفرا کا انشرویوں میں جانا بند ہو جاتا ہے تب صفرا جمع ہو کر جگر کی نالیوں کو تن دیتا ہے اس لیے جگر بڑا ہو کر تین چار انگشت سینے سے نیچے محسوس ہوتا ہے مگر بعد میں جب جگر کے اصل ذرات چرنی اور رنگ پرکڑا ل ہو جاتے اور زائد ریشہ پیدا ہو کر سکڑتے ہیں تب جگر چھوٹا ہو کر پھر پلیوں کے اندر چھپ جاتا ہے اور اونکی سطح دانہ دار ہو جاتی ہے۔ مگر سرور سے کم یرقان ہو جاتا خون رک کریٹ میں بائی بڑھ جاتا اور تلی بڑھ جاتی ہے۔ گھلائی کو جن بنانیکا فعل ناقص ہو جاتا ہے۔

ششم۔ بلیری کیلکولائی۔ صفراوی پتھریاں۔ اس کا بیان علیحدہ کیا جا چکا ہے۔

ہفتم۔ ٹیوبیکلوسس۔ یہ مرض جگر میں شاذ و نادر ہو تا زیادہ تر سطح جگر پر اور عام ٹیوبیکلوسس کے ضمن میں ہوتا ہے۔ وبلتہ الکبد۔ یہ ہے ٹیکلوسس جگر کا پھوڑا۔

اسباب۔ اکثر شراب، سرائیت، زہر میلدا۔ (۴) متعفن مادہ کا انشرویوں یا دیگر اعضائے پیچ بمانا مثلاً پیچش، فلافائیٹس، پائی ایسیڈ، سپٹیسیمیا (۵) گرم ملکوں میں یہ مرض کثرت سے ہوتا ہے جو ٹریپیکل ابسیس کہتے ہیں۔ اس کی نسبت چند خیالات ہیں بعض چشیش اور بعض میلدا اور بعض شدت گرمی کو اس کا باعث بتلاتے ہیں (۵) صفراوی کنکریوں یا حیات یا کسی غیر جنس شے یا ہائیڈریٹڈ مسٹ کی وجہ سے جگر میں خراش ہو کر زہم ہو جانا اور اس کے بعد پیپ پڑ جانا بدہیزی زیادہ کھانا است عادات اور شراب نوشی اس کے اسباب بعید میں شمار کئے جاتے ہیں۔

کیفیت پہلے معمولی طور پر اجتماع خون ہو کر ورم ہو جاتا بعد ازاں خون کا پانی اور ذرات خارج ہو کر گلے شروع ہوتے پھر پیپ ہنتی سے پہلے جگر کے لایسولوز میں مختلف مقامات پر پیپ ہنتی ہے۔ ان طرح چھوٹے چھوٹے پھوٹے نگر ایس میں ملتے جاتے ہیں۔ تعداد و جسامت اور مقام کے لحاظ سے یہ پھوٹے نہایت مختلف ہوتے ہیں۔ زیادہ تر دہانے لوہ میں ہو کر تھے ہیں پیپ میں خون اور صفراء ملے ہوئے ہوتے ہیں ایک پھوڑا تو مدور شکل کا ہوتا ہے مگر بہت سو پھوٹے باہم ملکر بے طرح ہو جاتے ہیں ٹراپی کل البیسس عموماً ایک اور بہت بڑا ہوتا ہے مگر بایا ایسیا سے جو پھوٹے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے اور تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں جب پھوڑا بہت بڑا ہو جائے تب جو فٹکلم یا معدہ یا احای یا گردہ یا جوف سینہ یا حجاب القلب یا انفیر ریونا کا د کے اندر کھلیا جاتا ہے یا باہر کی طرف منہ کر لیتا ہے۔ تمام پیپ خارج ہونے کے بعد غار بھر کر سکر جاتا ہے کبھی مدو ست ہر ایک سخت نور کر آتا اور پھیلا شروع ہو جاتا ہے کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ پیپ کا سائل حصہ جذب ہو کر باقی کا جو نہ بچتا ہے کبھی پورٹل دین میں ورم ہو کر پیپ پڑ جاتی ہے تب اسکی دیواریں موٹی ہو کر گردی کا سائل میں بھی ورم ہو جاتا ہے اور ورید کا خون نچھوڑ کر کھرا صلب بن جاتا ہے جسکو نگرہ ٹوٹ کر خون کے ساتھ شش دماغ گردہ اور جوڑوں میں پھینک پھوٹے بدلا کر سکتے ہیں۔ اور عام پیدری ٹوٹنا کیٹس بھی ہو جاتا ہے بچوں میں ناف کی ورید میں ورم ہو جانے سے ایسا ہو جاتا ہے کبھی فیض شے کے گھس جانے سے ایسا ہو جاتا ہے علامات جگر کا مقام دردناک ہو جاتا اور خود بخود بھی میٹھا میٹھا درد ہوتا ہے۔ انتقال صس کی وجہ سے دہانے شا نک درد ہو پڑتا ہے۔ گہرا سانس لینے یا کھانسنے سے درد زیادہ ہوتا ہے۔ اسواسطے مریض سانس روک لیتا ہے تمام بدن زرد ہو کر آنکھیں اور لب زرد ہو جاتے ہیں۔ ہاضمہ خراب رہتا۔ نفخ اور قبض کی شکایت ہتی ہے۔ جب پھوڑا بنتا ہے تو اس کی ابتدائے الزہ کے بخار کے ساتھ ہوتی اور پیپ پڑ جانے کے بعد بار بار زردی کے ساتھ بخار ہوتا اور سینہ آتا ہے سخت ضعف ہو کر مریض ڈال پڑا رہتا اور دوا ہوتا ہوتا ہے۔

انجام چھوٹے چھوٹے بہت سے پھوٹے جو پیپ کا مادہ پہنچنے سے بنتے ہیں وہ سخت ہلکے ہوتے ہیں مگر ٹراپی کل البیسس جو ایک اور بہت بڑا ہوتا ہے علاج پذیر ہے اور چھ مہینہ تک رہ سکتا ہے مگر چھوٹے پھوڑے جلدی ہلاک کر دیتے ہیں۔

ملاحظہ و امتحان اگر پھوڑا پھوڑا اور گہرا ہے تو ملاحظہ و امتحان سے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا۔ بڑے پھوڑوں میں حسب ذیل علامات معلوم ہو سکتی ہیں۔

جگر کا بڑھ جانا اور اس کے ایک حصہ میں زیادہ ابھار ہونا جگر کا کتا رہ اور سطح کا تار ہوا اور اونچا نیچا ہو جانا۔ ابھرے ہوئے حصہ میں پکلا اور ٹکڑیوں میں محسوس ہونا۔ ہائیڈریٹڈ مرض کی فرکشن غریبی سے ہونا سینہ میں لگاتار سے ورم کی جگہ پر گڑ کی آواز سموع ہونا ٹکڑی داخل کرنے سے پیپ ہرا ہونا جگر کے پھوٹے میں فیض کی طرح ٹرپ بھی محسوس ہوا کرتی ہے جو ایسا ملتے آتی ہے۔

پورٹیل وین میں پیپٹ جگہ کی علامات حسب ذیل ہوتی ہیں۔

۱۔ مہلہ پر درد محسوس ہونا جو نیچے اور پہلو کی جانب پھیلتا ہے

یرقان، قے، اسہال، عظم الطحال، ہتھکڑے، مرق البطن، اسہال الدم اور عام پانی ایسیلا میں جگر نہیں

تاوقتیکہ خود اسکے اندر بھی پھوڑا نہ ہو جاوے۔

۲۔ جگر کی رسولیاں۔ یہ بہت قسم کی ہوتی ہیں مثلاً سسٹ، ڈرائڈ سسٹ، خیزش کرنیوالی رسولیاں

عروق جاذبہ کی رسولیاں ٹیوبرکل سرطان، ہائی ڈیڈ جے اینڈ رسولیاں ان میں سے ٹیوبرکل سرطان اور

ہائیڈیڈ قابل ذکر ہیں جگہ کا علیحدہ بیان کیا جاتا ہے۔

۳۔ سرورسز آف دی لور جگر کے اصل ذرات نائل ہو کر فاسڈ ریشہ پیدا ہو جاتا ہے دو طرح کا

ہوتا ہے اول وہ جس میں زائد ریشہ سکڑ کر جگر کو چھوٹا بناتے ہیں اسکو اٹروفک سرورسز کہتے ہیں۔

دویم وہ جس میں فاسڈ ریشہ بکثرت ہو کر جگر کو معمول سے بڑا کر دیتے ہیں اسکو ہائی پوسٹروفک سرورسز کہتے

ہیں یہ حالت تین طرح سے پیدا ہو سکتی ہے۔

اول جگر کے ریشوں میں ورم ہو کر۔

دویم فطری خصوصیت کی وجہ سے جس میں تمام اعضائے میں زائد ریشہ بنتے ہیں۔

سولہ جگر کے خاص ذرات کو فاسڈ ہونے اور زایل ہونے سے۔

اسباب (۱) شراب، آتشک، پراسے نمبر (۲) میلیریا اور شدت گرمی۔ (۳) صابحات کی کثرت (فساد باضمہ

کی وجہ سے خراب مادہ پیدا ہونا۔ (۴) پرانی ورم (۵) صفراوی نگیروں کی وجہ سے خراش رہنا (۶) پرانی

تبلی امراض کی وجہ سے اجتماع خون رہنا۔

علامات (۱) اٹروفک سرورسز۔ عموماً آہستہ آہستہ نامعلوم طور پر برتری کرتا ہے شکم کے دوران خون

میں خلل آکر مہلہ اور امحائل اجتماع خون رہتا ہے جس سے باضمہ خراب رہتا اور قبض رہتا یا دست آتے ہیں

تلی بڑھ جاتی دستوں میں کبھی کبھی خون آتا اور بواسیر ہو جاتی ہے یرقان کبھی خفیف اور کبھی شدید ہوتا

ہے اور کبھی محدود رہتا ہے۔ پیٹ کی سطحی وریدیں پھول جاتی اور مرق البطن میں بانی پڑ جاتا ہے۔

(۲) ہائی پوسٹروفک سرورسز میں یرقان شروع سے زیادہ رہتا اور دوسری علامات دیر میں

اور خفیف طور پر ہوتی ہیں مگر داغی علامات نمایاں ہوتی ہیں۔

ملاحظہ و امتحان۔۔ اٹروفک سرورسز میں جگر چھوٹا ہو کر اسکا کنارہ اور سطح ناہموار اور دانہ دار ہو جاتی ہے۔

اور کبھی کبھی رنگ کی آواز بھی سنائی دیتی ہے ہائی پوسٹروفک سرورسز میں جگر ہموار طور پر بڑھ جاتا ہے۔

دونوں صورتوں میں بدن کارنگ پھیکا نندی نائل پڑ جاتا بدن لاغر ہوتا جاتا اور جلد پھیلی جاتی سطح پر

خون کے دھبہ ہوجاتے ہیں۔

یہ دونوں مرض بہت دیر پاہوتے ہیں۔ کبھی جلدی زور پکڑ جاتے ہیں۔ اکثر ہلکے ثابت ہوتے ہیں۔ عام ضعف پر فغان ہڈیاں اور پیٹھ کی وجہ سے یا دماغی فسادات یا جریان خون یا پیری ٹوٹائی ٹس سے واقع ہو جاتی ہے بعض حالتوں میں مریض رو بھٹ ہو کر برسوں زندہ رہتا ہے۔

کیفیت (۱) انڈوفک سر و سس میں سکر کر بہت سخت چھوٹا اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ انکسار اصل سے پاپاٹ کے قریب ہو جاتا ہے۔ دبائے سے سخت کرخت چمٹے کے مشابہت میں ہوتا ہے اور سطح پر سخت دانہ محسوس ہوتے ہیں۔ رنگ بھورا زردی یا پیل ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے اسکا نام سر و سس ہے۔ جگر کا غلاف سخت ہو کر چمٹ جاتا ہے۔ لایبولون کے بیرونی اور اندرونی ریشہ زرد ہو کر سکتے ہیں۔ جنکی وجہ سے خون کی رگیں بند ہو کر ذرات جگر فاسد ہوتے جاتے ہیں۔

(۲) ہائی پرٹروفک سر و سس میں بکڑ اصل سے بڑھ کر دو چندان سچن ہو جاتا ہے۔ مگر عام صورت میں فرق نہیں آتا۔ سطح کبھی کھری ہو جاتی ہے۔ فساد صفراوی نالیوں میں شروع ہو کر جگر کے ذرات کو چھوٹا کرتا یا چربی میں بدلتا جاتا ہے اور صفراوی رنگ پلا دیتا ہے۔ اس کے بعد زرد ریشہ بعض بعض صورتوں میں بڑھتے جاتے ہیں۔ انڈوفک قسم میں فساد کی ابتداء روق سے ہوتی ہے۔

یازدھم جگر کا سفلس۔ یعنی آتشک۔ آتشک کی وجہ سے جگر میں فسادات ذیل ظاہر ہو سکتے ہیں۔

(۱) ایسوی نائڈوزیز (۲) پیری پیٹھ نائی ٹس (۳) سر و سس (۴) آتشک کی گیان۔ یہ اقداد میں بہت سی ہوتی اور اکثر غوشہ بناتی ہیں۔ باسانی جذب ہو جاتی یا سخت ہو کر ان میں چونہ پڑتا ہے۔

دوازدھم۔ جگر کے افعال میں خلل واقع ہو جاتا۔ یہ تین قسم کا ہو سکتا ہے۔

(۱) اسکے گلائی کو جینک فعل میں خلل واقع ہو کر زیا بطیس ہو جاتا۔ جس کا بیان علیحدہ کیا گیا ہے۔ دیکھو بیان ڈایابی ٹرنگا۔

(۲) اخراج صفراوی میں کمی ہوتی ہو جانا۔ اگر صفرا خارج ہو تو باضمہ خراب ہو کر زبان پیلی ہو جاتی ذائقہ خراب ہوتا۔ شہاندار داور نفخ غالب ہوتا ہے۔ قبض ہو کر پاخانہ سخت پیل یا سیاہ رنگ کا بدبودار آتا ہے۔ چہرہ پیکھا ہوتا یا پیل اور پر قل زرد رہتا ہے۔ طبیعت نڈال رہتی سرد و کتران مزاج کھجور اور چڑچڑا ہونا اور بالیخو یا کڑوا پیداہوتے ہیں۔ پیشاب غلیظ یا سیاہ یا پیل اور لٹھیس سے بھرا ہوا خارج ہوتا ہے۔ اگر صفرا مقدار میں زیادہ خارج ہو بہت رقیق صفراوی دست افراط سے آتے اور خیران وقت غالب رہتے ہیں صفرا کی تیزی سے پیش میں کاٹ اور پھینپی رہتی اور اخراج کے وقت مقعد میں جلن ہوتی ہے۔ دل دھڑکتا سرد و کتران اور طبیعت بقر اور پھر مردہ رہتی ہے۔ پیشاب گہرے رنگ کا لٹھیس سے بھرا ہوا آتا ہے۔ اکثر بخا بجا ساتھ ہو جاتا ہے۔

(۳) جگر کی آس قوت تحلیل میں فرق آ جانا جو ایسوی نائڈ غذاؤں کا تجزیہ کر کے پوریا اور ایسوی جنس

مادہ بناتی ہے جو پیشاب اور پسینہ کے ساتھ خارج ہو جاتے ہیں نیز جلدی حرارت کو قائم رکھنے میں امداد دیتے ہیں جب اس فعل میں خلل واقع ہو جاتا ہے تو نائٹروجن مادہ اور ریا میں نہیں بدلتی اور تھیسٹولتھک کثرت پیدا ہو کر تھیمینا کرتے ہیں۔ مفلوں پر حالت سہکرا آخر سخت تکالیف اور امراض کا باعث ہو جاتی ہے خفیف حالتوں میں کچھ تکلیف محسوس نہیں ہوتی اور پیشاب میں شہک لایڈ و تھیسٹولتھک کثرت خارج ہوتے بہتے ہیں مگر تاہم کے آخر کار نفخ، سوزش، مدہ، ترش و کار، ضعف، کثرت خواب، قبض، اختلاج قلب، صعل، دوران سر، طینس، زہر مری، اور بالیوٹیا تکلیف دہ ہو جاتے ہیں۔ ان عارضی تکالیف کو علاوہ امراض ذیل میں دیکھا جاسکتا ہے۔

نقرس، سنگ گردہ، سنگ مثانہ، سنگ صفرا، خود اور اعضا میں ورم، جلدی امراض مثل اگزیم، سورس، سکر لائی کن، اسلی گریا۔

سیزدہم۔ جگر میں چربی پڑ جانا۔ فیٹی لور۔ اسکو ہیپ پرایڈی پوزم بھی کہتے ہیں۔ علامات۔ عموماً اس مرض کی علامات نہایت خفیف اور نامعلوم رہتی ہیں مثلاً ضعف، اضمہ، ٹوٹنے سے جگر بڑھا ہوا معلوم ہوتا اسکا کنارہ گول نرم اور ہموار محسوس ہوتا ہے۔ یرقان، استسقاے اور عظم الطحال کثیر ہوتے۔ پیشاب میں بھی کوئی تغیر نہیں ہوتا۔

کیفیت۔ جگر بڑھ جانا ساخت نرم اور کمزور ہو جاتا ہے۔ سنگ زرد دیکھیں کہ سرخ و صعبہ اسکے ذرات میں چربی پڑ کر محلول جاتے ہیں کیسائی طور پر ۲۵ فیصدی روغن نکلتا ہے۔

اسباب (۱) پرانے زائل کرنے والی امراض مثلاً سمل سرطان، بچیش وغیرہ۔ (۲) پیچھے چڑوں اور قلب کے پرانے مرنے (۳) روغنی یا کثرت سم کا نام (۴) شراب پیانا (۵) ورزش نہ کرنا (۶) سست پڑے رہنا (۷) سروس اور البیوی نائڈٹیز کے ساتھ ہی ایسا ہو سکتا ہے۔

چھکاردہم۔ جگر کا استسقاے خون۔ کنگنچیمپن یا پریسیڈنٹ می لور بھی کہتے ہیں۔ اسباب (۱) شراب اور تیز مصالحہ کی کثرت (۲) شدت کی گرمی (۳) میلیبیا (۴) فسادات حیض (۵) ضرب (۶) جگر میں فاسد مادہ پڑ جانا (۷) صفراوی کنکریوں یا حیات وغیرہ تھیسٹولتھک سے خراش رہنا۔ علامات۔ جگر کے مقام پر کھینچ۔ بوجھ اور خفیف مدد محسوس ہونا طحال کا بڑھ جانا مگر یہ لازمی نہیں۔ جگر ہی کیسقد بڑھ جاتا ہے۔ اضمہ خراب ہو کر پیشاب میں تھیسٹولتھک بیٹھنے میں کبھی خفیف استسقاے ہی ہو جاتا ہے۔

کیفیت۔ جگر محمول کی نسبت قدرے بڑھ جاتا ہے اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس میں ٹنگان دینے سے سیاہ خون برآمد ہوتا ہے۔ عروق خون کشادہ اور بھرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ عموماً یہ اجملع خون سے بے رنگ وین کی شاخوں میں ہوتا ہے اسلئے لاپور کے وسط میں زیادہ علامات پائی جاتی ہیں جہاں ویدوں کی شاخیں زیادہ تر ہوتی ہیں۔ برعکس شریانوں اور پورٹل وین کا اجملع خون لاپور کے کناروں پر اور شاخوں و فسادات ہوتا ہے قطع شدہ حصہ کی سطح میں سفید زرد اور سرخ واریاں نظر آتی ہیں جو مایہ فصل کے مشابہ ہوتی ہیں۔ کیونکہ وسط میں سرخی زیادہ

ہو جاتی محیطیہ کا سفید رنگ کا ہوتا اور مریانی حصہ صفراوی نالیوں کے اجتماع سے زرد ہو جاتا ہے۔

محیط پرخون کم ہو جاتا ہے بہت سی ذرات چربی میں بھی بدل جاتے ہیں۔

پانزدہم۔ جگر کا مردار پر چرانا۔ گینگلون آف دی لور۔ یہ مرض عموماً ایس کے ضمن میں پیدا ہوتا ہے اسلئے

اسکے اسباب و علامات وغیرہ وہی ہیں جو ایس میں بیان کی گئی۔ دیکھو نمبر دہ میں دبلیہ الکبد کا بیان۔

سیزدہم۔ جگر کا سرطان۔ کنسر آف دی لور۔ جگر میں دوسرے اعضاء اندرونی کی نسبت سرطان

بہت کثرت سے ہوتا ہے کبھی تو ابتداً اور کبھی دوسری جگہ جسم میں ہو جانے کے بعد زیادہ تر پچاس اور پندرہ سال

کی عمر کے درمیان ہوتا اور موروئی طور پر ہی ہو جاتا ہے

علامات۔ کاٹھا ہوا اور چھپوتا ہوا اور سخت ٹھنک۔ یرقان۔ استسقاء۔ مرق البطن۔ پیری ٹونائٹس۔

جگر کا ناموار طور پر بڑھ جانا اور ابھرے ہوئے حصہ کا سخت اور دروناک ہونا سانس کے ساتھ رگڑ

کی آواز سمیٹھ ہونا۔

کیفیت۔ عموماً علیحدہ علیحدہ حصوں میں شروع ہو کر چھوٹی گٹھلیاں بناتا ہے جن میں سے بعض سخت

اور بعض نرم ہوتی ہیں نرم قسم کا کنسر بہت جلد بڑھتا ہے بیٹولنے سے سخت گٹھلیوں کے درمیان خیم

پلپٹائٹس محسوس ہو کر آتا ہے۔

ہفتدہم۔ ورم الکبد۔ بے ٹک انفلیشن۔ اسمیں تین اقسام شامل ہیں۔

۱۔ پیری ہے کھائی ٹس۔ یعنی جگر کی پیری ٹونیم کا ورم۔ اسمیں جگر کے مقام پر دبانی سے اور خود

بخود بھی درد ہوتا ہے۔ مگر افعال جگر میں کچھ خل نہیں آتا۔ سانس کے ساتھ ٹھیکف ہوتی ہے۔

اسلئے مریض کھینچ کر سانس لیتا ہے۔

۲۔ جگر کی گہری ساختوں میں ورم۔ اسمیں تیز کاٹھا ہوا اور چھپوتا ہوا اور داٹھتا ہے افعال جگر میں خل مگر آئندہ

خواب ہو جاتا ہے۔ زبان خشک اور میل آتھنا زرد قشقی زیادہ کبھی قبض اور کبھی اہمال ہوتے ہیں پیشاب سرخ

اور غلیظ آتا ہے کبھی استسقاء مرق البطن بھی ہو جاتا ہے بخا دلسل رہتا اور سردی یا لرزہ کے ساتھ

شروع ہوتا ہے۔

۳۔ جگر کی صفراوی نالیوں کا ورم۔ یہ مرض بچوں اور تفرس والوں میں زیادہ تر ہوتا ہے۔ اسمیں مدہ اور

دیوڈی نم کا ترلہ ہو کر یرقان ہو جاتا ہے۔ جگر کا مقام دروناک اور بخا دلسل رہتا ہے۔

اسیادخت گرمی کھانے پینے کے اعتدالی شراب۔ سیلیر یا ضرب۔ ورم نمکد۔ ۲۵ اور ختیس سال

کی عمر کے درمیان زیادہ تر ہوتا ہے۔

کیفیت۔ معمولی طور پر اجتماع خون ہو کر بالہ الدم اور ذرات الدم خارج ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جگر

اور اسکی سطح دانہ دار ہو جاتی ہے کائن سے زیادہ خون خارج ہوتا ہے کسی کسی ملکب کی قطرات بڑھ

چھوٹے چھوٹے ٹپھوٹے بناتے ہیں۔

قطع شدہ سطح پر سرخ زرد اور سفید چھان نظر آتے ہیں۔ پیری ہے ٹائش میں جگر ڈایا فلیم سے پیوستہ ہو جاتا ہے۔
ہشتم دم۔ ہائی پریسی آف وی لور۔ جگر کا اتجاع خون۔ دیکھو نمبر (۱۴) کا بیان۔

نوزدہم۔ ہائی ڈیٹ ڈز آف وی لور۔ یہ مرض ٹیڈا اکائی ٹوکاکس سے پیدا ہوتا ہے جو ایک قسم کے ٹپ وڈر یعنی فیتہ کے مشابہہ کیڑے ہیں جو کتوں اور بھیڑوں کے اندر پڑ جاتے ہیں جب انکو کھڑے ٹوٹ کر پرانے ساتھ انکو شکم سے خارج ہوتے ہیں تو گھمانے کے بعد ان کے او والے حصے بیضہ نکل آتے ہیں۔ جب یہ بیضہ کھلنے یا پینے کی شے کے ساتھ شکم انسان میں چلے جاتے ہیں تو ان بیضوں میں سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بچہ معدہ کی دیوار میں اپنے نش سے سوراخ کر کے جگہ میں جا لگتے ہیں۔ ابجگہ انکے پچھلے طرف تو ایک تھیلی پیدا ہو جاتی ہے جسکو ہائی ڈے نڈ کہتے ہیں گویا کہ پورا حیوان تو کھنوں اور بھیڑوں کے اندر ہوتا ہی اور وہی انکے مرنان میں گر انسان کے اندر اسکا ہائیڈ میڈ ہوتا ہے جسکو سکولیکس کہتی تھیلی دار صورت کہتے ہیں۔ یہ مرض آسٹریلیا میں بکثرت ہوتا ہے۔ ایک ہائی ڈے نڈ کی کیفیت حسب ذیل ہے۔


۱۔ سب سے باہر روق خون اور ریشوں سے بنا ہوا مضبوط غلاف ہوتا ہے جو مریض کی ساختوں سے بنتا ہے
۲۔ اس کے اندر دو تھول والی ایک تھیلی ہوتی ہے جسکی بیرونی تخت مضبوط اور قد سے شفاف ہوتی اور اندرونی تخت نہایت نازک ہوتی ہے جسکی سطح پر باریک رواں ہوتا ہے۔

۳۔ اس تھیلی کے اندر صاف شفاف پانی ہوتا ہے

۴۔ اس صاف شفاف پانی میں بہت سی چھوٹی تھیلیاں ہوتی ہیں جن میں سو اکثر توبانی میں پیرتی رہتی ہیں اور بعض اصل تھیلی کی دیوار سے لگی ہوئی ہوتی ہیں ہواصل تھیلی کو ڈر سٹ کہتے ہیں۔ اور ان چھوٹی تھیلیوں کو ڈائر سٹ جو تعداد میں سینکڑوں اور ہزاروں ہوتی ہیں اور بعض اوقات کل مدرسٹ کو بھر دیتی ہیں اور سخت میں مدرسٹ کو مشابہ ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی تھیلیاں ہوتی ہیں انکو اندر میسی نسل کی تھیلیاں ہوتی ہیں جنکو گرینڈ ڈائر سٹ کہتے ہیں (مدرسٹ یعنی ماں ڈائر یعنی بیٹی گرینڈ ڈائر یعنی پوتی)۔

۵۔ تھیلی کی اندرونی سطح پر سفید داغ نظر آتے ہیں جو کائی ٹوکاکس کے سکولیکس ہوتے ہیں اور جو کبھی علیحدہ علیحدہ اور کبھی مجموعہ ہوتے ہیں کبھی یہ پانی میں پیرتے رہتے ہیں ہر ایک سکولیکس پہلے پہلے سے ۱۱ پچھلے تک لمبا ہوتا ہے انکے سر پر ایک خرطوم اور چار منہ ہوتے ہیں خرطوم کے گرد نیشوں کی دوہری قطار ہوتی ہے جو سب متحرک ہوتے ہیں۔

خرطوم اور منہ کی تعداد



عموماً ایک ہی اسے ڈسے نہ ہوتا ہے مگر بعض اوقات دو تین یا زیادہ بھی ہو جاتے ہیں کبھی اس قدر بڑے ہو جاتے ہیں کہ کل شکم کو بند دیتے اور سانس آننا دشوار ہو جاتا ہے ڈائٹسٹ ایک باجوہ کے دانہ سے لیکر انڈے کے برابر ہوتی ہیں مگر گینڈ ڈائٹسٹ بہت ہی چھوٹی ہوتی ہیں انکے دباؤ سے دوسرے اعضا بے جگہ دیکر فاسد ہو جاتے ہیں کبھی کسی عضو کے ساتھ جکڑ چکی یا اس کے اندر چاکھلتی ہے مثلاً معدہ انٹری یا پھیپھڑے کے اندر رہ جاتا پانی کھانسی یا قے یا اسہال کے ساتھ خارج ہو جاتا ہے کبھی ضرب و بھی ہائیڈمیڈیٹ جاتا ہے کبھی ہائیڈمیڈیٹ میں ورم ہو کر پیپ پڑ جاتی ہے کبھی اسکی ساختوں میں خداداد کرچہلی یا چوہ پڑ جاتا ہے اس طرح جیسے یا متورم ہو جانے سے تحلیل ہو کر صورت اکرام ہو جاتی ہے اور محض ایک سکڑی ہوئی تھیلی باقی رہ جاتی ہے کبھی ایسی سٹ بھی دیکھی گئی ہیں جنہیں کوئی اکائی نوکاکس نہیں تھا انکو لے کیسے لوسٹ کہتے ہیں کبھی ایک تھیلی کے کوئی خانہ ہو جاتے ہیں اسکو ملٹی لاکول کہتے ہیں۔

علامات۔ جگر ناہموار طور پر بڑھ جاتا ہے ٹٹولنے سے تھیلی دار رسولی کا احساس ہو سکتا ہے۔ جگر کے افیاد میں کچھ خلل واقع نہیں ہوتا نہ درد اور بخار کی علامات ظاہر ہوتی ہیں عام ضعف اور کالیف بھی چنداں نہیں ہوتی جب بہت بڑی ہو جاتی ہے تب تنادٹ کھینچ اور گرانی تہتی صفر اوی نالی پر دباؤ دینے سے یرقان ہو جاتا۔ اور پورٹیل وین پر دباؤ پڑنے سے بواسیر عظم الطحال استسقا و مرق البطن اور اسہال ہو سکتی ہیں سانس کھینچا اٹا ہے اگر تھیلی چھٹ جائے تو دفعتاً سخت درد اور بے چینی ہو کر عشی ہو جاتی اور پیری ٹونانی ٹس ہو کر مریض ہلاک ہو سکتا ہے۔

ملاحظہ و کیفیت۔ تھیلی بند رہتی جاتی ہے کو بد رج غایت پھیلا دیتی اور سینہ پر دباؤ پہنچاتی ہے۔ جگر کے متصل ٹٹولنے سے ہموار نرم اور لچکدار اور بھار معلوم ہوتے ہیں۔ سینہ بین لگانے سے فری ٹس کی آواز سنائی دیتی ہے نگی داخل کرنے سے صاف پانی برآمد ہو سکتا ہے مگر یہ عمل نہایت احتیاط اور سوچ سمجھے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ملٹی لاکول سٹ سخت گروہ دار اور دردناک ہوتی ہے اس میں یرقان استسقا و عظم الطحال زیادہ ہوتے اور ایسی ہی سٹ میں ورم ہو کر پیپ زیادہ تر بڑھتی ہے۔

بسنو۔ یرقان۔ جانڈس۔ اکثرس۔ دیکھو بیان یرقان کا۔

علاج۔ اب ہم ذیل میں ان امراض کا علاج ترتیب وار درج کرتے ہیں۔

اول۔ اپو پیکسی آف وی لور۔ جگر کے اندر خون خارج ہو جاتا۔ یہ مرض عموماً مہلک ثابت ہوتا ہے اگر جریان خفیف ہو تو مریض کو آرام سے لٹائے رکھنے اور مقام جگر پر برقی تھیلی لگانے سے آرام حاصل ہوتا ہے۔

دوم۔ کیوٹ اٹرونی آف وی لور۔ اسکو ملو اٹرونی بھی کہتے ہیں۔ یہ مرض سخت مہلک ہے جو جموحنات معدنی مثلاً ایسڈ سلفیوک ڈائیوٹ اور ایسڈ ایدز و کلورک ڈائیوٹ ٹینکرا کونایت کونین اور کافور بعض اوقات اس میں مفید ثابت ہوئی ہیں۔ یرقان جریان خون عام ضعف و بیہوشی وغیرہ کا علاج قواعد کلیہ مطابقت کرتے

رہنا مناسب ہے۔

سوم کرائیک ٹرونی آف ہی لور۔ یہ مرض عموماً دیگر دیر پاے امراض کے ضمن میں عام ضعف اور لاغری کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے جگر کے کڑھوٹا اور سخت ہو جاتا ہے۔ اسکا علاج اصل مرض کا علاج ہے۔

چھٹم۔ البیومی نائڈوزیزہ دیکھو بیان البیومی نائڈوزیزہ کا۔

پنجم۔ بلیری ٹیچن۔ جگر کی نالیوں میں صفرا کا اجتماع ہو جانا۔ اسکا بیان یرقان میں مفصل درج کیا گیا ہے۔

ششم۔ بلیری کیلکولائی صفراوی پتھریاں پتہ میں پتھریاں ہو جانا۔ اسکا بیان بلیری کیلکولائی میں مفصل کیا گیا ہے پس اسکا بیان دیکھو۔

ہفتم۔ ٹیو برکوس آف ہی لور جگر میں سل کا مادہ پیدا ہو جانا جو عام سل کا علاج ہے مہی کا علاج ہو۔

پس دیکھو بیان نھائی سس اور ٹیو برکوس کا۔

ہشتم۔ دبلیہ الکید۔ سبے ٹک آپس۔ جگر کا پھوڑا شروع درج میں جبکہ سب نہیں پڑتی بلکہ محض انجمن خون اور دم ہو تو جگر کے مقام پر سینک کر نایا پوشین لگانا اور رفع درو کے لیے ماریفائی جلدی پچکاری کرنا

ورم کو رفع کر سکتی ہیں اگر پیش کے ضمن میں درم شروع ہو تو یہ گمان کرنا چاہیے کہ اغلباً پیش کا زہر یعنی امیبا کولائی یا انکا مادہ جگر میں پھنک کر اپنے فسادات کر رہا ہے اور قریب ہے کہ ورم کے بعد آپس بناوی۔ ایسے اپی کے کو انا

پندرہ میں گرین کی خوراک میں تین بار روزانہ کھلائیں تاکہ امیبا کولائی بھجان یا ہلاک ہو کر ورم رفع ہو جائے اور پیپ نہ بننے پائے جب پیپ پڑ کر آپس بن جائے تب عام پھوڑوں کی طرح اسکا ہی علاج ہے۔ کہ

ٹنگاف دیگر ڈیجیٹوب داخل کر دیں۔ اور کافی طور پر اینٹی سپٹک ڈرینج لگاتے رہیں۔

جس جگہ جلد سرخ اور ابھری ہوئی معلوم ہو اسی جگہ ٹنگاف دینا مناسب ہے کیونکہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جس طرف آپس رخ کر کے دیوار ٹک کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے عموماً آپس ابھری ہوئی جگہ پر جلد کے ساتھ پیوستہ

ہوتا ہے مگر ہمیشہ نہیں ایسے بہتر یہی ہے کہ ٹنگاف کو بتدریج گہرا کرتے جائیں اور اگر بالفرض ٹنگاف کی دیوار آپس کی دیوار سے علیحدہ معلوم ہو تو پہلے پرائیمل بری ٹونیم کو جگر کے ساتھ گہرے ٹانگوں کا رسیدیں پھر جگر میں ٹنگاف دیں تاکہ جلد زخون و سبب وغیرہ خارج ہو وہ مراقبطن کے اندر نہ جائے پائے۔

یہ یاد رکھیں کہ جگر کے چھوٹے کی تشخیص کوئی آسان امر نہیں ہے۔ ایسے ہمیشہ اوپر نشین سے پیشتر ضروری ہے کہ ٹنگاف اور کینولا داخل کر کے اپنی تشخیص کی تصدیق کر لیں۔ چونکہ جگر کے چھوٹے کی سپا اکثر بہت گاڑھی ہونے کی وجہ سے کینولا کو اندر لگانا داخل نہیں ہوتی ایسے کینولا کے ساتھ آپریشن کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ داخل کرنے میں ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ جو کینولا کا منہ پیپ کی غاریں گستا ہے تو میں فوراً پیپ چڑھ

آتی ہے ورنہ اندیشہ ہے کہ کینولا غار سے گذر کر آگے نکلیجائے اور تشخیص میں دھوکا دے دیکھو بیان آپس کا

کینولا داخل کرنے میں کوئی زیادہ اندیشہ نہیں ہو بشرطیکہ ایٹمی سپنک تدریس کی کامل طور پر پابندی کی جائے بلکہ معمولی
اجتماع خون اور ورم میں بھی اس سے خون کم ہو کر مرض میں تخفیف ہو جاتی ہے۔
اگر البیس کا اُبھار ایک جانب پر ہو تو پیلیوں کی محراب سے دو انچ اوپر بغل کے وسطی خط میں شکاف یوں پر ہو گا کہ
پلیوراکوڈایا فارم کے ساتھ سیکرہجہر جا میں شکاف دیں۔

بعض اوقات جگر کا پھوڑا اندر ہی اندر رتھ یا اترتی یا گردہ یا شش کے اندر کھتا ہے اگر علامات سے اس امر کی
ہو جاوے تو اوپر شش میں جلدی نہ کریں بلکہ انتظار کریں کہ پپ ایک طرف کسی عضو کے اندر سے اپنے اخراج کا سہارا
گم جگر کی رسیاں یہ بہت اقسام کی ہوتی ہیں جن میں سے سرطان اور ایڈیڈ گائیان بلیوہ کیا گیا ہے۔ دیکھو نمبر ۱۶
۲۰ کا بیان۔ باقی تمام رسیوں کا اعلان محض عام نکالنے کا وسیع ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ حد اختیار میں نہیں ہے
دھم سروسس آف وی لور جگر کے ریشوں میں پرانی سوزش ہو کر اسکا سخت اور کثرت ہو جانا چونکہ اس مرض
میں جگر کی سطح کھر سی ہو جاتی ہے اسلئے اسکا نام گرنیولر یا بیل لوب بھی ہے اسکو علاج کے لئے مفصلہ ذیل
صول اور تدابیر ہیں۔

(۱) اصلاح غذا چونکہ یہ مرض عموماً سطح ہی شروع ہوتا ہے کہ تیز گرم اشیاء مثلاً شراب بکثرت مہج و ترشی تبر
عصا بجات۔ آچار و چٹنی وغیرہ کے کھانے پینے سے جگر میں زیادہ خون پہنچتا ماضی ورم ہوتی رہتی ہے کچھ مدت
کے بعد یہ ماضی ورم دائمی صورت میں منتقل ہو کر جگر کے ریشوں میں پایدار سوزش پیدا کر دیتی ہے جس کا نتیجہ سروسس
ہوتا ہے۔ اسلئے اسکے علاج میں سب سے مقدم یہ امر ہے کہ شراب چٹنی آچار سرخ مہج وغیرہ تیز گرم اشیاء سے قطعی
پرہیز کریں اور سادی پنچاش سیرجہ الضمغہ اول کی ہدایت کر دیں مثلاً دو دو سادہ بخنی آتش جو کچھ جگر میں
اور دودھ جریو فیونی وغیرہ حسب پسند مرض دیکھتے ہیں۔ شراب کو قطعی پرہیز لازم ہے لیکن آخر درجہ مرض میں
جب کہ صحت کی طرف سیلابی ہوئی ہو اور سخت نقاہت ضعف غالب رہتا ہو تو قیام فوائی وارواں کو کیے
قلیل مقدار میں اسکی اجازت دیکھیں۔ زیادہ تر دودھ اور روغن۔ پرمعدہ و کھنا اس مرض کا علاج ہے۔ ساگو و انش
یا اراروٹ وغیرہ ہی رو د میں پکا کر دیکھتے ہیں۔ روغن اور صفائی حتمی الوسع کم مقدار میں دینے چاہئیں حیوانی غذائوں
سے پرہیز لازم ہے بناتی غذائیں جو عمدہ طور سے کئی ہوئی ہوں حسب موافق کھا سکتے ہیں۔

(۲) معدہ و امعاء کی حالت پر نظر رکھنا اور جو علامات نفخ سوزش اسہال وغیرہ پیدا ہوں انکا علاج کرتے رہنا جو تیز
گرم اشیاء جگر کی سوزش اور سروسس کا باعث ہوتی ہیں وہی معدہ و امعاء کو سوزش فساد و اضمحلال وغیرہ کا باعث
رہتی ہیں ساتھ ہی جگر کے سروسس کی وجہ سے کورنل دریدوں کا دوران خلل پذیر ہو کر معدہ و امعاء کے تھپہ چھوٹنے والے
اسہال الدم اور بواسیر وغیرہ کا باعث ہو جاتا ہے غذا معمولی طور پر ہضم ہونے کے بجائے فضلات رہ جاتی ہیں
بدل کر کبھی نفخ کبھی درد کبھی قبض اور کبھی اسہال پیدا کرتی رہتی ہے۔ اسلئے دوسرے تیسرے روز قبض
کشا جو ہوا کو ساتھ امعاء کو صاف کرتے ہیں انہایت ضروری ہے تاکہ یہ تمام شکایات رفع ہوں۔ ساتھ ہی

کم ہو کر اصل مرض کو بھی تخفیف دے اور قے الدم اسہال الدم وغیرہ بھی سکے رہیں۔ اگر بویسٹرا ہر ہو تو دبر کے گرد جو نکلیں لگوانا مفید ہوتا ہے۔ رفع قبض کے لیے پوڈوفلین۔ ایریڈین۔ صبر الہونی میں ہوزون میں بفر نفع کے لیے کرے روٹ اور تھانی مال مناسب ہیں اگر سوزش اور درد رہتا ہو تو بسمتھ۔

افیمون وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں

(۳) پوٹینکسچین کو تخفیف دینا اسکے لیے حب فیل تدا میر ہیں اس کا دوسرے تیسرے روز قبض کننا جوڑ کے ساتھ صاف کرتے رہنا۔ دبر کے گرد جو نکلیں لگوانا۔ جگر پر پولیٹین باندھنا یا نائٹرو پائڈر وکلو کرک ایڈ کا سینک کر نائٹرو پائڈر ایڈ کا اونس ہائڈروکلو کرک ایڈ ایک اونس گرم پانی ۱۵ سیر بخیتہ) بیان کیا گیا ہے کہ نائٹرو پائڈر وکلو کرک ایڈ کا داخلی استعمال بھی نہایت مفید ہے۔

(۴) علامات مندرجہ جو اس مرض کو ضمن میں پیدا ہوں ان کا علاج کرنا مثلاً قے الدم اسہال الدم اور اسانی ٹیز (استسقا مرق البطن) ان علامات کا علاج عام قواعد کے مطابق کرنا چاہیے جیسا کہ علیہ طور پر ان امراض کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے۔ ذیل میں مختصر طور پر اگلے علاج کے اصول درج کیے جاتے ہیں۔

۱) قے الدم اسہال میں قبض کشا اور یہ مثلاً صبر کیلوٹ۔ ایریڈین۔ ریوڈر جینی میگنیشیا سلفاٹ وغیرہ سے امعا کو دوسرے تیسرے روز صاف کرتے رہنا۔ دبر کے گرد جو نکلیں لگوانا۔ جگر پر پولیٹین لگانا یا نائٹرو پائڈر وکلو کرک ایڈ کا سینک کرنا۔ ڈالیوٹ سلفیو کرک ایڈ پلانا وغیرہ۔ ۲) استسقا مرق البطن جب پریٹ ہیں پانی پر جائی تو اسکو نکلی داخل کر کے نکال دینا چاہیے۔ جقدر دفعہ اس عمل کی ضرورت پڑے بار بار کر سکتے ہیں ساتھ مدرات صہلات اور معرفات کا استعمال کرتے رہیں اور مناسب غذاؤں اور دواؤں سے مرض کی طاقت کو قائم رکھیں

دیکھو بیان اسانی ٹیز کا۔

(۵) اگر سبوس کو کوئی خاص اسباب مثلاً آتشک یا میلیریا وغیرہ دریافت ہوں تو ان کا علاج کرنا چاہیے۔ آتشک کی حالت میں پوٹاسیم آیوڈائیڈ اور پارہ کا استعمال ضروری ہے۔ میلیریا کی حالت میں سسٹیمین اور کوئین مفید ہو سکتے ہیں۔

یازدھم سفس یعنی آتشک۔ اگر جگر کے اندر آتشک کو کوئی فسادات ظاہر ہوں تو ان کا علاج عام قواعد کے مطابق کرنا چاہیے۔ دیکھو بیان آتشک کا۔

دوازدھم۔ سور مزاج کبد جگر کے افعال میں خلل واقع ہو جانا۔ یہ خلل تین قسم کا ہو سکتا ہے۔ ۱) اس کے گلابی کوھینک فعل میں خلل واقع ہو جانا جسکی وجہ سے ذیابیطس ہو جاتا ہے پس اس کا علاج ذیابیطس جو ذیابیطس میں بیان کیا گیا۔ دیکھو بیان میٹینر کا۔

(۲) اخراج صفرا میں کمی یا بیشی ہو جانا۔ دونوں صورتوں میں علاج قرصا ایک طرحی جی جی صفر

اودو یہ مثلاً بوڈو اخلین۔ اینڈرین۔ اینڈرین کی کم۔ ایونی مین وغیرہ اودو یہ خفیف مہلات مثلاً اسٹریکٹ
مہبائی صبر کیسٹ اسکیروٹیکیلوٹو وغیرہ کے ساتھ دیتے ہیں۔ کہاری اور نکین مہلات بھی مفید ہیں۔
نڈامین لطیف سرعہ البضم صبا کہ سرورس میں مفصل بیان کی گئی کھلاتے ہیں۔ زیادہ تفصیل
کے لئے دیکھو بیان بلین کیس کا۔

(۴) جگر کی اس قوت تخلیل میں خلل واقع ہو جانا جسکی وجہ سے تمام البیون کی غذائیں یوریا اور یورک ایسڈ
وغیرہ مادوں میں متغیر ہو کر پیشاب اور پسینہ کے ساتھ خارج ہو جاتی اور باقی حصہ بضم ہو کر جزو بدن بن جاتا
ہے جب جگر کے اس نہایت ضروری فعل میں نسا د واقعہ ہوتا ہے تو خون کی وہ حالت جسکا نام تھیمیا
رکھا گیا ہے پیدا ہو جاتی ہے پیشاب میں ریگ خارج ہوتا ہے۔ گردہ مثانہ وغیرہ میں کنکریاں
پتھریاں بنی شروع ہو جاتی ہیں اور نفرس میں جمع مفاصل بھی ظاہر ہو سکتی ہیں جلدی امراض
مثل جنبل وادوہ وغیرہ پیدا ہوتے ہیں اسکو علاج میں نکین مہلات۔ مخرج صفرا اور کھائی اودوہ
مفید ہیں۔ دیکھو بیان یورک ایسڈ دایا۔ تھیس کا۔

سیزہ جگر میں پستری پڑ جانا فیٹی لور۔ اسکا علاج اسباب کے مطابق کرنا چاہیو پس اگر
معلوم ہو کہ مریض آسودہ حال ہو کھائے پیئے کوئی ہر قسم کی نعمتیں موجود رکھنا ہو مگر ست اوبہ کیا ہوتا ہے
اوپنی قسم کی ریاضت یا محنت اختیار نہیں کرنا تو اسکا کھلی ہو امیں کافی ورزش کرنے کی ہدایت کریں
مرغ غذاؤں سے پرہیز کر لیں۔ مٹھائی اور نشاستہ دار اشیاء کی نہایت قلیل مقدار میں اجازت دیں۔
غیر اب سوچی قطعی پرہیز لازم ہے خاص کر اس میں نہایت مضر ہوتی ہے اگر ضعف ہاضمہ ساتھ ہو تو سلفیو
ایسڈ ڈالمیوٹ۔ نائٹرو بائڈرو کلورک ایسڈ اور تلخ اودوہ مثل جراثیم کلبا منشیہ۔ وغیرہ و اسکی اصلاح
کریں نکین مہلات مثلاً سوڈی سلفاس گینیشیا سلفاس وغیرہ و اسکا کو صاف کرتے ہیں۔ اگر کسی مرض مزمن کو ضمن
میں جگر کے اندر جبری پڑنی شروع ہوئی ہے تو اس مرض کو خاص علاج کو ساتھ عام طاقت اور ورزش کی طرف
خیال رکھیں۔

چھلک دھمکنا۔ کچھن یا لپی پر سیا آف ڈی لور جگر کے اندر خون جمع ہو جانا جگر کا اجتماع خون یہ دو قسم کا ہو
سکتا ہے (۱) ایکٹو (۲) پسیو۔ ایکٹو کچھن سے مراد وہ اجتماع خون ہے جو کثرت شراب کثرت مصابحات۔ اجازت خانی
وغیرہ تیز گرم اشیاء استعمال سے خراش ہو کر خون زیادہ مقدار میں جگر کی طرف پہنچتا ہے اور زیادہ شرابوں میں خراب
واقعہ ہو کہ وہی محض مریض لگنے سے بھی ایکٹو کچھن ہو جاتا ہے۔ اسکا علاج یہ ہے کہ مریض کو فہر کم تیز گرم اشیاء
کے استعمال سے پرہیز کر لیں اور ان لطیف سرعہ البضم غذاؤں کے استعمال کی اجازت دینا چکی مشرق سرورس
میں پوکی ہے اگر مریض کی سست مٹھی ہوئے اور جھک کر کام کرنے کی عادت ہو تو اسکو ملکی ورزش مثلاً پساؤ
سیرگشت یا سواری کی اجازت دیں۔ نکین مہلات و اسکا کو صاف کرنے میں جگر کے تمام پریوشین

لگائیں سینک کریں یا گرم پانی کے تریٹے دیں سخت حالتوں میں دبر کے گرد جو کلیں لگانا مفید ہو۔ اگر احتیاس اس حالت کی وجہ سے اجتماع خون ہو تو اسکا مناسب ایسے سے علاج کریں۔ دیکھو بیان ایفینوریا کا۔
 کینسر یا سچن اس سے مراد وہ اجتماع خون ہے جو امراض قلب یا شش وغیرہ کی وجہ سے دوران خون کے جگر کی وریدوں میں خون جمع ہو جائے۔ اس مرض کو علاج کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اصل مرض کا قواعد کلیہ بیان کرنا چاہیے اور ساتھ ہی امعا کو نمکین مسہلات کو ساتھ صاف رکھیں تاکہ وریدوں کا پانی خارج ہو کر اجتماع میں تخفیف ہو جائے۔

پانزدہم۔ گینڈرین آف دی لور جگر کا مردار پڑ جانا۔ یہ مرض عموماً ایسے کو ضمن میں پیدا ہوتا ہے اور اسکا علاج بھی انہیں اصول و تدابیر کے مطابق ہے جو ایسے آف دی لور میں بیان کی گئی ہیں اسکا بیان دیکھو۔
شانزدہم۔ بیلگنٹ ویز آف دی لور جگر کا سرطان۔ کینسر آف دی لور۔ یہ مرض لا علاج ہی۔ اور آخر کار ہلاک ثابت ہوتا ہے۔ در و کو مار فیال جلدی بچکاری سے خفیف کرنے رہنا اور صحت و طاقت کو عام قواعد کے مطابق قائم رکھنا چاہیے۔ اصل مرض پر طبیب یا جراح کا کچھ اختیار نہیں۔

ہفتدہم۔ ورم الکبد ہے ناک العظیمیشن جگر کی ورم اسکا علاج کے لئے مفصلہ ذیل تدابیر ہیں۔
 مسہلات سے امعا کو صاف رکھنا اور اجتماع خون کو کم کرنے رہنا جگر کے مقام پر پولشیں لگانا۔ یا نائٹریٹس ناک ایڈ سے سینک کرنا۔ دیر پر جو نمکین لگانا۔ غذائیں لطیف سرلیج الہضم دینا وغیرہ وغیرہ۔
 تیشیج کے لئے دیکھو بیان وبلۃ الکبد اور کینسر جگر کا۔

ہیزدہم۔ ہائی پریسیا آف دی لور جگر کا اجتماع خون دیکھو بیان کینسر آف دی لور کا۔
نوزدہم۔ ہائی ڈیڈ آف دی لور۔

اس مرض کے علاج میں تمام ادویہ میوڈ ثابت ہو چکی ہیں۔ ڈاکٹر سمولا صاحب پوٹاسیم آیوڈائیڈ کا مفید ہونا اکثر یہ طور پر بیان کرتے ہیں آیوڈو فارم کی بھی بہت تعریف کی گئی ہے۔
 جھوٹی تھیلیوں کے لئے مفصلہ ذیل جراحی عمل مفید بیان کئے گئے ہیں۔
 (۱) باریک سوئی تھیلی کے اندر داخل کر کے دس پندرہ منٹ اندر کے چھوڑنا سوئی کے داخل کرنے اور نکالنے میں نہایت احتیاط لازم ہے۔

(۲) بجلی کے تار اندر داخل کرنا۔

(۳) ٹیپ کر کے پانی نکال لینا۔ اس مطلب کے لئے ایک گلاس سرنج جیمیں دو اونس پانی آسکے اور اسکی سوئی معمولی جلدی بھکاریوں کی نسبت زیادہ مضبوط اور لمبی ہو نہایت موزون ہو سوئی داخل کرنے کو بعد سٹ کا پانی باسانی کھینچ سکتے ہیں سب سے کچھ پانی نکال کر عموماً گرم ہلاک ہو جاتا ہے اور دوبارہ اس عمل کی ضرورت نہیں پڑتی بعض اوقات ایک دفعہ ٹیپ کرنے کے بعد تھیلی پڑ جاتی اور اسکا او بجا پہلو کی نسبت زیادہ معلوم

ہونے لگتا ہے اسکی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تھیلی کی دیوار سے رطوبت خارج ہو کر اصل پانی کے ساتھ
لمبائی ہے جو کچھ مدت میں خود بخود جذب ہو جایا کرتی ہے اسلئے جب اس قسم کی زیادتی معلوم ہو تو کم از کم
ایک سال تک دوبارہ ٹپ کرنے کا ارادہ نہ کرنا چاہیے۔

جب مفصلہ بالابتداء سے صورتاً ام سیدانہ ہو اور تھیلیوں کا حجم بڑھتا جائے تو آخری علاج یہ کہ شکم کو نمونہ اور تھیلی
میں ٹنگاف دیکر اسکو صاف کریں اور ڈرنیج ٹیوب لگا کر صاف کرنے میں ٹنگاف کو ایسے بہتر مقام وہ ہے جسجائے تھیلی
کا ابھار نمایاں طور پر معلوم ہو ورنہ ریکٹس عضلہ کے بیرونی کنارہ کے ساتھ ساتھ کاسٹل آج سے ایک ماہ بچھڑ
دو دوائی انچ لمبا ٹنگاف دیکتے ہیں ٹنگاف کو وقت ہر ایک ساخت کو کھال احتیاط کے ساتھ قطع کرنا چاہیے۔
جس قدر خون جاری ہو اسکو ساتھ کے ساتھ بند کرنے جائیں جب پیری ٹونیم کے قریب پہنچیں تو احتیاطاً معلوم کریں
کہ سٹڈیو از شکم کے ساتھ پیوستہ ہے یا علیحدہ اگر پیوستہ نہ ہو تو اسکی دیوار کو زخم کے کنارہ پر ریلے ٹل مہری ٹونیم
کے ساتھ سیدیں بعد میں ٹنگاف دین تاکہ اسکا مواد باہر آجائے اور مرقا البطن کو اندر خارج نہ ہو سکے اگر سٹ بہت
بڑی اور تنیدہ ہو تو پہلے اسپرے کے ذریعہ کیقدر پانی نکال سکتے ہیں تاکہ سینے میں دقت نہ ہو ٹنگاف دین کے بعد
گرم مہری لوشن کی دہار کے ساتھ تمام تھیلی کو ہر چار طرف سے خوب صاف کریں تاکہ تمام چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ٹوٹ کر
باہر آجائیں بعد میں ڈرنیج ٹیوب اخل کر کے اینٹی سیپٹک ڈرینگ لگادیں۔

اگر تھیلی بہت بڑی ہو اور جگر کے کنارہ سے ابھر کر دایسے پیچھے پڑے کو بھی اوپر کٹیف دبائے سکے اور دایسے جانب
میں اسکا ابھار معلوم ہو تو نفل کے وسطی خط میں آٹھویں ہلی کے نیچے ٹنگاف کی تجویز کر سکتے ہیں اگر ٹنگاف کے بعد
تھیلی اور ڈایا فرام دیوار سینہ کے ساتھ پیوستہ معلوم ہوں تو اسوقت ٹنگاف دیکر کھول سکتے ہیں۔ ورنہ ڈایا فرام
میں ٹنگاف دیکر تھیلی کی دیوار کو کاسٹل پیور کے ساتھ سیدیں اور دو تین روز کے بعد جب وہ باہم پیوستہ ہو جائیں پھر
تھیلی کو کھول کر معمولی عمل کریں یعنی اس میں ٹنگاف لیکو گرم مہری لوشن کی دہار سے خوب صاف کریں اور ڈرنیج ٹیوب
لگا کر اینٹی سیپٹک ڈرینگ لگاتے ہیں۔

جگلیٹین - جو گلاس الباکا بیان دیکھو۔
جگنو گرم شب تاب پٹ پٹ جینا۔ گلو درم حاجب تین عدد ونا سفرس کی طرح سخت نہر ہے۔ اگر ایک جگنو کا سڑکا
خشک کر کے ہینگ کو خساندہ کے ساتھ پیسے تو تین روز میں گردہ و مثانہ کی پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے نکال دے
ہے خشک جگنو کو رومن گل میں حل کر کے کان میں بٹکانا بہرے پن کا دافع ہے۔ اور ایلوے اور سفیک
کے ساتھ بوا سیر کے منول کو گرا دیتا ہے۔

خ ایک سرمدہ و خشک کردہ۔
جلکا یا جلیک سہ تینا کی طرح اھا کو ترکیب بجز اسکی رطوبتین خارج کرنا اور سہل تر پیدا کرنا ہے۔ زیادہ مقدار
میں بڑے و خشک نہیں ہی رقیق و سستا آواز شریع ہو جاتے ہیں۔ خمر اگر شکست طپ دیکو نہ خفا ہلا کر

لو جلد کو ۲۰ گرین تک ٹیکر چاہ نصف ڈرام سے ۴ ڈرام تک چلو پین اگرین سے ۵ گرین تک سفوف بلب، اگرین جو ۳۰ گرین تک۔

جل پیل کی کھ کھاضی - سنویری -

خارجی استعمال میں سخت خراش کرتی اور زخم ڈالتی ہو۔ ہلکی سوار سے سخت چھینکیں لنی ہیں اس کا لپ گنج پھینسیوں سموں اور دانوں کو ناف ہے۔ اسے تپوں کا حمل سقط حمل و مد حیض ہو صرف خارج استعمال کی جاتی ہے۔

جل پیل فیصل الہی فیصل المار، تقویٰ محد و جگر، باضم غزا ہے۔ اس کے تپوں کا لپ حمل اور ام و نشانات جلدی ہے سیاہ مریج کو بجائے کھانے میں بھی ڈالتو ہیں، ستر نصف ڈرام سے ۴ ڈرام تک۔

جل جانا - احراق کا بیان دیکھو۔

جلد کے امراض - امراض جلدی کی تقسیم نہایت مختلف طریقوں پر کی گئی ہے۔ اگر تمام اقسام کی تشریح مختصر طور پر بھی کی جاوے تو کئی ضخیم جلدیں بھی لکھنی نہ ہو سکیں اس لئے ذیل میں ہم محض ایک آسان طریق پر امراض جلدی کی تقسیم اور اثاب بیان درج کرتے ہیں۔

اول و امراض جلدی جو خاص امراض مثل چیچک، خسرہ، چولا، کنکھی، سکارلیٹ، فیور، چکن، پاکس، ٹائیفس، ٹائیفائیڈ وغیرہ کے ضمن میں ظاہر ہوتے ہیں ان امراض کی تعریف اور تشخیص علیحدہ علیحدہ درج کی جا چکی ہے۔

دوم۔ وہ امراض جو خاص جلد کی سوزش سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی حسب ذیل اقسام ہیں۔

۱۔ ارے جی مے ش انقلیمیشتر۔ یعنی وہ سوزش جو جلد کی بیرونی تہ پر ہی محدود ہے مثلاً ارگ پی - روزیولا۔

۲۔ کٹارل انقلیمیشتر یعنی وہ سوزش جو جلد کی تمام تہوں کو افروختہ کر کے رطوبت بکثرت خارج کرنی ہو مثلاً چینل

۳۔ میپور انقلیمیشتر۔ یعنی وہ سوزش جس میں جلد کے اندر سے سخت اور نحوس پھنسیاں نمودار ہوں مثلاً

لای کن - پرورای گو۔

۴۔ دیسی کو لرا انقلیمیشتر یعنی وہ سوزش جہاں آبی رطوبت والو اچھالے نمودار ہوں مثلاً ہرنیر پیٹھی گس۔

۵۔ ایچپور انقلیمیشتر۔ یعنی وہ سوزش جہاں پ و الو اچھالے نمودار ہوں مثلاً ایسے ٹائی گو - کنکھی ما۔

۶۔ سکونے مس انقلیمیشتر یعنی وہ سوزش جہاں جلد کے اوپر گول گول طبقہ جھلکوں کی چٹیں پیدا ہوں۔

سویڈر۔ وہ امراض جو خاص طور پر فسادات خون کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں مثلاً آتشک، جذام، خنازیر وغیرہ۔

چھکمرہ۔ وہ امراض جو جلد کی زائد بالیدگی کی وجہ سے پیدا ہونے میں مثلاً انٹن - رسہ کیلا انڈر فایبر و مارفی۔

سکے نوڈر مارکھیوسس والی فیٹلے کے سنس جلدی رسیولیاں۔

پنجم۔ وہ امراض جو جلد کے زایل ہونے سے پیدا ہونے میں مثلاً ضعیفی میں جلد تلی اور کھرت ہو جاتی ہے۔

ششم۔ وہ امراض جو جلد کے اندر فاسد مادہ پیدا ہوئی وجہ سے ظاہر ہوں مثلاً واپس - سوڈنٹالسٹر

ہفتم۔ وہ امراض جو جلد کی تہوں میں خلیج خون کی وجہ سے پیدا ہوں مثلاً پوریا اور سکروی میں سرخ نشان یا دوسری

عام بے چینی اعضا شکنجی و ج مفاصل اور خفیف بخار کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔
علاج علیحدہ درج کیا جا چکا ہے۔

(ب) سر و زنیولا۔ اس میں سرخ دھبہ مختلف مقدار اور حیثیت کو نمودار ہو کر جلد جلد غائب ہوتا اور
نئے ظاہر ہوتے رہتے ہیں بچپن میں معدہ اور دانوں کی خرابی سے یہ مرض پیدا ہوا کرتا ہے
بعض اوقات دوسرے امراض مثل چیچک۔ و ج مفاصل مہیضہ خسرو اور سری برو سپائٹل
کے ضمن میں پیدا ہوا کرتا ہے۔ زیادہ چہرہ پر ہی ظاہر ہوتا ہے۔

(ج) ارٹی کیریڈا۔ رگ پتی۔ دم شری۔ اس مرض میں تمام جسم پر سرخ دانہ دار دھبے دفعتاً ظاہر
ہو کر جلد جلد غائب ہو جاتے ہیں جن میں جلن اور کھجلی بہ شدت ہوتی ہے سخت جالتوں میں بخار
بھی ہو جاتا ہے۔ یہ مرض اکثر بار بار ہوتا رہتا ہے۔ و حقیقت ورم کچھ نہیں ہوتا بلکہ محض جلد کی ہیر
پڑت میں دفعتاً اجتماع خون زیادہ ہو کر رگ پتی اوچھل آتی ہے۔ علاج علیحدہ درج کیا گیا ہے
(د) پیسورس۔ اس میں ہونے لگنے کا یا پیلیو نڈاھیوے ٹی کا۔ اسکی ریش ناخت ہو کہ پہلو بخت کے
ساتھ جوڑوں میں درد ہو کر سرخ سرخ دھبہ اطراف پر نمودار ہو جاتے ہیں جو اکثر دوبارہ سہ بارہ
عود کرنے لگتے ہیں۔

رہا امری تھیا پرینو۔ اس سے مراد وہ سرخی جلدی ہے جو بچانے سے پیدا ہو۔
(و) امری تھیا لینیوی۔ اس سے مراد وہ سرخی جلدی ہے جو زیادہ کھڑے ہونے سے متورم ناگوینہ
نمایاں ہو جایا کرتی ہے۔

(م) کٹارال انکلیمیشنر۔ یعنی وہ سوزش جو جلد کی تمام تہوں کو افروختہ کر کے رطوبت بکثرت خارج کرتی ہے
اسکی دو اقسام میں جو ذیل سے صاف ظاہر ہیں۔

(۱) اگزیمیا۔ چنبیل۔ اس میں تمام تہوں کا تڑلہ ہو کر جلد موٹی اور دردناک ہو جاتی۔ رطوبت بکثرت خارج
ہو کر بہتی رہتی یا غلیظ ہو کر بطور پتھریوں یا کھنڈوں کے جمتی جاتی ہے۔ بالوں کی جڑیں خراب ہو کر
اکھڑ خانی ہیں یہ مرض چہرہ اور سر پر بہت کثرت سے ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن جسم کے ہر ایک حصہ کو مبتلا
کر سکتا ہے لمحاظ مختلف صورتوں اور حیثیتوں کے اس کے مختلف نام ہیں بشرطیکہ جب پھنیاں
نمودار ہوں تو اگزیمیا ہے پو لوزم کہلاتا ہے اگر آبی حوالہ پیدا ہو جائیں تو اگزیمیا و سی کلوزم۔ اگر پیپ
حوالہ ظاہر ہوں تو اگزیمیا سیمپل پو لوزم اور اگر سخت کھربے دانہ پیدا ہوں تو اگزیمیا نوڈوزم کہلاتا ہے۔
بعض اوقات جلد پھٹی شروع ہو جاتی ہے یا سوزش اسکو اگزیمیا سے موزم کہتی ہیں اگر بقدر کھنڈ جمنے
شروع ہوں تو اگزیمیا سیکلوزم کہلاتا ہے یا پھر سوزش بہت ہوتی ہے علاج علیحدہ درج کیا چکا ہے
(ب) ڈرمٹائیٹس جب جلد کا تڑلہ خاص اسباب سے ظاہر ہو مثلاً دھوئیں کے یا خوشبو

اصرتیج دکن میں کثرت پینہ کی وجہ سے یا کسی جگہ پر کوئی تیز واصل روغن جہاں کو نہ بھلاواں کرای سو فینا کلسٹ
شہنشاہین، روغن رائی وغیرہ جلا اندرونی طور پر مثل سنگریا۔ دھتورہ، بیلا ڈونا۔ مارینا۔ انیون بروانڈر، کورل
بائریٹ۔ پوٹاشیم آیوڈائیڈ، کلائیائیسیلک اسلک ایسڈ وغیرہ کھانے سے اسکو ڈرے ٹائی ٹس کہتے ہیں۔

(۳) پورائٹلمیشین یعنی وہ سوزش جلدی جس میں سخت اور ٹھوس پھنسیاں نمودار ہوں اسکے دو اقسام ہیں۔
(۱) پورائٹلمیشین خشک خارش جو کبھی کبھلی اس میں چھوٹی چھوٹی سخت پھنسیاں تمام بدن پر متفرق طور سے نمودار
ہوتی ہیں جو کھجانے سے کھچ جاتی اور اکثر سرخ رہتی ہیں اس میں کھچلی شدت رہتی ہے بعض اوقات اس میں
ہو کر آبی یا سپ دا چھالوں میں تغیر ہو جاتے ہیں۔

(ب) لائیکن۔ اس میں بے شمار چھوٹے چھوٹے دانہ جلد کی رنگت کو باخبری مائل پیدا ہونے میں جن میں سے
بعض بعض گھچون میں اور باقی متفرق طور پر ہونے میں۔ ان میں گرمی میں اور خارش ہوتی ہے۔ اکثر
دانوں کی چوٹی پر ایک چمکا دیزہ یا چمکا سا نظر آتا ہے جسے ککوت اور گچھوں میں ہوں وہاں جلد بھی
سیاہی مائل ہو جاتی ہے جب دانہ چھلون میں ترتیب یافتہ ہوں تو اسکو لائیکن سرسی نے ٹس کہتے ہیں
جب متفرق طور پر یا بعض بعض جگہ گچھوں میں ہوں تو لائیکن پینس کہلاتا ہے۔ یہ مرض اکثر عود
کرنا رہتا ہے۔

(۴) ویسی کو لریٹلمیشین یعنی وہ سوزش جلدی جس میں آبی رطوبت والی چھالوں نمودار ہوں اسکے
تین اقسام ہیں۔

(۱) ہریدیز اس مرض میں پہلے سرخ نورم جیسے نمودار ہو کر پھر چھوٹے چھوٹے سخت دانہ ظاہر ہونے میں
جو بند رتج آبی رطوبت سے بھر کر چھوٹے چھوٹے چھالوں کی صورت پکڑ لیتے ہیں۔ اور آخر کار خشک کھڑک
بن کر اتر جاتے ہیں۔ جب اس قسم کی پھنسیاں اعصاب کو بہتہ پر ظاہر ہوں تو اسکو ہریدیز اسٹریٹس کہتے ہیں۔ یہ
ہریدیز اسٹریٹس یعنی اور سینڈ کو اعصاب پر اکثر ظاہر ہوتا ہے اس واسطے ہریدیز اسٹریٹس کہتے ہیں اور ہریدیز اسٹریٹس
اسٹریٹس اس علیحدہ علیحدہ نام سے بھی پکارا جاتا ہے جب عضو تناسل کو نقاب پیدا ہو تو اسکو ہریدیز
پری پونیٹس کہتے ہیں تمام اقسام ہریدیز شروع سے در وطن اور شیش شدت سے ہوتی ہیں۔ ہاتھوں
اور ٹخنوں پر اسکی پھنسیاں بھرا میں بنایا کرتی ہیں اس واسطے اسکا نام ہریدیز کہتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ
اور فیتے اس میں منہ کے اندر تا لو پر بھی دانہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مرض متعدی ہوتا ہے اور اگر عود
بھی کرنا رہتا ہے۔ عکاحیم علیحدہ درج کیا جا چکا ہے۔

دوب ایلمینیٹس اس مرض میں بڑے بڑے چھال آبی رطوبت سے پیدا ہونے میں جو مریض کو بہت
کمزور کرتے ہیں کبھی علیحدہ علیحدہ اور کبھی خوشنوں میں ہوتے ہیں۔ بعض انکو کے برابر اور بعض
بیضہ مریض کے برابر ہو جاتے ہیں۔ ان میں طین اور شیش شروع سے کم ہوتا ہے۔

(ج) سروپیا۔ اس میں منفرد چھوٹے چھالے دوانی کے برابر پیدا ہوتے ہیں۔ ان پر گہری چھوڑے رنگ کے کھرنڈ جھانٹے میں جکڑ کر جانے سے مکرور زخم بجاتے ہیں۔ ان چھالوں میں ابتداء سے خیم کدرا یا کڑی طور پر ہوتی ہے مگر وہ چھالوں کو پوسے طور پر نہیں کرتی

(د) لیچیا۔ اس میں سوزش جلدی جس میں سب وار ابلہ پیدا ہونے میں اس کو دو اقسام ہیں۔
(۱) لمبے ٹائی گو۔ یہ ایک متعدی مرض ہے جو اکثر بچوں میں ہی ظاہر ہوتا ہے یہ منفرد طور پر ابلہ ہوتا ہو کر رہتے جاتے اور خوشون میں جمع ہوتے رہتے ہیں عموماً دس یوم میں خشک کھرنڈ بن کر جھڑ جاتے ہیں مگر اس مرض میں سوزش رہتا ہے اور آخر خود بخود جاتا رہتا ہے۔

(ب) اکٹھیما۔ اس مرض میں چھوٹے چھالے مرتفع سطح پر متفرق طور سے پیدا ہونے میں جو دس اور چودہ یوم درمیان خشک ہو کر جھڑ جاتے ہیں مگر چھال کا فساد محض سطحی ہوتا ہے اس لیے کھرنڈ اترنے کے بعد کوئی داغ یا نشان نہیں رہتا عموماً نانا انگوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔

(۴) سکوپس میں اس میں سوزش جلدی جس میں جلد کے اوپر گول گول جھکڑ چھلکوں کی چٹین پیدا ہونے کے دو اقسام ہیں۔

(۱) سورایسس۔ اس میں مخی مایل مرتفع دھبہ متفرق طور سے جلد پر نمودار ہوتے ہیں جن کا سطح بچھوٹے چھلکوں کے مطابق ترتیب یافتہ ہوتے ہیں جو باسانی کھرچے جاسکتے ہیں بعض بعض چھلکوں کے نیچے چھوٹی چھوٹی سخت پھنسیاں بھی ہوتی ہیں پرانی چٹین وسطی صاف ہو کر سورے سے بنو لارس کے نام سے نامزد ہوتی ہیں جو رفتہ رفتہ چھلکوں کی شکل بچھوٹے چھلکوں کی بناوٹ میں اور جب بہت سی مل جکر جال بناویں تو سورے سے فگور اٹایا سورے سر گائی ریٹا کہلاتا ہے۔ علاج علیحدہ درج کیا جا چکا ہے۔

(ب) پٹی راسیسس۔ روبرا۔ اس کا دوسرا نام جنرل اکسفولی ٹوڈر ہے ٹائی شن جھکڑ اس مرض میں جلد کا موٹا حصہ بہت موٹا کھردرا اور سخت ہو جاتا ہے اس کی جلد پر چھلکوں کی تہیں جمی ہوئی نظر آتی ہیں یہ مرض پھیلتا پھیلتا تمام جسم کی عصبیت بنا دیتا ہے تمام جلد موٹی سخت اور کھردری ہو جاتی اور جھلی اترتی رہتی ہے۔

سوئم وہ امراض جلدی جو خاص طور پر فسادات خون کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں مثلاً جذام۔ اٹشک۔ سکرافیلا وغیرہ کا بیان علیحدہ کیا گیا ہے۔

چھلکرم وہ امراض جلدی کی بنیادیں ہیں جو جسم کے تمام اقسام میں ان کی مفصل ذیل اقسام ہیں۔
ادل کارن۔ اس میں یہ مرض جونی پستے سے اکثر باؤں کی انگلیوں پر ہو جاتا ہے جو تھکی انگلی اور رگڑ کی وجہ سے جلد خراب و موٹی ہو کر کارن بناتی ہے جو اکثر بہت دردناک ہوتا ہے علاج علیحدہ درج کیا جا چکا ہے۔

(۳) اکتھیوسس :- ایک پیدائشی مرض جو چین تمام جلد رفتہ رفتہ مچھلی کی جلد کے مشابہ ہو جاتی ہے۔
 مخض متھلیاں پاؤں کے تلوی چہرہ اور اعضاء نہانی صاف ہوتی ہیں پہلے نوسام نہیں رطوبت منجم
 ہو کر جلد سخت اور کھردری ہو جاتی ہے پھر خراب ذرات جلد کے چہرے شروع ہوتے ہیں۔ یہ ذرات علیحدہ
 چوگوشہ قطعات میں جمع ہو کر کھردری اور اٹھی ہوئی پیش بناتے ہیں یہ چین رفتہ رفتہ خراب ذرات
 اور یکن کچیل سے دور نہ بڑھ کر سنگ کی طرح سخت اور پانی نکت کو مچھلتے ہیں۔

(۴) مولسکیم فرم :- ایک قسم کی چھوٹی چھوٹی گھنڈیوں کو مشابہ زرد یا آبی رسیاں ہوتی ہیں جو جلد کے گہرے ذرات
 کی بالیدگی سے بنتی ہیں مختلف صورتوں اور مقدار کی ہوتی ہیں اکثر بلاؤندی کے ہوتی ہیں بعض فکندی
 بھی ہو جاتی ہیں ان کو فاکا برو بھی کہتے ہیں۔

(۵) وروکایا وارثس :- اس میں جلد کی گلیاں بڑھ کر چھوٹے چھوٹے خار دار دانوں کی طرح نمودار ہوتی ہیں
 علاج :- علیحدہ دوا کیا گیا ہے۔

(۶) کانڈی لوما :- یہ چھوٹے چھوٹے لکھی اور بھار ہوتے ہیں جو جسم کے ایسے مقام پر پیدا ہوتے ہیں جہاں
 جلد اور یوس جھلی یا ہم ملتے ہیں مثلاً مقعد فرج کی لید اور شغہ بغل اور چھوٹے پیر بھی ہو جاتے ہیں۔ اکثر آتشک
 کے باعث سے ہوتے ہیں۔ علاج :- علیحدہ دوا کیا جاتا ہے۔

(۷) ڈرمی ٹوٹس :- اس مرض میں تمام جلد انداز سے بہت زیادہ اور موٹی ہو جاتی ہے اور اسکی تہیں جا بجا
 ٹٹک جاتی ہیں۔

(۸) مارفی :- اس مرض میں تھیلی کے برابر جلد کے قطعات کھردری سخت اور موٹے ہو کر مازی گلابی رنگت کی ہو جاتے
 ہیں جن میں نہ تو حس باقی رہتا ہے نہ بال اکثر ہیں اور نہ پسینہ یا سیم خارج ہوتا ہے باقی سطح کی نسبت یہ قطعات
 کس قدر عمیق ہوتے ہیں۔

(۹) سکلر وڈر مایہ :- یہ مرض مارفی کے مشابہہ مخض فرق اس قدر کہ یہ زیادہ عام اور وسیع ہوتا ہے اور جلد موٹی اور
 سخت ہو جاتی ہے جب یہ مرض کسی جوڑیاں کھ یا ناک یا کان یا منہ یا فرج کے قریب واقع ہو تو ایک طرف
 کی جلد کو کشیم جانی بد وضعی ہو جاتی ہے۔

(۱۰) سکلر ریما نیو ٹورم :- یہ نورائیدہ بچوں کا سکلر وڈر مایہ ہے جو تمام جلد کو سخت اور موٹا کر کے طرح طرح کی بد وضعی
 پیدا کرتا اعضاء پر دباؤ پہنچاتا اور عموماً بچہ کو ہلاک کر دیتا ہے۔

(۱۱) کیلائیڈز :- یہ نہایت سخت جرمی رسیاں ہوتی ہیں جو ضرب یا جلنے کے بعد ہو جاتی ہیں بعض پیدائشی ہوتی ہیں
 پیچھے محوہ امراض جو جلد کے پتلا اور زایل ہو جانے سے ظاہر ہوں ضعیفی میں اور نیز بعض اوقات تشک
 کی وجہ سے جلد تلی اور کمزور ہو جاتی ہے جس کا نام انڈوفیا کیوش ہے۔

ششتم :- وہ امراض جو جلد کے اندر فاسد مادہ پیدا ہونے کی وجہ سے ہوں مثلاً لوئس۔ روٹا۔ السرس سلطان۔ انکا

بیان صلیحہ کیا جا چکا ہے۔

ہفتہ وہ امراض جو جلد کی تہوں میں اخراج خون کی وجہ سے پیدا ہوں مثلاً پریوراک اور سکروی تیس چونکہ یہ صلیحہ کوئی امراض نہیں ہیں بلکہ عام امراض سکروی و پریوراک ایک جز ہیں اس لیے ان کا بیان علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ پس دیکھو بیان سکروی اور پریوراک۔

ہشتہ وہ امراض جو جلد کے اعصابی فسادوں سے واقع ہوں مثلاً قوت حس کا اعتدال سے کم یا زیادہ ہو جانا خود بخود گرمی یا سردی یا جلن یا میس یا گدگدی وغیرہ کا احساس ہونا کھجلی سورہ وغیرہ یہ تمام صلیحہ امراض نہیں ہیں بلکہ دیگر امراض اعصابی کی علامات ہیں۔

نہ وہ امراض جو جلد کی رنگوں میں کمی بیشی ہونے سے پیدا ہوں۔ انکی مفصلہ ذیل اقسام میں۔

۱) لیوکوڈرمیا و ایٹھ لیگو سفید ارغ۔ اسکو عربی میں برص کہتے ہیں جابجا جلد پر سفید ارغ پڑ جاتے ہیں۔ جابجا تان میں نہایت چھوٹے چھوٹے ہوتے پر رفتہ رفتہ بڑھتے جاتے ہیں۔ عوام الناس اسکو کوڑھ جانا مکر لیتی ہیں حقیقت میں یہ کوڑھ نہیں ہوتا

۲) کلوزما۔ اس میں گول یا بیضوی دھبہ زردی یا سیاہی یا لیل جلد پر ظاہر ہوتے ہیں۔ جہاں دھبوں کی رنگت سیاہی یا لیل ہوتی اس مرض کو ملاصلا۔ یا جھاٹین بولتے ہیں۔ یہی سسے سس ورسی کو لارکو بھی کلوزما کہہ جاتے ہیں۔

۳) ملینوڈرمیا یا می لے نوچیا جلد کی رنگت کا تغیر ہو جانا خواہ کسی سبب سے ہو مثلاً سیلیریا یا آتشک جل۔ جلدی امراض ایڈی سنٹروڈیز وغیرہ سے۔

دھ وہ امراض جو جلد کے اندر حیوانی یا نباتی مخلوقات کے گہرے سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو اقسام حسب ذیل ہیں۔

۱) جوں پرجانا۔ اسکو انگریزی میں پیڈی کلوس یا تیسریٹس کہتے ہیں۔ علاحدہ صلیحہ ص ۱۱۱ کیا جا چکا ہے۔
۲) ترخاش کیل کھجلی یعنی سکنیز اس مرض میں ایک قسم کا باریک جیوان جسکا نام لکے رس سکولی یا راج مانیت ہو جلد کے اندر جگہ کے سخت خارش اور سوزش پیدا کرتا ہے جسکی وجہ سے جلد میں سوزش ہو کر جابجا پھنسیاں اور جھجکا وغیرہ نمودار ہو جاتے ہیں۔ جلد بہت جگہ سے متورم ہو کر پھٹ جاتی ہے یہ مرض سخت متعدی ہو جوانوں میں زیادہ تر ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان سلوت کرتا ہے بچوں میں چوڑا اور کنج۔ ان پر عورتوں میں پستان کے قریب ہوتا ہے۔ دیکھو بیان سکے بیزکا۔

۳) ٹینا فاورا۔ اسکو فاورس اور پودائی گو بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک متعدی مرض ہو جو ایک نباتی مادہ آکوڈن شان لینا ای نام کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے بچوں کا سر اسکی عزیز جگہ ہے۔ گندھکی رنگت کر پالی نام سخت کھر ٹہنا دیتا ہے جنہیں چوہوں کی سی بو آ کر تھی ہے۔ ان کھر ٹہنوں میں بھر بھرے بال جھڑھوئی ہوتے ہیں جو

خود بخود گرتے رہتے ہیں۔ ناخون ہونڈھوں قضیب فوطوں بازو اور رانوں پر بھی بعض اوقات یہ مرض ہو جاتا ہے۔
شعث خلش اور سوزش کی وجہ سے قریب قریب اگر یا پھنسیاں اور پھوٹے بھی ہو جاتے ہیں۔

۴۴) ٹینیا ٹرائی کوئی ٹینیا۔ رنگ ورم واد اس مرض میں پہلے سرخی یا لچھوٹے چھوٹے نقطہ پیدا ہوتے ہیں جو تھوڑے ہی عرصہ میں بڑھ کر گول چکروں کی شکل پکڑ لیتے ہیں بعد میں جلد سرخ ہو کر اس پر چھوٹی چھوٹی تیز سرخ پھنسیاں ہو جاتی ہیں جب یہ پھوٹ جاتی ہیں کھنڈر مثل سبوسہ کے جھڑ بن جاتے ہیں۔ ابتدائی چکر بڑھ چھوٹی شکل پکڑتے رہتے ہیں۔
خارش بکثرت ہوتی ہے اسکی غریبہ ران چوڑے گردن اور پشت میں جب ٹینیا سرخ ہو کرے تو اسکی ٹینیا نانسور انس بولتے ہیں۔ سر اسکی ابتدا اسی طرح نقطوں اور چکروں اور جھلوں سے ہو کر بالوں کو بھی بھر کرتی جاتی اور آخر کار تمام سر کو گھنا بیتی ہے جب یہ ٹینیا واڑی کے مقام پر چلا آوے تو اسکو ٹینیا ساسی کوگ کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی اسطرح جھلے بکر سبوسہ اترنا شروع ہوتا اور ساتھ بال بھی جھڑنے لگتے ہیں۔ جب یہ ٹینیا ناخون پر چلا آوے تو اسکو کزخت بے آب و ثابا اور سخت کرے تو اسکا نام ٹینیا انجیدو ہے جب جسم کو کسی اور حصہ پر چلا آوے تو اسکا نام ٹینیا سراسی ناٹا ہے۔ پس ٹینیا ساسی کو س ٹینیا ٹانسوس ٹینیا انجیم نے تحقیقت ایک ہی قسم کے نبات پیدا ہونے ہیں جبکا نام ٹینیا ٹرائی کوئی ٹی نا ہے۔

۴۵) ٹینیا وسی کولار۔ چھپ بہن۔ پٹی سراسیس و سراسی کولار۔ کلونز ما۔ اس مرض میں پہلی ندری یا لچھوٹے چھوٹے دلغ پیدا ہونے میں جو تندرینج بڑھتے جاتے اور باہم مل کر تمام سینہ پر چھلٹے ہیں۔ انکی سطح کسیدراؤچی ہوتی ہے جسکا امتیاز کرنا مشکل ہے۔ داغوں پر چھوٹے چھوٹے بھوسی کی شکل کے سبوسے لگی ہوتے ہیں یہ مرض کل جسم پر ہو سکتا ہے مگر زیادہ تر سینہ شکم اندام ہانی بغل و بازو پر ہوتا ہے خاصہ کپی کم اور کبھی زیادہ ہوتی ہے۔

یاندھو۔ بالوں کے امراض۔ اکابیان علیہ کیا گیا ہے پس نکھویان بالوں کے امراض کا۔
دواندھم۔ پینہ کے امراض۔ اکابیان علیہ کیا گیا ہے پس نکھویان پینہ کے امراض کا۔
سیدھو۔ بے شش غدود کے امراض۔ اکابیان علیہ کیا گیا ہے پس نکھویان بے شش غدود کے امراض کا۔
چھل دھو۔ ناخون کے امراض۔ اکابیان علیہ کیا گیا ہے پس نکھویان ناخون کے امراض کا۔
جلق۔ میسٹیشن رشت زنی۔ اس سے مراد وہ تمام ناگفتنی بد فعلیاں ہیں جن میں انسان اپنی منی کو جلق کرے سوائے اور و امیات طریقوں سے زالی کرتا ہے۔ اس خلاف ورزی کے نتائج اسکو اول و آخر پہنچنے پڑتے ہیں جبکی مختصر فہرست حسب ذیل ہے۔

اول تو خیر عمر میں یہ جوہر طور پر عام منی کے بکثرت زائل ہونے سے تمام قوائے ضعیف پڑ جاتے اور غمت اور حسرت کی بجائے کاہلی اور پستی غالب ہوتی ہیں۔ تمام دن بیکار رہنا اور سست سیٹھنا یا پڑنا خوشگوار معلوم ہوتا ہے۔ قوت فکر و غور اور فہم و ادراک نہایت پست اور آوارہ ہو جاتی ہے۔

دومہ۔ خاص عضو کی استناد کی ضعیف پڑ جاتی اور اسکی درمیں بھول جاتی ہیں شہوت بہت جلدی غالب ہوتی لیکن قیام بالکل نہیں رہتا ضعف باہ نامردی سرعت انزال۔ کثرت اختلام اور جریان لاحق حال ہو جاتا تو ہیں۔ ان امراض کے لاحق ہونے سے مریض ان تمام لائید سے محروم ہو جاتا ہے جو صحبت عورت سے حاصل ہو سکتی تھی بلکہ اکثر عورات کا قرب اسکے لیے شرمناک اور خوفناک ماجر ہو جاتا ہے۔ اول طبق زرد و کثرت عورت کے قرب سے استناد کی اور شہوت حاصل ہی نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی بھی ہو تو دخول کے وقت فوراً انزال ہو کر دم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ہر عورت کی شہوت براگھنٹہ ہو کر لٹنا اور لپٹنا چاہتی ہے مگر اس طرف کوئی دم باقی نہیں بلکہ طبعی اور فراس کی پڑ رہی ہے بہ طر سے ایک دفعہ کی جماع کے بعد دوبارہ اسکا خیال یا ارادہ محال ہو جاتا ہے۔

سوم۔ قبل از وقت منی کے بے طرح زائل ہوتے رہنے سے خصیہ ایسی خراب ہو جاتے ہیں کہ اصل منی پیدا کر کے قابل نہیں رہتے۔ ایسے ایسے شخص ہمیشہ کو اسطرح قوت تولید سے محروم رہ کر اولاد سے بے بہرہ رہتے اور مقوی ذہنی اور دہی کے لیے سرپیٹتے رہتے ہیں۔

چھٹا۔ وحشت، یققان۔ اختلاج القلب، ضعف اور اسی لاحق حال ہو جاتے ہیں۔

پنجم۔ بعض اوقات کثرت جلق و اغلام وغیرہ کی وجہ سے جنون، الیغویا صرع، رعشہ، اختناق الرحم وغیرہ سخت لاعلاج و اعنی امراض بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔

اس نامر اور غلیظ عادت کا رواج بھی استعد ہے کہ حاجت بیان نہیں۔ یہ عموماً بچپن میں اسطرح سے شروع ہوتی ہے کہ جلد شغفہ کو اندر میں کھچ لیا یا پیشاب وغیرہ جمع ہو کر یا پتھری مثلاً یا چٹوٹ وغیرہ کی وجہ سے عضو تناسل میں خراش پیدا ہوتی ہو جس سے بچہ اکثر سپاسی کو کپڑا کر لٹا اور کھجلا تا ہے۔ اس سے عضو استادہ ہو کر شہوت ظاہر ہوتی اور عضو کا ملنا خوشگوار معلوم ہونے لگتا ہے۔ اسطرح سے رفتہ رفتہ مشت زنی کی عادت ہو جاتی ہے چھوٹی عمر میں فتنہ کر دینا اس نامر اور ہلک عادت سے بچنے کا ایک بڑا بھاری ذریعہ ہے۔ اگر کوئی اور مرض عضو تناسل کو قریب موجود ہو مثلاً سنگ مثلاً نہ چلنے وغیرہ تو اسکا فوراً علاج کر دینا بچہ کو اس عادت سے روک سکتا ہے۔ ان اسباب کے علاوہ خیر یہ فتنہ چون کی صحبت اکثر نادان بچہ کو اس بد کرداری میں مبتلا کر دیتی ہے جس سے بچا ناماں باپ کا فرض آتا ہے اور کمال ہوشیاری اور دانائی چاہتا ہے۔ اس ملک میں لڑکیوں میں عادت جلق بہت کم سننے میں آتی ہے مگر دیگر ملکوں کی نسبت نہایت عبرتناک قصہ سماع میں آتے ہیں۔ لڑکیاں اور بیوہ عورتیں آتش شہوت کو فرو کرنے کے واسطے طرح طرح کی تجاویز ایجاد کرتی ہیں جنکلیان اس کتاب کے احاطہ سے باہر ہے غرض کہ یہ عادت خواہ لڑکیوں میں ہو یا لڑکیوں میں سخت نامراد اور اپنے نتائج میں نہایت ہی خوفناک ہے۔ اسبغہ پر مختصر اسکا ذکر کر رہے ہیں ہمارا مطلب محض اعداد ہے کہ اسکے نقصانات غیر متناہی سے اطلاع پاکر والدین اپنی معصوم اولاد کی بہتر تربیت کے طرف خاص توجہ کر سکیں مگر انصوف اس سہ معاملہ کی طرف عموماً کوئی توجہ نہیں کی جاتی اور بچہ رہ

نادان بچوں کو اس آدم خور بلا کا شکار بنا کر دین اور دنیا کی نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔
جل کھنبی۔ سطر اطی طیس۔ دافع سوزش اور عابس الدم ہے محض غار جا اسکو استعمال کرتے ہیں۔

جل نیم۔ خارجی استعمال میں سوزش کرتی اور زخم ڈالتی ہے۔ ورموں پر بطور کاؤٹری ٹٹ استعمال کر سکتے ہیں

جسمان کا بیان۔ مرد کا اپنی منکوحہ عورت کو ساتھ جائز طریق سے صحبت کرنا جماع کہلاتا ہے۔ یہ فعل اپنی

کیفیت موجودہ اور نتائج کے لحاظ سے تمام انسانی افعال میں اعلیٰ درجہ پر خاص خاص آداب کی پابندی چاہتا ہے

کیونکہ اس کے نقص و محال پر تمام حسن معاشرت اور اولاد کا نقص و کمال منحصر ہے اگر خواہش صادق اور جائز طریقوں کو

ساتھ جماع کیا جائے تو اعلیٰ درجہ کی لذات انسانی اور ضروریات صحت جسمانی میں سے ثابت ہوتا ہے۔ اور برعکس

اس کے اگر کاذب خواہشوں اور بیہودہ طریقوں سے کیا جائے تو انسان اس کی خاص لذات سے ہی محروم نہیں رہتا بلکہ تمام

قوت جسمانی و دماغی کو سخت نقصان پہنچاتا ہے جہاں تک گذشتہ تاریخ انسان پر نظر پڑتی ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ

تمام دانشمندیوں اور بزرگوں کی اس فعل کے آداب پر خاص نظر رہی ہے حیوانات میں یہ فعل محض ایک جذبہ شہوت پورا

کرنے کے واسطے ہوتا ہے اس کے ضمن میں تسلسل نوع قدرتی طور پر ظہور پذیر ہو جاتا ہے۔ مگر انسان میں اس فعل کے

مقاصد اور آداب کچھ اور ہیں جن کی پابندی بقائے نوع التوازن نفس حسن معاشرت صحت والدین اور نسل کے لیے نہایت

ضروری ہے۔ مگر افسوس کہ جب قدر انسانی حالت اخلاقی اور جسمانی سلسلیں روز بروز تسلسل کرتی چلی جاتی ہیں اس قدر اس فعل کے

خاص آداب کی پابندی متروک ہوتی جاتی ہے جس کا نتیجہ اس عالم میں بھلی جی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا اور خود کو گناہ پر تائب و تائب

نابست کرتی ہے کہ ایک وقت وہ تھاجیک اندے لگ کرے۔ اور پھر وہ ناقص القوا و ضعیف الفطرت بچہ پیدا ہی نہیں ہوتے

تھے اور اگر ہوتے بھی تھے تو اس قدر کم تعداد میں کہ کالعدم کے برابر تھے جس کا نتائج سے بہت نہیں ملتا ان کی تمام زندگی امراض

صاف رہتی تھی۔ بڑی بڑی عمریں پاتے اور آخر کار عطرطبی کو پہنچ کر مرض موت میں ہی مبتلا ہو کر رہی ملک بقاء ہوتے تھے

اور اب وہ زمانہ ہے کہ شاید میں فیصدی سے زیادہ بچہ ناقص الفطرت و ضعیف القوا پیدا ہوتے ہیں جو طفولیت میں ہی

ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر زندہ رہے تو ہمیشہ کے لیے اپنی ذات اور اپنے والدین اور رفیقو نذر وبال جان سمیٹ کر

کبھی کوئی مرض ہے کبھی کوئی مرض غرض کہ ہمیشہ کے لیے صاف تندرست نہ بنایا شاذ و نادر امر ہو گیا جو یا دھرم عورتوں کا

حال سنو کہ بے ادبی اور خلاف ورزی تو ان میں جماع کی وجہ سے ہمیشہ ہسپتالوں یا طبیہوں کے دروازوں کی غیر معمولی

ہاضمہ اور شہتہا کا ہمیشہ فاسد رہنا عام ضعف۔ اختلاج القلب۔ صدرع۔ دوران سرکان اور سستی لاحق حال رہنا

تو ایک معمولی بات ہے۔ ان تمام امراض کی اگر غور سے تحقیقات کی جائے اور مرد و عورت اپنے خفیہ چال چلن کو صاف طور پر

ظاہر کر دیں تو ثابت ہو جائیگا کہ تمام نتیجہ جماع کی بے ادبیوں کا ہے۔ صاف جان آپ میری اس طرز کلام پر زیادہ نہ ہنس کر
در اصل یہ فعل ہر ایک انسان کو خاص خاص آداب چاہتا ہے۔ اور اگر کوئی بشر ان آداب کو ترک کرے تو اسی عالم میں سخت
سخت سزائیں قدرتی طور پر پگھلتی پڑتی ہیں جس کی تفصیل ہم انشاء اللہ تعالیٰ مختصر ذیل میں درج کریں گے۔ یہ مضمون بذات
خود ایسا وسیع اور قابل توجہ ہے کہ اپنے لیے ایک علیحدہ کتاب چاہتا ہے۔

یہ فعل ایسے عجیب عجیب اسرار سے بھرا ہوا ہے کہ انکے تمام معقولات اسرار دانوں اور حکیموں کی نظر میں اس میدان میں ہوتا
مگر دانی اور حیرانی کو کچھ حاصل نہیں کرتی۔ ہاں حیدر عجایب واقعہ ہونے مشاہدہ کرتے ہیں لیکن انکو اسرار و حقائق پر حاوی نہیں
ہو سکتی کیا وجہ ہے کہ ایک ہی والدین کے بہت سی اولاد ہوتی ہو کبھی لڑکی ہو کبھی لڑکا ایک سیدہ کی ایک شہتی۔ ایک
سالم الفطرت اور صحیح القول ہے۔ اور ایک ناقص الفطرت اور ضعیف القول۔ ایک صحیح اور تندرست ہو اور ایک مریض و لشکر اللہ۔ یا
اندھا وغیرہ کیا وجہ ہے کہ ایک بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے اور دوسرا باپ کو ایک دونوں میں سے ہر ایک کو نقص و نگار اور اخلاق و
قوایک لکھتا ہے اور ایک دونوں سے بالکل نرالا ہوتا ہے۔ ایک حسین و خوبرو والدین کے ایک نوحہ بین اور وجہ یہ پیدا
ہو جاتا ہے دوسرا بد شکل اور کریمہ۔

ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک عورت کا خاوند مر جاوے اور بعد میں وہ عورت دوسرا خاوند کر لے تو دو ایک بچوں تک پہلے
خاوند کی شکل صورت کو لڑکے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کیا تاثر اور کیا حال ہے پہلے خاوند کی سہنی نے اسکا انشیں پر سطح
سے ایسا دیر پا اثر ڈال دیا اور کیا کر دیا غرض کہ اس قسم کے اسرار نہر اسد نہر دیکھو میں آتے ہیں جنکو ابھی تک انسانی تحقیق
نے حل نہیں کیا اور بلا کر اسرار میں شمار ہوتے ہیں۔

بیان کیا گیا ہے کہ جامع کے قریب اور قرآن کے بعد بقدر مرد و عورت میں باہم گہری محبت اور الفت ہو جتدر انکی صحت
اعلیٰ درجہ ہو اور جتدر انکی اخلاقی و دماغی اور روحانی حالت عمدگی اور بہتری پر ہو اور جتدر پورے عورت کی شہوت اور
کے ساتھ جامع کی بجا کی اور جتدر زیادہ لذت اور فرحت حاصل ہو اسی قدر اولاد حسین و جمیل صحیح القوائے کمال الفطرت اور
مبارک پیدا ہوگی۔ برعکس اگر جتدر انہیں باہم تفراد و مخالفت ہو جتدر انکی صحت خراب ہو اور جتدر انکی اخلاقی و
دماغی اور روحانی حالت ابتور و فاسد ہو اور جتدر ضعیف شہوت اور کم رغبتی کے ساتھ جامع کیا جائے اور جتدر
لذت حاصل میں کمی واقع ہو اور جتدر اولاد بد صورت کریمہ منظر ناقص القوائے بد اطوار اور بد بخت پیدا ہوگی۔ اکثر
انہیں سے جب تک کہ شکم مادر میں ہیں اور سکودائیم المرض اور خستہ حال رکھیں گے بعض انہیں سے پیش از وقت گرجا
بعض ایسے ضعیف القوائے پیدا ہونگے کہ چند روز دنیا میں ہو اکھا کر چلنے لگیں گے جو زندہ رہے وہ خزانہ رسل و رکنش وغیرہ اسرار
کاشکا بنینگے بعض اندھے یا بے بالنگر یا اونچے پیدا ہونگے بعض ہمیشہ کے اسہال قبض۔ بعض بھی غیر میں مبتلا ہوں
بعض بد اخلاق اور بد اطوار ہو جائینگے بعض شاہ و دلاک چوہوں کی طرح جسے عقل بے حواس اور سادہ لوح رہینگے۔
العرض تمام ناقص پیدائش فسادات جامع یا نقص والدین کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لئے کاشتوت ہم کو بنانات اور حیوانات
کے تجربہ اور مشاہدہ کی کافی طور پر ملتا ہے بنانات کی عمدہ پیدائش کے لئے پہلے عمدہ تخم کا ہونا ضروری ہے۔ پھر زمین
مناسب اور عمدہ ہونی چاہیے تخم بھی خاص خاص طریقوں سے اور خاص موسم میں لگایا جائے اور بعد میں اسکی نگہداشت
بھی مناسب طور پر ہو چوٹی و عمدہ طور پر بچوں اور بچلنا ہے ورنہ یا نقصان ہو جائے یا ناقص اور بے پھل ہو جاتا ہے
خواہ تخم میں کوئی نقص یا خرابی ہو یا زمین یا طریق و وقت کاشت میں یا بعد کی نگہداشت میں تو ہرگز ہرگز اسکا
بچلنا اور بچلنا کمال طور پر نہیں ہو سکتا۔

عورت بھی مرد کے لیے ایک کھیتی ہے۔ بقول سبحانہ تعالیٰ **نِسَاءٌ لَّكُم مِّثْلُكُمْ حَوْتَ لَّكُمْ** لکھ پھیر دکانفہ بجائے تخم کے ہو رحم
 انشیں بجائے زمین کے مناسب وقت پر جماع کرنا مناسب موسم کی کاشت اور ایام حمل کی بھرائی یا بعد کی بھگدشت
 ہے پس جو قدر یہ تمام اجزا کامل اور صحیح ہو گئی اس قدر نسل عمدہ ہوگی۔ **اولیٰ** تو نطفہ صحیح و سالم بننا چاہیے جو اسی حالت پر
 ممکن ہو سکتا ہے جبکہ تمام قوای حسانی و دماغی و روحانی پوری پوری صحت و عافیت کی حالت میں ہوں۔ **دوم**۔
 انشیں اور رحم کا عمدہ حالت میں ہونا تاکہ نطفہ کو بخوبی قبول کر سکیں۔ **سوم** جماع کے وقت مرد و عورت کا ایسا باہمی
 ارتباط اور التفات ہو کہ گویا کہ دو جسم اور روح نہیں بلکہ عین جوش و لذت کی حالت میں ایک ہی جسم اور ایک ہی روح
 معلوم ہوتا کہ نطفہ کے ساتھ تمام قوای و اعضاء کو کاست کامل طور پر بھگدشت و اندر قرار پذیر ہو جائے اور اصر عورت
 اپنی تمام خواہشوں اور طاقتوں کے ساتھ لٹکے جذب کرنے اور پکڑنے کی کوشش کرے۔ غرضیکہ کوئی قوت اور کوئی
 خواہش نہ مرد کی طرف ہو سو وقت میں علیحدہ یا پریشان رہنی چاہیے اور نہ عورت کی طرف جو قوت یا خواہش ایشی قوت
 میں کسی کی طرف ہو علیحدہ رہنا چاہیے وہی تفصل و لاد میں ہمیشہ کو لیے قائم رہیگا اگر عمدہ ہو اور اسکی توجہ ضم غذا کی طرف
 مصروف ہو اور خون بھی معمول کی نسبت اسکی طرف زیادہ آ رہا ہے تو بچہ کے حمل میں نقصان رہ کر ہمیشہ کی بیماریوں
 اور ضعف کا موجب رہیگا اگر دماغ تفکرات یا صدمات وغیرہ کی وجہ سے پریشان حالت میں ہو تو دماغی قوے
 ہمیشہ کے لیے ناقص رہ جائیں گے اگر کسی بد خیالی یا بد فعلی کی وجہ سے جماع کے وقت اخلاق اور رزق کا حال
 خراب ہو تو بخل و بے دین بچہ پیدا ہوگا اگر کسی عضو مثل لکھ ناک کان جگودل پیچھے وغیرہ میں کوئی مرض ہو جو
 ہے تو اسی قسم کا مرض نطفہ کے ساتھ جا کر بچہ کا اور انگیر رہیگا اگر خون میں تشنگ یا سل یا خنیر یا وجع اللغافل یا جربان
 وغیرہ کا مادہ ہو تو وہی مادہ نطفہ کے ساتھ خارج ہو کر بچہ کے خون کو خراب کر دے گا۔ اگر جماع سے پہلے اترنا جگر تار یا
 یہودہ تنکبہ اندر دخی بانڈ ہوتا آیا ہے تو نطفہ خصوصیت نفاق اور تکرر کنگ چڑھ کر بچہ میں ہی اتار دینا اور اگر خدا
 پرستی عبودیت اور پاک باطنی کی حالت میں اس نے صحبت کی ہو اور عورت کا بھی یہی حال ہے تو خدا پرست نیک ہوا
 غریب طبع بچہ پیدا ہوگا۔ اگر ناموافق عورت کجالت میں صحبت کی ہے تو اغلباً اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت
 کم ہوگی۔ یہ سب سائل میں جو نے الحال خیالی طور پر قائم کئے ہیں اور حکی تصدیق یا کذب محققین کی مزید تحقیقات پر منحصر
 حیوانات کو تخریب اور شاہدہ بھی ان سائل کا ثبوت کتاب ہے مختلف حیوانات کو عمدہ طور پر پرورش کیے گئے اور مزار
 خاص حالتوں میں مادہ کو رکھا گیا تو بعض حالتوں میں نہایت عمدہ نسل پیدا ہوئی اور بعض میں ضعیف اور کمزور مخلوق
 کے اثرات کا حال شاید ہر شخص جانتا ہے کہ جنکو مناسب حرارت پہنچتی رہتی ہو انہیں بچہ ہو جاتا ہے ورنہ گندہ کل جانی
 میں مصنوعی طور پر انڈوں کو حرارت پہنچانے سے جس میں کیساں اور مناسب حرارت کا پورا پورا انتظام کیا جاتا ہے۔
 شاخ و مادہ ہی انڈے خراب جاتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جس مرغی کے ساتھ ایک مد سے زیادہ دھندلے مرغی جتنی
 کہ لٹکے انڈے ناقص ہو جاتے ہیں یعنی کثرت جتنی سے مرغی کے انشیں کو نقصان پہنچتا ہو جس پر
 وہ صحیح انڈے بنانے کے قابل نہیں رہتی عمدہ اصل کے گھوٹے عمدہ نسلوں کے واسطے طویلوں میں پرورش

کئے جاتے ہیں چھ ماہ تک ایام حل میں عورت کی خاص نگہداشت ضروری ہو کثرت تفکرات اور ترددات سے آزاد رہنا۔
تمام اصول حفظ صحت کی پابندی سے اپنی صحت اور طاقت کو قائم رکھنا ہر قسم کے بدادوں بد عادات بد اخلاق اور بیزاری
کے خیالات اور حرکات سے بچنا صحیح اور نیک اولاد حاصل کرنے کے لیے ضروری امور ہیں۔

استدقہ عید کو بعد میں ذیل میں اس مضمون کو علیحدہ علیحدہ کر کے بیان کرتے ہیں۔

اول جماع کو مقاصد و مطالب۔
دوم کس وقت اور کس حالت میں جماع کرنا چاہیے تاکہ وہ مقاصد اور مطالب پورے حاصل ہو سکیں۔
سوم عورت کو ساتھ طرز معاشرت۔

چہارم طبی طور پر کین حالتوں میں کثرت از و وجہ جائز ہے۔
پنجم کیا ایسی کوئی تدبیریں جن سے والدین کو کون یا لڑکیوں کی بیدار شیش پر قادر ہو سکیں۔
اول جماع کے مقاصد و مطالب۔

راجماع سے پہلا مقصود جو تمام مخلوقات حیوانی میں بالائے شریک کھجا جانا ہے بقائے نوع ہے اسلئے انسان
لائم ہے کہ ہمیشہ اس پر مقصد کو مد نظر رکھ کر ایسے اوقات اور ایسے طریق اور ایسی حالتوں میں جماع کرے اور
اپنی عادات اور اخلاق کو اس قسم کا بنا جو عمدہ نسلیں پیدا کرنے کے لیے موزوں ہوں جب تک شہوت صا
طور پر غاب نہ ہو اس وقت تک جماع کا ہرگز ارادہ نہ کرے اور جماع سے پہلے عورت کو خوب اوس و کنا اور دلفریب
باتوں سے براہ گنجہ نہ ہو اس وقت تک جماع کا ارادہ نہ کرنا سخت ظلم میں داخل ہے ایسی حالت کو جماع سے فرق منظم کو نہ صرف
عارضی تکلیف پہنچتی ہے بلکہ طرح طرح کے امراض مخصوصہ متعلقہ رحم و انبیس پیدا ہونیکا اندیشہ ہے اور اگر طفلہ ذرا
پاہلے تو اولاد میں طرح طرح کے جسمانی و دماغی اخلاقی اور روحانی نقص واقع ہو جاتے ہیں تمام کمزور و اہل الض
اور ناقص الخلقہ سے بچو مایوسی ناموافق شہوت سے پیدا ہونے میں عورت کو لینے لازم ہے کہ جب وہ غیش شہوت
کی حالت میں اوسکو اپنی طرف بلائے تو فوراً خوشی اور محبت کو ساتھ اسکی خدمت میں حاضر ہو جائے خواہ کیسی ہی
کام میں مصروف ہو کیونکہ جماع موافق اعلیٰ درجہ کی ضروریات بشری میں ہو ہے بلا عذر بیماری یا حیض و نفاس وغیرہ
انکار یا کراہت ظاہر کرنا اس کے لیے جائز نہیں بلکہ اکثر اوقات سخت بخشش اور فسادات کا باعث ہو جاتا ہے دیگر حیوانات
میں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب مادہ گرمی پر آتی ہے یعنی اسکی شہوت افروز ہوتی ہے اس وقت وہ خود کو چاہتی ہے
تب زور دے اسکی طرف رغبت کرتا اور خوشی میں مشغول ہوتا ہے جب تک مادہ کی اپنی شہوت غالب نہ ہو اس وقت تک
وہ نہ کر اپنے قریب نہیں آنے دیتی مگر یہ کلیہ قاعدہ نہیں بہت حیوانات میں اسکی استثنائیں موجود ہیں بعض
حیوانات میں زور دے کرنا اور مادہ کو دبانے کے لیے جھانکنا اور زبردستی دیکھ کر لینا ہے مادہ چند انکار کرتی
اور اوسکی گرفت سے ٹکرا جاتا ہے یا جتنی ہو کر کوجہ کم طاقتی کے اور کاجہ کم نہیں ہوتا اور زبردستی مادہ کو دبا کر اپنی حالت
پوری کر لیتا ہے مگر انسان میں اسکی کیفیت دیگر کوں سے نہ ہو کہ باہر ہے کہ زبردستی خوش جانہ طور پر عورت پر

حلا آور ہو۔ اور نہ عورت پر جائز ہے کہ جب اسکی اپنی شہوت برافروختہ ہو اسوقت ہی مرد کو پاس آنے دے بلکہ حیا
مرد کو شہوت ہو اسوقت فوراً اسکی طلبی پر برضا و رغبت حاضر ہو جائے اگر شہوت پہلے سے نہیں ہے تھوڑی دیر
کے ماساں و دبوس و کنار اور شیرین گفت و کلام سے جماع کے لئے طیار ہو سکتی ہو اور جب عورت خود چاہے تو
مرد کو بھی بلا کسی عذر معقول کہ اسکو مایوس الوقت اور شکستہ خاطر نہ کرنا چاہیے قرآن مجید میں اس بارے میں اس طرح
پراشاد ہو۔ **نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاَتُوا حَرْثَكُمْ اَفَنْتُكُمْ وَ قَدْ مَوَّالًا نَفْسِكُمْ**
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَلَاقُوهٗ وَنَسَبِ الْمُؤْمِنِينَ یعنی عورتیں تمہاری
کھیتی ہیں جسکو تم اولاد حاصل کرتے ہو پس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آمد رفت کرو انسی جیسے چاہو ماساں کرو پھر
کنار کر محبت آئینہ باتیں کرو و رغبت کیوقت جماع کرو مگر یہ تمام نسل ایسے طریق سے کرو کہ ہر ایک حرکت آئندہ کیوسط
ہر قسم کی خیر و برکت کا باعث ہو یہ انسان کیوسط بڑے فتنہ اور بلا کا مقام ہے پس ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے خوف
کھاتے رہو تاکہ شہوت کو مغلوب ہو کر کوئی بیجا حرکت نہ کر بیٹھو اور یقیناً چاہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے جو یوں محاسب کیا مالک
ملنا ہے۔ اور اپنے تمام فعل و ارادہ کی جوابدہی کرنی ہو۔ اور باایاں لوگوں کو بشارت دے کہ انکے لئے اس جہان
میں بھی فلاح ہے۔ اس آیت کا خلاصہ مطلب ایک روایت میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہو **وَعَاشِرُ وَهَرُ الْمَعْرُوفِ**
سورۃ ن ع یعنی عورتوں کے ساتھ ایسے طریق سے معاشرت کرو جو فطری عقل و نیک تقاضاؤں کے موافق ہو
حدیث شریف یعنی کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح پر وارد ہے **وَحَيْثُمَا كُنَّ نِسَاءُكُمْ فَهِيَ**
تم میں نیک لوگ ہی ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ نیک میں یعنی انکے ساتھ ہمیشہ محبت شفقت رحم اور
موافقت کے ساتھ بسر اوقات کرتے ہیں اور غلبہ شہوت کو وقت کسی قسم کی زبردستی یا بیجا حرکت ظاہر نہیں کرتے
اور دھرتوں کے لئے تاکید فرمائی ہے کہ ہر حال میں مردوں کی تابعدار رہو کہ میں تمام شہوت داروں کو خوشنوی
نسبت اپنی خاوند کی سب سے زیادہ عزت و ادب کریں جب مرد اپنی شہوت پورا کرنے کو لئے بلا و تو فوراً بلا کی
عذر معقول کے حاضر خدمت ہو جائیں۔

(۴۲) جماع سے دوسرا مقصود ایک نیا وی جنین و احتفاظ ہے چنانچہ نبی امی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان
مبارک سے یہ ارشاد جاری ہو چکا ہے **لَا يُلَاحِظُ اَمْرًا وَلَا يَنْهَى عَنْهُ اَمْرًا وَلَا يَنْهَى عَنْهُ اَمْرًا وَلَا يَنْهَى عَنْهُ اَمْرًا**
آرام کا سامان ہو اور انکے تمام سامان میں نیک عورت سے بڑے کرشمہ میں آرام کا ذریعہ ہو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے
کہ تمام خاگی امن۔ لذت جماع خوبی اولاد اور صحت مرد و عورت اسی ایک مسئلہ پر مبنی ہے کہ عورت ہر طرح سے
مرد کی فرمانبردار رہے۔ اور جماع ہمیشہ ایسے وقت میں کیا جائے جیکہ دونوں کو پوری پوری خواہش اور رغبت
ہو اور دونوں کی جسمانی و اخلاقی و ماضی اور روحانی حالت اعلیٰ درجہ پر قائم ہو۔ اصل نیک فرمانبردار
عورت کے برابر دنیا میں کوئی لذت و عشرت نہیں۔

(۴۳) جماع سے تیسرا مقصود آفات شہوانی اور انکے متعلقہ بے حیائیوں سے بچنا ہے چنانچہ وہ ربانی

فیلسوف جسے کبھی کسی مرد سے یا کالج میں تعلیم نہیں پائی تھی بلکہ جو کچھ سیکھا وہ براہ راست اپنی اندر اچھی فہم قدرت اور
ابھی نقصان سے مائل کیا تھا۔ فرماتا ہے کہ عورتیں جو ان مرد کے واسطے ایک حفاظت ہیں۔

المسرة نصف الايمان - (دومذی) یعنی عورت - ایمان کا نصف ہے ۲۔

قرآن مجید میں نکاح کرنے کا حکم ہے لیکن اگر کوئی شخص فحاش کی وجہ سے عورت کے اختراجات برداشت کرنے کی
طاقت نہ رکھتا ہو اس کے لئے صبر کرنے اور روزہ رکھنے کا حکم ہے اور عورت کو مرد کا لباس اور مرد کو عورت
کا لباس فرمایا گیا ہے۔ جیسا کہ ھُنَّ رِبَاسٌ لِّکُوْا وَاَشْکُلُ رِبَاسٌ لِّھُنَّ کا حکم قرآنی آپکا ہے
العرض اس میں کیا شبہ ہے کہ عورت اعلیٰ درجہ کے سامان و دنیاوی میں سو ہے نفس کی بھوانی خواہشیں اس سے
پوری ہوتی اور اس کا سلسلہ جاری ہوتا اور ہر طرح کے فحش اور بیجانی کے کاموں سے بچا ہوتا ہے۔

۴۔ جماع سے جو عورت مقصود حفظ جسمانی و دماغی و روحانی ہے۔ یہ کلیہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی عضو کچھ عرصہ
کے لئے بیکار پڑا ہے تو رفتہ رفتہ زایل اور خراب ہو کر بیکار ہو جاتا ہے۔ یہی حال اعضائے ولادت کا ہے
یعنی اگر کوئی خدائے مرد یا عورت عدم موجودگی زوج کی وجہ سے انکو بیکار رکھو تو آخر کار یہ اعضاء ضعیف
اور بیکار ہو جاتے ہیں اور اگر زوال کے ساتھ دیگر اعضائے جسمانی و دماغی بھی متورن ہو جاتے ہیں تو اس لئے
عقلیہ ناقص ہو جاتے جو اندرونی اور بیہوش کی بجائے بزدلی اور کمالی آجاتی ہے اور علم لاغری و ضعف طاری
ہو جاتے ہیں۔ قوت فکر و غور میں فتور واقع ہو کر انسان مجبوراً اس اور سادہ لوح بن جاتا ہے۔ جربان
اختناق الرحم اختلاج القلب رخشہ خفقان توخس، مایحویا وغیرہ امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ ان نقصانات
اور فسادات کا ثبوت فوجوں کے حالات سے کافی طور پر ملتا ہے کہ خبیثوں کے نکال دالنے سے انکے قوا و جسمانی و
دماغی و اخلاقی کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی جو شخص اپنے خبیثوں کو اپنے مجاہدہ سے بیکار کر بیٹھتا ہے اس کا
حال ہوتا ہے۔

برعکس نافذ ان میں لوگ عدم موجودگی نوح کی وجہ سے ہر طرح کے مکروہ اور مہلک عادات مثلاً خلق، اغلام، لوطیت
زنا وغیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط عادات انکو تاخیر جسم کو ضعیف اور برباد کر دیتی ہیں انکے عقل اخلاق اور
دین میں سخت فتور واقع ہو جاتا ہے اور منی جیسا پیش بہائم ہمیشہ کے لئے بیجان اور بیکار ہو جاتا ہے چنانچہ
اس قسم کی عادت کو لوگ اکثر اولاد کو مایوس گدے جاتے ہیں۔ اگر کسی ایسے شخص کے اولاد ہو ہی تو نہایت ضعیف
اور دائم المرض ہوتی ہے جو اپنے لئے اپنے ماں باپ اور دیگر عزیزوں کے لئے ہمیشہ کی مصیبت رہتی ہے۔

العرض جو ان مرد کا مجبور بنا دو مرد و خوار و اثنون کے درمیان کھڑے ہونا ہوگا انہیں سے ایک ضرر و اسکو
گلیجا بگی یہی وجہ ہے کہ اسلام میں تجر و جائز نہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ کہ
لا رہبائتہ فی الاسلام۔

مجر و آدمی ان پاک انسانی جذبات اور اخلاق کی بھیس سے بھر رہا ہے جو خدا و خدا و باپ اور دادا

و نانا وغیرہ بٹنے کی حالت میں حاصل ہو سکتی ہے عمدہ لباس عمدہ خوراک عمدہ مکانات و عمدہ باغات وغیرہ انسان کے لیے دنیا میں باعث اطمینان اور فرحت ہوتے ہیں مگر ایسی صورتوں میں نیک عورت اور نیک اولاد کا ہونا نہایت ضروری ہوتا ہے ورنہ تمام سامان اتم اور ادا سی کا سما ہوتا ہے۔

کوئی انسانی قوت بالاصل باطل یا بیفائدہ نہیں ہے ہاں اگر اسکو بیودہ طور پر استعمال کیا جائے تو بدی میں شامل ہو جاتی ہے اور اگر جائز طریقوں سے استعمال کیا جائے تو کمال اور خوبی میں شمار ہوتی ہے یہی قوت شہوت کا حال ہے۔ اسکو دراصل باطل سمجھنا اور عمدہ اہلاک کرنا سخت غلطی ہے۔ ہاں اگر بیودہ طور پر غلیظ طریقوں مثلاً طبق زنا و اطاعت وغیرہ میں استعمال کیا جائے تو سخت ظلم اور گناہ ہے۔ لیکن اگر معروف طریقوں سے کام میں لائی جائے تو اعلیٰ درجہ کی نیکی اور سعادت ہے۔

دوا کس وقت اور کس حالت میں کھانا چاہیے تاکہ بقائے نوع حفظ اور حفظ صحت وغیرہ مقاصد کامل طور پر حاصل ہو سکیں۔ پس واضح ہو کہ اصل جمل کے لیے بہترین وقت اور حالت وہ ہے جبکہ مرد و عورت دونوں پوری پوری صحت کی حالت میں ہوں تمام جسمانی و دماغی قوتیں صحیح سالم اور ہر قسم کے فساد اور ضعف سے پاک ہوں کھانے کے بعد متعدد وقت گزر چکا ہو کہ عمدہ کا فعل یا ضمہ قریب الاحتتام ہو یعنی کھانے کے بعد قریباً تین گھنٹہ یا زیادہ وقت گزر چکا ہو شہوت خود بخود تیزی اور جلالی پر آئے پہلو ویر تک عورت کی ساتھ خوب بوس و کنار کیا جائے اور محبت آمیز باتوں سے تالیف قلوب کامل طور پر حاصل کی جائے حیض کی حالت میں جمل کے استعمال کو ناگزیر ناگوار ہے جب خون بند ہو کر سفیدی کا آنا بھی ہو قوف ہو جائے اس کے بعد جمل کرنا جائز ہے۔ شہوت صادق اور کاذب میں امتیاز کرنا ایک نہایت ضروری امر ہے شہوت کاذب کی پہچان یہ کہ اول تو اس میں اصل شہوت کی برابری جوش اور قیام نہیں ہوتا بلکہ ضعیف اور ناپائیدار ہوتی ہے۔ اعضا مخصوصہ کو ناپائیداری اور حرکت پونے زور کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی۔ دوم بخود بخود اچھوٹ نہیں ہوتی بلکہ بناوٹی طور پر اپنے ارادہ اور خیال سے یا دیگر ظاہری اسباب شراب، اندھے تیز مصالحات، مچھلی وغیرہ گرم اشیاء کھانے سے یا متعدد کے اندر بازیاد کم کی موجودگی سے یا عضو خاص کو کھیلانے یا لٹنے سے پیدا ہوتی ہے۔ سوم یہ کہ شہوت عموماً عادات کو مریضوں مثلاً طبق زنا و اطاعت میں غلبہ ہوتی ہے شہوت کاذب نہایت خفیف اسباب سے پیدا ہو کر مبالغہ پرستہ کر دیتی ہے یہ نہایت مضرا و خوفناک عادت ہے تو اس میں خط و نفس پونے طور پر حاصل ہوتا ہے اور نہ اولاً و اخیراً حاصل ہو سکتی ہے۔ اور عام صحت کو اس سے سخت نقصان پہنچتا ہے ایسے اشخاص اکثر نامردی سے عیش و انزال، ضعف، ہاضمہ، کثرت احتلام اور جریان وغیرہ کے شاکل اور یہی مسک و لذت و ادویہ کے متلاشی رہتے ہیں اور دراصل ایسے مریضوں کا کوئی علاج نہیں ہے تا سچا و خراب طبیعوں عطاریوں اور ڈاکٹروں کے دروازوں پر جمع ہو کر پھرتے اور اکثر دوا باز عطاریوں اور شہنشاہی نسخوں کے فکار ہو جاتے ہیں یہ غلط فہمی اور تلاش حدیث شہنشاہی طبیعوں کی خود مرضی اور بے ایمانی ان حیلوں کو کھنڈ اور خراب حال کر دیتی ہے۔

ان نادانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایک انسانی فعل اور طاقت کی ایک حد ہو تو شہوت اس کو مستثنیٰ نہیں ایک جو ان صحیح القوای اور سطا ایک یا دو دفعہ فی ہفتہ جماعت کر سکتا ہے۔ اکثر کے لئے ایک دفعہ فی ہفتہ اور بعض کے لئے ایک دفعہ فی مہینہ کافی ہوتا ہے۔ پس جو شخص اس حساب سے تجاوز کرتا ہے وہ معمولاً شہوت صادق پھیل نہیں کرتا بلکہ شہوت کا ذہب ہی مصروف ہو کر اپنے نہایت بیش قیمت مادہ رجولیت کو ضائع کرتا رہتا ہے اور آخر کار اس بے اعتمادی کا نتیجہ اس کو بگھٹنا پڑتا ہے۔ تمام نباتات ایک موسم میں پھل لاتے اور ایک موسم میں آرام کرتے ہیں زمین بھی ایک وقت سبزی اپنے اندر سے اگاتی ہے اور ایک وقت ضرور آرام کرتی ہے۔ تمام حیوانات کی طرف نظر کرو کہ وہ ایک سال یا مہینہ میں کتنے دفعہ اور کتنی دفعہ فی ماہ یا فی ہفتہ جفتی کرتے ہیں اور کس قدر عرصہ اس فعل سے بالکل علیحدہ اور بے خیال رہ کر اپنے اعضا کو مخصوصہ کو آرام دیتے ہیں۔ لے نادانوں کی اتم اپنے اعضا کی نسبت یہ خیال کرتے ہو کہ وہ دن رات جماع کے لئے مستعد رہیں اور کبھی ان کو مہلت اور آرام کی ضرورت نہ پڑے۔ اس خیال بہت و محال است وحیوں جلوتی اور اغلام کچھ اور نئے ہے اور اصل جماع کچھ اور نئے میری جو اس بارہ میں فصاحت پر ہیں وہ امپوشی کے ضمن میں بیان کیجا چکی ہیں پس دیکھو بیان امپوشی اور طلق کا۔

تمام حیوانات اپنی فطرتی عقل سے کام لیتے ہیں۔ جب تک خود بخود شہوت صادق اپنے غالب نہیں ہوتی وہ ان خود جفتی کا ارادہ نہیں کرتے اور کسی قسم کی بد عادات سے اس مادہ لذت و بقا کو نوع کو خراب نہیں کرتے مگر انسان پر انوس کہ اس معاملہ میں اپنے فطرتی عقل سے کام نہیں لیا۔ ہزار ہا سے تبلیغ شہوت کا تو افروختہ کرنے کی ایجاد اور طرح طرح کی بد فعلیاں اختیار کیں۔ چند دیوانان کی پرانی کتب بھی مسک و ملذذ ادویات پر ہیں۔ انہوں نے ہزار جہنی نوع کو دھوکہ میں ڈال کر برباد کر دیا ہے۔ اخبارات میں جعفران ادویہ کے اشتہارات شائع ہوتے ہیں شاید اور کسی مضمون یا مطلب کی نسبت شائع نہیں ہوتے مگر ڈاکٹری کتابوں میں اس بہودہ اشاعت پر کوئی تنبیہ نہیں ہوتی اور نہ کبھی کا بجوں میں زبانی طور پر اس معاملہ میں تنبیہ ہوئی ہے اسلئے میں اپنے ناظرین کو خاص طور پر توجہ دلاتا ہوں کہ ایسے ضروری مضمون کو نہایت غور اور توجہ سے پڑھیں اور اسکی حتی الوسع اشاعت بھی کریں تاکہ عند الناس مشکور اور عند اللہ ماجور ہو سکیں ایسے مضامین نام نہانی نوع کی ہمدردی اور بہترانی منصوص ہے۔

سورہ عورت کے ساتھ طرز معاشرت۔ اگرچہ یہ بحث اخلاق اور سوسائٹی سے متعلق ہے اور ایک طبی کتاب میں اسکا ذکر ناظرین نظر میں خلاف محل معلوم ہوتا ہے مگر دراصل جماع سے اسکا بہت کچھ تعلق ہے اسلئے اس پر اشارہ کچھ ذکر کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ تہمدی بیان سے یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ جماع کے قر جو اخلاقی و روحانی حالت مرد و عورت کی ہو اسکا اثر نطفہ کے ساتھ اولاد پر ضرور پہنچتا ہے اور جب ایک مرد و عورت ایک جگہ میں تو جماع کے لئے کوئی دن یا کوئی وقت مقرر نہیں ہو سکتا اسلئے انکا ہمیشہ

خاص محبت اور الفت کو ساتھ ایک ہو کر رہنا نہایت ضروری امر ہے اگر کم الفتی یا ناموافقیت کی حالت میں جماع واقع ہو گا تو اس سے اولاد میں طرح طرح کے نقصانات یا بد عادات پیدا ہوں گے انڈیشہ کی کون ماں یا باپ سے جو اپنی اولاد کے حق میں اندھا یا لنگڑا یا لولایا ناقص الخلقیت یا بد عورت یا بد خلق برپا عہد پسند کر سکے۔

مگر اپنی نادانی اور بے خبری کی وجہ سے اپنی اولاد میں طرح طرح کے نقصانات پیدا کر دیتے ہیں خواہ اگر توہم ایک ماں باپ کی بھی ہوتی ہو کہ اوکی اولاد نہایت حسین قوی تندرست و انشمنہ اور نیکی بخت پیدا ہو مگر اکثر اعمال الیہ کو نہ سمجھتے ہیں کہ تیس سو سال کے خلاف ہونے والے طرز معاشرت کی خرابی کا اثر نہ صرف اولاد پر ہی پہنچتا ہے بلکہ ماں کی صحت پر بھی بہت برے اثر مرتب کرتا ہے۔

اکثر قوموں اور مذہبوں میں عورت کو اپنے خاوند کی خاص عزت اور اطاعت کی بڑی تاکید ہو۔ اور ہر خاوند کے لئے خاص محبت، رحم اور شفقت کو ساتھ عورت کو رکھنے اور پرورش کرنے کا حکم ہے یہی مسئلہ تمام حسن معاشرت کی بنیاد ہے چنانچہ قرآن مجید میں اس بارہ میں اس طرح پر ارشاد ہے **الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِأَنَّهُمْ أَهْلٌ لِّلْهَيْئَةِ** **فَالطَّيِّبَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ** **وَاللَّاتِي**۔۔۔۔۔ یعنی مرد عورتوں

کے محافظ اور سردار ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص خاص قواؤں میں بعض مردوں کو بعض عورتوں پر فضیلت دی ہے اور وہ ان کی پرورش کرتے ہیں ایسے نیکی بخت و مہربانیاں ہیں جو اپنے خاوندوں کی تابعدار ہیں اور پس پردہ ان کے مال و متاع کی حفاظت کریں؟ اور اُس چیز کی حفاظت کریں جسکی حفاظت کا خدا نے حکم دیا ہے۔

ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو دوسرے شخص کے لئے سجدہ کرنے کا حکم کرتا تو عورت کے لئے یہ حکم کرنا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے۔ اسلام میں سجدہ کرنا ایسی انتہا و جبر کی ذلت اور دوسرے کی اعلیٰ درجہ کی عظمت ظاہر کرنا اور اپنی ساری طاقتوں اور قوتوں کے لئے گتے جھک جانا ہوتا ہے ایسے سوا کو ذلت باری کا اور کسی کے واسطے سجدہ جائز نہیں تو گویا اس حدیث شریف کا دوسرے الفاظ میں یہ مطلب ہو کہ عورت پر اس وجہ کی تابعداری اور خدمت گزاری اپنے خاوند کے لئے واجب ہو جو دوسرے کسی شخص کے لئے واجب نہیں۔

اور ہر خاوند کے لئے خوش خلقی، محبت، رحم اور عفو کی تاکید ہے۔ الغرض عورت میں وفاداری اور اطاعت اور مرد میں عفو اور محبت کا ہونا تمام حسن معاشرت کی بنیادیں اور حسن معاشرت پر تمام مقاصد جماع کا کامل طور پر حاصل ہونا منحصر ہے۔

چھٹا حکم۔ طبی طور پر کثرت از دواں جائز ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس کا جواب مختصر قیول میں تو یہی ہو کہ ہاں جائز بلکہ بعض حالتوں میں ضروری ہوتا ہے۔ اس اختصار کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

اس مضمون کے حصہ اول میں بیان کیا جا چکا ہے کہ جماع کے چار مقاصد ہیں۔ اول بقا و نفع و دوم حفظ نفس و سوم حفظ صحت و چہارم بخش عادات مثلاً جلق اغلام و لواطت زنا وغیرہ سے بچنا۔ اگر ان تمام مقاصد پر علیحدہ علیحدہ یا مجموعی طور پر نظر ڈال کر دیکھا جائے تو کثرت ازدواج نہ صرف جائز بلکہ اکثر حالتوں میں ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اگر بقا و نفع کے لحاظ سے دیکھا جائے تو صاف ظاہر ہے کہ اگر ایک عورت سے اولاد حاصل نہیں ہوتی اور اُس نکاح سے جو پہلا مقصود تھا یعنی بقا و نفع فوت ہوتا ہے تو سولے اسکے اور کیا ہو سکتا ہے کہ دوسرے نکاح کی بخیر کی جائے یا اگر پہلی عورت کسی ایسی مرض میں مبتلا ہو گئی ہو جو علاج ہو کہ جسکی وجہ سے جماع محال یا نامناسب ہو گیا ہو تو تمام مقاصد جو نکاح سے مطلوب تھے حاصل نہیں ہو سکتے پھر ایسی صورت میں کس طرح جو ان باثروت آدمی کو ہمیشہ کی مایوسی بد حالی اور بے اولادی پر مجبور کیا جاسکتا ہو۔ قطع نظر اتفاقی اسباب کو عام طور پر بھی مرد کو لیے ایک سے زیادہ ازدواج جائز ہو سکتی ہیں کیونکہ اول تو عورت پر حیض و نفاس کو ایام ایسے ہیں جو اسکو قطعاً مرد سے علیحدہ کر دیتی ہیں و دوم طبی طور پر قرحصل کے بعد اور اختتام زمانہ رضاعت تک جماع نامناسب ہی جو دو یا تین سال کا زمانہ خیال کیا جاسکتا ہے۔ سوم عورت میں قابلیت جماع او سطا پینتالیس برس تک رہتی ہے اور مرد میں ساٹھ برس تک اسی اور نوے برس تک کو بوڑھے مردوں کے اولاد اکثر دیکھنے اور سننے میں آتی ہے مگر ساٹھ برس سے اوپر عورت کو اولاد ہونا ایک نہایت ہی شاذ و نادر ماجرا ہے۔

آب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد کو زیادہ عورتیں کرنے کی اجازت دی جاتی ہے تو عورت کو ایک سے زیادہ خاوند کوئی بھی اجازت ملنی چاہیے۔ اس سوال کی بنیاد سراسر سطح خیالات اور بے غوری پر معلوم ہوتی ہے اول تو عورت اپنے خاوند سے علیحدہ ہو کر اولاد کی خواہش ہی نہیں کر سکتی کیونکہ اولاد کی پرورش اور تعلیم وغیرہ کا تمام بار عموماً مرد پر ہی ہوتا ہے۔ دوم مردوں میں ایسی امراض جو اسکو جماع کے ناقابل کر دیں اور لاعلاج ہی ہوں ایسے شاذ و نادر ہیں کہ عدم کے برابر ہیں جبکہ کالہ فواہد مرتب کر کے وقت خیال کرنا سراسر فضول ہے۔ مگر ان ہر دو صورتوں کا علاج اسلام میں حلیع رکھا گیا ہے یعنی بالفرض عورت کو اولاد کی بڑی آرزو ہو اور اسوجہ سے اپنے موجودہ خاوند سے ہمیشہ رنجیدہ خاطر اور مایوس الوقت رہتی ہے۔ اور اُس سے علیحدگی چاہتی یا بوسلکی کسی سخت مرض کی وجہ سے قطع تعلق کی طلبگار ہو تو ہمیشہ کی ناموفقت کا علاج طلاق سے فرمایا گیا ہے۔ سوم فطر ثامروان نقصانات سے بری ہیں جو عورتوں کو ایک مدت تک جماع کے ناقابل کر دیتے ہیں مثلاً حیض۔ نفاس حمل رضاعت چہارم عورت کی وہ مدت العجز جس میں کہ وہ قابل جماع رہتی ہو مرد کی نسبت قریب دو تہائی کے سے پیچیدہ عورتوں کے محافظ اور مگر ان ہوتی ہیں اور وہ فطری طور پر اسی قابل ہیں اور برعکس اسکو عورتیں اور انکی پیچیدہ مردوں کو زیر سایہ پرورش پاتے ہیں اور وہ فطر ثا اسی قابل ہیں۔ ایام حمل و رضاعت انکی لیے ایسے ہیں کہ وہ کسی بڑی محنت کو قابل

نہیں رہتی، پھر یہ صبح غلطی اور ظلم کی کمرد اور عورت کو بہرہ لہو سے برابر سمجھا جائے۔ اور تمام نطرق کی پیشی کو کلیتہً نظر انداز کر لیا جائے کیا مرد بھی حیض اور نفاس کی وجہ سے کچھ عرصہ کے لیے ناقابلِ جماع ہو جاتے ہیں کیا اون کو اپنے شکم میں بچہ کا وجہ اٹھانا اور اپنی چھاتیوں سے دودھ پلانا پڑتا ہے کیا عورتیں اپنی کمائی سے مردوں کی پرورش کرتی ہیں کیا مرد عورتوں کی طرح پچاس سال کو پہنچنا ناقابلِ جماع ہو جاتا ہے ہیں کیا اگر ایک عورت بہت سی خاوند کرے تو اون تمام کی پُرورش کرے گی۔

پنجم کیا کوئی شخص اس میں جنس و الدین لڑکوں یا لڑکیوں کی سیدائش پر قادر ہو سکیں۔
 اگرچہ انسان کو بارہ میں قطعی اور یقینی طور پر اس سوال کا بھی تک فیصلہ نہیں ہوا لیکن دوسرے حیوانات پر قدرتی اور مصنوعی تجربوں سے ہزار بار مفصلہ ذیل قواعد کا صحیح ہونا ثابت ہو چکا ہے۔
 (۱) اگر مرد کا لطفہ عورت کا اودم کی نسبت زیادہ قوی اور جاندار ہے تو اس کا مادہ غالب آکر لڑکا بنا دیتا ہے اور برعکس اسکے اگر عورت کا اودم قوت اور صحت میں غالب ہو تو لڑکی بنتی ہے۔ اس قاعدہ کا تجربہ صد ہائے موشیوں پر اس طرح کیا گیا ہے کہ پچاس جفت اس قسم کے جمع کئے گئے جنہیں نر زیادہ عمک اور قوی تر تھا اور مادہ خورد سال اور کمزور تھی، ایسی صورت میں نر اولاد کی تعداد مادہ کی نسبت زیادہ رہی اور جب قدر زوت اور صحت میں زیادہ تر تھے اور سیدہ مقابلتہ نرؤں کی تعداد زیادہ دیکھی گئی، برعکس اسکی پچاس جفت اس قسم کے جمع کئے گئے جن میں نر خورد سال اور کمزور تھا اور مادہ پوری جوان اور قوی تھی تو ایسی صورت میں مادہ اولاد کی تعداد نر کی نسبت زیادہ رہی اور جب قدر مادہ عمر اور طاقت میں زیادہ تھی اوسی قدر اوس کی اولاد میں مادہ بچوں کی تعداد زیادہ دیکھی گئی۔

(۲) ایام حیض سے جب قدر قریب تر جماع واقع ہو اوس قدر مادہ بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور جب قدر دیر کے بعد ہو اوس قدر نر بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اسکی وجہ یہ بیان کی گئی ہو کہ حیض کو قریب پہنچنے اور اودم ادوری کے قریب فلوپین ٹیوب میں ہوتا ہے اور سپرے ٹازو والو ایکٹو صلبہ بیدار کر کے اوٹس لینچنا پڑتا ہے جو جو جی بہت کم تعداد سپرے ٹازو اور اودم سے ملتی ہے اور اودم غالب رہ کر لڑکی بنتی ہے۔ برعکس اسکے اگر حیض کے بعد کچھ مدت گزر جائی تو اودم رحم میں پہنچنا ہے جس جگہ پر زیادہ تعداد سپرے ٹازو والی حملہ آور ہو کر لڑکا بنا دیتے ہیں اور وجوہات بھی بطور شرح پیش کی گئی ہیں۔ چنکا اس کتاب میں بیان کیا جانا خلاف محل معلوم ہوتا ہے۔

(۳) جب قدر آسودگی اور فراغ البالی ہو اوس قدر لڑکیوں کی تعداد اور برعکس اسکی جب قدر تنگی اور مصیبت ہو اوس قدر لڑکوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ایک عجیب سلسلہ ہے اسکا ثبوت تمام حیوانات اور نیز انسان کے حالات سے بخوبی ملتا ہے۔ اسکی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آسودگی اور فراغت کے

ایام میں عورتیں زیادہ خوش وقت اور خوش باش رہتی ہیں اور زیادہ قوی اور توانا ہوجاتی ہیں۔ اسلئے انکا اووم زیادہ قوی اور جاندار ہونے کی وجہ سے لڑکیاں زیادہ بنا رہے اور برعکس اسکے تنگی اور مصیبت کو ایام کا صدر یہ بھی عورتوں پر زیادہ پہنچتا ہے اور کھانے پینے کا حال اونپر زیادہ اثر ہوتا ہے اسلئے مقابلتا ان کا اووم کمزور اور اوجھل پڑ جاتا ہے۔ اور مرد کے سپرے ٹاز وغالب اگر لڑکے زیادہ پیدا کرنے ہیں۔

ناظرین اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ ہر اصول جو بیان کئے گئے کلیہ یا عامیہ نہیں بلکہ مقابلتا ہیں۔ جنکا ثبوت تجربہ حیوانات کے حال سے ہی ہم پہنچ چکا ہے۔ نیز دیکھو بیان سپرے ٹاز یا جریان استوری لٹی (عقربانچہ پن) انپیوٹنسی (نامردی) وخلق کا کیونکہ ان تمام مضامین کا جامع سے خاص تعلق ہے۔

جمال گوٹہ۔ تخم بید انجیر خطائی۔ حبالت لاطیں۔ کروٹن سیڈز۔

اسکا روغن خارجی استعمال میں تیز اسی ٹنٹ ہی جلد پر سخت حرارت اور تیزی پیدا کر کے چھوٹی چھوٹی اور چھالہ اٹھا دیتا ہے۔ ورم شش اور مفاصل میں بطور کاؤنٹر اری ٹنٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ داخلی استعمال سے گلو اور معدہ میں سخت سوزش پیدا کر کے غثیان تھے اور سہماں پیدا کرتا ہے۔ اس سے امعاء کے میو کس ممبریں میں زکام ہو جاتا ہے۔ بنام غدو سے رطوبت زیادہ خارج ہوجاتی اور لمبی لیشوں کو حرکت ہو کر پیری شکاک حرکت زیادہ تیز ہوجاتی ہے۔ ابھی روغن جمالگوٹہ معدہ میں ہی ہوتا ہے کہ ریفلیکس طور پر یہ تاثیر ظاہر ہونی شروع ہوجاتی ہیں۔ اس طرح سے گویا کہ یہ نہایت سریع التأثير اور قوی مسہل ہی۔ ایک دو گھنٹہ میں ہی اسکے کھلانے کے بعد سہماں شروع ہو جاتے ہیں۔ خمر لیم بوند سے ایک بوند تک۔

جمہرہ۔ آتشک کا بیان دیکھو۔

جینما سلویٹرس *Gymnemia Sylvestris* اسکے بیوں میں یہ عجیب تاثیر ہے کہ **جینمک ایڈ** *Gymnemic Acid* متحاس اور تلخی کا ذائقہ اسکے چائے

بعد چند گھنٹوں تک بالکل محسوس نہیں ہو سکتا لیکن ترش نکلیں اور پکڑنے والے ذائقوں کی شناخت برابر قائم رہتی ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ اور تاثیر ان میں اپنی کاک کو مشابہت اسکے پتہ سانپ کونیش پر لگاتے اور مار کر نہرو کو اسکو بڑ کا جوشانہ پلاتے ہیں۔

آخذہ۔ مدرکہ۔ قاطو خض۔ تنخوس۔ دیکھو بیان کیٹا لپسی کا۔

ججود

Ginger زنجبیر۔ سوٹھ۔ زنجبیل کا بیان دیکھو۔

جندیہ ستر۔ دانہ تشنج مغوی اعصاب و بطن مستطیل ہے صریح۔ فالج۔ رعشہ۔ صرام۔ نیان۔ شقیقہ۔ مایہ۔ بکلی۔ قوی۔ اور رام۔ صعبیان میں مفید ہے۔ اسکا خلا و ملاح و رام اور کان میں دالنا۔ ورج الاذن اور

نقل الاذن کو دور کرتا ہے۔ خر ۲ گرین سے۔ اگر گرین تک۔

جنرل پرے لی س آف وی النین۔ دیکھو میان پرے لی س جنرل کا۔

جنشین Gentian تلخ معویٰ مدہ اور انٹی سیٹک ہی تفصیل کے لئے دیکھو میان کلیا کا۔ خر ۱۔

اکٹر اٹ جنشین ۲ گرین سے ۵ گرین تک ٹیکچر جنشین کو ۱/۲ ڈرام سے ۲ ڈرام تک انفیوزن جنشین کو۔ ایک اونس سے ۲ اونس تک۔

جنون۔ النینی ٹی کا بیان دیکھو۔

جنین اور اوس کے متعلقات کے امراض جنین کے متعلقات ہو جاتی ہیں۔ اور جنین

ایمین۔ کورین۔ آنول اور ناول ہیں۔ ڈسی جواوہ چھلی ہے جو رحم کی اندرونی سطح سے اڑھکڑا دودھ۔

محیط ہو جاتی ہے۔ کورین اور ایمین و جھلیاں ہیں جو بلا سٹو ڈرم سے پیدا ہو کر جنین پر محیط ہوتی ہیں۔

کورین انہیں سے بیرونی ہے۔ اور ایمین اندرونی ہے۔ دو جھلیاں غموٹا ملی ہوئی رہتی ہیں۔ کبھی کبھی ان کی

درمیان قدرے پانی بھر جاتا ہے۔ ان کے امراض کی مختصر فہرست حسب ذیل ہے۔

۱۔ ڈسی جواکی ورم۔ اس کے اسباب و کیفیت و انجام حسب ذیل ہیں۔

اسباب۔ ورم رحم حمل سے پہلے موجود ہونا۔ یا آتشک۔

کیفیت۔ اجتناع خون ہو کر اسکی سطح سے عروقی رسولیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور معمول کی نسبت

ڈسی جوا بہت موٹا ہو جاتا ہے۔

۲۔ انجائیم۔ بچہ کی موت یا جریان خون کی وجہ سے اسقاط ہو جاتا ہے۔

۳۔ ٹائیکڈ وریا گریوئی ڈورم۔ ایام حمل میں پانی جاری ہو جانا۔ یہ عموماً تیسرے مہینے سے شروع

ہو کر آخر تک رہتا ہے۔ اسکا انقبض کچھ نہیں۔ یہ پانی کورین اور ایمین کے درمیان سے آتا ہے۔

ڈسی جول کے نزلہ سے لائیکو ارا مینائی سے اسکی شناخت اسطرح ہو سکتی ہے کہ اس میں دیرینہ

نہیں اوتھنا نہ فم رحم کشا وہ ہوتا ہے اور نہ وضع حمل کی کوئی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔

۴۔ مائیکڈ ریمیناس۔ لائیکو ارا مینائی کا افراط سے پیدا ہونا۔

اسباب۔ ڈسی جوا یا کورین کے امراض کے باعث سو دوران خون رک جانا۔

علامات۔ رحم نکر دکھتی پیدا کرتا قلب پر دباؤ پہنے سے اختلاج ہو جاتا وریڈوں کو پیٹنے سے

ٹھانکوں اور اندام میں ورم ہو جاتا اور عموماً اسقاط ہو جاتا ہے کبھی رحم کو زیادہ تن جانے اور کبھی

بچہ کے مرنے سے شکم معمول سے زائد بڑھتا ہے۔ رحم تنا ہوا اور لچکا رہا محسوس ہوتا ہے جنین کے

قلب کی آوازیں مدہم سنائی دیتی ہیں فرج میں انگلی داخل کرتے سے رحم پانی سے تنا ہوا اور پھولا

ہوا محسوس ہوتا ہے۔

امراض متشابهہ استقاع مرق البطن او ویدین سسٹ اور تقام -
 تشخیص استقاع مرق البطن میں پانی اپنی جگہ بدلنا رہتا ہے۔ ایک طرف ہاتھ رکھ کر دوسری
 طرف ٹھونکنی سے پانی کی جمال محسوس ہوتی ہے۔ رحم بڑھا ہوا نہیں معلوم ہوتا او ویدین سسٹ
 میں حمل کی تمام علامات نادر ہوتی ہیں اور حیض جاری رہتا ہے تو ام میں قلب کی آوازیں صاف
 سنائی دیتی اور رحم کا اجمار نرم پکڑا نہیں ہوتا نیز رگڑائی ڈرینڈاس میں بچہ کا کوئی حصہ معلوم نہیں
 نتیجہ پیدائش کے وقت زیادہ تنجانے کے سبب رحم پورا کام نہیں کر سکتا اور بہت دیر ہو جاتی
 ہے جریان خون کا بھی زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔

علاج رحم پر پی کا سہارا رکھیں اور گرد باؤ سے نکالیں پیدایوں کو جھلیوں کو بچاڑ کر کچھ جنوٹا
 چاہیے۔

(۴) پانی کم ہونا۔ ایسی حالت میں بچہ پر دباؤ رکھ کر بد وضعگیاں ہو جاتی ہیں اور اینین جھلی بچہ کے ساتھ
 چپک جاتی ہے۔

۵) مائے ڈیڈ یا وسی کو لرمول۔ اس میں جنین کے گرد شفاف آبلوں کو خوشہ پیدا ہو جاتے
 ہیں جو کو رین و لائی کے بٹھنے اور او میں بلغم پٹنے سے بنتے ہیں۔ اگر پلے سنٹا کے بننے سے پہلے یہ
 تبدیلی ہو تو کل سطح پر آبلہ ہو جاتے ہیں اور اگر بعد میں ہو تو محض پلے سنٹا کی جگہ پر ہوتے ہیں۔ اس مرض
 میں جنین ہمیشہ زائل ہو کر معدوم ہو جاتا ہے۔ آتشک اس کا سبب بیان کیا گیا ہے کہی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب
 کسی جیسی جنین رحم کے اندر جاتا ہے تب اسکی پرورش کا خون کو رین کے بڑھ جانے کا سبب بنتا ہے اور تباہی
 علاوہ اس رحم بہت جلدی بڑھتا ہے یہاں تک کہ تیسرے مہینے میں ناف تک پہنچ جاتا ہے رحم دبائے سے ہو کر
 اور پیلہ محسوس ہوتا ہے قلب کی آوازیں اور بلٹے منٹ غائب ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی رحم کے اندر سے پانی
 یا خون یا آبلہ نکلتے رہتے ہیں۔ اس مرض میں عموماً اسقاط ہو جاتا ہے۔

علاج جب یہ مرض تشخیص ہو جائے تو فم رحم کو ٹیٹ یا باریک نیگ سوکھا کر کے ارگٹ دیوینی چاہیے
 کٹاؤ فم رحم کے بعد ایک انگشت رحم میں پہنچا کر او دم کے اخراج میں امداد کر سکتے ہیں۔

۶) پلے سنٹا کا خلاف معمول ہونا کہی پلے سنٹا ایلی شکل کا ہوتا ہے۔ کبھی جھلی کی طرح سے کل
 جنین پر محیط ہو جاتا ہے۔ کبھی علیحدہ ٹکروں میں کئی جگہ چپان ہوتا ہے۔ کبھی محمول ہی بہت
 ۷) او کبھی بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کبھی نیچے فم رحم کے قریب آگتا ہے۔ کبھی اس میں رحم بھی ہو جاتا
 ہے۔ کبھی چربی پڑ جاتی ہے۔ کبھی چونڈیا رنگ پڑ جاتا ہے اور کبھی فاسد غیرات سی اس میں فائیر و ما
 یا سار کو یا کسو ما بجاتے ہیں کبھی اس کا آتشک ہو جاتا ہے پہلی پانچ صورتوں کے سوا باقی تمام میں
 اسقاط کا احتمال رہتا ہے۔ جب جھلی کے طور پر ہو یا علیحدہ ٹکروں میں یا فم رحم کے قریب ہو ہو

نوریدائش کے وقت سخت جریان خون ہونے اور بعد میں کوئی حصہ باقی رہ کر نقص کا اندیشہ ہوتا ہے۔
(۷) امبی لائی کل کارڈ جسکو ناف یا آنول کہتے ہیں کبھی پلے سنٹلے کے ایک کنارہ پر لگ جاتی ہے اور کبھی
جھلی طرح پھیل کر ناول میں لگتی ہے کبھی بعد میں دو کارڈ ہوتے ہیں سلبائی میں چھ لہج تک چھوٹی ریشائی
اور کبھی ساٹھ لہج تک لمبی دیکھی گئی ہو جب طول میں محمول ہی زیادہ ہو تو جنین کے گرد بل ڈاکٹر اسکے طرف
کو کاٹ ڈالتی ہے اور کبھی خون بند ہو کر جنین ہلاک ہو جاتا ہے کبھی اس میں دو وریدیں اور ایک شریان
ہو جاتی ہے اور کبھی ایک ہی ورید اور ایک ہی شریان رہتی ہے کبھی رحم کے اندر اور کبھی پیدائش
کے وقت اس میں گرہ پڑ جاتی ہو اور کبھی بل آ جاتا ہو۔

(۸) بچہ کو بہت سی امراض رحم کے اندر دامنگیر ہو جاتے ہیں بعض سی مر جاتا ہے اور بعض
بچہ سلامت پیدا ہو جاتا ہے چھک خسرہ اور سکارلیٹ بخار سی پر مر جاتا اور اسقاط ہو جاتا ہے۔ کبھی
چھک کے نشان لے ہوئے پیدا ہو جاتا ہے کبھی رکش کی تمام علامتوں کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے آتشک بچہ
اکثر بچہ مر جاتا ہے اور اسقاط ہو جاتا ہے بعض زندہ پیدا ہو جاتے ہیں جنہر آتشک کے نشانات ہوتے ہیں
موسمی بخار اور عظم الطحال بھی بچہ کو ہو جاتا ہے ہڈیاں ٹوٹ جاتی اور جوڑا گھڑ جاتا ہے اور کبھی ہاتھ پاؤں
کٹ بھی جاتے ہیں۔ یہ واقعہ ناف کو بچوں یا زائدریشوں سے ہو جاتا ہے۔ اگر قطع شدہ حصہ چھوٹا ہے تو کلگر
تخلیل ہو جاتا ہے۔ ورنہ پیدائش کے وقت بچہ کے ساتھ باہر آ جاتا ہے مفصلہ ذیل امراض ہو کر عسر ولادت
کا باعث بنتی ہیں۔

نایڈروکیٹوس ریڈنگویس سپائنا بائی فیڈانق مراق البطن ہستقا مراق البطن اعتبار البول
ہو کر نشانہ کا تہنا نا جگر تلی یا گردہ کا ریمہ جانا سرطان یا سٹ یا اور رسولیاں ہو جانا۔

(۹) جنین کا رحم کے اندر مر جانا۔ موت کو بعد جنین فوراً باہر آ جاتا ہے یا رحم کے ضعف یا زائد
رحموں کی وجہ سے اندر رہ جاتا ہے۔

اسباب (۱) ناول اور جھلیوں کے امراض یا ماں کی طرف سے کسی زہر یا مرض مثل آتشک چھک
وغیرہ کا اثر پہنچنا شدید بخار جو ۱۰۹ درجہ کا ہو بعض عورتوں کا بچہ ایک خاص مدت حمل کے بعد مر جاتا
ہے یہ صدمہ یا ضرب۔ تغیرات اگر جنین بہت چھوٹا ہے تو لایکوار ایمینائی میں حل ہو جاتا ہے۔
اگر بڑا ہے تو بھیک کر اوس کی جلد اور تر جانی تمام جوڑ کھل جاتے اور بدن پھول کر پھلا ہو جاتا ہے کبھی
خشک ہو کر تمام جسم سکڑا ہوا اور سخت ہو جاتا ہے اگر رحم کے اندر ہو اینج جائے تو جنین گلجاتا اور ٹکڑے
ٹکڑے ہو کر نکلتا رہتا ہے اگر وہ اینج تو خشکی اور سختی کے بعد اوس میں چونڈ پڑ کر پھر سا بن جاتا ہے ایسی حالت
میں نقص یا زخم یا اشتقاق الرحم سے حاملہ کے مر جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔

علاج مردہ بچہ کو فوراً مصنوعی طور پر نکال لینا چاہیئے۔

علامات جن موت کی قریب بہت زیادہ حرکتیں کرتا اور اس کا دل بقواعد طوری پر دھڑکتا ہے۔ موت کے بعد اس کی حرکات اور قلب کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں۔ ماں کی پستان ڈھیلی پڑ جاتی اور وحنف و تقاہت طاری ہو کر نڈھال پڑ جاتی ہے پیڈ و میں گرانی اور بے چینی محسوس ہوتی ہو کبھی لاکھوار ایمینائی کے نکل جانے کے بعد مردہ جنین کا تغضن رحم کو خراب ہواؤں سے ایسا بھر دیتا ہے۔ کہ رحم تنگ و حصول کی طرح بولنے لگتا ہے یہ حالت ماں کو فاسطے سخت خطرناک ہے۔ آمیں بھی سیمیا ہونے یا رحم کی وریدوں میں ہوا داخل ہونیکا اندیشہ ہے جو سخت ہلاک میں جب ایسی صورت پیدا ہو تو فوراً رحم کو ہواؤں سے خالی کر کے اینٹی سپیک اوشنوں کے ساتھ رحم کو دھو ڈالنا چاہیئے۔

جواسا۔ خارشتر۔ حلق۔ مفتوح اور نافع اوجاع ہے خمر ۵ اگرین سے ایک ڈرام تک

جواشیر۔ جاد شیر کا بیان دیکھو۔

جواکھار۔ نظرون۔ محل ریح و درم مفتوح سدہ۔ ہاضم غذا مفتحت حصاۃ مشاندہ نافع قولنج ہے۔ بورہ امی سے تمام تاثیرات میں مشابہ ہے خمر ۸ گرین سے ایک ڈرام تک

جوڑی۔ بزبان۔ لبباسہ۔ جاد و تری مقوی معدہ و کبد و باہ۔ محل ریح اور اینٹی سپیکس ہوسلسن نفث الدم۔ زخم امعا۔ اسہال کہنہ۔ درد سر میں نافع ہے خمر نصف ڈرام سے ۲ ڈرام تک۔

جوڑو بیبا۔ جرد بیبا کا بیان دیکھو۔

جوڑوں کے امراض۔

امراض مفاصل۔ ان کی مختصر فہرست معہ علاج حسب ذیل ہے۔

(۱) **سامی گلوئی لٹس**۔ غشاے مفاصل کی ورم یعنی اس جھلی کی سوزش جو جوڑوں پر محیط ہوتی اور ٹہیوں کے اتصالی حصہ کو ملفوف کرتی ہے۔ یہ دو طرح کی ہوتی ہے سمپل ج میں پیپ نہیں پڑتی

پر لینٹ ج میں پیپ پڑ جاتی ہے۔

(۲) **ہائیڈرارتھرورس**۔ استحقاق مفاصل جوڑ میں پانی پڑ جانا۔ پانی کی تھیلیاں جوڑ کو چاروں طرف او بھرتی ہیں۔ کبھی تخم تھوز کے مشابہ اجسام بھی پیدا ہو جاتے ہیں جنکو ملن سیدھا باڈین کہتے ہیں

(۳) **آکیوٹ آرٹھرائٹس**۔ جوڑ کی ورم شدید۔ اس میں جوڑ کی ہر ایک ساخت یعنی عشا۔

باطنیں مری اور ہڈی وغیرہ متورم ہو جاتی ہیں۔

علامات متورم جوڑ سو جگر گرم تپا ہوا سرخ اور دردناک ہو جاتا ہے جس طرح سے جوڑ کی اتصالی سطوحات علیحدہ اور اس کی رگیں ڈھیلی میں اُسی وضع پر جوڑ رہتا ہے۔ درد نہایت ہی شدید اور جانگذاں ہوتا ہے۔ وقتاً فوقتاً شنج سے قریب کے عضلات اینٹھتے رہتے ہیں۔ بخار مسلسل رہتا ہے تخفیف ورم کے ساتھ بخار اور دیگر تکالیف کم ہوتی جاتی ہیں۔ مدت تک جوڑ کے بیکار رہنے سے

قریب کے عضلات تپڑاؤ کمزور پڑ جاتے اور کبھی غلوج ہو جاتے ہیں۔

کیفیت غشائے مفصل سو جگر موٹی ہو جاتی اور بہت موٹا انگور پیدا ہو کر سائی نوویل میمبرین کو گوشت کے مشابہ بنا دیتا ہے۔ سیدھ پر رباط اور نسین وغیرہ سو جگر موٹا انگور بن جاتی مری اور بڈی سب کو بوجہ متورم ہو کر گلنی شروع ہوتی ہیں۔

السکاب۔ ضرب بعض خیر مادہ کا سرایت کر جانا۔ پائی ایسا گرم سرد ہو جانا۔ وجع مفصلوں کے امراض۔ آتشک جوڑے قریب بھوڑا یا زخم ہو جانا۔ بچوں اور بزرگوں میں خفیف اسباب سے یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔

انجام۔ تمام نیا انگور تحلیل ہو کر جھلی۔ باطامری اور بڈی وغیرہ اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہیں ورنہ زائد ریشہ بن کر جوڑ کی حرکات محدود رہتی ہیں۔ یا متصلہ ہڈیوں کو جڑ جملے سے جوڑ سخت ہو کر ناپید ہو جاتا ہے۔

(۴) کرائک سٹروس آر تھرائیٹس۔ اسکے دوسرے نام سفید ورم اور ریو برکلا آر تھرائٹس بھی ہیں۔ یہ مرض خفیف ضرب یا مسکوٹے کے بعد تندرست ترقی کرتے ہی کبھی کرائک سائی وائیٹس ہوتا ہے پھر۔ باطامری اور بڈی میں ورم ہوتی ہی متورم ساختیں سو جگر نرم اور پلچ ہوتی ہڈیوں کے اوچھا رخائب ہو جاتے رات کو سوتے ہوئے عضو یا وائف میں تشنجی آنکھ ہوتی اور آخر کار پیپ پڑ جاتی ہے۔

کیفیت سائی نوویل میمبرین سو جگر موٹی اور نرم ہو جاتی اور بہت موٹا انگور او سکی سطح پر پیدا ہو جاتا ہے یہ حالت بڑھتے بڑھتے سائی نوویل جھلی نصف انچ سے ایک انچ تک موٹی ہو جاتی ہے ایسا ہی حال دوسری نرم ساختوں کا ہوتا ہے کہ ان میں ورم ہو کر موٹا انگور بن جاتا ہے۔

بھی انگور بڈی ورم مری کی سطح پر چڑھتا ہوا انگور بھی اپنے مشابہ بناتا جاتا ہے اور انکی اصل ساخت پتلی کھوکھلی کمزور اور ناپید ہوتی جاتی ہے۔ آخر کار جوڑ کی ساختوں کا نام و نشان نک نہیں رہتا بلکہ تمام بلبلہ موٹے انگور سے بھر جاتا پھر اسکے اندر ریو برکلا ناڈیولوز پیدا ہو جاتی ہیں ریو برکل کی ساخت مشرح طور پر تھائی سس اور ریو برکلوسس میں بیان ہو چکی ہے۔

انجام عام ریو برکل کی طرح اسمیں بھی تغیرات ذیل ہو سکتی ہیں (۱) کنیزی ایشن یعنی ٹھکڑے کے طور پر ہو جانا (۲) ریشہ بن کر ریو برکل کی گرہ بن جانا اور جوڑ کا سخت غیر متحرک ہو جانا۔ (۳) چونہ پڑ کر سخت ہو جانا (۴) پیپ پڑ کر گل جانا۔

میعاد۔ یہ مرض چھ مہینہ سے کم میں شاذ و نادر ہی علاج پذیر ہوتا ہے۔ (۵) کرائک میوٹ ٹاک آر تھرائیٹس اسکے دوسرے نام ہونے ٹانڈ آر تھرائیٹس

اور آرٹھرائٹس ڈفارنس ہیں دیکھو بیان یہیوئے ٹائیڈ آرٹھرائٹس کا۔

۷) مفلوج اطراف کی جوڑوں میں درد اور ورم ہو جاتا۔ اسکی علامات اور کیفیت اور علاج وغیرہ حسب معمول ہیں۔

۸) آرٹھر ویتھرائٹس ایٹیکس۔ اسکا دوسرا نام شار کو صاحب کی بیماری ہے۔ یہ درد اور ورم مرض ایٹیکس میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس میں جوڑ بہت زیادہ سوج جاتا لیکن درد نہیں ہوتا نہ بخار نہ تھکاوٹ ہوتا ہے۔ چند یوم کے بعد ورم تحلیل ہو جاتا مگر جوڑ پانی سے تیار ہوتا ہے کبھی قریب کی ریسہ بھی پانی بنجاتے ہیں۔ چند ہفتوں یا مہینوں میں پانی تحلیل ہو کر جوڑ اصلی حالت میں آ جاتا ہے مگر سخت حالتوں میں جوڑ میں گر گر شروع ہو جاتی۔ رباط ڈھیلے پڑ جاتے اور ہڈیوں اتھالی سطح صورت بدل کر گھسنی شروع ہو جاتی ہے۔ اسوجہ سے جوڑ کو بلانے سے رگڑ اور کوڑ کوڑ کی آواز سموع ہوتی ہے مگر دیکھ نہیں ہوتا کبھی جوڑ اپنی جگہ سے اٹھ جاتا ہے۔

کیفیت۔ ہڈی کا بہت سا حصہ گھس جاتا اور کبھی مری پر کسی کسی جگہ نئی ہڈی بن جاتی ہے پانی تحلیل ہونے کے بعد رباط ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔

۹) اینکی لوسس۔ جوڑ کا سخت ہو جانا۔ یہ دو قسم کا ہوتا ہے (۱) ناقص جو زائد ریشوں کی وجہ سے پیدا ہوتا اور جسم میں جوڑ قد سے حرکت کر سکتا ہے۔ اس میں جوڑ کا غلاف موٹا اور سخت ہو جاتا زائد ریشوں کی رباط بن جاتے پہلے رباط اور نین چھوٹی اور سخت ہو جاتی اور مری کی بجائے بھی مضبوط ریشہ پیدا ہو جاتا ہے (۲) کامل جسم میں ہڈیوں کی اتھالی سطح آپس میں جڑ جاتی اور حرکت محال ہو جاتی ہے کبھی تو اتھالی سخت ہوتی ہے اور کبھی کچھ استخوانی اور کچھ ریشوں دار کبھی ایک ہڈی سے دوسری ہڈی تک استخوانی محریر اور کمانیں بن جاتی ہیں۔ علاج علیحدہ درج کیا گیا۔

۱۰) سامی نوویل جھلی پر مس ہو جانا۔

۱۱) جوڑ کے اندر علیحدہ اجسام پیدا ہو جانا۔ یہ تین قسم کے ہوتے ہیں (۱) تخم تر بوز کے مثلاً اجسام جو پچاس سے زیادہ تک تعداد میں دیکھے گئے ہیں یہ خون کے ٹھنڈوں میں انگوروں کے ٹکڑوں سے بن جاتے ہیں (۲) مری کے ٹکڑے جو ورم کے بعد سابقہ مری پر ابھار ہونے اور اسکے ٹوٹ جانے سے بنتی یا زائد انگوروں کی مری بن جاتے اور اسکے ٹوٹ جانے سے پیدا ہوتے ہیں کبھی اصل مری کے ٹکڑے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔

علامات جوڑ کو زور پڑ جاتا اور جب کبھی کوئی مکڑہ اتھالی سطحوں کو درمیان آ کر دیتا ہے تو دفعتاً درد ہو جاتا ہے جس کو ورم ہو کر پانی بھی پڑ جاتا ہے کبھی شدت درد سے غشیان اور غشی تک نوبت پہنچ جاتی ہے کبھی جوڑ کو مچھلانے اور اٹھا کرتے وقت دفعتاً روک پیش آ جاتی ہے۔

(۱۱) جوڑوں میں سٹ ہو جانا۔ کبھی تو غشاء مفصل میں جیب کو طریق پر ابھار ہو کر ایسا ہو جاتا ہے مثلاً امراض ذیل میں ٹیوبریکلر ٹائڈ راکٹروسس، شارکووز ڈیزیز، کبھی قریب کریسہ یا غلاف و رباط کے پھولنے سے ایسا ہو جاتا ہے۔

(۱۲) جوڑوں کا اعصابی درو۔ کسی عصب پر دباؤ پڑنے سے ایسا ہو جاتا ہے مثلاً پیڈ وکس، سٹران میں آئیڈیو ریٹر عصب پر دباؤ پڑنے سے گھٹنے میں درد ہو جاتا ہے یا رجم اور انشیں کے امراض سے ٹانگوں میں سخت درد رہتا ہے۔

علاج (۱) سائی نووائی ٹس۔ جوڑوں کے غشاء میں ورم ہو جانا۔ ورم مفصل سے نکال دینا۔ سائی نووائی ٹس میں دیکھو۔

(۲) ارتھرای ٹس کیوٹ۔ جوڑ کی تمام ساختوں یعنی غشاء، مری ہڈی، رباط وغیرہ میں ورم

ہو جانا۔ یہ مرض عموماً سائی نووائی ٹس سے شروع ہوتا ہے یعنی پہلے غشاء مفصل میں ورم ہو کر دوسری ساختوں کو مبتلا کر لیتی ہے۔ اسلئے شروع درجہ میں اس کا علاج بعینہ سائی نووائی ٹس کا علاج ہے۔ مائوف جوڑ کو قطعی آرام سے رکھنا اور ہر قسم کی حرکت سے منع کر دینا یک مقدم اور تمام علاج کی روح ہے۔ تمام جوڑوں کو ایسی وضع پر آرام سے نکال دینا چاہیے کہ ہڈیوں کی متصد سطح ایک دوسرے سے علیحدہ رہے۔ تا ایک دوسرے کی مریض سطح دباؤ اور رگڑ سے محفوظ رہے۔ تمام جوڑوں کے لئے سوائی ٹخنہ اور کہنی کے میدھی سمت مناسب ہوتی ہے۔ اس سمت میں مناسب بوجھ کے ساتھ کھینچ رکھنا مفید ثابت ہوتا ہے تفصیل کے لئے دیکھو بیان سائی نووائی ٹس کا۔ جب پیپ کا پر جانا یقینی طور پر ثبات ہو جائے اس وقت کامل اینٹی سیپٹک احتیاط کے ساتھ شگاف دیکر ڈرنیج ٹیوب لگانا اور اینٹی سیپٹک ڈرینج کرنے رہنا ضروری ہو جاتا ہے۔

(۳) کرائٹک سائٹروسس (ارتھرای ٹس)۔ اس کے دوسرے نام کرائٹک ٹیوبریکلر ارتھرایٹس اور وٹائیٹ سویلنگ ہیں۔ اس مرض میں جوڑ کے اندر مادہ آتشک پڑ جاتا ہے جو آہستہ آہستہ جوڑ کی تمام ساختوں یعنی غشاء، رباط، غضوف وغیرہ کو فاسد انگور میں بدل دیتا ہے۔ شروع درجہ میں سائی نووائی ٹس کے طریق پر علاج کرنا عام صحت کو مغویات فولاد کا ڈکٹور آٹل وغیرہ سے قلعی دینا اور اینٹی سیپٹک ادویہ بکثرت کھلاتے رہنا جیسا کہ تھائی سس کے عام بیان میں تفصیل بیان کیا گیا ہے مفید ہو سکتا ہے لیکن اگر مرض بڑھتا جائے اور ورم بہت زیادہ ہو جائے تو جراحی تدابیر سے اس کا علاج کرنا چاہیے جراحی تدابیر حسب ذیل ہیں۔

(۱) ورم کی جگہ پر شگاف ڈرنیج ٹیوب داخل کریں اور روزانہ دو تین دفعہ اینٹی سیپٹک لوشنوں مثلاً کاربالک لوشن (۱) اور مرکری لوشن (۱) سے کامل طور پر دھو کر ڈریس کر رہیں۔

جوڑ کو ایسی وضع پر رکھیں کہ اگر اتصال واقع ہو جائے تو عضو کی کار آمد صورت باقی رہ جائے مثلاً گھٹنے اور گونے کے لیے سیدھی وضع اور ٹخنہ و کہنی کے زاویہ قائمہ کی وضع بعد میں کار آمد ہو سکتی ہے۔
(۲) ادھڑیکٹھی۔ اس اوپریشن سے مراد یہ ہے کہ جوڑ ورم خوردہ کو کافی طور پر کھوکھو کر تمام انگور ہر چار طرف سے کھچ کر صاف کر دیا جائے جو ہڈیوں کی اتھالی سطحیں مردار پر لگی ہوں انکو بھی اندر سے کھچ کر صاف کر دینا ضروری ہوگا۔

(۳) کینرین یعنی جوڑ کی تمام اتھالی سطحوں کو آری سے چیر کھینک دینا تاکہ جوڑ معدوم ہو جائے۔ اور شعلہ ہڈیاں باہر چڑھائیں۔

(۴) کرانک دھیوے ٹک ادھڑائی ٹس۔ اس مرض کا دوسرا نام آرتھرائٹس ٹس فارنس بھی ہے۔ دیکھو بیان رھیوے ٹائیڈ آرتھرائٹس کا۔

(۵) وجع مفصل۔ رھیوے ٹزم۔ بہ مرض دراصل خون کے فساد سے ہوتا ہے۔ اسکا علاج متغای اور داخلی تدابیر سے کیا جاتا ہے۔ دیکھو بیان رھیوے ٹزم کا۔

(۶) اینکلو سیس۔ مفصل کا جڑھ جانا۔ دیکھو بیان اینکلو سیس کا۔

(۷) ادھڑویتیہی اف ایٹکسیا۔ اس کا دوسرا نام شمار کوڑو زینہ ہے۔ یہ مرض لوگوں کو اور ایکسی کے ضمن میں ظاہر ہو کر جوڑوں میں دردناک سوج پیدا کر دیتا ہے۔ اسکا علاج انھیں اصول اور قواعد کے مطابق کرنا چاہیے جو سائی نووائی ٹس میں بیان کئے گئے ہیں پس دیکھو بیان سائی نووائی ٹس کا۔

جوگولانس الببا۔ Jugulans Alba
جوگولانس شامی نیریا۔ Jugulans Cineria
اسکے دوسرے نام ٹرنٹ اور وائیٹ ٹ بھی ہیں۔ مخرج صفراء
مفتح مدد اور زیادہ مقدار میں مٹی اور تیز مسہل ہو۔ اسکی چھال عمدہ مسہل ہو۔ صفر خارج کرتا۔ ہضمہ کو تقویت دیتا اور ہمال کے بعد قبض نہیں کرتا ہے۔ بدضمی۔ بواسیر، یرقان، ضعف جگر، قبض، دایمی، امراض جلد و گردہ میں اسکو دے سکتے ہیں۔ اسکی چھال کی... اندر دنی تو کوششی کپڑے کے نیچے جلد پر رکھنے سے چھال پیدا ہو جاتا ہے۔

خمر سفوف چھال ۱۰ گرین سے ۶۰ گرین تک۔ فلوئڈ اکثرٹ ایک ڈرام سے ۳ ڈرام تک
سالڈ اکثرٹ ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک۔ جگلیڈ ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

جوگولانس راجیا۔ Jugulans Regia
جوگولانس شامی نیریا۔ Jugulans Cineria
جوگولانس نیرا۔ Jugulans Nigra
آخر وٹ کا بیان دیکھو۔
جوگولانس الببا کا بیان دیکھو۔
مصلح خون اور متوجی جسم ہو۔

تمام امراض سکرافیولا آتشک کہنہ اور سخت لاغری کی حالت - اور نیز پرانے جلدی امراض اور زخم ہائے کہنہ میں نہایت مفید ہے سوزاک فلوئڈ اکثر کٹ ۳ پوند سے ۳۰ پوند تک -

جون پرجانا - دیکھو بیان لاوی نیس کا -

جونک - لیچر ہرودو -

جونکس اپنے قد و قامت میں نہایت مختلف ہوتی ہیں اور جب قدر انکا جسم بڑا ہوتا ہے اسے قدر وہ خون بھی زیادہ چوستی ہیں - بہت چھوٹی جونکس اپنے وزن سے ڈھائی گنا خون چوستی ہیں - چھوٹی درمیانی چار گنا - بڑی درمیانی جونک جو آرام کی حالت میں دوا سچ کے قریب لمبی ہو سب سے بہتر ہے چھوٹی جونکوں میں یہ وقت ہے کہ وہ تعداد میں زیادہ لگانی پڑتی اور خون بھی بہت دیر میں چوستی ہیں اور ان کے زیادہ انگوں سے چون بیکر بہتار ہوتا ہے جبکہ دباؤ سے بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے - بہت بڑی جونک میں یہ قیامت ہے کہ کئے ڈنک کا کھلا زخم رہتا اور اکثر اسکا بد نما داغ باقی رہ جاتا ہے جب ایک محدود مقام پر دو تین جونکیں لگانی ہوں تو ہاتھ سے پکڑ کر لگا سکتے ہیں - لیکن جب بہت سی جونکیں زیادہ جگہ میں لگانی ہوں تو ہل طریق یہ ہے کہ ایک چھوٹے شیشے کے گلاس میں ڈال کر اس گلاس کا منہ اسجک پر لگا دیں جب جونکیں خود بخود لگا دیں تو گلاس کو اٹھا لینا چاہیے - اگر کسی دوا یا سیل کی وجہ سے جونک نہ لگے تو اس جگہ کو صابون اور گرم پانی کے ساتھ خوب صاف کر کے خشک کریں - اگر پھر بھی کامیابی نہ ہو تو چار تدا بیر ہیں -

اول - یہ کہ جونک کو پانی سے نکال کر گرم خشک کپڑے میں دس منٹ رکھ چھوڑیں بعد ازاں لگا دیں -

دوم - یہ کہ اس جگہ پر بالائی یا میٹھا کیا ہوا دودھ تھوڑا سا لگا دیں -

سوم - یہ کہ رائی کا پشیر لگا کر اسجک کو سرخ کر دیں - اس تدبیر سے جونک باسانی لگجاوے گی - اور خون بھی جلدی سے خارج ہوگا -

چھارم - اگر ان تمام تدابیر سے ناکامی ہے تو تھوڑی سی جگہ تیر چاقو یا سوئین کے ساتھ کھرچ کر خون نکال کر اسجک کو مسل دیں تب جونک ضرور لگ جاوے گی - یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر مریض کے قریب تاکو یا گندہک یا سرکہ کی بو ہو تو جونک نہیں لگتی -

جب جونک کا کسی خاص نقاط پر لگانا منظور ہو تو اسکی بہ آسان ترکیب یہ کہ ایک جاذب میں حسب ضرورت سوراخ کر کے اسجک پر رکھیں - اور ایک چھوٹے گلاس میں جونکیں ڈال کر اس کا غذر لگا دیں جونکیں اس کاغذ کی کھر درمی سطح پر پھینگیں - اور جب سوراخوں پر اون کا منہ پہنچ گیا تو فوراً وہیں لگ جاویں گی -

جونکیں عموماً پندرہ بیس منٹ کا اندر خود ڈوٹ جایا کرتی ہیں - اگر ایسا نہ ہو تو تنگ پانی یا سرکہ یا پستیز اوں کے منہ پر لگائے سے اتر جاتی ہیں - جونک اُتارنے کے بعد اگر خون زیادہ نکالنا مقصود ہو تو

پولشیں یا سینک یا بھانپ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر خون جلدی بند کرنا منظور ہو تو پھپھکری یا نیلے طوطیا کے پانی میں گدی جھگو کر باندھنی چاہیئے اور اسی پانی سے زخموں کو دھو ڈالنا چاہیئے۔ اگر چونک ناک یا متعذر یا شرمگاہ کے اندر داخل ہو جائے تو پانی میں سرکہ یا منک ملا کر پھپکاری کرنی چاہیئے۔ کسی بڑی وریہ پلک پستان مخرج جالہ جلد عضو تناسل و فوطوں پر چونکوں کا لگانا منع ہے کیونکہ ایسے مقامات چونک لگانے سے زیادہ ورم کا اندیشہ ہوتا ہے۔ چھوٹے بچوں میں بھی چونک لگانا احتیاط چاہتا ہے۔ کیونکہ انہیں خون بے حد نکلمہ ہلاکت کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پس چھوٹے بچوں میں چونک ہمیشہ کسی ہڈی کے مقابل اور صبح کے وقت لگانی چاہیئے تاکہ جب خون زیادہ نکلتا معلوم ہو تو فوراً دباؤ سے بند کر سکیں۔ شام کے وقت لگانے میں یہہ ہرج ہے کہ رات کو وقت بچہ خون زیادہ بہکے بچہ کو ہلاک کر سکتا ہے۔ چھ سال کی عمر تک جب قدر سال کی عمر ہوئی ہو اور سید قدر جونکیں لگانی چاہئیں۔ بعد ازاں جوان عمر تک یہی تعداد کافی ہے

تمام مقامی ورموں شروع دنبل و دبیلہ رگرمسکوڑ وغیرہ میں جبکہ درد اور سوزش زیادہ معلوم ہو چھ سال جونکیں لگادینا اور بعد میں پولشیں یا بندہ سینک یا تیرہنا بہت جلدی آرام بخشتا اور پپ پڑنے سے روکتا ہے۔ سرد و جو اجتماع خون کی وجہ سے ہوا یہیں پپ پڑیوں پر چھ سات جونکیں لگانا شروع سرسام کی حالت میں قفائی گردن پر احتباس الطمت کو صداع میں اندام نہانی کے بیرونی لب کے قریب شکم اور سینہ کے درد میں جو اکثر بخار کی حالت میں ہو جاتا ہے مقام درد کے مقابل صداع اور شقیقہ میں جو خون بوا سیر کے احتباس سے ہو کنا رہ و بربر جونکیں لگانا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔

سخت فم جو کسی طور سے بند نہ ہو بعض اوقات قعر معدہ کے مقابل جونکیں لگانے سے آرام ہو جاتا ہے۔ سخت آشوب چشم میں ہر دو کو ڈوں کے قریب جونکیں لگانی سرخی اور ورم کم کر دیتی ہیں۔ درد ناک بیرونی بوا سیر اور نبل میں بعض اوقات چونک تریاق اعظم کام دیتی ہے۔

ہم نے خود دیکھا ہے کہ ایسے بوا سیری موہلوں کا درد اور ورم عارضی طور پر ہی ہو موقوف نہیں ہوا۔ بلکہ برسوں بعد مریض نے کوئی شکایت نہیں ظاہر کی سخت پچیش اور ورم جگر کی حالت میں دبر کے کنارہ پر جونکیں لگانا بہت آرام دیتا ہے۔

انڈیرا الزما کابیان دیکھو
بالوکار پس پیٹنی فولیم کابیان دیکھو
ایضاً

کیروبا کابیان دیکھو۔
کیروبا کابیان

Geonia inermis
Jaborandi
Jaborina
Decorenda Procera

جیافرا زمس
جیورنڈی

جیورین
چیکارنڈا پروسیرا
چیکارنڈا اٹکنسوزا

دیکھو۔

جلیسی میم کچا
کے حرکتی

Gelsemiprine
Gelsemio Acid

جلیسی مین
ایڈ

ریشوں کو

Gelsemia

ان دھنوں
کو جو جلیسی مین
بھی کھاتیں اور ناتوان
کردیتا اور

Geisemium Sempervereus

Geisemium Nitidum

Gelsimine

آخر کار جس کو

Gelsemine Hydrochloras

جلیسی مین
ہائڈروکلوراس

بھی ضعیف۔ اور کالعدم کردیتا ہے۔ تنفس بند کر کے موت کا باعث بننا اور قلب پر بھی ضعف لانا
مگر جلد کو تحریک دیتا ہے۔ پتلی پھیل جاتی اور تمام عضلات چشم مغلوب ہو جاتے ہیں۔ بوجہ ضعف مخدر
اور دافع تشنج اثر کے اسکو کزاز۔ در۔ ہونیک کف اعصابی درد صداع و شقیقہ میں
استعمال کرتے ہیں۔

تھوڑی مقدار میں اطمینان غنودگی سستی دوران خون پیدا کردیتا جنف الا علی پنچے کو گر جاتی اور
پتلی پھیل جاتی ہے۔ طبی مقدار میں دافع حرارت مسکن سوزش۔ دافع تشنج۔ مدر حیض۔
حابس الدم۔ واضح حل اور مخدر تاثيرات پیدا کردیتا ہے۔ غشا و احتلا کے شعری دوران
خون کو کم کر کے سوزش کو روک دیتا ہے اور درد و موڑ وغیرہ کو کم کردیتا ہے۔ ہر قسم
کے درد خاصکر متعلق چہرہ ویشانی و دندان و مفصل کے لیے نہایت قوی الاثر ثابت ہوا ہے
دماغ اور احشائے دماغی سوزش میں جبکہ خون زور اور کثرت کو ساتھ جمع ہو رہا ہو جسکی وجہ سے چہرہ
اور آنکھیں سرخ پتلیاں مقبض اور طبیعت سخت بے چین ہو۔ اسکے استعمال سے دوران خون
اعتدال پر آکر تمام علامات درد و سوزش فیلے قرار دی دفع ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب اجتماع خون
ضعف دوران کی وجہ سے ہو جن میں چہرہ پر مردہ اور نیلگوں ہو جاتا۔ پتلیاں کشادہ اور آنکھیں بھی
نیچ جان رہتی ہیں۔ جلیسی میم ہرگز استعمال نہ کرنا چاہیے۔ سخت غصہ بہک اور بایاکی حالت میں جلیسی
میم کے دینے سے طبیعت برقرار ہو سکتی ہے۔ دماغی اور نخاعی منتجائی لٹس میں جلیسی میم دوران
کو مہوار کر کے کسی جگہ کے اجتماع خون اور سوزش کو روک دیتی ہے۔ چونکہ یہ تمام عضلات
کو ڈھیلا کر کے تشنج کو دور کردیتی ہے۔ ایسے کزاز میں مفید ہے جو بے خوابی کہ زیادہ بغیر لادی اور
گھبراہٹ کی وجہ سے ہوا اسکو دفع کرتی ہیں۔

بخارات میلیریا میں بھی اسکو اس بنیاد پر دیتے ہیں کہ یہ تمام ریشوں کو ڈھیلا اور کشادہ کر کے تبخیر زیادہ
کرتی اور فضلات کو خوب خارج کرتی ہے۔ بخارات کہنہ میں جبکہ جگر اور معدہ سخت کمزور ہو جاتے

میں نہایت مفید ثابت ہوئی ہے۔

تیز بخار کی حالت میں جبکہ نبض اسطرح پر ہو۔ ہڈیاں تشنج اور سخت بقیقاری ساتھ ہو تو حرارت کے کم کرنے اور تشنجی حرکات کے دفع کرنے میں جیسی میم بڑا کام دیتی ہے۔

سن سڑوک یعنی احتراق اشمس میں دماغی اجتماع خون اور سوزش کو کم کر کے بہت آرام دیتی ہے۔ وہ عسر الولادت جو سختی اور تشنج فم رحم کی وجہ سے ہو جیسی میم کے دینے سے آسان ہو جاتا ہے۔ جس البول درد رحم و انہیں عسر الطمث اور احتباس الطمث میں نہایت مفید دوا ہے خشک کھانسی۔ دمہ۔ ذات الریہ۔ ذات الحجب میں خراش کو کم درد کو رفع اخراج بلغم کو زیادہ اور سوزش کو دور کر کے سود مند ثابت ہوتی ہے۔

چونکہ بچوں میں ریفلکس فعل نہایت تیز ہوتا ہے کھف تکلیف مثل اخراج دندان قبض اور کرم امعا سے علم تشنج بخار بیہوشی وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں جیسی میم خاص کر مفید ہے ضعف قلب دوران۔ ضعف نخاع دماغ اور سخت کمزوری اور لاغری کی حالت میں اسکا استعمال اندیشہ ناک ہے۔

خمر سفوف چھال ۲ گرین سے ۵ گرین تک۔ فلوڈاکسٹراکٹ اربوند سے ۱۰ بوند تک سالڈاکسٹراکٹ۔

پاگرین سے ۲ گرین تک۔ ٹیکچر ہ بوند سے ۳۰ بوند تک۔ جلیسپیرین یا جلیسی میں جو ایک قسم کا اکسٹراکٹ ہے ۱۰ گرین سے ایک گرین تک جلیسی مینا یا بیسی میا ۱۰ گرین سے ۱۰ گرین تک جلیسی مین ہائڈروکلوراس ۱۰ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

جیمیکا ڈاک وڈ۔ Jemaca Dogwood

پسی ڈیاری تھرائیا۔ یہ ایفون کی طرح خواب آور دافع اوجاع ہے۔ لیکن اوس سے مضرات لینے قبض۔ سکر فادیا ضمہ۔ غثیان۔ گرانی سر جس وغیرہ سے پاک ہے نیز ایفون کی طرح اسکی عادت بھی نہیں ہوتی۔ ہر قسم کے درد کو موقوف کرتی نہایت خوشگوار نیند لاتی۔ لیکن دماغ میں اجتماع خون نہیں پیدا کرتی ہے۔

ہر قسم کی دماغی گھبراہٹ تکلیف ہڈیاں جنون اور بے خوابی کو دور کر کے عجیب سکین اور آرام بخشتی ہے۔ دماغ۔ نخاع اور تمام اعصاب کی سوزش۔ خراش اور درد میں تسکین دینے اور سوزش رفع کرنے کے لحاظ سے ایفون کے ہم پلہ ہے۔ لیکن چونکہ اس کا اثر اوس کی نسبت تھوڑی دیر رہتا ہے۔ اسلئے اسکو بار بار تین چار گھنٹہ کے وقفہ سے دینا چاہیئے۔

اعصابی دردوں میں خواہ کسی مقام کا ہو مثلاً سرچہرہ جڑے۔ وانت۔ آکھے۔ کان۔ گردن۔ کمر۔ گردہ۔ جگہ۔ ران۔ ٹانگ۔ سینہ۔ مفاصل۔ عضلات وغیرہ میں نہایت مفید ثابت ہوئی ہے۔ اسکی اوقات حکایتیں بوناسیم۔ برومائیڈ۔ کلورل۔ کیسیلجین۔ انٹی پائیرین۔ انٹی فبرین۔ باربیتا۔

جیسی میم وغیرہ سے درد میں کچھ بھی تخفیف ظاہر نہیں ہوتی۔ اس کے استعمال نے عجیب معجزہ اثر دکھانے میں مریض کو آرام بخشا ہے اور دونوں کی بے چینی بے خوابی اور طاقت کو آٹا فائبر پر کر رکھا گیا ہے۔ ہڈیاں انخر میں ماریفائلورل اور برومائیڈ سے کسی طرح کم نہیں ہے۔

مردار دانتوں پر لگانا بعض اوقات فوراً درد کو موقوف کر کے مصیبت زدہ مریض کو جو بہت سی ادویہ کی بعد دیگرے آزما کر قطعی مایوس ہو گیا تھا ایک دفعہ بھروسہ اور تسکین بخشتا ہے۔

اعضائے تنفس یعنی ہوائی نالیوں، ہوائی مسامات اور زرخہ پر اسکا ممکن بخندراور دراف تشنج آتا ہوتا ہے اسلئے ہر قسم کی خشک کھانسی، دمہ ہونیکا کف اور تشنج خیمہ میں مفید ہے۔

وجع مفاصل کے دردوں کو تخفیف دیکر دوسرے علاقوں کے واسطے آسانی

کر دیتی ہے۔ آنکھ اور کان کے ہر قسم کے دردوں میں اس کے

کھلانے سے بہت جلد تخفیف ہو جاتی ہے۔ عسر ولادت

عسرت الطمث اور رحم کے دردوں میں نہایت

مفید ثابت ہوتی ہے۔ —

خوم الک

فلوئڈ اکثر اکٹ ۱/۲ ڈرام سے ۲ ڈرام تک۔ خشک اکثر اکٹ ۲/۳ گرین سے ۱۰ گرین تک۔ پنکچر

۲۰ بوند سے ۶۰ بوند تک۔ پسی ڈین ۱/۲ گرین سے ۱/۴ گرین تک۔

پوسٹ پنچ پسی ڈیاکاسفوف ۱۰ گرین سے

۶۰ گرین تک۔ —

فقط

تَمَّتْ بِالْخُسَيْنِ



فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مفيد عام حصه اول ختم شد

السرائق ————— م خا

والمرحوب عبد الحكيم خا - ايم نلى است سرجن پشيان

۸ اکتوبر ۱۵۰۵ء

اللَّهُمَّ اشْفِنَا بِشَفَائِكَ اللَّهُمَّ دَاوِنَا بِدَوَائِكَ

أَرْحَمُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ

خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ جَمْعِينَ

اللهم اغفر لکاتبه (وهو محمد عبد الغزنی عادل) ولقاریه ولساعیه ولمن نظرفیه

مفتاح العرب - اس کے ذریعہ سے معمولی اُردو خواں تمام صرف پر دو مینے میں ایسا حاوی اور مشاق ہو جاتا ہے کہ میزان ششہ صرف میر - دستور المبتدی - فصول الکبریٰ - غمیر - ہایت الخ - کافیہ - شرح ملا وغیرہ سے دو سال میں نہیں سکتا جو صاحب مفتاح القرآن کے بعد اس کو پڑھنا چاہیں وہ ایک مینے میں ہی ختم کر سکتے ہیں - اس کے بعد دوسری کتاب عربی یا بخوی کی ضرورت نہیں رہتی قیمت ۱۰۰۰ محصول اک بذمہ خریدار ہوگا

تشخیص الامراض - اس کتاب میں مفید عام کی طرح تمام امراض لغت کی ترتیب پر درج کئے جا کر ہر ایک مرض کی تعریف - اسباب کیفیت - علامات - امتحان - اور تشخیص درج کئے گئے ہیں - طب - جراحی - امراض قابلہ - امراض بعینہ امراض النسوان - امراض البصیان - امراض البین وغیرہ میں سے کوئی مرض مستثنیٰ نہیں رہا - تمام امراض پر یہ کتاب کامل طور سے حاوی اور جامع ہے - اگرچہ پہلے سے اس کتاب کی نسبت ہمارا ارادہ محض اس قدر تھا کہ ہر ایک مرض کی تعریف اور تشخیص درج کی جاوے - مگر یہ نظر کھیل اسباب و علامات و امتحان و کیفیت کا بھی کامل بیان درج کر دیا گیا ہے - باوجود زیادتی حجم نظر افادہ عام وہی بجا قیمت ۱۰۰۰ محصول اک بذمہ خریدار -

تفسیر سورہ فاتحہ و پارہ اتم - یہ تفسیر القرآن بالقرآن کا ایک علیحدہ جزیہ ہے - قیمت ۶۰

تفسیر پارہ عم - یہ بھی تفسیر القرآن بالقرآن کا ایک علیحدہ جزیہ ہے - قیمت ۲۰

رسالہ عضائے مخصوصہ - اس میں ان تمام امراض مخصوصہ مثلاً آتشک و سوزناک و جربیان و نامردی و خضرات و خلق و عقر - سرعت انزال - احتلام - عسرت لثت - اسقاط وغیرہ کا علاج - جماع کے قواعد اور آداب اور بہت سے ضروری مضامین لغت کی ترتیب پر درج کئے گئے ہیں - نیز تمام ادویہ جو ان عضائے متعلق ہیں درج کی گئی ہیں - زمانہ موجودہ کی تمام خرابیوں اور فسادات کا اس میں کامل علاج ہے - قیمت ۶۰۰ محصول اک بذمہ خریدار -

مفید لہا و الصبیان - اس رسالہ میں ان تمام ناگمانی دکھوں اور دردوں کا علاج ہے جو عورتوں کی خبری دایوں کی نادانی اور واہیات رسوم کی پابندی سے حاملہ اور زچہ اور نوزائیدہ بچوں کو ہمارے ملک میں دبائے عالمگیر کی طرح ہلاک کر رہے ہیں - قیمت ۳۰۰ محصول اک بذمہ خریدار -

تفسیر القرآن بالقرآن النری میں - اس کے بالائی حصہ میں قرآن مجید کا با محاورہ انگریزی ترجمہ ہے اور نیچے تفسیر القرآن بالقرآن کے مطابق حاشیہ چلا جاتا ہے - قرآنی فصاحت و بلاغت کا کسی انسان سے دوسری زبان میں ادا ہونا تو ناممکن ہے - جس قدر میری حد امکان میں تھا میں نے صحیح ترجمہ کر کے کی کوشش کی ہے - اور اس مقام سے جو تمام عالم میں قرآنی تراجم کی نسبت پہلی ہوئی ہے لوگوں کو بیدار کرنا چاہا ہے - خداوند عالم مجھے کامیاب کرے - اگر کوئی صاحب ترجمہ کے متعلق مجھے کسی غلطی کی اطلاع دیں گے - یا کسی مقام پر بہتر الفاظ بتلائیں گے تو میں شکرگزاری کے ساتھ ان کو قبول کروں گا اور آئندہ کو اس سے فائدہ اٹھاؤں گا - اگر مسائل میں اختلاف ہو تو اس کے ساتھ قرآن مجید یا احادیث صحیحہ یا علوم محققہ سے دلائل ساتھ آنے چاہئیں - ورنہ کوئی توجہ نہ کی جاوے گی - قیمت باوجود ان خوبیوں کے صرف چھ ۶

